



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>






3 2044 106 465 214

**Library**  
**Arnold Arboretum**



**of**  
**Harvard University**



AA










*Don't*  
*overroth 8<sup>th</sup> L. et Yach*  
**FLORA FENNICA.**

---

**SUOMEN KASVIO.**

**Uusi parannettu laitos.**

---



Till Kongliga Svenska Vetenskaps  
akademien

Ordre  
of  
Th. Salen

7000  
58

DUPLETT

**Suomalaisen**

# **Kirjallisuuden Seuran**

**Toimituksia.**

---

**24 Osaa**

---

---

**Helsingissä,  
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapainossa,  
1866.**



FLORA FENNICA.

---

SUOMEN KASVIO.

Uusi parannettu laitos,

jonka toimittivat

**E. L. ja Th. Sælan.**

---

---

HELSINGISSÄ,

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapainossa, 1866.

649/19.



59,798  
Oct. 31, 1973

Fl  
47.1  
Sa-ls

• 11/200

## Alkulause ensimmäiseen laitokseen.

*Tarpeellisinten ja hyödyllisinten koulu-oppien sekaan on epäilemättä kasvioppi luettava. Se tarjoaa samassa siehen, kun ruumiinki voimille hyvin sopivaa ja otollista harjoitusta, eikä kun moni muu oppi-aine yksipuolisesti ainoastaan edellisille. En tiedä, mikä paremmin kun kasvioppi totuttaisi harjoittajaansa omavaraiseen tutkintoon ja ulkonaisten erinäisyyksien tarkkaan havaintoon, enkä myös, mikä oppilaiselle saattaisi paremman mielihyvityksen, kun se, että äsken tuntemattomista kukista sai tuttavias itselleen, tuttavias, jotka jälkeenpäinkin usein näkee ja joiden seurassa voipi monta iloista hetkeä viettää, monella suloisella muistolla mieltänsä lohdutella, ettei suuresti kaipaakaan muita joutavias, usein turmelevaisiaki seuroja. Kasvien tutkinto ja niistä omalla työllään selvän saaminen totuttaa hänen vähitellen muistakin ennen tuntemattomista kohdista selvää pyytämään, eikä heti epäilyksiin heittäymään, kun jotain sellaista eteen sattuu.*

*Outoin uusien kasvien etsintö-matkat ahoilla, mummilla, kedoilla, laksoissa, mäillä, vuorilla ja tuntureilla, soissa, rämeissä ja korpiloissa saattaa myös ruumiille kyllä terveellistä liikuntaa, ettei olekkaan suurta vaaraa ja pelkoa kirjan ääressä koukkuun kasvamisesta. Eikä se aika, mikä semmoisiin matkustuksiin kukaan, tule juuri mihinkään lukuun, sillä istua ihminen ei muutenkaan aina jaksa, jonka tähden moni paremman puutteessa etsii väliaikaista liikuntaa turhissa, usein vahingollisissaki huvituksissa.*

*Kasviopin sanotaan myös vaikuttavan siveämielisyttä, tyyneyttä ja lempeyttä harjoittajissansa, joka kyllä onkin*

Till Kongliga ~~Swenska~~ Vetenskaps  
akademien

Ordre  
of  
Th. Selan

7000  
58



**Suomalaisen**

# **Kirjallisuuden Seuran**

**Toimituksia.**

---

**24 Osaa**

---

---

**Helsingissä,**

**Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapainossa,**

**1866.**

Till Kongliga Svenska Vetenskaps  
akademien

Ordkamr  
af  
Th. Selan

7000  
58

**Suomalaisen**

# **Kirjallisuuden Seuran**

**Toimituksia.**

---

**24 Osaa**

---

---

**Helsingissä,**  
**Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapainossa,**  
**1866.**



FLORA FENNICA.

---

SUOMEN KASVIO.

Uusi parannettu laitos,

jonka toimittivat

**E. L. ja Th. Sælan.**

---

HELSINGISSÄ,

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapainossa, 1866.

689/3.



59,798  
Oct. 31, 1973

Fl  
47.1  
Sa-ls

• p1200

## Alkulause ensimmäiseen laitokseen.

*Tarpeellisinten ja hyödyllisinten koulu-oppien sekaan on epäilemättä kasvioppi luettava. Se tarjoaa samassa siehen, kun ruumiinki voimille hyvin sopivaa ja otollista harjoitusta, eikä kun moni muu oppi-aine yksipuolisesti ainoastaan edellisille. En tiedä, mikä paremmin kun kasvioppi totuttaisi harjoittajaansa omavaraiseen tutkintoon ja ulkonaisten erinäisyyksien tarkkaan havaintoon, enkä myös, mikä oppilaiselle saattaisi paremman mielihyvityksen, kun se, että äsken tuntemattomista kukista sai tuttavias itselleen, tuttavias, jotka jälkeensä useinkin näkee ja joiden seurassa voipi monta iloista helkeä viettää, monella suloisella muistolla mieltänsä lohdutella, ettei suuresti kaipaakaan muita joutavias, usein turmelevaisiaki seuroja. Kasvien tutkinto ja niistä omalla työllään selvän saaminen totuttaa hänen vähitellen muistakin ennen tuntemattomista kohdista selvää pyytämään, eikä heti epäilyksiin heittäymään, kun jotain sellaista eteen sattuu.*

*Outoin uusien kasvien etsintö-matkat ahoilla, mürmillä, kedoilla, laksoissa, mäillä, vuorilla ja tuntureilla, soissa, rämeissä ja korpiloissa saattaa myös ruumiille kyllä terveellistä liikuntaa, ettei olekkaan suurta vaaraa ja pelkoa kirjan ääressä koukkuun kasvamisesta. Eikä se aika, mikä semmoisiin matkustuksiin kuuu, tule juuri mihinkään hukkuu, sillä istua ihminen ei muutenkaan aina jaksa, jonka tähden moni paremman puutteessa etsii väliaikaista liikuntaa turhissa, usein vahingollisissaki huutuksissa.*

*Kasviopin sanotaan myös vaikuttavan siveämielisyyttä, tyyneyttä ja lempeyttä harjoittajissansa, joka kyllä onkin*

uskottava asia, sillä monet muutkin ulkonaiset kohdat, joiden vaiheella tulet kauvemmin elämään, usein taivuttavat mielen mukaansa.

*Erisanoista, joita kasviopissa, kuin muissakin itsenäisissä tietohaaroissa tavataan, ei tarvitse kenenkään pelästyä, jotta niiden tähden heittäisi koko kasviopin sikseen. Onhan merimiehilläki paljo omia sanoja, mutta ei kukaan merimieheksi rupeava niitä pelänne. Kasviopin erisanat suomenkielessä eivät paljon eroakkaan tavallisista sanoista, ja toisekseen voipi jo vähemmälläki niiden tuntemisella ruveta erityisiä kasveja tutkimaan, jonka alla erisanat ikään kuin itsestään pian sekiävät ymmärrettäväksi.*

*Melkein tähän tapaan koin jo 13 vuotta sitte kansan opetuksesta kirjoittaissani kasvioppia puohustella\*), eikä ole syytä nytkään toisin siitä ajatellakseni. Sopimattomasti kyllä tähän asti meillä ei ole ollut suomalaista kasvioppia, ja juuri sitä puutosta olenki tällä tekosellani pyytännyt poistaa. Tunsin kyllä jo työhön ruvetessani oman kehnouteni siihen, kun en koskaan olekkaan varsinainen kasvitutkija ollut, ja siitä sitte itse työki vielä monasti uudelleen muistutti minua, vaikka en kuitenkaan hennonnut heittää yritystäni, kun tietämätöntä oli, ottaisiko joku toinen sitä pitkään aikaan toimittaakseensa. Nyt valmistuneena olkoonpa tämä kasvioppi millainen hyvänsä, se ansio on sillä kuitenkin, että on tien raivaajana vastaisille paremmille.*

*Parhaana ja alinomaisena apunani olen käyttänyt seuraavia:*

1. Herbarium Musei Fennici af W. Nylander och Th. Sælan. Helsingf. 1859.
2. Handbok i Skandnaviens Flora af C. Hartman. Stockholm 1858.
3. Svensk Flora af S. Liljeblad. Upsal. 1816.
4. Svensk Botanik 1802—1843.

---

\*) *K. Litteraturblad f. allm. medborgerl. bildning 1847, siv. 12.*

*Ensimmäistä olen seurannut kasvien järjestämisessä ja kasvanto-paikkain osottamisessa. Kun siinä ei kuitenkaan nimitetä muita paikkoja, kun mistä niitä on museon kokoukseen saatu, niin moni kasvi kyllä kasvaa laajemmaltaki Suomessa, kun minkä samat osotukset viittaavat.*

*Enimpien kasvien suku- ja lajiselitys, kukkima-ajan ja kasvi-alan määräys, kasvin tavallisuus tahi harvinaisuus on n:o 2:n mukaan\*). Muutamat Suomen kasvit niissä suhteissa välistä vähän eroavat ruotsalaisista vertaisistansa, jota eroamista kuitenkin harvoin on määrätä taidettu.*

*Kasvien ja kasviosain lääkevoima tahi muu hyöty ja käytäntö on enimmiten n:o 3:n ja 4:n jälkeen. Tässä sopinee muistuttaa, täyden lääkevoiman olevan juurissa ainoastaan varhain keväällä tahi myöhään syksyllä koottuna, kuoriaineissa ennen lehden puhkeamista, varsissa ja lehdissä vähä ennen kukkimista, kukissa ja kukkapäissä juuri kukkimisen alussa, marjoissa ja siemenissä valmistuneina, ja että ne ovat silloin poutasäällä koottavat ja sitte varjo-paikassa, ei päivänpaisteessa, kuivattavat.*

*Lajiselitysten Hartman'ista suomentamisessa on Nurmijärven pitäjän kouhimestari Malakias Kostander minua paljon auttanut. Sammalkasvienki lajiselitykset olivat jo kirjoitettuna valmiit, mutta kun kirja niistä olisi useampaa arkkia suuremmaksi kasvanut ja harvat niitä kuitenkin olisivat kysyä tainneet, niin päätin ne kokonaan pois jättää. Luultavasti on ensi-alkaville jo kylliksi niiden suluselityksestä yksinänsä.*

*Suomalaisia nimiä muutamilla kasveilla oli liiaksiki, toisilla ei ainoatakaan, aivan kuin sanotaanki, hyvällä olevan montaki nimeä, pahalla katoavan ainoanki. Niidenki kasveille, joilla ennestään ei ollut nimeä, olen parhaan taitoni mukaan kokenut suomalaisen nimen saada,*

---

*\*) Jonka rinnalla toisinaan on pidetty Wahlenberg'in Flora Suecica. Hartman'issa löytymättömät suvut ja lajit ovat selitetyt muiden kirjain (Fries'in, Ledebour'in, Fr. Nylander'in j. n. e. tekemäin) avulla.*

joka työ ei juuri olhukaan huokeinta, koska siinä piti lu-  
kuan ottaa milloin kasvien ulkomuoto, milloin sukulaisuus  
toisten kasvien kanssa, milloin niiden lääkevoima tahi mau-  
hyöty ja käytäntö, milloin kasvanto-paikka ja senki seit-  
semän muuta seikkaa.

Toisinto-nimiä en tahtonut pois jättää, vaikka kyllä  
ovatkin sekavia ja epävakaisia. Yhdellä nimellä välistä  
osotetaan monta eri kasvia ja toisen kerran on yhdellä  
kasvilla monta eri nimeä. Kaikessa epävakaisuudessaan  
semmoiset nimet kuitenkin antavat jotain johtoa Suomalais-  
ten miehialasta kasveja suhteen kuin monesta muustaki lä-  
hellisestä seikasta. Ne ovat enimmäksi osaksi tohtori H.  
A. Reinholman kokoamia ja 1850-vuotisessa Suomi-nimi-  
sessä aikakirjassa julkaisemia.

Kun joku vanha latinainen kasvinimi on lajiniingksi  
muutettu, on monella tapana kirjoittaa se isolla alkupuus-  
tavilla, esimerk. *Matricaria Chamomilla*, *Achillea Millefolium*,  
*Artemisia Absinthium*. Sitä tapaa en ole huolinut noudat-  
taa, kun ei lienekkään muuta kun turhamaista oppinäy-  
tettä, eikä sitä ole seurattu edellä mainitussa Herbarium  
Musei Fennici kirjassakaan.

Kasviopillisten erisanain selitys on lyhennetty siitä  
vähän täydellisemmästä, joka tavataan 1858-vuotisessa  
Suomi-kirjassa. Johtosanat päätteillä -hko, -htava, -kas,  
-ke, -kkeinen, -llinen, -mainen, -ton, -ukka, -va j. n. e.  
jotka enimmiten ovat pois jätetyt, kyllä lienevät jo varsi-  
sanansa selityksestä ymmärrettävät. Niin tarkoittaa esi-  
merk. vaaleahko vaalean puoleista, hertahtava, vähin hertan  
muotoista, varreikas, että jollain on varsi, korvake, jotenki  
korvan tapaista osaa, korvakkeinen, korvakkeella varus-  
tettua, kannallinen, kannalla olevaa, kalvomainen, kahvon  
tapaista tahi muotoista, vartaloton, ilman vartalotta olevaa,  
lehdyykkä, pienoista lehteä, varteva, vahvavartista.

Helsingissä Lokakuussa 1860.

E. L.

## Alkusana toiseen laitokseen.

*Tämä uusi Suomen Kasvion laitos ilmaantuu nykyisessä muodossaan kaikin puolin täydellisempänä, kun sen edelläkävijä, v. 1860 painettu kasviopin koelma oli. Viisi uutta kasvisukua ja 52 erityistä lajia, jotka sen ajan jälkeen ovat Suomessa löydetty, ovat tähän lisäksi tulleet. Kasviopilliset tiedesanat ovat tarkemmin selitetyt, järestetyt ja lisätyt paitsi muuta myös tarpeellisimmilla salasiittiöisten tiedesanoilla, jonka ohessa epäsamaisten sijaan on sopivampia mietitty. Luokkain, lahkoin, heimoin, sukuin ja lajien selitykset ovat läpensä korjatut, parannetut ja lisätyt siinäki suhteessa, että monen kasvin kasvanto-ala nyt on taidettu tarkemmin osottaa. Kun ruotsalaiset kasvinimet monellenki ovat paremmin tutut, kun ne enimmäksi osaksi vielä vakaumattomat suomalaiset, niin ovat siitä syystä neki suomalaisten nimien viereen pannut. Sammalkasvien sukuselitykset kuin myöskin Näkinparta-kasvit (Characeæ) sitä vastoin ovat tästä laitoksesta poisjätetyt, koska ne toivottavasti ynnä muiden salasiittiöisten kanssa aikaa saaden tulevat erittäin selitetyksi.*

*Edellä mainituista ja muista parannuksista, joita tämä kirja on saanut, tulee yksinään kiittää Suomen Kasvion tarkkaa ja harrasta tulkijaa, Yliopiston Kasviomuseon amanuensia, lääkintäopin tohtoria Th. Sælania, joka väsymättömällä huolella, tarkkuudella ja ahkeruudella on ne Suomen Kasvion suureksi hyödyksi suosiollisesti toimittanut.*

E. L.

59, 198  
Oct. 31, 1973

FLORA LEZ

FLORA LEZ

FL

47.1

Sa-Is

FLORA LEZ

FLORA LEZ

FLORA LEZ

FLORA LEZ

## Alkulause ensimmäiseen laitokseen.

*Tarpeellisinten ja hyödyllisinten koulu-oppien sekaan on epäilemättä kasvioppi luettava. Se tarjoaa samassa siehän, kun ruumiinki voimille hyvin sopivaa ja otollista harjoitusta, eikä kun moni muu oppi-aine yksipuolisesti ainoastaan edellisille. En tiedä, mikä paremmin kun kasvioppi totuttaisi harjoittajaansa omavaraiseen tutkintoon ja ulkonaisten erinäisyyksien tarkkaan havaintoon, enkä myös, mikä oppilaiselle saattaisi paremman mielihyvityksen, kun se, että äsken tuntemattomista kukista sai tuttavias itselleen, tuttavias, jotka jälkeensäinkin usein näkee ja joiden seurassa voipi monta iloista hetkeä viettää, monella suloisella muistolla mieltänsä lohdutella, ettei suuresti kaipaakaan muita joutavias, usein turmelevaisiaki seuroja. Kasvien tutkinto ja ruumiin koululla työllään selvän saaminen totuttaa hänen välikäsi muistakin ennen tuntemattomista kohdista selvää perustusta. Eikä heti epäilyksiin heittäymään, kun jotain sellaista tapahtuu.*

*Ompelun kasvien etsintö-matkat ahoilla, nurmilla, metsä- ja pelto-alueissa, mäkien rinteillä ja tuntureilla, soissa ja korpeloissa, ja myös ruumille kyllä tervetuloa, ettei kukaan ole vaaraa ja pelkoa. Eikä se aika, kun koulussa koulun koulusta. Eikä se aika, kun matkustetaan, tule juuri mihinkään, vaan ihminen on aina jaksaa, jonka paremmin on etsii väliaikaista liikuntaa useimmiten. Eikä se aika, kun opin se, vaikuttavan siveämielisyyttä, ja leikkiä, jota onkin*



59,798  
Oct. 31, 1973

Fl  
47.1  
Sa-1s

• 11200

## Alkulause ensimmäiseen laitokseen.

*Tarpeellisinten ja hyödyllisinten koulu-oppien sekaan on epäilemättä kasvioppi luettava. Se tarjoaa samassa siehen, kun ruumiinki voimille hyvin sopivaa ja otollista harjoitusta, eikä kun moni muu oppi-aine yksipuolisesti ainoastaan edellisille. En tiedä, mikä paremmin kun kasvioppi totuttaisi harjoittajaansa omavaraiseen tutkintoon ja ulkonaisten erinäisyyksien tarkkaan havaintoon, enkä myös, mikä oppilaiselle saattaisi paremman mielihyvityksen, kun se, että äsken tuntemattomista kukista sai tuttavvia itselleen, tuttavvia, jotka jälkeensä useinkin näkee ja joiden seurassa voipi monta iloaista hetkeä viettää, monella suloisella muistolla mieltänsä lohdutella, ettei suuresti kaipaakaan muita joutavia, usein turmelevaisiaki seuroja. Kasvien tutkinto ja niistä omalla työllään selvän saaminen totuttaa hänen vähitellen muistakin ennen tuntemattomista kohdista selvää pyytämään, eikä heti epäilyksiin heittäymään, kun jotain sellaista eteen sattuu.*

*Outoin uusien kasvien etsintö-matkat ahoilla, mureilla, kedoilla, laksoissa, mäillä, vuorilla ja tuntureilla, soissa, rämeissä ja korpiloissa saattaa myös ruumiille kyllä terveellistä liikuntaa, ettei olekkaan suurta vaaraa ja pelkoa kirjan ääressä koukkuun kasvamisesta. Eikä se aika, mikä semmoisiin matkustuksiin kuha, tule juuri mihinkään hukua, sillä istua ihminen ei muutenkaan aina jaksa, jonka tähden moni paremman puutteessa etsii väliaikaista liikuntaa turhissa, usein vahingollisissaki huvituksissa.*

*Kasviopin sanotaan myös vaikuttavan siveämielisyyttä, tyyneyttä ja lempeyttä harjoittajissansa, joka kyllä onkin*

uskottava asia, sillä monet muulkin ulkonaiset kohdat, joiden vaiheella tulet kauvemmin elämään, usein taivuttavat mielen mukaansa.

*Erisanoista, joita kasviopissa, kuin muissakin itsenäisissä tietohaaroissa tavataan, ei tarvitse kenenkään pelästyä, jotta niiden tähden heittäisi koko kasviopin sikseen. Onhan merimiehilläki paljo omia sanoja, mutta ei kukaan merimieheksi rupeava niitä pelänne. Kasviopin erisanat suomenkielessä eivät paljon eroakkaan tavallisista sanoista, ja toisekseen voipi jo vähemmälläki niiden tuntemisella ruveta erityisiä kasveja tutkimaan, jonka alla erisanat ikään kuin itsestään pian selviävät ymmärrettäväksi.*

*Melkein tähän tapaan koin jo 13 vuotta sitte kansan opetuksesta kirjoittaissani kasvioppia puohustella\*), eikä ole syytä nytkään toisin siitä ajatellakseni. Sopimattomasti kyllä tähän asti meillä ei ole ollut suomalaista kasvioppia, ja juuri sitä puutosta olenki tällä tekosellani pyytänyt poistaa. Tunsin kyllä jo työhön ruvetessani oman kehnouteni siihen, kun en koskaan olekkaan varsinainen kasvitutkija ollut, ja siitä sitte itse työki vielä monasti uudelleen muistutti minua, vaikka en kuitenkaan hennonnut heittää yritystäni, kun tietämätöntä oli, ottaisiko joku toinen sitä pitkään aikaan toimittaakseen. Nyt valmistuneena olkoonpa tämä kasvioppi millainen hyvänsä, se ansio on sillä kuitenkin, että on tien raivaajana vastaisille paremmille.*

*Parhaana ja alinomaisena apunani olen käyttänyt seuraavia:*

1. Herbarium Musei Fennici af W. Nylander och Th. Sælan. Helsingf. 1859.
2. Handbok i Skandinavien's Flora af C. Hartman. Stockholm 1858.
3. Svensk Flora af S. Liljeblad. Upsal. 1816.
4. Svensk Botanik 1802—1843.

---

\*) *K. Litteraturblad f. allm. medborgerl. bildning 1847, siv. 12.*

*Ensimmäistä olen seurannut kasvien järjestämisessä ja kasvanto-paikkain osottamisessa. Kun sinä ei kuitenkaan nimitetä muita paikkoja, kun mistä niitä on museon kokoukseen saatu, niin moni kasvi kyllä kasvaa laajemmaltaki Suomessa, kun minkä samat osotukset viittaavat.*

*Enimpien kasvien suku- ja lajiselitys, kukkima-ajan ja kasvi-alan määräys, kasvin tavallisuus tahi harvinaisuus on n:o 2:n mukaan\*). Muutamat Suomen kasvit niissä suhteissa välistä vähän eroavat ruotsalaisista vertaisistansa, jota eroamista kuitenkin harvoin on määrätä taidettu.*

*Kasvien ja kasviosain lääkevoima tahi muu hyöty ja käytäntö on enimmiten n:o 3:n ja 4:n jälkeen. Tässä sopinee muistuttaa, täyden lääkevoiman olevan juurissa ainoastaan varhain keväällä tahi myöhään syksyllä koottuna, kuoriaineissa ennen lehden puhkeamista, varsissa ja lehdissä vähä ennen kukkimista, kukissa ja kukkapäissä juuri kukkimisen alussa, marjoissa ja siemenissä valmistuneina, ja että ne ovat silloin poutasäällä koottavat ja sitte varjo-paikassa, ei päivänpaisteessa, kuivattavat.*

*Lajiselitysten Hartman'ista suomentamisessa on Nurmijärven pitäjän kouhimestari Malakias Kostander minua paljon auttanut. Sammalkasvienki lajiselitykset olivat jo kirjoitettuna valmiit, mutta kun kirja niistä olisi useampaa arkkia suuremmaksi kasvanut ja harvat niitä kuitenkin olisivat kysyä tainneet, niin päätin ne kokonaan pois jättää. Luultavasti on ensi-alkaville jo kylliksi niiden suse-lityksestä yksinänsä.*

*Suomalaisia nimiä muutamilla kasveilla oli liiaksiki, toisilla ei ainoatakaan, aivan kuin sanotaanki, hyvällä olevan montaki nimeä, pahalla katoavan ainoanki. Niidenki kasveille, joilla ennestään ei ollut nimeä, olen parhaan taitoni mukaan kokenut suomalaisen nimen saada,*

---

*\*) Jonka rinnalla toisinaan on pidetty Wahlenberg'in Flora Suecica. Hartman'issa löytymättömät suvut ja lajit ovat selitetyt muiden kirjain (Fries'in, Ledebour'in, Fr. Nylander'in j. n. e. tekemäin) avulla.*

*joka työ ei juuri ollutkaan huokeinta, koska siinä piti luksun ottaa milloin kasvien ulkomuoto, milloin sukulaisuus toisten kasvien kanssa, milloin niiden lääkevoima tahi mauhyöty ja käytäntö, milloin kasvanto-paikka ja senki seitsemän muuta seikkaa.*

*Toisinto-nimiä en tahtonut pois jättää, vaikka kyllä ovatkin sekavia ja epävakaisia. Yhdellä nimellä välistä osotetaan monta eri kasvia ja toisen kerran on yhdellä kasvulla monta eri nimeä. Kaikessa epävakaisuudessaan semmoiset nimet kuitenkin antavat jotain johtoa Suomalaisen mielialasta kasveja suhteen kuin monesta muustaki lähellisestä seikasta. Ne ovat enimmäksi osaksi tohtori H. A. Reinholman kokoamia ja 1850-vuotisessa Suomi-nimisessä aikakirjassa julkaisemia.*

*Kun joku vanha latinainen kasvinimi on lajinimeksi muutettu, on monella tapana kirjoittaa se isolla alkupuustavilla, esimerk. Matricaria Chamomilla, Achillea Millefolium, Artemisia Absinthium. Sitä tapaa en ole huominnut noudattaa, kun ei lienekkään muuta kun turhamaista oppinäytettä, eikä sitä ole seurattu edellä mainitussa Herbarium Musei Fennici kirjassakaan.*

*Kasviopillisten erisanain selitys on lyhennetty siitä vähän täydellisemmästä, joka tavataan 1858-vuotisessa Suomi-kirjassa. Johtosanat päätteillä -hko, -htava, -kas, -ke, -kkeinen, -llinen, -mainen, -ton, -ukka, -va j. n. e. jotka enimmiten ovat pois jätetyt, kyllä lienevät jo varsisanansa selityksestä ymmärrettävät. Näin tarkoittaa esimerk. vaaleahko vaalean puoleista, hertahtava, vähin hertan muotoista, varrekas, että jollain on varsi, korvake, jotenki korvan tapaista osaa, korvakkeinen, korvakkeella varustettua, kannallinen, kannalla olevaa, kalvomainen, kalvon tapaista tahi muotoista, vartaloton, ilman vartalotta olevaa, lehdykkä, pienoista lehteä, varteva, vahvavartista.*

*Helsingissä Lokakuussa 1860.*

**E. L.**

## Alkusana toiseen laitokseen.

*Tämä uusi Suomen Kasvion laitos ilmaantuu nykyisessä muodossaan kaikin puolin täydellisempänä, kun sen edelläkävijä, v. 1860 painettu kasviopin koelma oli. Viisi uutta kasvisukua ja 52 erityistä lajia, jotka sen ajan jälkeen ovat Suomessa löydetty, ovat tähän lisäksi tulleet. Kasviopilliset tiedesanat ovat tarkemmin selitetyt, järjestetyt ja lisätyt paitsi muuta myös tarpeellisimmilla salasiittiöisten tiedesanoilla, jonka ohessa epäsamaisten sijaan on sopivampia mietitty. Luokkain, lahkoin, heimoin, sukuin ja lajien selitykset ovat läpensä korjatut, parannetut ja lisätyt siinäki suhteessa, että monen kasvin kasvanto-ala nyt on taidettu tarkemmin osottaa. Kun ruotsalaiset kasvinimet monellenki ovat paremmin tutut, kun ne enimmäksi osaksi vielä vakaumattomat suomalaiset, niin ovat siitä syystä neki suomalaisten nimien viereen pannut. Sammalkasvien sukuselitykset kuin myöskin Näkinparta-kasvit (Characeæ) sitä vastoin ovat tästä laitoksesta poisjätetyt, koska ne toivottavasti ynnä muiden salasiittiöisten kanssa aikaa saaden tulevat erittäin selitetyksi.*

*Edellä mainituista ja muista parannuksista, joita tämä kirja on saanut, tulee yksinään kiittää Suomen Kasvion tarkkaa ja harrasta tutkijaa, Yliopiston Kasviomuseon amanuensia, lääkäintäopin tohtoria Th. Sælania, joka väsymättömällä huolella, tarkkuudella ja ahkeruudella on ne Suomen Kasvion suureksi hyödyksi suosiollisesti toimittanut.*

E. L.

## Sanalyhennyksistä ja merkeistä osottaa:

A. — Ahvenanmaalla (Olannissa).	laks. — laksoissa.
ait. — aitovierillä.	leht. — lehtomaissa.
E. — L. — etelästä Lappiin asti ja Lapissaki.	linj. — linja; linjan *).
E. — P. — etelästä Pohjanmaalle asti ja Pohjanmaallaki.	lop. — lopulta, lopullisesti.
ed. — kuin edellinen; katso edellistä.	läht. — lähteitten ympärillä.
erinom. — erinomattain.	m., melk. — melkein.
H. — Hämeessä; heimo; hyöty.	mer. — merirannoilla.
h., harv. — harvoin; harvinainen.	mets. — metsissä.
ist. — istutus; istutettava.	metsist. — metsistynyt.
j. m. — ja muualla.	mäk. — mäkimaissa.
j. n. e. — ja niin edespäin.	niit. — niituilla.
jok. — jokiloissa.	P. — Pohjanmaan pohjoispuolella.
jokivars. — jokivarsilla.	Pe. — Pohjanmaan eteläpuolella.
järv. — järvivesissä.	paik. — paikoissa, paikoilla.
K. — Karjalassa Laatuken ranta- mailla; kukka, kukat; kasvin- paikka.	pelt. — peltomaissa.
k. ed. — kuin edellinen; katso edellistä.	pien. — pientareilla.
kasv. — kasvatettava; kasvate- taan.	pih. — pihoilla.
Ke. — Karjalan eteläpuolella.	pit. — pituinen.
Kp. — Karjalan pohjoispuolella.	pun. — punainen.
Kv. — Karjalassa Wenäjän puo- lella.	päiv. — päivänpaisteessa.
kank. — kankailla.	rant. — rantasilla, rannoilla.
kelt. — keltainen.	rint. — mäki-, ahorinteillä.
kost. — kosteilla paikoilla.	rusk. — ruskea.
kyl. — kylätienoilla.	ryytim. — ryytimaissa.
kylv. — kylvetään; kylvettävä.	räm. — rämeissä.
käyt. — käytetään.	S. — Savossa.
l. — eli; tahi.	sant. — santaisessa maassa.
L. — Lapissa Suomen puolella; luokka.	saviper. — saviperäisessä maassa.
Lv. — Lapissa Wenäjän puolella.	sein. — seinävierillä, seinuksilla.
lait. — laitumilla.	seur. — seuraava; kuin seuraava.
	siem. — siemenet.
	sin. — sininen.
	St. — Satakunnassa.
	T. — Turun puolella.
	t. — tahi, taikka.
	tav. — tavallisesti; tavallinen.
	tien. — tienoilla.
	tievars. — tievarsilla.

\*)  $\frac{1}{10}$  osa tuumaa.

tois. — toisintolaji.  
 tunt. — tunturi; tuntureilla.  
 tuum. — tuuma; tuuman.  
 töyr. — töyräillä.  
 U. — Uudella maalla.  
 us. — usein.  
 vaaks. — vaaksa; vaaksan.  
 valk. — valkea, valkoinen.  
 valm. — valmistuneena.  
 varj. — varjopaikoissa.  
 vehr. — vehreä, viherjä.  
 ves. — vesipaikoissa.  
 vesiper. — vesiperäisillä paikoilla.  
 vet. — vetisillä paikoilla.  
 vilj. — viljöksillä; viljelömailla.  
 vuor. — vuoriseuduilla.  
 väl. — välistä.

y. k. — yksi kun, sama kun.  
 yl. — yleinen; yleisesti.  
 ☉ — vuosinaisella  
 ☽ — kaksivuotisella } juurella.  
 ♄ — monivuotisella }  
 ♀ — pensas- tahi puukasvi.  
 ♀♂ — ruohontapainen pensas.  
 ♂ — hedekukka; hedekasvi.  
 ♀ — emikukka; emikasvi.  
 (—) — vaihteleva edellisen ja seuraavan tunnussanan välillä, esimerkiksi. 1—5 s. o. 1, 2, 3, 4 tahi 5.  
 ☉, ☽, ♄-merkkiä seuraava numero osottaa kuukautta, jona kasvi kukkii, esimerk. 5 toukokuuta, 6 kesäkuuta j. n. e.

### Kasvitutkijain nimilyhennykset:

Adans. — M. Adanson.  
 All. — C. Allioni.  
 Ands. — N. J. Andersson.  
 Andrz. — A. Andrzejowski.  
 Ard. — P. Arduino.  
 Backh. — J. Backhouse.  
 Bechst. — J. M. Bechstein.  
 Benth. — G. Bentham.  
 Bernh. — J. J. Bernhardt.  
 Beurl. — P. J. Beurling.  
 Big. — J. Bigelow.  
 Bl. — M. N. Blytt.  
 Br., Al. — Al. Braun.  
 Br. — R. Brown.  
 Cass. — H. Cassini.  
 Cham. — A. v. Chamisso.  
 Clairv. — Clairville.  
 Coult. — Th. Coulter.  
 Curt. — W. Curtis.  
 Cust. — Custer.  
 DC. — A. P. De Candolle.  
 Desf. — R. L. Desfontaines.

Desv. — Desvaux.  
 Dew. — C. Dewey.  
 Drey. — S. T. N. Dreyer.  
 Dur. — Durieu.  
 Ehrh. — F. Ehrhart.  
 Esch. — Eschscholtz.  
 Fr. — E. Fries.  
 Fröl. — J. A. Frölich.  
 Gärtn. — J. Gärtner.  
 Gaud. — J. Gaudin.  
 Gilib. — J. E. Gilibert.  
 Gmel. — Gmelin.  
 Gochn. — Gochnat.  
 Good. — S. Goodenough.  
 Gren. & Godr. — M. Grenier & M. Godron.  
 Griseb. — A. Grisebach.  
 Gron. — Gronovius.  
 Gunn. — J. E. Gunner.  
 Hall. — A. v. Haller.  
 Haw. — A. H. Haworth.  
 Hayn. — F. G. Hayne.



- l'Hér. — l'Héritier.  
 Hn. — C. J. Hartman.  
 Hoffm. — G. F. Hoffman.  
 Hook. — W. J. Hooker.  
 Hop. — D. H. Hoppe.  
 Horn. — J. W. Horneman.  
 Huds. — W. Hudson.  
 Jacq. — N. J. Jacquin.  
 Juss. — A. L. de Jussieu.  
 Kit. — Waldstein & Kitaibel.  
 Köll. — J. L. Kölle.  
 L. — v. Linné.  
 Læst. — L. L. Læstadius.  
 Lam. — J. B. Monnet de Lamarck.  
 Led. — C. F. Ledebour.  
 Lehm. — Lehman.  
 Lej. — A. L. S. Lejeune.  
 Less. — C. F. Lessing.  
 Light. — J. Lightfoot.  
 Liljebl. — S. Liljeblad.  
 Lindl. — J. Lindley.  
 Lois. — Loiseleur Deslongchamp.  
 Mchx. — Michaux.  
 Med. — F. C. Medicus.  
 Meisn. — C. F. Meisner.  
 Mich. — J. Micheli.  
 Mielich. — Mielichhofer.  
 Mik. — Mikan.  
 MK. — Mertens & Koch.  
 Mühl. — Mühlenberg.  
 Müll. — O. F. Müller.  
 Murr. — J. A. Murray.  
 Myr. — C. G. Myrin.  
 Nutt. — Th. Nuttall.  
 Nyl. — Fr. Nylander.  
 Nym. — C. F. Nyman.  
 Pall. — P. S. Pallas.  
 Panz. — G. W. Panzer.  
 Parl. — F. Parlatore.  
 PB. — Palisot de Beauvois.  
 Pers. — C. H. Persoon.  
 Poir. — J. L. M. Poiret.  
 Poll. — J. A. Pollich.  
 Pourr. — Pourret.  
 Reich. — Reichenbach.  
 Ren. — F. Renealm.  
 Retz. — A. J. Retzius.  
 Rich. — L. C. Richard.  
 Rostk. — F. G. Rostkov.  
 Rottb. — Chr. Fr. Rottböll.  
 RS. — Roemer & Schultes.  
 Rupr. — F. J. Ruprecht.  
 Salisb. — R. A. Salisbury.  
 Schk. — Chr. Schkuhr.  
 Schlecht. — D. v. Schlechtendal.  
 Schleid. — M. J. Schleiden.  
 Schrad. — H. A. Schrader.  
 Schreb. — J. C. D. v. Schreber.  
 Schult. — J. A. Schultes.  
 Schum. — C. F. Schumacher.  
 Scop. — J. Scopoli.  
 Sm. — Smith.  
 Smft. — S. C. Sommerfelt.  
 Sond. — Sonder.  
 Spreng. — Curt Sprengel.  
 Sternb. — C. v. Sternberg.  
 Sw. — Ol. Swartz.  
 Thom. — Thomas.  
 Thuill. — J. L. Thuillier.  
 Tourn. — J. P. de Tournefort.  
 Trin. — C. B. Trinius.  
 Turcz. — Turczaninov.  
 Vaill. — Seb. Vaillant.  
 Waldst. — katso Kit.  
 Wallm. — J. H. Wallman.  
 Wallr. — F. G. Wallroth.  
 Weig. — C. E. Weigel.  
 Wg. — G. Wahlenberg.  
 Wib. — Chr. Wibel.  
 Vill. — D. Villars.  
 Willd. — C. D. Willdenow.  
 Wimm. — Fr. Wimmer.  
 With. — W. Withering.  
 Viv. — D. Viviani.  
 Wrmskj. — Wormskjold.  
 Wulf. — Xav. v. Wulfen.

E. B. — English Botany.	H. M. F. — Herbarium Musei
Fl. D. — Flora Danica.	Fennici.
Fl. L. — Flora Lapponica.	Mant. — Mantissa.
Fl. Su. — Flora Suecica.	N. Fl. — Norges Flora.
Fl. Wett. — Flora der Wetterow.	Sp. pl. — Species plantarum.
Gottl. Fl. — Gottlands Flora.	Sv. B. — Svensk Botanik.

---

# Linnein Kasviluokat.

## Siiteosat selviä.

Kukat kaksineuvoisia.	Heteet emistä erillään.	Heteet eripontisia.	Heteet erin toistaan.	Heteet tasapitkiä t. epäpitkiä.	Heteitä 1 . . . . .	1. Yksiheteisiä (monandria).
					" 2 . . . . .	2. Kaksiheteisiä (diandria).
					" 3 . . . . .	3. Kolmiheteisiä (triandria).
					" 4 . . . . .	4. Neliheteisiä (tetrandria).
					" 5 . . . . .	5. Viisiheteisiä (pentandria).
					" 6 . . . . .	6. Kuusiheteisiä (hexandria).
					" 7 . . . . .	7. Seitsemiheteisiä (heptandria).
					" 8 . . . . .	8. Kahdeksaheteisiä (octandria).
					" 9 . . . . .	9. Yhdeksäheiteisiä (enneandria).
					" 10 . . . . .	10. Kymmenheteisiä (decandria).
Kukat eri-neuvoisia.	Heteet emistä erillään.	Heteet eripontisia.	Heteet erin toistaan.	Heteet tasapitkiä t. epäpitkiä.	" 12-19 . . . . .	11. Kaksitoistaheteisiä (dodecandria).
					" monta { kiinni ver-	12. Parikymmenheteisiä (icosandria).
					"            { hossa	
					"            { kiinni emi-	13. Moniheteisiä (polyandria).
					"            { pohjassa	
					Heteet { 4, joista 2 pidem-	14. Kaksivaltaita (didynamia).
					eripitkiä { pää	
					" { 6, joista 4 pidem-	15. Nelivalentaita (tetradynamia).
					" { pää	
					Palhot { 1:hen kimppuun	16. Yksikuntaisia (monadelphia).
Kukat eri-neuvoisia.	Heteet emistä erillään.	Heteet eripontisia.	Heteet erin toistaan.	Heteet tasapitkiä t. epäpitkiä.	" { 2:hen "	17. Kaksikuntaisia (diadelphia).
					" { moneen "	18. Monikuntaisia (polyadelphia).
					Ponnet yhteen kasvettuneet . . . .	19. Yhdyskukkaisia (syngenesia).
					Heteet (1,2,6) ja emi yhteen kasvettuneet	20. Emiheteisiä (gynandria).
					Hede- ja emikukat samassa kasvissa	21. Yksikotisia (monœcia).
					" " " eri kasveissa . . .	22. Kaksikotisia (diœcia).
					Hede- ja emikukkaa ynnä täysineu-	23. Sekasopuisia (polygamia).
					voisten kanssa.	
					Siiteosat epäselviä . . . . .	24. Salasiittiöitä (cryptogamia).

Edellisestä osotuksesta löydetään siis *luokka*, mihin kukin kasvi kuuluu, ja sikäli tavataan.

- I. Kasvit *ilman* selvittä siiteositta . . . . 24 luokassa.
- II. Ne joiden *kaikki* kukat ovat 2-neuvoisia 1—20 „
- |             |                       |                    |   |
|-------------|-----------------------|--------------------|---|
| 1:llä       | heteellä joko . . . . | 1 tahi 20          | „ |
| 2:lla       | „ „ . . . .           | 2 tahi 20          | „ |
| 3:lla       | „ . . . .             | 3                  | „ |
| 4:llä       | „ joko . . . .        | 4 tahi 14          | „ |
| 5:llä       | „ „ . . . .           | 5, 16, tahi 19     | „ |
| 6:lla       | „ „ . . . .           | 6, 15, 17 tahi 20  | „ |
| 7:llä       | „ . . . .             | 7                  | „ |
| 8:lla       | „ joko . . . .        | 8 tahi 17          | „ |
| 9:llä       | „ . . . .             | 9                  | „ |
| 10:llä      | „ joko . . . .        | 10, 16 tahi 17     | „ |
| 12—19:llä   | „ . . . .             | 11                 | „ |
| 20—1000:lla | „ joko . . . .        | 12, 13, 16 tahi 18 | „ |
- III. Sekä 2- että 1-neuvoisilla kukilla . . . . 23 „
- IV. Ainostaan 1-neuvoisilla „ joko 21 tahi 22 „

Heteitä lukiessa on muistettava, että niiden ponnet siittämisen perästä pian varisevat ja ainoastansa palhot tavallisesti jäävät jälille. Muutamissa kasveissa hedetten luku on epävakainen. Niin esimerk. on *Trientalis*'ella usein vaan 6 hedettä, ehkä tavallisesti 7, jonka tähden se onki *seitsemheteisiin* asetettu. Toisissa harvoissa kasvisuvuissa hedetten luku vaihtelee joko saman varren eri kukissa taikka saman suvun eri lajeissa. Ne semmoiset luetaan siihen luokkaan, mihin suurimman hedelukunsa mukaan kuuluvat. Niin esimerk. tavataan *Monotropa*'n päähimmäisessä kukassa 10 hedettä, muissa ei kun 8. Se luetaan siis *kymmenheteisiin*. *Polygonum*-suvun eri lajit vaihtelevat 5:llä, 6:lla ja 8:lla heteellä, ja luetaan *kahdeksaheteisiin*.

Ne sulkiaisilla (—) erotetut, jota kuta luokkaa, lahkoa tahi lahkojakoa seuraavat kasvisuvut tahi lajit juuri ovat semmoisia epävakaisia. Nimeä seuraavat numerot osottavat, mihin ne oikeastaan kuuluvat. Niin esimerk. tavataan 2:sen luokan kaksemisten perässä (*Anthoxanthum* 3, 2), joka merkitsee, että se kasvi tavataan 3:mannen luokan kaksemisissä, jos sillä joskus ei olisikaan kun ainoastansa 2 hedettä.

Heteet välistä ovat niin kehän peitteessä, ettei niitä ollenkaan näy ilman kehän halkaisematta. *Yhdyskukkaisissa* (19 luokka) ne 5 ponnet ovat yhdistyneet emin ympäri niin, että näyttävät kun yhdeltä. Kaikki semmoiset kasvit ovat kuitenkin luokkansa ja luonnollisen heimonsa (*Synantherea* l. *Compositae*) vuoksi helposti tunnettavat siitä, että niillä tavallisesti on paljo pieniä kukkia

yhdellä pyöreällä pohjalla, niinkuin esimerk. *Voikukalla*, *Ohdakkeella*, *Kissankäpälällä*, *Päivänkukalla* j. n. e. *Orchideæ*-heimossa (20 luokkaa) on hede yhdistynyt emin kanssa niin kutsutuksi *siitintukuksi* 1:llä, harvoin 2:lla, 2-lokeroisella ponnella päässään.

*Lahkot* itsekussaki luokassa ovat sen osituksen mukaan, kun niistä paikallansa on saatava:

1—13 luokassa.	{	Yksemisiä (monogynia).
		Kaksemisiä (digynia).
		Kolmemisiä (trigynia).
		Neliemisiä (tetragynia).
		Viisemisiä (pentagynia).
		Kuusemisiä (hexagynia).
		Seitsenemisiä (heptagynia).
		Kahdeksaemisiä (octagynia).
		Yhdeksäemisiä (enneagynia).
		Kymmenemisiä (decagynia).
14 luokassa.	{	Moniemisiä (polygynia).
		Paljassiemenisiä (gymnospermia).
15 luokassa.	{	Kotassiemenisiä (angiospermia).
		Litukkaisia (siliculosæ).
16—18 luokassa.	{	Liskoisia (siliquosæ).
		Viisiheteisiä (pentandria).
		Kuusiuheteisiä (hexandria).
		Kahdeksaheteisiä (octandria).
		Kymmenheteisiä (decandria).
19 luokassa.	{	Moniheteisiä (polyandria).
		Yksisopuisia (monoclinia).
20 luokassa.	{	Epäsopuisia (polyclinia).
		Yksi-, Kaksiuheteisiä.
21 luokassa.	{	Yksi — Moniheteisiä.
		Yhdisuheteisiä (syngenesia).
22 luokassa.	{	Yksi — Moniheteisiä.
		Yksikuntaisia (monadelphina).
23 luokassa.	{	Yksikotisia (monœcia).
		Kaksikotisia (diœcia).
24 luokassa.	{	Sanikkaisia (filices).
		Sammalia (musci).
		Leviä (algæ).
		Jäkälä (lichenes).
		Sieniä (fungi).

Lahkot usein jakauvat kahteen tahi useampaan eri *jakoon*, merkityt †, ††, ††† j. n. e., ja välistä vielä nämät jaotki pienempiin, tähdeillä \*, \*\*, \*\*\* j. n. e. merkittyihin *osiin*. Kun sitte jota

kuta kasvia tutkittaissa sen heteistä ja niiden luvusta tahi laadusta on tultu tietämään, mihin *luokkaan* se kuuluu, katsotaan sen emistä, hedelmistä ja muista tunnusmerkeistä, mihin *lahkoon*, *jakoon* ja *osaan* se sopii, sikäli kun niiden osotukset kussaki luokassa johdattavat. Isonnuslasilla hedelmän laadun usein saattaa jo ennen hedelmän valmistumistaki nähdä. Toisinaan se kuitenkin on mahdotonta, ja silloin täytyy kasvin muista tunnusmerkeistä sen tarkemmin vaarin ottaa, taikka, missä ne ei anna tarpeeksi selkoa, odottaa kunnes hedelmä joutuu.

Sittekun kasvin *suku* on vasta mainitulla tavalla määrättyksi saatu, etsitään sukuselitettä seuraavan numeron johdolla se *luontaisheimo*, johon sama kasvisuku kuuluu. Jos sitte heimonki selite sopii kasvin kanssa yhteen, niin kyllä jo saapi vakuutettu olla siitä, että tutkittavalle kasville on oikea sukunimensä saatu. Mutta jos heimon selitteessä olisi jotaki vastahakoista, taikka jos kasvi muuten ei oikein soveltuisi mihinkään sukuun siinä luokassa, johon se heteistänsä kuuluisi, niin katsottakoon, eikö sopisi niihin sukuihin, jotka lahkojaon tahi jako-osan jälestä ovat sulkiaisten (—) sisällä nimitetyt.

Suvusta selko saatua mennään sitte saman suvun lajiselitettä katsomaan, että saataisi kasvin *lajikin* määrättyksi, joka niiden paikallansa olevain osviittain johdolla ja vähällä harjaantumisella ei juuri olekkaan mikään erittäin vaikea työ.

Luontaisjärestöstä seuraa jälkeinpäin täydellisempi selitys. Sen 21 luokkaa eri heimoinensa ovat:

## A. — SIRKKALEHTISIÄ

(Cotyledoneæ).

### I. — Yksisirkkaisia

(Monocotyledoneæ).

#### 1 luokka. — *Heinäkukkioita*

(Glumifloræ).

e. 1 heimo. Gramineæ.

#### 2 luokka.

*Puikelokukkioita*  
(Spadicifloræ).

e. 2. Cyperaceæ.

d. 3. Typhaceæ.

c. 4. Potamogetonaceæ.

b. 5. Araceæ.

#### 3 luokka.

*Liljakukkioita*  
(Liliifloræ).

e. 6. Juncaceæ.

d. 7. Nartheciaceæ.

c. 8. Alismaceæ.

b. 9. Colchicaceæ.

a. 10. Liliaceæ.

#### 4 luokka.

*Hedelmäkukkioita*  
(Fructifloræ).

e. 11. Najadaceæ.

c. 12. Hydrocharidaceæ.

b. 13. Iridaceæ.

a. 14. Orchidaceæ.

## II. — Kaksisirkkaisia

(Dicotyledonæ).

1 jakso. — Terähetiöitä (Corollifloræ).

5 luokka. <i>Sikiäisteräisiä</i> (Seminifloræ).	6 luokka. <i>Läpiteräisiä</i> (Annulifloræ).	7 luokka. <i>Torviteräisiä</i> (Tubifloræ).
a. 15. Synantheræ.	a. 20. Campanulaceæ.	a. 27. Oleaceæ.
16. Dipsacaceæ.	21. Lobeliaceæ.	c. 28. Asclepiadaceæ.
b. 17. Valerianaceæ.	b. 22. Convolvulaceæ.	d. 29. Gentianaceæ.
c. 18. Rubiaceæ.	c. 23. Boraginaceæ.	e. 30. Solanaceæ.
q. 19. Caprifoliaceæ.	24. Labiataæ.	31. Personatæ.
	d. 25. Menyanthaceæ.	32. Utriculariaceæ.
	e. 26. Polemoniaceæ.	33. Primulaceæ.
		34. Plantaginaceæ.
		35. Plumbaginaceæ.

2 jakso. — Pohjushetiöitä (Thalamifloræ).

8 luokka. <i>Piehuspohjaisia</i> (Discifloræ).	9 luokka. <i>Kantapohjaisia</i> (Sertifloræ).	10 luokka. <i>Pielipohjaisia</i> (Columnifloræ).
a. 36. Cornaceæ.	a. 40. Nymphaeaceæ.	b. 47. Tiliaceæ.
c. 37. Umbellifereæ.	c. 41. Ranunculaceæ.	48. Malvaceæ.
38. Adoxaceæ.	d. 42. Papaveraceæ.	49. Geraniaceæ.
d. 39. Aceraceæ.	43. Fumariaceæ.	50. Hypericaceæ.
	44. Crucifereæ.	d. 51. Cistaceæ.
	e. 45. Polygalaceæ.	52. Violaceæ.
	46. Balsaminaceæ.	53. Droseraceæ.
		e. 54. Silenaceæ.
		55. Alsinaceæ.
		56. Elatinaceæ.

3 jakso. — Verhohetiöitä (Calycifloræ).

11 luokka. <i>Niekuheteisiä</i> (Faucifloræ).	12 luokka. <i>Piekuheteisiä</i> (Rosifloræ).	13 luokka. <i>Pohjahueteisiä</i> (Centrifloræ).
a. 57. Cucurbitaceæ.	a. 65. Pomaceæ.	b. 69. Ericaceæ.
58. Ribesiaceæ.	c. 66. Rosaceæ.	70. Empetraceæ.
b. 59. Rhamnaceæ.	d. 67. Drupaceæ.	c. 71. Euphorbiaceæ.
c. 60. Saxifragaceæ.	68. Papilionaceæ.	e. 72. Portulacaceæ.
61. Crassulaceæ.		73. Paronychiaceæ.
e. 62. Lythraceæ.		74. Polygonaceæ.
63. Oenotheraceæ.		
64. Haloragidaceæ.		

## 4 jakso. — Vajakukkioita (Incompletæ).

14 luokka.	15 luokka.	16 luokka.
<i>Suojuskukkaisia</i> (Bracteifloræ).	<i>Norkkokukkaisia</i> (Julifloræ).	<i>Kehättömiä</i> (Nudifloræ).
a. 75. Thymeleaceæ.	b. 80. Cupuliferæ.	c. 85. Callitrichaceæ.
76. Elæagnaceæ.	d. 81. Salicaceæ.	e. 86. Ceratophylla- ceæ.
e. 77. Ulmaceæ.	e. 82. Betulaceæ.	
78. Urticaceæ.	83. Myricaceæ.	
79. Chenopodiaceæ.	84. Coniferæ.	

## B. — SIRKATTOMIA

(Nemes).

## III. — Erivartisia

(Heteronemes).

17 luokka.	18 luokka.
<i>Sanikkaisia</i> (Filices).	<i>Sammalkasveja</i> (Musci).
87. Equisetaceæ.	92. Bryacei.
88. Polypodiaceæ.	93. Hepatici.
89. Ophioglossaceæ.	
90. Isoëtaceæ.	
91. Lycopodiaceæ.	

## IV. — Sekovartisia

(Homonemes).

19 luokka.	20 luokka.
<i>Leviä</i> (Algæ).	<i>Jäkähä</i> (Lichenes).

## 21 luokka.

*Sieniä*

(Fungi).

Vasta kuvatussa luontaisjärestössä ne heimonumeron edelliset puustavit *a*, *b*, *c*, *d*, *e* osottavat *lahkoja*, joita hedelmän eri laadun mukaan on 5 kussaki luokassa, vaikka ei Suomen kasveja toki yletykkään joka lahkoon muissa kun 3:nnessa ja 6:nnessa luokassa. Niin merkitsee *a* yhdiskoppista, *b* monikoppista, *c* erikoppista, *d* laita-istukkaisesti yksikoppista, *e* keski-istukkaisesti yksikoppista hedelmää.

Selvemmin, kuin millään muulla tavalla voisi tapahtua, näyttää tämä luontaisjärestön osotus kunki kasviheimon sekä li-



keisemmän että kaukaisemman sukulaisuuden toisten heimoin kanssa. Likeisempää sukua on heimo vierellisten heimoin kanssa samassa luokassa, esimerk. heimo 44 (*Cruciferae*) heimoin 43 (*Fumariaceae*) ja 45 (*Polygalaceae*) kanssa. Kaukaisempaa sukulaisuutta taas ovat samapuustaviset lahkot ei ainoastaan sivullisissa luokissa, vaan niissäki, jotka ovat lähinnä suoraan ylempänä ja alempana toisissa jaksoissa, esimerk. heimo 44 heimoin 25, 39, 51—53, 67 ja 68 kanssa.

---

## Kasviosain selitesanoja.

Kaksi pää-osaa on kasveissa merkittävä: *Juuri* ja *Varsikko*, joista jälkimäinen jakaupi moneen eri osaan. Itsekullaki osalla on monta ominaisuutta, jotka tekevät ne eri kasveissa erilaisiksi. Niiden selittämiseksi tarvitaan vastaavia, osiksi oudompia sanoja.

*Pintansa* vuoksi on itsekuki osa miten milloinkin: *kalju* (glaber), jolla ei ole karvoja; *sileä* (laevis), kun ei ole uurteja, nyyliä eikä muita epätasaisuuksia; *karkea* (asper), pienillä kyhmyillä, nyhillä ja nystyröillä; *karhea* (scaber), epäselvillä, kankeilla karvoilla; *lienteä* (pubescens), lyhyellä, hienolla, tiheällä karvalla; *sametti-nukkainen* (velutinus); *silkkimäinen* (sericeus), hienukaisella, pinta-myötäisellä, tiheällä, silkkikiiltoisella karvalla; *höyteä* (villosus), pitkällä, lahealla, tiheällä karvalla; *karvainen* (pilosus); *hatuinen* (hirsutus), karkea-, pitkä- ja tihukarvainen; *takkuinen* (hispidus), karkea-, paksu- ja harsukarvainen; *kalsea* (hirtus), lyhytkarvaisempi edellistä; *villainen* (lanatus l. lanuginosus); *nutturainen* (floc-cosus), tukkupäisellä villalla eli *nutturoilla* (flocci); *vanukkeinen* (tomentosus), vanuksissa oleva, villainen; *seittinen* t. *lukeinverkkoi-nen* (araneosus l. arachnoideus), hämähäkin verkon tapaan yhteen kutouneilla villakarvoilla; *paljastuva* t. *kaljustuva* (glabrescens), kun karvaisuus aikaa saaden katoaa.

*Ripsikarvainen* t. *ripsinen* (ciliatus), yhtäpitkillä karvoilla jonkun osan (e. m. lehden) reunassa; *parrakas* (barbatus), vihkoisilla karvoilla jonkun osan päässä; *sukainen* t. *sukasinen* (setosus), kankeilla, lieireillä karvoilla; *nojosukainen* (strigosus), kankeilla, lyhemmillä, litteämäisillä, alaspainuneilla karvoilla; *koukkusukai-nen* (setis hamosis, l. hamatis, l. aduncis, l. apice uncinatis), koukeropäisillä sukakarvoilla; *väkäsukainen* (glochidiatus), kun on päässä vastahakaisia, väkämäisiä (glochides), karvoja; *polttisukai-nen* t. *polttava* (urens), polttavilla sukakarvoilla; *pistinsukainen* (aciculosus), kun karvat tarttuvat koskiessa ihoon ja heltiävät juuriltansa; *piikkisukainen*, *piikillinen* (aculeatus), kun karvat (piikit) eivät lähde juuriltansa irti; *pehmytpiikkinen* t. *hakarainen* (muricatus) *pehmeillä piikeillä* t. *hakaroilla* (murices); *kärheä* t. *takis-tava* (adhaerens), hienoilla, väkäpäisillä piikeillä; *koukkupiikkinen*

t. *okainen* (hamulosus), kun piikit ovat väärä- t. koukkupäisiä; *varullinen* (armatus), jolla on oria, piikkejä, poltinsukia j. n. e.; *varuton* (inermis), jolla niitä ei ole.

*Odaksi* (rostrum) sanotaan oramaista tahi neulamaista, suuraa sekä väärää lisäkettä jonkun osan päässä, ja *odattomaksi* (erostriis l. muticus) sitä, jolla ei ole sellaista lisäkettä.

*Piikeistä* (aculei) on itsekuki joko *yksikertainen* (simplex) tahi *halkoinen* (fissus), *haarapäinen* (furcatus), *kaksi-*, *kolmehaarainen* (bi-, trifurcatus), *suora* (rectus), *käyrä* (incurvus), *keikkä* (recurvus), *alaspäin väärä*. Käyrää ja keikkää sanotaan myös yhteisellä sanalla *koukeroiseksi* (aduncus). Myös voivat piikit olla *tukkuisia* (fasciculati), *vastakkaisia* (oppositi), *ulospäisiä* (divergentes) j. n. e. samoite kun haarat ja lehdet, joista edempänä.

*Nyhäinen* (verrucosus) on se pinta jolla on pieniä syyliä tahi nystyröitä; *tahmea* (viscosus, viscidus) ja *jäläinen* (glutinosus), josta tihkuu tarttuvaista nestettä; *härminen* (pruinosis), kun pinnalla on hyvin ohuelta ulospihkunutta vaaleansinertävää, vaksimaista ainetta; *nystykarvainen* (pilis glandulosus), nesteisellä *nystyrällä* (glandula) karvan päässä; *haarakarvainen* (pilis furcatis); *sulkakarvainen* (p. plumosis); *tähtikarvainen* (p. stellatis); *nivelkarvainen* (p. septatis); *kilseinen* (lepidotus), pienoisilla, tähtikarvoista yhteen kasvettuneilla suomukkeilla; *somuin* (squamosus); *kalvosomuin* (paleaceus), ohuilla, kuta kuinki läpinäkyvillä, suomunmoiseksi kasvettuneilla karvoilla; *liisimäinen* (furfuraceus), hyvin pienoisilla suomukkeilla; *kehäinen* (farinosus); *pai-kullinen* (maculatus); *kaarnainen* t. *pullokuvorinen* (suberosus); *uurteinen* t. *juovikas* (sulcatus); *juomuin* (striatus); *pyköinen* (rimosis).

## 1. — Juuri (Radix).

*Juureksi* sanotaan alaspäin kasvavaa kasvin osaa, jolla kasvi oikeastaan on kiinnitetty maahan, saadakseen siitä ainaki enimmänsä ravintonsa.

*Juurenniska* t. *niska* (collum radice), juuren ja varren raja eli välipaikka.

*Lisäjuuret* (radices adventitiæ), varren sivuista, erinomattain nivelistä, sekä haaroista, enimmänsä maanalaisista, juurenmoisista varsimuodostumista lähtevät juuret. Eri laji lisäjuuria ovat

*Ilmajuuret* (radices aëreæ), jotka lähtevät maanpäällisestä varresta ja vasta myöhemmin, jos ollenkaan, joutuvat maahan.

*Pääjuuri* (radix primaria), varren eli kasvikeskustan yhtäjaksoinen pidennys alaspäin, tavataan enimmänsä vuosinaisissa ja kaksivuotisissa kasveissa, ja on ulkonaisen laatunsa suhteen: *yksikertainen* (r. simplex) juuri, joka alkuansa on yhtenä, jos sitte alempana jakauisiksi; *moniperäinen* (r. multiplex), heti alusta jaka-

unut; *haaraton* (r. integra), yksikertainen, jolla ei ole kun ainoastaan *hapsia* (fibrillæ); *kokonainen* (r. integerrima), yksikertainen haaraton sekä hapsiton; *haarova* (r. ramosa), enimmäiten säännötömästi haaroteltu; *paalujuuri* (r. palaris), kun juuren keskimäinen osa eli runko on pitkin pituuttansa aina päähän asti haaroja paljon vahvempi, niinkuin esimerk. meidän maan metsäpuissa. Juuren pään ja haaroin pienimpiä haarotuksia sanotaan *hapsiksi* eli *juurihapsiksi* (fibrillæ), jotka usein, erittäinki päätä vasten, ovat peitetyt hienoilla haivenilla, eri nimeltänsä *juurihöyty* (capillus radicalis). Kun pääjuuri ei ole kehkeytnyt, vaan sen sijassa varren alipäästä lähtee joukko hapsimaisia lisäjuuria, syntyy *hapsinen* juuri (r. fibrosa l. fibrillosa); kun kaikki tahi osa näistä juurihapsista ovat paksuneet sanotaan juuri olevan *kimputtu* (r. fasciculata), Kuv. 1; *tupastava* (r. caespitosa) on se juuri, jonka niskasilmikoista vuosittain kasvava uusia varsia ja juuria yhteen kutouten entisten kuihtuneitten kanssa tuppaaaksi eli mättääksi; *rönsyävä* (r. stolonifera), jonka niskasta kasvaa *lehtivesoja* t. *rönsyjä* (stolones) varren ympäri; *suomuniskainen* (r. stipata), suomumaisilla hilseillä niskan ympäritse; *karvaniskainen* (r. comosa); *yksivartinen* (r. unicaulis), josta nousee ainoastaan yksi varsi; *monivartinen* (r. multicaulis), josta lähtee useampaa vartta.

Muotoansa on juuri: *tappimainen* (r. fusiformis), keskeltä paksumpi, pitkulainen, haaraton; *keilamainen* (r. conica), niskasta alkain vähitellen hoikkeneva; *naurimoinen* (r. napiformis), niskasta pullakka, alemmaa hoikalla hännällä; *mahkurainen* (r. tuberosa), haarat paikottain tursuneet pyöreiksi tahi mukulaisiksi kyhmyiksi; *helminauhainen* (r. moniliformis), useammilla pienillä mahkuroilla eli nyylillä toinen toisensa perästä joka haarassa; *rippu-nyyläinen* (r. filipendula), harvemmillä, ikään kuin rippuvilla nyylillä eli myhkyröillä; *rihmamainen* (r. filiformis), rihmanpaksuinen; *typätty* (r. præmorsa), typäkkä, ikään kuin poikki purtu päästä.

Suuntaansa katsoen on juuri: *pystäinen* (r. perpendicularis l. verticalis); *uloskohtainen* t. *lojottava* (r. horizontalis); *kallava* (r. obliqua).

Kiinteytensä eli sisuslaatuksensa vuoksi on se: *tihkeä* (r. carnosa), e. m. nauris; *mehevä* (r. succosa); *maitias* (r. lactescens); *puutava* (r. lignosa), sitkeää, puuntapaista ainetta.

Kestäväisyytensä vuoksi on juuri: *vuosinainen* (r. annua l. fugax); *monivuotinen* (r. perennis); *kaksivuotinen* (r. biennis l. vivax), ensi vuotena tavallisesti ei tekevä kun varren, toisella kukkiva ja siementyvä, sen jälkeen katoava, e. m. nauris; *talvehtiva* (r. perennans), kukkimisen ja siementymisen jälkeen vielä jonkun vuoden kasvava.

Muist. — Muutamilla harvalukuisilla kasveilla on juurensa vedessä, ja monta löytyy, jotka ovat toisiin kasveihin juurtuneet. Näitä jälkimäisiä sanotaan *loiskasveiksi* eli *loisioiksi* (plantæ parasiticæ). Ne ovat kahta laatua, toiset *varsinaisia*, toiset *epäperäisiä loisioita*. Edelliset ovat sellaisia, jotka kasvavat muilla eleksivillä kasveilla ja saavat ravintonsa niiden nestelistä, jälkimäiset ovat liittyneet muiden kasvien pintaan, mutta eivät saa niistä ravintoansa.

## 2. — Varsikko (Cormus).

Juuresta nousevaa kasviosaa sanotaan yhteisellä nimellä *varsikoksi*, joka tavallisesti on maan päällä, mutta muutamissa kasveissa kokonansa tahi osiksi maan sisälläki. Maan-alaista varsikkoa ennen arveltiin ja tavallisesti vieläki sanotaan juureksi, vaikka se ylöspäin kasvamallansa, hilseisillä lehtien jäännöksillä ja silmikoillansa selvästi osottaa samaa laatua olevansa, kun muuki varsi.

Maan-alaisen varsikon eri lajia ovat *Sipuli*, *Mukula* ja *Juurakko*.

### a. — Sipulista.

*Sipuli* (bulbus), lyhyt, käpertynyt varren-osa päälletysten röyköttyneillä, hilseisillä kuoruslehdillä, Kuv. 47, b.

*Sipulin sydän* t. *kehrä* (lecus) on sipulin hyvin kutistunut, maanalainen varsikkoosa, jossa sipulin silmikko tavataan ja josta sen yksikertaiset juurihapsit lähtevät maahan.

*Hilseinen* (b. tunicatus), on sipuli, jonka lehdet ovat leveinä, monikertaisina kalvokääreinä; *verkkosuoninen* (b. reticulatus), verkontapaisilla ristisuonilla; *töyhtöinen* (b. fimbriatus), kun suonet yhdistyvät hepsupääksi; *liistoinen* (b. foliosus), lehtisellä eli liistoisella kuorella; *suomuinen* (b. squamosus).

*Sikiösipuleiksi* (bulbuli) sanotaan niitä sipulimaisia sivusilmikoita, jotka sipulin kehrästä kasvavat sen kalvosoppilaihin. Jos niitä on enemmän kalvosoppiloissa, niin saapi sipuli siitä nimensä *monisikiöinen* (b. compositus) ja näitä nuoria sipuleita yhteensä sanotaan *sipulin sikiöksi* (proles bulbi), koska ne ennemmin tahi myöhemmin eriävät emäsipulista uusiksi, itsevaraisiksi kasveiksi. Tämän ja seuraavan lajin välimuodostumana on *pakkasipuli* (bulbotuber), jonka sisuskuoret ovat kasvettuneet yhdenmoiseksi, kiinteäksi aineeksi kuivettuneitten kalvoin sisälle.

Muist. — *Sipuliumput* t. *-silmikot* (bulbilli) ovat pieniä, sipulimaisia kavaimia, jotka tavataan maasta ylempänä olevissa kasvin osissa ja ovat muodostuneet muuttuneista, sikistyneistä ja lihouneista lehti- tahi kukkasilmikoista. Näillä on sijansa joko lehtihangassa tahi, jos ovat alkunsa saaneet muuttuneista kukkasilmikoista, kukinnossa, ja ne voivat emäkasvista erittyänsä muodostua uusiksi, itsenäisiksi kasveiksi.

## b. — Mukulasta.

*Mukula* (tuber), täyteinen, turpea tahi möyheämpi maanalainen varren-osa, jonka silmikoista sikiää uusia kasveja ja jonka lehtiosat tuskin ovat alullakaan, Kuv. 2; sillä on seuraavia tunnus-sanoja: *jakaumaton* (tuber indivisum), joka taas on joko *palleroinen* (t. globosum) tahi *pitkänpalleroinen* (t. oblongatum l. oblongo-rotundatum); *kümmeikkäinen* t. *sormijakoinen* (t. palmatum); *kaksoismukulat* (tubera geminata), joista toinen, tavallisesti vanhempi, josta maanpäällinen kasvi lähtee, on kurtuttainen, rypyliäinen, vaan se toinen nuorempi sileä ja mehevä, jossa seuraavana vuotena ilmautuvan kasvin silmikko tavataan; *nysteröinen* (t. granulatatum) on se, jossa on monta pientä, yhteen nyhertynyttä mukulaa.

## c. — Juurakosta.

*Juurakko* (rhizoma), erästen kasvien tavallisesti maanalainen varren-osa, joka sivuiltansa työntää lisäjuuria ja jonka ylipäästä vuositain kasvaa uusi varsi maan päälle, Kuv. 3. Se on enimmäkseen haaroileva ja nivelikäs tupenmoisilla tahi suomumaisilla lehden-  
nöillä taikka jäännösmerkeillä edellisen vuoden kuihtuneista lehdistä. Juurakolla on seuraavia erotussanoja: *suikertava* (rhizoma repens), maan pinnassa venyvä eli loikertava; *nivelikäs* (rh. articulatum); *solmikas* (rh. nodosum); *typpäkkä* (rh. præmorsum l. succisum), lyhyt ja ikään kuin katkaistu päästä.

Maan-päällisen varsikon eri osia ovat *Emävarsi* (truncus, caulis), *Haarat* (rami), *Oksat* eli *Haarukat* (ramuli), *Lehdet* (folia), *Suojuslehdet* (bracteæ), *Apulehdet* (stipulæ), *Silmät* eli *Silmikot* (gemmae), *Kukka* (flos), *Siittimet* (partes fructificationis) ja *Hedelmä* (fructus).

## a. — Emävarresta.

*Runko* t. *puuvarsi* (truncus), haaroiva ja oksiva, kiinteä-aineinen ja monivuotinen (puilla ja pensailla). Meidän maan puuvarsissa tavataan lustoina eli syinä sydämen ympärillä useampia vuotuisia puuaineen kerroksia ja kuori nuorimman kerroksen päällä. *Puinen* (truncus arboreus) on runko, milloin se vasta maasta ylempänä jakaupi haaroihin ja oksiin, jotka sitte uusilla haarottumilla muodostavat latvan; *pensainen* (tr. fruticosus), maasta alkain jakauva isompiin haaroihin; *pensastava* (tr. suffruticosus), haarat ovat tyvestä kiinteä-aineisia ja monivuotisia, ylempää ruohomaisia, vuosittain lakastuvia.

*Palmuvarsi* (cauloma l. caudex), tasapaksu, puinen, tav. haaraton, erottamattomalla sydän-, puu- ja kuorikerralla, Kuv. 4 a.

*Korsi t. heinävarsi* (culmus), heinäkasvien pillikäs, solmunivelinen, tuppilehtinen varsi; vahvempaa sanotaan *oleksi*, Kuv. 5.

*Ruoko* (calamus) nivelitön, hohka-aineinen, ei pillikäs korsi.

*Ruohovarsi t. varsi* (caulis), pehmeä laatuansa, eikä ollenkaan taikka vaan osiksi puutava, vuosittain lakastuva, lehditetty.

*Vana* (scapus) on sipulista, mukulasta tahi juurakosta nouseva, tavallisesti lehdetön eli alaston kukallinen varsi, Kuv. 7 a, 47 c.

*Täyteinen* (c. solidus), varsi joka läpensä on yhtä välitöntä ainetta; *pillikäs* (c. fistulosus), tyhjä sisältä; *pullakka* (c. inflatus), pillikäs ja pöhökäs; *runsasytyinen t. ytevä* (c. medullusus), tavallisesti vahvemmalla ytimellä; *hohkamainen t. sienettävä* (c. spongiosus), täynnä pieniä kolosia; *mehinen* (c. succulentus), runsaalla vehreällä tahi vedenkarvaisella nesteellä; *hentoinen* (c. latus) ja *hoikka* (c. debilis), tuskin pystössä pysyvä; *velitto t. hervoton* (c. flaccidus), joka ei ollenkaan kestä pystössä; *tankea t. tönkeä* (c. rigidus), taivuttaissa katkeava; *notkea* (c. flexilis), katkeamatta taipuva; *sitkeä* (c. tenax), työläästi taittuva; *hauras* (c. fragilis), helposti katkeava.

*Solmikas t. solmunivelinen* (c. nodosus l. nodoso-articulatus), varsi jolla on useampaa *solmuilla* (nodi) erotettua jaksoa eli *solmuväliä* (internodium), e. m. olella, Kuv. 5 e; *nivelikäs t. hoikkanelinen* (c. articulatus l. constricto-articulatus), solmut ovat pehmeämpiä ja hoikempia; *yhtenäinen* (c. continuus l. contiguus), jolla ei ole eri jaksoja; *solmuton t. nivelitön* (c. enodosus l. exarticulatus); *lieretä* (c. teres), tasaympyräinen ilman kulmitta, pyöreällä poikkileikkauksen jäljellä; *puolilieretä t. sivupuolinen* (c. semiteres), poikkileikkauksen jälki toiselta puolen suora, toiselta pyöreä; *littedäinen* (c. compressus), kaksisivuinen, pyöreänäinen; *littedä* (c. complanatus), ohuempi edellistä; *kaksisärmikäs* (c. anceps), kahdella terävällä, vastapäisellä syrjällä; *kulmikas* (c. angulatus), harjumaaisesti kohonneilla sivuilla; *nulokulmainen* (c. obtusangulus), tylppämaisilla harjuilla; *särmikäs* (c. acutangulus), terävillä kulmilla; *ohutsärmäinen* (c. acutissangulus), vieläki teräväkulmaisempi; *kolmi — kuusi-, monikulmainen* (c. tri — hexa-, polygonus), 3 — 6:lla, monella keherällä kulmain välisellä sivulla; *kolmi — kymmentahkoinen* (c. tri — decemqueter), niin monella tasaisella sivulla; *kolmi — kuusi-, monisärmäinen* (c. tri — sex-, multangularis), niin monella kouruisella sivulla jo ohuella terämaisellä syrjällä; *nauhamainen* (c. fasciatus), useammasta varresta yhteenkasvettunut.

*Lehtinen* (c. foliatus), lehdillä varustettu varsi; *lehvakka t. lehtevä* (c. foliosus), runsaslehtien; *lehdetön* (c. aphyllus); *tupillinen t. tuppikäärinen* (c. vaginatus), varren ympärillä on tuppimaisia,

usein lehdestyviä kääreitä, Kuv. 5 d, 11 b; *suomuinen* (c. squamosus); *suomukainen* (c. squamulosus), hyvin pienoisilla suomuilla; *paanuttu* t. *limittäinen* (c. imbricatus), päälletysten limitetyillä suomuilla tahi lehdillä peitetty; *siivikkä* (c. alatus), kaksi vastakkaista syrjää ovat lehtimäisesti levenneitä, Kuv. 8 f; *apulehtinen* (c. stipulatus); *apulehdetön* (c. exstipulatus); *paljas* (c. nudus); *juovikas* (c. sulcatus), pitkittäisillä syvemmillä juovilla eli uurteilla; *uurteinen* (c. tenuiter sulcatus) matalammilla juovilla; *juomuinen* (c. striatus) ihan mataloilla juovilla t. viivoilla.

*Pysty* t. *pystöinen* (c. erectus), suoraan ylös maasta nouseva varsi; *kallas* t. *kalteva* (c. obliquus), kallellaan; *suora* (c. rectus), mutkiton; *piukka* (c. strictus), suora ja tankea; *mutkiva* (c. flexuosus), sinne tänne väärä; *polviva* (c. geniculatus), erisuuntaisilla solmuväleillä; *koheneva* (c. adscendens), tyvipuoli maassa tahi kallellaan, latvapuoli pysty; *kaareva* (c. curvatus l. arcuatus), kaaressa ylöspäin; *lenko* (c. declinatus), tyveltä pystössä, latvempaa alaskaareva; *nuoktuva* (c. nutans), pää kallellaan; *noukahtava* (c. cernuus), vähemmin kallellaan päästä; *rippuva* (c. pendulus), toisiin kasveihin, kalliovieriin tahi muihin aineisiin juurtunut ja varrelaan alas roikottava; *rento* (c. procumbens), maassa makaava ilman juuria tekemättä; *lama* (c. prostratus l. humifusus), haaroinensaki maassa; *laitto* t. *laiehtiva* (c. fluitans), veden kalvolla makaava; *sukertava* (c. repens), maassa makaava ja juuria maahan lähettävä; *longertava* (c. sarmentosus) ja *loikertava* (c. reptans), juuria lähtee harvemmalta maahan ja väljaksot eivät makaa aivan maassa kiinni; *kiiveksivä* t. *juurrehtiva* (c. radicans), pienoisilla ilmajuurilla tarttava muihin aineisiin ja niitä myöten kohotteleiva, Kuv. 9 c; *väänneliäs* (c. scandens), muiden kasvien tahi ainetten varassa nouseva ja niihin *kärheillään* (cirrhi) tahi hakoillaan takistuva, Kuv. 8 e; *köynneliäs* (c. volubilis), kiertyvä jonkun muun kasvin tahi aineen ympäri joko *vastoin päivää* (c. volubilis dextrorsum) e. m. humala, tahi *myöten päivää* (c. vol. sinistrorsum) e. m. salkopapu.

*Yksikertainen* (c. simplex), varsi haaraton, kukat haarovia; *ihan yksikertainen* (c. simplicissimus), ei varsi- eikä kukkahaarukoilla; *haarova* (c. ramosus); *haarikas* t. *monihaarainen* (c. ramosissimus), paljoilla ja uudelleen haarovilla haaroilla; *yltävä* t. *löpöittävä* (c. excurrent l. integer), pitkin pituuttaan aina latvaan asti selvästi haaroistaan erotettava, e. m. havupuissa; *haihtohaarainen*, *haihtuva* t. *sortuva* (c. deliquescent), kun varsi sortuu haaroiksi, joista sitä lopulta ei taida erottaa, e. m. lehtipuissa; *latvavarainen* (c. prolifer), kun uusia haaroja ja lehtiä lähtee ainoastansa latvasta; *toishaarukainen* (c. dichotomus), jakauva kahdeksi haa-



raksi ja haarat eteenpäin kahdeksi haarukkaaksi; *kolmishaarukkainen* (c. trichotomus), kerroten jakauva kolmeksi haarukkaaksi; *ristihaarainen* (c. brachiatus), haarat vastakkaisia ja ristissä toisen vastakkaisen haaraparin kanssa; *pitkittävä* (c. indeterminatus), sivulta kukkiessaan latvasta pitkittävä kasvunsa; *rajattu* (c. determinatus), latvasta kukkiva ja siihen kasvunsa päättävä.

Erittäin merkittäviä varressa ovat *ydin* (medulla), *puuaine* (lignum), *kuori* (cortex). Puuaineessa on kaksi erikertaa, sisämäinen kovempi *sydänpuu* (duramen) ja ulkomainen pehmeämpi ja tavallisesti valkeampi *manto* eli *pintapuu* (alburnum). Kuoressa samoin on useampaa erikertaa, ensin puuta vasten *nila* t. *niini* (liber), sitte *välikuori* (periderma) ja päällimmäisnä *närvi* t. *ketto* (epidermis).

## b. — Haaroista.

*Vastakkaisia* (rami oppositi), ovat haarat, kun ovat vastapäätä, toinen toisella, toinen toisella puolella vartta; *vuorottaisia* (r. alterni), kun lähtevät ympäri vartta toinen toistansa ylempää; *ristikkäisiä* (r. brachiati), ristittäin vastakkaisia; *kahtaallisia* t. *kahdappäisiä* (r. distichi), päällensä ei kun kahta suuntaa; *härkikillisiä* (r. verticillati), kolme tahi useampaa haaraa lähtee yhtä korkealta kuki suunnallensa; *erindäisiä* (r. sparsi), kun lähtevät sieltä täältä ympäri vartta; *hajallisia* (r. remoti), enemmän toisistaan erillään; *lähinäisiä* (r. conferti l. approximati), tiheässä ja liketysten; *sisäpäisiä* (r. coarctati), latvoillaan varteen päin kääntyneitä; *tasalatvaisia* (r. fastigiati), kun ovat eri paikoista lähteneitä ja latvoin yhtä korkealla, jolloin myös itseä vartta sanotaan *tasalatvaiseksi*.

*Vitsamainen* (ramus virgatus), hoikka, pitkä ja melkein haaromaton haara; *pystöndäinen* (r. erectus); *ulostyvinen* (r. parallelopatens), alkuansa ulospäinen, sitte pystönäinen; *varsimyödyäinen* (r. adpressus), pitkin vartta kasvava; *siirottava* t. *ylöspäinen* (r. patens), suippokulmaisella haarahangalla; *ulospäinen* t. *lojottava* (r. divergens, horizontalis, diffusus, divaricatus l. patentissimus) suoraan varresta ulospäin; *alaskaareva* (r. deflexus); *alaspäinen* (r. reflexus l. refractus), kaarettomasti alaspäin vartta vasten; *taaspäinen* (r. retroflexus), alaspäin mutkainen; *rippuva* (r. pendulus), veltto ja suoraan alaspäinen.

*Haarahanka* (ala) on haaran ja varren välikulma, ja *haarahankainen* (alaris), haarahangassa oleva tahi siitä lähtevä.

Erilaatuisia haaroja ja haara-osia ovat:

*Lonkero* (sarmentum), maassa kulkeva, lehdetön, usein kou-

keroinen hyötöhaara, jonka päästä kasvaa lehtiä ja unsia juuria, Kuv. 6 c.

*Rönsy* (stolo l. flagellum), maasta kohoamaton lehdekäs haara, jonka alapuolelta paikoin kasvaa juuria maahan ja päästä lehtiä, välistä kukkiaki, Kuv. 7 b. *Kerkkä* t. *kasvanne* (turio), haaran tahi varren vuotuinen lisä.

*Ora* (spina), keskieräinen kova, pistävä oksan käperö, lähtevä, kuin muutki oksat, varren puuaineesta, kun *piikit* (aculei) lähtevät ainoastaan kuoresta.

*Kärhi* (cirrhus) rihmamainen ja usein kierteinen haaran pidentmys, jolla kasvi tarttuu muihin aineisiin, Kuv. 8 e. Kärhet toisinaan lähtevät lehden ruodista tahi keskisuonesta, välistä kukkaperästäki.

### c. — Lehdistä.

*Sirkkalehdet* (cotyledones), ensimmäiset itulehdet, Kuv. 10 a.

*Aluslehdet* (folia radicalia), lähtevät varren alimmaisesta päästä, Kuv. 6 b, 7 c.

*Varsilehdet* (f. caulina) ja *haaralehdet*, *oksalehdet* (f. ramea) lähtevät varresta, haaroista tahi oksista, Kuv. 10 b.

*Kukkalehdet* (f. floralia), lähellä kukkia, Kuv. 10 c.

*Lehtihanka* (axillum), lehden ja varren välikulma, ja *lehtihankainen* (axillaris), lehtihangassa oleva tahi siitä lähtevä.

*Lehtilapa* (lamina) on lehden levennyt osa eli sen levy, Kuv. 6 b, 9 b, jota vastaan

*Lehtiruoti* t. *ruoti* (petiolus) on se soukistunut, hoikempi lehden tyviosa, jolla se on varressa kiinni, Kuv. 6 a, 9 a.

*Lehden päällystä* (pagina superior);

— *alusta* (pagina inferior);

— *kanta* (basis folii), varren tahi ruodin puolinen laita;

— *pää* (apex folii), kantaa vastapäinen laita;

— *laita* (margo), ympärys, reuna, ääri eli syrjä.

Tavallisia ruodin erotuksia ovat:

*kupuva* (petiolus ventricosus), keskeltä tursea eli pöyheä; *tuppi-*  
*mainen* (p. vaginans), varren puolelta laajennut ja tupenmoisesti  
sen ympäri kääriytynyt, Kuv. 11 a.

*Tuppi* on milloin lehdestävä (vagina foliifera), lehdeksi muuttuva, milloin lehdestymätön (v. aphylla); *halkinainen* (v. fissa), kun se on auki lehden vastaiselta puolelta, niinkuin heinäkasveissa; *kokonainen* t. *umpinainen* (v. integra) yhteenkasvaneilla laidoilla, nk. Sarakasveissa; *pullea* (v. inflata).

*Kourumainen* (petiolus canaliculatus) on pitkinpään rästäskourun lailla kovertunut ruoti; *litistynyt* (p. dilatatus), yhteenpaimunut joko sivuiltapäin tahi päältä ja alta; *siivikäs* (p. alatus), kah-

della lehtimäisellä syrjällä, Kuv. 8 a; *kärhikäs* (p. cirrhiferus), kärheksi jatkuva; *lehdentö* (phyllodium), lehtimäisesti laajennut lavaton ruoti.

*Ruodikas* (folium petiolatum), jolla on ruoti, Kuv. 7 c, 9 b; *ruoditon* (f. sessile), suoraan varressa kiinni, Kuv. 12 a; *johteinen* (f. decurrens), kannastaan jatkuva ja juokseva vartta myöten alas seuraavaan lehteen asti; *puolijohteinen* (f. semidecurrens), kun juoksee vaan puoliväliin; *sepivä* t. *sepokantainen* (f. amplexicaule l. amplexens), kannallaan varren ympäri, Kuv. 12 b; *puolisepoinen* (f. semiamplexicaule), vaan puolen vartta kiertävä; *läpikantainen* (f. perfoliatum), varsi käypi lehden kannasta läpi, Kuv. 12 c; *yhtynyt* (f. connatum), kahdesta vastakkaisesta lehdestä niin yhteen kasvanut, että näyttää kun olisi vaan yksi lehti, ja varsi sen läpi pistäynyt.

*Silposuoninen* (f. simplicinerve l. nervosum), jonka suonet ei haarau; *haarasuoninen* (f. ramosinerve l. venosum), haaraisilla suonilla; *verkkosuoninen* (f. reticulato-venosum), suonihaarat juoksevat ristin rastin toisiinsa yhtyen; *tasasuoninen* (f. parallelinerve), silposuonisen lehden suonet juoksevat suoraan ja tasasuuntaisesti pitkin lehteä; *kaarisuoninen* (f. curvinerve), kaarevilla suonilla, Kuv. 28; *tukkusuoninen* (f. diverginerve), useampia silposuonia on tyvestä yhdessä tukussa; *sulkasuoninen* (f. penni- l. pinnatinerve), keskisuonesta kummallenko puolelle lähtevillä, sulantapaisesti haarauneilla suonilla, Kuv. 13, 14; *kourasuoninen* (f. palmatinerve), kannasta lähtee yhdestä paikkaa melkein tasavahvuisia suonia ympärinsä lehden laitaan, Kuv. 15, 16, 17; *kilpisuoninen* (f. pelti- l. stellinerve) tahi *kilpimäinen* (f. peltatum), ruotia vasten lähtevillä, säteemäisillä suonilla yltä ympärinsä, jotta ruoti on keskellä emälehteä alla puolen, kuin varsi männässä, Kuv. 18; *kantasuoninen* (f. pedatinerve), kannasta lähtee kaksi hyvin haarottavaa emäsuonta (toisinaan niiden välissä vielä kolmaski pienempi), ja niistä uusia suonihaarukoita lehden päähän, Kuv. 19.

*Yksikertainen* (f. simplex), ruodilla on vaan yksi lehti; *toisikertainen* t. *liittoinen* (f. compositum), ruodilla on monta pientä erinäistä lehteä eli *lehdykkää* (foliolum), jotka ovat kiinni emäruodissa (petiolus communis l. rachis folii), joko ruodittomasti taikka eri ruodeillansa eli *ruodukoilla* (petioluli l. petioli partiales).

*Ehytlaitainen* (f. integerrimum), kun laidassa ei ole minäkänlaisia *pykäleitä* (incisuræ), vaan se on yltänsä yhtätasainen, Kuv. 12 a; *ehä* t. *kokonainen* (f. integrum), pienemmillä laitapykäleillä; *nirhalaitainen* (f. erosum), laidassa on pieniä pyöreämaisii, erisuuruisia pykäleitä ja välissä pieniä teräväpäisiä hampaita; *nyhälaitainen* (f. crenatum), laidassa on suoraan ulospäisiä nyhiä ja

niiden välissä pieniä kulmapohjaisia pykäleitä, Kuv. 36; *toisnyhäinen* (f. duplicato-crenatum), ensin isompia nyhäreitä ja niiden laidassa toisia pienempiä, Kuv. 37; *suipponyhäinen* (f. acute crenatum); *tylppänyhäinen* (f. obtuse crenatum); *hienonyhäinen* (f. crenulatum); *nyhähampainen* (f. crenato-dentatum), laidassa on harvemmalta pieniä, suoraan ulospäisiä, nyhämäisiä hampaita; *hammaslaitainen* (f. dentatum), yhtä- tahi erisuurilla, ulospäisillä, pienillä, hampaamaisilla lisäyksillä laidassa; *hienohampainen* (f. denticulatum), pienoisilla hampailla; *sahalaitainen* (f. serratum), sahanterän näköinen laidalta, Kuv. 43 c, 44 d; *vastosahainen* (f. retrorsum serratum), *sahahampaat* (serraturæ) kääntyvät lehden kantaan päin (ovat vastasukaisia), Kuv. 38 b; *toissahainen* (f. duplicato-serratum), ensin isompia sahashampaita ja niiden laidassa pienempiä, Kuv. 39; *hienosahainen* (f. serrulatum); *iso- t. jurasahainen* (f. grosse serratum); *otasahainen* (f. mucronato-serratum); *epäsahainen* (f. inæqualiter serratum), erisuuruksilla sahashampailla; *mutkalaitainen* (f. repandum), hyvin laimeilla, kaarevilla painanteilla lehden laidassa, joka siitä tekeyy vähin aaltoilevan tapaiseksi Kuv. 18; *oralaitainen* (f. margine spinosum).

*Pykälaitainen* (f. incisum) vähän erisuurilla, jotenki syvillä, ei kuitenkaan keskilehteen astisilla, suippupäisillä pykäleillä lehden laidassa, Kuv. 25 a; *halkoinen* (f. fissum), noin puolitiehen keskilehteä ulottuvilla, suoralaisilla pykeillä, Kuv. 15; *kaksi-, kolmi-, neli-, viisi- . . . monihalkoinen* (f. bi-, tri-, quadri-, quinque- . . . multifidum); *liuskainen* (f. lobatum), puolitiehen lehden keskipaikkaa ulottuvilla pykeillä ja niiden välissä kehräiläisillä *liuskoilla* (lobi), Kuv. 16; *kaksi-, kolmi-, neli- . . . moniliuskainen* (f. bi-, tri-, quadri- . . . multilobum); *jakoinen* (f. partitum), yli keskilehden ulottuvilla pykeillä, Kuv. 17; *kaksi-, kolmi-, neli-, viisi- . . . monijakoinen* (f. bi-, tri-, quadri-, quinque- . . . multipartitum); *osainen* (f. sectum), pykeet menevät lehden keskitali kantasuoneen asti, Kuv. 27; *mutkaileva t. mutkikas* (f. sinuatum), kaarteisilla tuskin puolitiehen lehden keskustaa ulottuvilla *mutkilla* (sinus).

*Parihalkoinen* (f. pinnatifidum), kun halkoisen lehden liuskat ovat vastakkaisia, Kuv. 13; *kahdesti t. toistain parihalkoinen* (f. bipinnatifidum), liuskatkin ovat parihalkoisia; *kolmesti parihalkoinen* (f. tripinnatifidum), kahdesti parihalkoisen lehden liuskat ovat vielä uudelleen parihalkoisia; *parikaarteinen t. lyrymäinen* (f. lyratum), tyvipuolella on vastatusten muutamia syviä kaarteita pyöreämaisillä väliliuskoilla ja latvapuoli tavallisesti yhtenä isompana pyöreäkkönä liuskana, Kuv. 14; *taasliuskainen* (f. runcinatum), molemmin puolin keskisuonta on isompia, taaspäin käänty-

neitä, kairamaisia liuskoja vastatusten, Kuv. 25 b; *parijakoinen* (f. pinnatipartitum), jakoinen lehti vastakkaisilla liuskoilla, Kuv. 26; *kampalaitainen* (f. pectinatum), parijakoinen hienoilla, tasasoukilla liuskoilla; *parittainen* t. *parilehtinen* (f. pinnatisectum l. pinnatum), vastakkaiset liuskat ovat aivan erillään toisistaan ja ainoastaan keskisuonessa kiinni, Kuv. 20, 27; *epätasaisesti parittainen* (f. interrupte pinnatisectum), lehdykät eli liuskat ovat erisuuria; *epäliuskainen* (f. laciniatum), sulkasuoninen lehti useammalla, erisuurilla liuskalla yhtä suuntaa lehtilavan kanssa; *resaliuskainen* (f. lacerum), epäliuskainen repaleisilla liuskoilla; *sirottavasti parihalkoinen* (f. squarroso-pinnatifidum), parihalkoisen lehden liuskat eivät ole yhtä linjausta eli suuntausta lehtilavan kanssa; *kouramainen* t. *kourajakoinen* (f. palmatum l. palmatipartitum), kourasuoninen lehti pykeillä suonten välissä, Kuv. 15, 16, 17; *kourahalkoinen* (f. palmatifidum l. f. tri-, quadri-, quinque-, multifidum), kourasuoninen halkoinen lehti, Kuv. 15; *kouraliuskainen* (f. palmatilobum l. f. tri-, quadri-, quinque-, multilobum), kourasuoninen liuskainen lehti, Kuv. 16; *tähtiliuskainen* (f. stellilobum l. stellato-laciniatum), kilpisuoninen suonivälisillä pykeillä, Kuv. 24; *kantamainen* t. *kantaosainen* (f. pedatum l. pedatisectum), kantasuoninen liuskainen lehti, Kuv. 19; *kantahalkoinen* (f. pedatifidum), kantasuoninen halkoinen lehti; *kantajakoinen* (f. pedatipartitum), kantasuoninen jakoinen lehti.

*Yhteisruotinen* (f. simpliciter compositum), haarattomalla emäruodilla on useampia, nivelkantaisia lehdyköitä; *haararuotinen* (f. decompositum), varresta lähtevä *emäruoti* (petiolus primarius) jakauu *ruotihaaroiksi* (petioli secundarii), joilla kullakin on nivelkantaisia lehdyköitä; *haarukkaruotinen* (f. supradecompositum), ruotihaarat jakavat uudelleen *ruotihaarukoiksi* (petioli tertiarii), joissa lehdykät kantanivelillensä ovat kiinni.

*Vastaisparinen* (f. opposite pinnatum), vastakkaisilla lehdyköillä, joista kahta vastakkaista yhteensä sanotaan *lehtipariksi* (jugum), Kuv. 20; *yksi-*, *kaksi-*, *kolmi-*, *neli-*, *viisi-*, *moniparinen* (f. uni-, bi-, tri-, quadri-, quinque-, multijugum), 1:llä, 2:lla, j. n. e. lehtiparilla; *vuoroparinen* (f. alterne pinnatum), vuorottelevilla lehdyköillä; *tasaparinen* (f. paripinnatum l. abrupte pinnatum), parittaisen lehden päässä ei ole yksinäistä t. *päättö-lehteä* (f. impar l. terminale), Kuv. 21, 22; *päättöparinen* (f. impari-pinnatum l. pinnatum cum impari), päässä yksinäinen päätölehti, Kuv. 11 c, 20; *mukaparinen* (f. æqualiter pinnatum), kaikki lehtiparit yhtä suuria; *eriparinen* (f. interrupte pinnatum) suurempia ja pienempiä lehtiparia vuorottelevat keskenänsä; *kasvuparinen* (f. crescenti-pinnatum), kun lehdykät isonevat latvaan päin; *sortoparinen* (f.

decrescenti-pinnatum), kun pienenevät päätä kohden; *toisparinen* (f. bipinnatum), kun emäruodista pitkin pituuttaan lähtee parilehtisiä ruotihaaroja, Kuv. 21; *kolmisparinen* (f. tripinnatum), emäruodilla on pitkin pituuttaan toisparisia ruotihaarukoita, Kuv. 22.

*Sormikkainen, sormijakoinen* (f. digitatum, palmatisectum), ruodin päästä lähtee useampia lehdyköitä t. lehtiliuskoja säteettäin ruotia vasten, Kuv. 23; *kaksi-, kolmi-, neli-, viisi-, seitsensorminen* (f. binatum l. geminatum, ternatum, quaternatum, quinquatum, septenatum); *toissorminen* (f. bidigitatum), sormijakoisen emäruodin kullaki haaralla on sormikkaisia lehdyköitä; *toistain kaksisorminen* (f. bigeminatum l. geminato-binatum), emäruoti kaksijakoinen ja kumpiki haara kaksisorminen; *toistain kolmisorminen* (f. biter-natum l. duplicato-ternatum), emäruoti kolmijakoinen ja kuki haara kolmisorminen; *kolmissorminen* (f. tridigitatum), sormijakoisen emäruodin kuki haara toissorminen; *ratasmainen* (f. rotatum), lehdykät tasamukaisia, säteettäin kaikille puolin ulospäisiä.

*Vastakkaisia, vuorottaisia, erinäisiä, hajallisia, lähinäisiä, kahdappäisiä* t. *kahtaallisia, pystönäisiä, varsimyötäisiä, siivottavia, alaskaarevia, alaspäisiä* j. n. e. ovat lehdet samalla ehdolla, kun haaratkin edelläpäin, kats. siv. 8; *ristikkäisiä* (f. decussata), vastakkaislehtiparit ristissä toinen toisensa kanssa; *säteettäisiä* (f. verticillata l. stellata), varresta lähtee yhtä korkealta kolme tahi useampaa lehteä säteettäin kuki suunnallensa; *kolmi-, neli-, viisi-, kuusi-, kahdeksäteisiä* (f. terna, quaterna l. cruciata, quina, sena, octona), kolmella j. n. e. säteettäisellä lehdellä; *limittäisiä* (f. imbricata), alempi lehti latvallansa peittää lähimmäisen ylemmän kantapuolelta; *umpilimisiä* (f. undique imbricata), vartta ei näy ollenkaan; *kaksi-, kolmi-, neli-, moniratisesti limittäisiä* (f. bi-, tri-, quadri-, multifariam imbricata), lehdet ovat niin monessa eri rivissä; *yksinäisiä* (f. solitaria), kun on vaan yksi lehti paikassansa; *tuk-kuisia* (f. fasciculata), yhdestä paikasta lähtee useampia lehtiä; *ruusukkeisia* (f. rosulata), lehdet lähtevät yhdestä kimpusta varren ympärillä *ruusuosolmun* t. *pyöryläisen* (rosula) tapaisesti ulospäin.

*Erisuuntaisia* (f. heteromalla), lehdet kasvavat mille puolelle tahansa; *yhtäälläisiä* t. *yhdäppäisiä* (f. unilaterialia l. homomalla), ovat vaan yhdellä puolella; *lähentyviä* (f. conniventia), lähenevät latvoin toisiansa; *ulospäinen* (f. patentissimum l. horizontale), on lehti suoraan varresta ulos lähtevä; *harittava* (f. squarrosus), ulospäisellä latvalla; *riippuva* (f. pendens l. dependens), suoraan alaspäinen; *kampela* (f. obliquum), kierrähtänyt kuin väkärän siipi; *kiertynyt* (f. resupinatum l. inversum), aluspuoli kääntynyt päällepäin; *syjittäinen* (f. verticale), toinen laita suoraan ylös, toinen alaspäin; *laitto* t. *laiehtiva* (f. natans), veden kalvolla

makaava; *vedenpäällinen* (f. emersum), ylhäällä vedestä; *vedenalainen* (f. submersum l. demersum), vedessä oleva.

*Tasasoukka* t. *kaitainen* (f. lineare), pitkä ja soukka lehti, ei keskeltä erittäin leveämpi, kun päästäkin, e. m. heinillä, Kuv. 47 d; *neulamainen* (f. acerosum), e. m. havupuilla; *sukamainen* (f. setaceum), sukasen eli harjaksen paksuinen; *kapsimainen* (f. capillare), hieno kuin hivus; *soikea* (f. ovale), lähes kahden leveytensä pituinen, pyöreämaisilla sivuilla, suipoilla päillä, Kuv. 38; *pitkänpyöreä* (f. ellipticum), kahden leveytensä pituinen, pää ja kanta yhtä pyöreitä, Kuv. 36; *pitkulainen* (f. oblongum), 2—3 kertaa pidempi kun leveä, pyöreämaisella päällä ja kannalla; *suikea* t. *suitula* (f. lanceolatum), päälle kolmen leveytensä pituinen nirkoilla eli terävillä päillä, Kuv. 42 b; *puikea* (f. ovatum), kahden leveytensä pituinen, pyöreäkantainen, suippopäinen, Kuv. 28; *herttamainen* (f. cordatum), leveämpi edellistä, lovikantainen, pyöreillä liuskoilla molemmin puolin lovea, Kuv. 29; *nelikulmainen* (f. rhombeum), kulma kantana, toinen päässä, kolmas ja neljäs sivuilla; *epäneliinen* (f. deltoideum), neljällä suoralla sivulla, kantasivut lyhempiä, nulkulma välissä; *kolmikkomainen* (f. triangulare), kantasivut melkein suoralinjaisesti toisissaan; *miekkamainen* (f. ensiforme), pitkä, tönkeä, suorasivuinen, teräväpäinen; *äimämainen* (f. subulatum), hoikka, huippupääksi vähittäin kapeneva; *kalpamainen* (f. acinaciforme), toinen sivu paksumpi ja suurempi, toinen ohuempi ja erittäinki päätä vasten kikkerämpi; *sirppimäinen* (f. falcatum), ohut, kiverä lehti; *nalkkimainen* t. *vastokairainen* (f. cuneatum), hoikkakantainen ja vähittäin laajeneva melkein tasapäiseksi latvaksi, Kuv. 31; *kieloinen* (f. lingulatum), nalkkimainen pyöreällä päällä, Kuv. 32; *lapiomainen* (f. spathulatum), pyöreähkö pitkällä, kaarevasti hoikkenevalla kannalla, Kuv. 33; *vastopuikea* (f. obovatum), pyöreä lyhyellä, suipolla kannalla; *vastoherttainen* (f. obcordatum), suippokantainen, lovilatvainen pyöreillä liuskoilla molemmin puolin lovea; *kehrämainen* t. *pyöreä* (f. orbiculare), pyöreä ja yhtä leveä, kun pitkäki; *pyöreähkö* (f. subrotundum); *pyöreämainen* (f. rotundatum); *munuamainen* (f. reniforme), pituutensa leveämpi, pyöröpäinen, lovikantainen, pyöreämaisilla kantaliuskoilla, Kuv. 30; *kuutava* (f. lunatum, lunulatum l. semilunatum), kuun muotoinen ennen täytymistään.

*Soukkakantainen* (f. basi attenuatum); *kapsakantainen* (f. basi angustatum); *pyörökantainen* (f. basi rotundatum); *leveäkantainen* (f. basi dilatatum); *tasakantainen* (f. basi æquale), molemmat kantapuolet toisensa mukaisia; *epäkantainen* (f. basi inæquale l. obliquum), toinen kantapuoli isompi tahi pidemmältä ruotia seuraava kun toinen; *keihäskantainen* (f. hastatum), kannasta läh-

tee kaksi vastakkaista, ulospäistä liuskaletta, Kuv. 34; *nuolikan-  
tainen* (f. sagittatum), syvästi lovikantainen suipoilla liuskoilla mo-  
lemmin puolin lovea, Kuv. 35; *korvakantainen* (f. auriculatum),  
kannan alla on kaksi pyöreästä liuskaa; *munuaiskantainen* (f.  
basi reniforme), kannalta munuamaisen lehden muotoinen; *hertta-  
kantainen* (f. basi cordatum), lovikantainen, kahdella pyöreällä  
kantaliuskalla; *vinoherttainen* (f. basi oblique cordatum), hertta-  
maisien lehden kantaliuskat eivät ole yhtä isoja, Kuv. 44 d; *herttapuo-  
liskoinen* (f. basi semicordatum), toista kantaliuskaa ei ole ollenkaan.

*Suippo* (f. acutum), lehden sivut yhtyvät kaitakulmaiseksi  
pääksi; *suipukka* (f. acuminatum), vieläki kaitaisemmalla, pitkä-  
veteisellä kulmalla; *nirkko* (f. cuspidatum), pitkän soukalla ja ta-  
vallisesti tönkeämaisellä päällä; *kärkevä* (f. pungens), pistävällä,  
tönkeällä käreällä; *otapäinen* (f. mucronatum), keskisuoni sojottaa  
päästä ulkona; *tylppäpäinen* (f. obtusum), nykerä, ei suippo eikä  
nirkko päästä; *pyöröpäinen* (f. apice rotundatum), pyöreämaisellä  
päällä; *typpä* (f. truncatum), melkein kuin poikki leikattu pääs-  
tä; *katkottu* (f. præmorsum), kuin poikki purtu tahi järsitty; *lant-  
topäinen* (f. retusum), matalalla, ontevalla pykäleellä päässä; *pykäle-  
päinen* (f. emarginatum), vähän syvemmällä, kuta kuinki suippu-  
páisella pykäleellä ja lyhyillä, tylppäpáisillä liuskoilla; *hammas-  
päinen* (f. apice dentatum), useammalla pienellä, hampaamaisella,  
yhtä suurella liuskalla päässä; *kolmi-, neli-, viisihampainen* päästä  
(f. apice tri-, quadri-, quinquedentatum); *halkopäinen* (f. bifidum),  
syvämpi lovi jakaa pään kahdeksi liuskaksi, suippo kulma vä-  
lissä; *lovipäinen* (f. bilobum), kaksi liuskaa päässä ja syvämpi, pyö-  
reämainen kulma välissä; *jakopäinen* (f. bipartitum), kaksi nirkkoa  
liuskaa ja yli puolen lehteä ulottuva lovi välissä.

*Litteä* (f. planum), yltä ylensä yhtä tasainen lehti; *kovera*  
(f. concavum), keskipaikka alaspäin onteva eli kuopassa; *kehkerä*  
t. *kupera* (f. convexum), keskus ylöspäin pyöreämaisesti kohollaan;  
*tuuttimainen* (f. cucullatum), laidat torvimaisesti yhteen kiertyneet  
kannasta soukkapohjaiseksi latvaan päin laajenevaksi törröksi eli  
tötteröksi; *kourumainen* (f. canaliculatum), päältä päin pitkin pi-  
tuuttansa kuurnamaisesti kovertunut, Kuv. 40; *talkamainen* t. *ven-  
homainen* (f. carinatum), lehtipuoliskot keskisuonta myöten terävä-  
pohjaisesti toinen toistansa vastaan, Kuv. 41; *vastalaskuinen* (f.  
conduplicatum), lehtipuoliskot melkein yhteen laskeutuneet; *poi-  
muinen* (f. plicatum), useammilla pienillä laskoksilla; *pitkinpoinui-  
nen* (f. longitudinaliter plicatum); *poikkipoinuinen* (f. transversim  
plicatum); *sädepoimuinen* (f. radiatim plicatum); *aaltolaitainen* (f.  
undulatum), vähän mutkittelevalla laidalla; *kurttuinen* (f. rugo-  
sum), epätasainen, rypyläs; *kolea* (f. lacunosum), suonten välissä,



varsinki aluspuolella, pieniä koloja ja painanteita; *kiherä* (f. crispum), paljoilla erisuuruksilla, mutkaisilla poimuilla erittäinkin laidassa.

*Kalvomainen* (f. membranaceum), ohut ja hentukka lehti; *kälpeä* (f. scariosum), ohut, kuiva, hilseä; *pehmeä* (f. molle), löysäaineinen, ohutlanta, norea; *nahkea* (f. coriaceum), kiinteämpi ja tukevampi edellistä; *tanakka*, *tanea* t. *tankea* (f. rigidum), nahkamainen, ei notkea; *mehevä* t. *mehuinen* (f. pulposum), täynnä tuoretta, mehuista ainetta; *möyheä* t. *lihava* (f. carnosum), paksumalla, vähemmin mehevällä sisustalla; *pillimäinen* (f. fistulosum), liereä, tyhjäsisuinen.

*Erivärinen* (f. coloratum), ei vihreä; *kaksivärinen* (f. discolor), alus- ja päällyspuoli erivärisiä; *kiiltävä* (f. nitidum); *himetä* (f. opacum); *kuultopilkkuinen* (f. pellucide punctatum) t. *läpipisteinen* (f. perforatum), läpikuultavilla pilkuilla; *munanmoinen*, *nalkinmoinen*, *palleroinen*, *pitkänpalleroinen* j. n. e. (oviforme, cuneiforme, globosum, ellipsoideum etc.), paksu, munan-, nalkin- j. n. e. muotoinen; *lyhytaikuinen* (f. caducum), pian ilmestymisensä jälkeen jo ennen syksyä variseva tahi kuihtuva; *yksikesäinen* (f. deciduum), syksyllä lakastuva ja variseva; *monikesäinen* (f. persistens), talven yli, yhden eli useamman, kestävä; *kuihtuva* t. *surkastuva* (f. marcescens), nuutuva ja kuihtuva varrellansa ilman varisematta, niinkuin aluslehdillä useinkin on tapana; *ainavehreä* (f. sempervirens), y. k. monikesäinen.

#### d. — Apulehdistä.

*Apulehdet* (stipulæ), lehtimäisiä osia, jotka muutamissa kasveissa peittävät ja suojaavat varsilehden ennen sen puhkeamista ja sitte joko menehtyvät tahi jäävät lehden vaiheilla kasvamaan. Niitä on kolme erilajia: *Korvake*, *Tupeke* ja *Kieleke*.

*Korvakkeet* (stipulæ), parittain lehden tahi ruodin alapäässä olevat apulehdet, Kuv. 8 d.

*Sivukorvakkeet* (stipulæ laterales), yksi kummallaki puolella lehden kantaa.

*Hankakorvakkeet* (st. axillares l. intrafoliaceæ), lehtihangassa.

*Aluskorvakkeet* (st. extrafoliaceæ), lehtikannan alla.

*Vastaiskorvakkeet* (st. oppositifoliæ), vastatusten kummallaki puolella vartta, lehtikannan alla.

*Ruotikorvakkeet* (st. petiolares), ainoastaan ruodissa kiinni.

*Lehdykkäkorvakkeet* (stipellæ), lehdykkäin kannalla.

*Tupeke* (ochrea), kokonainen lehtitappi, jonka ulkopuolella lehti tavallisesti istuu, Kuv. 42 a.

*Kieleke* (ligula), hieno, kuulakka kalvo heinäkasveilla tuppi-  
maisten lehtiensä aukeamassa, Kuv. 5 a.

*Erilliset* (st. liberæ l. solutæ), ne korvakkeet, jotka ovat ainoastaan kannasta  
kiinni; *ruotivaraiset* (st. marginales l. petiolo adnatæ), sivuillaan ruotiin  
kiinnettyneet; *varsivaraiset* (st. cauli adnatæ), sivusta varressa kiinni; *kak-  
sivaraiset* (st. ambigue adnatæ), sekä ruodissa että varressa kiinni; *yhty-  
neet* (st. connatæ), toinen toiseensa kiinni kasvettuneet.

### e. — Suojuksista.

*Suojuksiksi* (bractæ) sanotaan niitä varren ylipäässä, kuk-  
kaperällä tahi kukassa kiinni olevia lehdekkeitä, jotka tavallisesti  
ovat yksikertaisia, suomumaisia, enimmäen ohukkaisia ja varistu-  
via (br. caducæ), usein myöski terälehtien tapaisesti erivärisiä,  
Kuv. 44 a, 47 a, 53 d.

Varsin pienukaisia, suomumaisia, itsellä kukkaperällä parittain  
olevia suojuslehdekkeitä sanotaan *suojukoiksi* (bracteolæ), Kuv. 7 d.  
Erinimisiä suojuslehtiä ovat: *Varus*, *Lisäverho*, *Kotelo* ja  
*Kehto*.

*Joutosuojus* (bractea vacua), jolla ei ole kukkaa, tahikka  
vaan joku kukan käperö.

*Latvasuojus* (coma), siksi sanotaan useampia kukkaperän lat-  
vaan ryhmistyneitä joutosuojuksia.

*Varus* (involucrum); varukseksi eli *varuslehdiksi* (f. involu-  
cralia) sanotaan niitä suojuslehdekkeitä, jotka perän alapäässä ta-  
vallisesti ovat säteettäin ja useampia, Kuv. 45 a, b.

*Sarjavarus* (involucrum universale), sarjakukissa yhteisen  
sarjan alapäässä, Kuv. 45 a.

*Sarjukkavarus* (inv. partiale l. involucellum), erityisten sar-  
jain eli sarjukkain alapäässä, Kuv. 45 b.

Kumpiki niin sarja- kuin sarjukkavarus taitaa olla joko *täysinäinen* (inv. com-  
pletum), kun varuslehtiä lähtee säteettäin yltä ympäritse, tahi *puolinainen t.  
vajainainen* (inv. dimidiatum l. unilaterale), kun niitä on vaan toisella puo-  
lalla.

*Lisäverho* t. *lisäkehto* (calyculus l. calyx exterior), pienoisia  
suojuslehdekkeitä, jotka ovat verhossa kiinni ikään kuin toisena  
ulkopuolisena eli *ulkoverhona*, Kuv. 46 a.

*Kotelo* (spatha), tuppimainen suojuslehti, joka eräissä kas-  
veissa peittää kukan ennen valmistumistansa ja sitte kukan ilmes-  
tyessä halkeaa kylestä, Kuv. 47 a, 54 b.

*Kehto* (periclinium l. calyx communis), monta verhomaiseksi  
kiehkuraksi ryhmistynyttä suojuslehteä yhteenkeräyneitten pienten  
erikukkasiin eli kukkaiston ympäri e. m. ohdakkeissa, Kuv. 46 b, 48 a  
Kehdon eri lehtiä sanotaan *kehtolehdyköiksi* (foliola), jos ovat veh-  
reitä, lehtimäisiä, ja *suomuiksi* (squamæ) ollen kuivia, kalvomaisia.

Muutamissa kukkaistoissa on myös itsekunkin eri kukkasen välissä pienenaisia, suomukkaisia lehtiä omalla nimellensä *vareet* (paleæ).

Tavallisimpia kehdon ja kehtolehtien tunnussanoja ovat: *yksirivinen* (uniserialis), *kaksirivinen* (biserialis), *paanuttu* t. *limitetty* (imbricatus), *lisäverhoinen* (calyculatus), *hariteltu* (squarrosus), *säteittäinen* (radiatus).

*Kehtokannaksi* (cupula) sanotaan hedelmän pohjalla olevaa maljamaista kehtoa, jonka suomet ovat kovettuneet ja yhteen kasvettuneet, e. m. pähkinöissä, terhoissa.

#### f. — Silmikoista.

*Silmikko* t. *silmä* (gemma), kaikenlaisten varsien, varsikasvainten, haarain j. n. e. ensialku, jonka ensittäin *lehtiaihos* ja päälliseksi *suomukat* (perulæ l. squamæ) tavallisesti peittävät.

*Latvasilmikko* (gemma terminalis), varren tahi haaran päässä.

*Sivusilmikko* (g. lateralis), lehtihangassa ilmautuva. Sitä lehteä, joka on suorastaan silmikon alla, sanotaan sen *kannatuslehekseksi* (folium fulcrans). Tämän pudottua, niinkuin meidän maan puukasveissa tavallisinta on talvisaikana, jääpi sen istumapaikkaan merkiksi *lehdenarpi* t. *-jälki* (phyllula l. cicatrix folii).

*Satunnainen* t. *liikasilmikko* (g. adventitia), joka ei ilmau lehtihangassa, eikä muussa vakinaisessa kasvin paikassa. Liikasilmikoita taitaa sopivissa tiloissa tekeytyä pian kaikkiin kasvin paikkoihin, yksin lehtilöihinki.

*Paljas* (g. nuda) on se silmikko, jolla ei ole suomukoita peitteenä; *kalteinen* (g. tecta), suomukoilla katettu; *lienteä* (g. pubescens); *tahmea* t. *jäläinen* (g. glutinosa), pihkamaisella aineella päällensä.

*Lehtisilmikko* (g. foliifera), josta ei tule kun lehtiä.

*Kukkasilmikko* (g. florifera), josta vaan kukkia lähtee.

*Sekasilmikko* (g. folio-florifera l. mixta), jossa on sekä lehden että kukan alkuja.

Silmikon sisäiset lehden-alut taidetaan tarkastella: 1<sup>o</sup> keskenäisen asemansa eli *Päällettäisyytensä* (præfoliatio) puolesta toinen toisensa suhteen, ja 2<sup>o</sup> itsekunki lehden erityisen aseman eli *Silmikkoalansa* (vernatio) puolesta. Ylimalkain on niiden päällettäisyys: *limilaskuinen* (præfoliatio equitativa), kun laidoillaan vuorotellen peittävät toinen toisensa; *vierettäinen* (pr. valvativa), kun ovat laidatusten, ilman toinen toistansa peittämättä. Edellinen laatu voipi olla *ristittäinen* (pr. decussata), kaksi sisämäistä lehden-alkua kulmamaisesti kääntyneet laidoillansa vastatuksin, ja niiden päällä toisia samalla tavalla kääntyneitä niin, että päälimäisten lehtien keskipaikat vastaavat alimaisten laidoille; *kaksittain limilaskuinen* (pr. alternativa), useampia vastalaskuisia lehtiä sisätysten, sisämäisten laidat ulkomaisten laskoskulmaa vasten; *kolmittain limilaskuinen* (pr. triquetra), kun useammista venhomaisista tahi vastalaskuisista, toinen toisensa sisässä olevista lehdenaluista

sisämäisen toinen laita on päälimäisen laskoskulmassa, ja keski-kohta päälimäisen toisen laidan alla, toinen laita taas juoksee ulkopuolelle päälimäisen lehdenalun laskoskulman; *viisikerroksinen* t. *viisindäinen* (pr. quincuncialis), kun kaksi ulkonaista lehteä laidoillaan peittävät ne muut, vaan kahden sisimmäisen lehden laidat sitä vastoin ovat peittyneet, ja sen keskimäisen lehden toinen laita peittää kun toinen on peitteessä j. n. e.

Erityisten lehdenalkuin *silmikkoala* taitaa olla: *tasainen* (vernatio plana), kun lehdet makaavat tasan toinen toisensa päällä; *alaskääntöinen* (v. reclinativa), kun lehden lapaa on ruotia vasten alaspainunut; *vastalaskuinen* (v. duplicativa); *poimuinen* (v. plicativa); *sisäkierteinen* (v. involutiva), kun molemmat laidat ovat kiertyneet lehden päälly- t. sisäpuolta päin; *uloskierteinen* (v. revolutiva), kun ovat kiertyneet alus- t. ulkopuolta päin; *käärymäinen* (v. convolutiva), laidasta lähtien, kuin paperikääry, itsesissänsä kiertyneet; *käppyräinen* (v. circinata), päästä alkain tuohikäppyrän lailla itsesissänsä kiertyneillä lehdenaluilla.

#### g. — Kukista ja siittimistä.

*Kukkaperä* t. *perä* (pedunculus), kukkasilmikosta lähtevä kukallinen varren jatko; kukkaa, jolla on selvä perä, sanotaan *peräkkääksi* (flos pedunculatus), jota vastoin *perätön* (flos sessilis) on puuttuvalla tahi epäselvällä perällä.

*Vana* (scapus), maanalaisen varren päästä lähtevä kukkaperä, Kuv. 47 c.

*Juuriperä* (pedunculus radicalis), lähtevä maanalaisen varren sivulta, ei päästä, Kuv. 7 a.

*Kukkavarsi* t. *lapakko* (rachis), se varren osa (tahi haarovän perän runko), josta lähtee useampia kukallisia *perähaaruksia* (pedicelli), Kuv. 50 a, 51 b, 52 a.

*Kukinto* t. *kukostus* (inflorescentia); kukinnolla tarkotetaan sitä yhdistyneitten kukkien eri laatua, jolla ne kukkiessaan ovat varteen asettuneet. *Päätteetön* (infl. indefinita) on se kukinto, jonka emävarsi ei pääty latvakukalla. Senlaisen kukinnon päälaadut ovat: *Tähkä*, *Terttu*, *Huiskilo*, *Röyhy*, *Sarja*, *Mykerö* ja *Kukkaisto*. *Päätteinen* (infl. definita) on kukinto, kun sen sekä emävarren että sivuhaaruksien päässä on latvakukka, jonkalaisia ovat: *Viuhko*, *Tupsu* ja se ainoastaan joissakuissa ulkomaan kasveissa tavattava *Kukkamöykky*.

**Muist.** — Kun päätteettömän kukinnon erityiset kukat tavallisesti valmistuvat ulkoapäin sisälle eli niin, että alimmat ja äärimmäiset ovat kukostuneet ennenkun ylimmäiset ja sisäpuoliset, mutta päätteisen kukinnon laita on päin vastoin, niin siitä edellistä kukintoa myös sanotaan *keskelläväksi* (infl. centripeta) ja jälkimäistä *äärettäväksi* (infl. centrifuga).

**Tähkä** (spica), kukat lähtevät perättöminä tahi hyvin lyhyt-peräisinä pitkulaisesta lapakosta, e. m. rukiissa ja sarassa, Kuv. 52 B.

Tähkä on miten milloinkin *yksikertainen* (sp. simplex), yksittäisillä kukilla; *toisikertainen* (sp. composita), kun yksityisten kukkain sijassa on pieniä *tähkylöitä* (spiculæ); *yhtenäinen* (sp. æqualis l. continua), jolla ei ole suurempia välipaikkoja; *välikköinen* (sp. interrupta), kun kukat ovat eri kihermissä; *yksipuolinen* (sp. unilateralis), kun ovat vaan yhdellä puolella; *yhdäppäinen* (sp. secunda), kun kääntyvät yhdelle suunnalle; *kaksi-*, *kolmi-*, *neli-*, *viisi-*, *kuusiratinen* (sp. bi-, tri-, quadri-, quinque-, sexfaria) taikka *kaksi-*, *kolmi-*, *neli-*, *viisi-*, *kuusitahkoinen* (sp. di-, tri-, tetra-, penta-, hexasticha).

**Norkko** t. *palmu* (amentum, julus), tähkämäinen kukinto, hienolla, tavallisesti notkealla, pitkulaisella, jälkeinpäin varisevalla lapakolla, jolla perättömät, vaillinaiset kukat istuvat, katetut ennen puhkeamistaan limisuomuisilla, ei tuppimaisilla suojuksilla, e. m. koivussa, lepässä, pajussa, haavassa, Kuv. 53.

Norkot ovat joko *hedenorkkoja* (amentum masculum), joilla on paljaita hedekukkia, Kuv. 53 b, tahi *eminorkkoja* (am. femineum) paljailla emikukilla, Kuv. 53 a. Edelliset varisevat kukassaan, jälkimäiset hedelmöinä.

Mikäli norkko ilmaantuu lehtimisen edellä, yhtäikaa tahi perästä on se *varhainen* (am. præcox), *yhtäikainen* (am. cœtaneum), tahi *myöhäinen* (am. serotinum).

**Sykerö** (anthurus), tähkämäinen tahi norkkomainen, usein haarova kukostus perättömillä *kukkapalleroilla* (glomeruli) pitkin lapakkoa ja sivuhaaroja.

**Käpy** (strobilus, conus), *eminorkko* kankealla tähkälapakolla, jonka suomet paisuvat ja kovettuvat nahkeamaiseksi aineeksi, e. m. kuusessa ja männyssä. Katajassa ja eräissä muissa ovat kukkasuojuukset yhteen kasvettuneet *marjakävyksi* (galbulus).

**Puikelo** (spadix), pitkänomainen, tähkämäinen kukostus, jossa kukkavarren pää on paksuksi turvonnut ja kukat siihen kuin sisään painuneet, e. m. suovehkassa, Kuv. 54 a. Puikelo on milloin *koteloinen* (spathaceus), milloin *koteloton* (espathatus).

**Terttu** t. *rypäle* (racemus), kukostus, jossa pitkäveteinen kukkavarso sieltä täältä pitkin pituuttansa työntää melkein yhdenpituisia kukkaperiä e. m. tuomella, Kuv. 49, 52 A.

**Huiskilo** (corymbus), kukkahaarukset lähtevät eri paikoilta pitkäveteistä lapakkoa, ja alemmaiset nousevat tasapäähän ylemmäisten kanssa, Kuv. 50.

**Röyhy** (panicula), pitkäveteisestä kukkavarresta lähtee sieltä täältä useampia siirottavia tahi ulospäisiä pidempiä kukkahaaruksia, jotka uudelleen haaraavat, e. m. kasteheinällä, Kuv. 5 b.

**Harkko** (thyrsus), niin taajakukkasinen röyhy, että se siitä muodostuu munanmoiseksi tahi pitkänpalleroiseksi, e. m. sirenillä, Kuv. 51.

*Sarja* (umbella), yhdestä kohti varren tahi varsihaaran päästä lähtee säteittäin useampia periä, joista kuki joko kantaa kukan, tahi lähettää päästänsä samantapaisia uusia sädeperiä, Kuv. 45. Edellisessä tapauksessa sanotaan sarjaa *yksikertaiseksi* (umb. simplex), jälkimäisessä *toiskertaiseksi* (umb. composita), Kuv. 45 d, e.

Toiskertaisia sarjoja sanotaan myös *sarjastoiksi*, ja niissä erotetaan *emäsarja* (umb. universalis) *sarjukoista* (umbellæ partiales l. umbellulæ), jotka lähtevät emäsarjan perien päästä. Emäsarjan periä sanotaan *säteiksi* eli *sarjaperiksi* (radii) ja sarjukkain periä *peryköiksi* eli *sarjukkaperiksi* (pedicelli).

*Tasakukkainen* (umb. similliflora) on sarjasto, jonka kaikki kukat ovat yhtäsuuria; *sädekukkainen* (umb. radiata), kun laitakukat eli terälehdet sarjan äärimäisissä kukissa ovat isompia, kun keskisarjassa; *kehkerä* (umb. convexa), yhtäpitkillä säteillä; *tasapäinen* (umb. plana), äärimäiset säteet pidempiä ja yhtiä korkealla keskimäisten kanssa; *onteva* (umb. concava), keskimäiset säteet paljo lyhemmät äärimäisiä ja sarja keskeitä kuopassa.

*Mykerö* (capitulum), eriverhoiset, perättömät tahi lyhytperäiset kukat ovat palleromaisesti kiinni ryhmistyneet lyhytvartiseen lapakkoon, e. m. apilassa, Kuv. 95.

*Kiehkura* (verticillus), kukat ovat kiehkurassa varren ympäri joko *perättöminä* (vertic. sessilis) tahi *peräkkäinä* (v. pedunculatus), Kuv. 43 a, 96.

*Kukkaisto* t. *koppilo* (anthodium, calathium l. calathidium), kukkamyerö paksuntuneella, usein tahkulaisesti levenneellä lapakolla t. kukkavarrella, jonka päälispuolella on joukko pieniä erikukkasia yhteisen suojuskehdon sisällä, Kuv. 48 b, c. Koppilossa erotetaan: *erikukkaset* (flosculi); *lava* t. *marto* (receptaculum commune l. anthoclinium), kukkavarren laajennut pää, jossa erikukkaset seisovat; *kehto* (periclinium), josta jo on ennen (s. 17) mainittu.

Muist. — Kukkaistoa on myös nimitetty *yhdyskukaksi* (flos compositus), mutta sopimattomasti, koska se niin kutsuttu yhdyskukka oikeastaan on vaan useampain pienten erikukkain tiheä yhteen mykeröitymä. Sitä nimitystä sentähden nykyaikoina onkin yhä vähemmän käytetty. Kukkaistokasveja kuitenkin sanotaan *yhdyskukkaisiksi* t. *yhtiskehtoisiksi* siitä syystä, että niiden erikukkaset ovat yhteisen kehdon sisällä (flores aggregati).

*Kieloiskukkainen* t. *kieloiskukkaisto* (calathium ligulatum l. semiflosculosum) on koppilo kieloisilla erikukkasilla; *pillikukkainen* t. *pillikukkaisto* (c. tubulosum), kun kaikki erikukkaset ovat pillimäisiä, Kuv. 46 c; *kehrämäinen* (c. discoideum), pillikukkaisto yhtäsuurilla kukkasilla; *säteetivä* (c. radians), vähän isommilla, epätasaisilla laitakukkasilla; *sädekukkainen* t. *sädekukkaisto* (c. radiatum), kukkaset keskellä ovat pystöisiä, pillimäisiä, laidalla ulospäisiä, kielekkeisiä; *tasaneuvoinen* (c. homogamum), kukkaisto, jonka erikukkaset ovat täysineuvoisia; *sekaneuvoinen* (c. heterogamum), yhden kukkaiston erikukkasilla on millä vaan heteitä, millä emiä; *erineuvoinen* (c. heterocephalum l. homogamum dielinum), saman lajin eri kukkaistoilla on millä vaan hede- millä emikukkasia.

*Sädekukkaiston* keskikohtaa pillimäisillä kukkasillansa sanotaan erinimellä *kehräksi* (discus), Kuv. 48 b. ja kielekkeisiä laita-kukkasia *säteiksi* (radii), 48 c.

Lavaa eli marttoa erotetaan seuraavilla selityssanoilla: *litted* (receptaculum planum), *onteva* (concavum), *palleroinen* (globosum), *keilamainen* (conicum), *liereä* (cylindricum), *täyteinen* (solidum), *onsi* t. *tyhjäsuisuinen* (cavum), *pilkullinen* (punctatum), *kuopurainen* (scrobiculatum l. foveolatum), *lokeroinen* (favosum), *vareinen* (paleaceum), *kalsea* (hirtum), *paljas* (nudum) j. n. e.

*Yksindisiä* (c. solitaria) ovat kukkaistot yksikoppiloisella varrella, ja mikäli itse sanat ottavat: *hajallisia* (sparsa), *lehtihankaisia* (axillaria), *röyhymäisiä* (paniculata l. in paniculam disposita), *harkkomaisia* (thyrsoides l. in thyrsus disp.), *huiskilomaisia* (corymbosa), *ryhymäisiä* (glomerulosa), *mykerömäisiä* (in capitulum disposita), *tertumaisia* (racemosa), *tähkämäisiä* (spiciformia), j. n. e.

*Viuhko* (cyma), päätteinen kukinto lähettävä emävarresta kohta alussa tahi latvempaa 2, 3 tahi useampaa haaruksia, joista sitte samoin lähtee toiskertaisia sivuhaaroja, niin että siinä taide-taan erottaa tois-, kolmas- ja useampikertaisia haarotuksia.

Viuhko taitaa samoin kuin sarjaki olla *tasalatainen* (c. planum), jonkalaisna sitä sanotaan myös *sarjamaiseksi*, e. m. heisipensaalla, Kuv. 55; *palleroinen* (c. globosum); haarotuskertainsa mukaan *tois-*, *kolmishaarainen* j. n. e. (c. di-trichotomum etc.).

*Töyhtö* t. *röyhyviuhko* (anthela) on röyhy- eli töyhtömäinen, näköänsä usein sivupuolinen viuhko, lehtimäinen kotelo tyvellä, e. m. piippo- ja vihviläkasveilla.

*Kiemura* (cincinnus l. cyma scorpioideum), kun viuhkon tahi tertun latvakukan läheltä lähtee sivuhaaroja ainoastaan toiselle puolelle; kukat enimmiten ovat selvästi sivupuolisia, rypälemäisiä, ja lapakko tavallisesti kiekurapäinen, e. m. lemmikillä ja koko karhealehtisien heimolla (boraginaceæ).

*Tupsu* (fasciculus), viuhkomainen kukustus varsin lyhyillä kukkahaaruksilla ja liketysten olevilla, täydemmillä kukilla, e. m. tervakolla.

*Ryhmä* (glomerulus), vieläki lyhemmillä haaruksilla ja kerämaisesti yhteen tukutuilla kukilla tavallisesti lehti- tahi haarahangassa.

*Kukkamöykky* t. *-pesä* (cœnanthium l. hypanthodium), kun viuhkon haarotukset yhteenjuottuvat möyheäksi aineeksi, johon pienet erikukkaset ovat sisäänpainuneet. Kukkapesä on joko litteä eli tasainen, jolloin erikukkaset ovat sen päällä, taikka, niinkuin viikunalla, laidoin sisäänpäin kääntymisestä muuttunut ainoastaan

latvasta avosuiseksi pullakoksi, jonka sisuskolo yltä ympärinsä on täynnä pieniä erikukkasia.

*Ilmisiittiö* (planta phanerogama), kukallinen kasvi selvästi erotettavilla siittimillä; *salasiittiö* (pl. cryptogama), kukaton kasvi puuttavilla tahi epäselvillä siittimillä.

Kun nämät nimennöt eivät ole tarkoin sopivia sen vuoksi, että useammallaki niin kutsutulla ilmisiittiöllä siittimensä ovat sangen epäselviä, jota vastoin ne salasiittiöissä hyvin yleisesti tavataan selvästi muodostuneina, jos kohta ainoastaan suurennuslasilla nähtävinä, niin on niille myöhemmin aikoina annettu asianmukaisemmiksi nimiksi ilmisiittiöille: *Siemenkasvit* t. *siemenelliset* (embryophytæ), joista siittyneinä valmistuu *kasvialkio* t. *idettä* (embryo) sisältäviä siemeniä uusiksi, samanlaisiksi kasveiksi, ja salasiittiöille: *Itiökasvit*, t. *itiölliset* (sporophytæ). Nämät jälkimäiset eivät uudistu siemenistä, vaan itiöistä (spore), jotka ovat yksikertaisia muodostumia sillä erotuksella siemenistä, että niissä ei ole valmistunutta aihetta eli kasvialkioa uusiksi kasveiksi. On myöski siitä syystä, että edelliset melkein yleisesti ilmaantuvat *sirkkalehdillä* (cotyledones), niitä nimitetty *Sirkkalehtisiksi* (cotyledonæ) ja jälkimäisiä, joilla ei ole sirkkalehtiä, *Sirkkattomiksi* (acotyledonæ).

*Kukka* (flos), siittimistä ja niiden peitteistä valmistuva kasviosa.

*Poimi* t. *kukanalku* (flos virgineus l. alabastrum), puhkeamaton.

*Kehä* (perianthium l. integumentum florale), lehtimäiset osat siitinten kattamista varten, jotka kuitenkin monessa kasvissa puuttavat; ne ovat *Verho* ja *Terä*.

*Verho* (calyx), ulkopuolinen, tavallisesti vehreä, tankeampi, ruohontapaisempi, usein lähtemätön kehä-osa, Kuv. 56 A, 57 a.

*Terä* (corolla), sisämäinen, hennompi, variseva, erivärinen kehäpuoli, Kuv. 56 B, 66 a b c.

*Kupu* (perigonium), kun kaikki kehälehdet ovat samanlaatuisia, Kuv. 90; se sitte on miten milloinki: *terämainen* (p. corollinum), *verhomainen* (p. calycinum), *akanamainen* (p. glumaceum) heinäkasveilla, *suomumainen* (p. squamiforme) e. m. pajun ja monen muun lehtipuun norkoissa.

*Hede* (stamen); heteiksi sanotaan niitä kukan osia, joissa *siitepöly* (pollen) kasvin siittämistä varten valmistuu. Ne ovat samoin kuin terälehdetki hentoja, ohuita, erivärisiä, ja menehtyvät siittämisen perästä, Kuv. 71 b c d.

*Emi* (pistillum) on keskellä kukkaa emävarren tahi haarain päässä, sisältävä *siemenaiheet* (ovula) ja valmistuva, kumminki osittain, siittymisen jälkeen siemenikkääksi *hedelmäksi* (fructus), Kuv. 71 fh.

*Täysinäinen kukka* (flos completus), jolla on kaikki edellä nimetyt kukkaosat; *vaillinainen kukka* (flos incompletus), jolla



ei ole kaikkia eriosia; *kehätön* (flos nudus), jolla ei ole verhoa eikä terää, vaan paljaat siittimet.

*Kaksi-* t. *täysineuvoinen* (flos hermaphroditus l. bisexualis), kukka jolla on sekä heteet että emit; *erineuvoinen* t. *yksineuvoinen* (flos diclinus l. unisexualis), eri kukissa on, missä vaan heteitä, missä emiä, s. o. ne ovat taikka *hedekukkia* (flores stamini-geri) — toisella nimellä *koirakset* t. *koiraskukat* (flores masculi ♂) — taikka *emikukkia* (flores pistilligeri) — myöski toisella nimellä *naarakset* t. *naaraskukat* (flores feminei ♀); *neuvoton* t. *tyhjä* (flos neuter), kukassa ei ole emiä eikä hedettä; *yksisopuinen* (planta monoclina), kasvi jolla on kaikki kukkansa täysineuvoisia; *erisopuinen* (pl. diclina), erineuvoisilla kukilla; *yksikotinen* (pl. monoica), kasvi jonka muutamissa kukostuksissa tavataan vaan hedekukkia, toisissa emikukkia; *kaksikotinen* (pl. dioica), saman lajin yhdessä kasvissa ei tavata kun emikukkia, toisessa ei kun hedekukkia; *sekaneeuvoinen* (pl. androgyna), samassa kukostuksessa ovat hede- ja emikukat erillään; *sekasopuinen* (pl. polygama), yhdellä kasvilla ovat muutamat kukkansa täysineuvoisia, toiset erineuvoisia.

*Erilehtinen* (calyx eleuterosepalus), on verho useammalla erillisellä lehdellä, *verholehdellä* (sepalum), joiden mukaan sitä sanotaan *kaksi-*, *kolmi-*, *neli-*, *viisi-*, *monilehtiseksi* (c. di-, tri-, tetra-, penta-, polysepalus); *yhdislehtinen* (c. gamosepalus l. monosepalus), lehdet ovat kasvettuneet yhtenäiseksi lehdeksi. Yhdislehtistä verhoa sanotaan myös *yhdisverhoksi*.

Kestäväisyytensä puolesta on verho *lyhytaikuinen* (calyx caducus), kun menehtyy ennen taikka heti jälkeen kukan puhkeamista; *menehtyvä* (c. deciduus), lähtevä siittymisen jälkeen, niin kuin tavallisinta on; *pysyvä* (c. persistens), jossa tapauksessa se hedelmän valmistuessa vielä lisäksi usein suurentuu (c. fructifer auctus); *kuihtuva* (c. marcescens), kun se ilman heti eriyttä surkastuu ja kuivettuu.

*Torvi* (tubus), yhdislehtisen verhon kokonaan yhteen kasvetunut alimainen, tavallisesti soukempi osa, Kuv. 56 a, 66 d.

*Laide* (limbus), ylempi erillaisempi, tavallisesti leveämpi osa, Kuv. 56 b, 66 e.

*Nielu* (faux), torven ja laiteen välikohta, Kuv. 56 c.

*Kokonainen* (calyx integer), on yhdislehtinen verho päähän asti yhteen kasvettuneilla lehdillä, jolloin pykeet laidassa enemiten hyvin selvästi osottavat niiden yhteen kasvettuneitten erityisten verholehtien luvun; *huulimainen* (c. labatius), kahdella eripitkällä huulten tapaisesti toinen toistansa vastaan asettuneella liuskalla, Kuv. 57 c; *kahdenkertainen* (c. duplex), lisäverholla va-

rustettu. Kahdenkertaisena varsinaista verhoa sanotaan *sisäverhoksi* (c. interior) ja lisäverhoa *ulkoverhoksi* (c. exterior).

*Kiinteisiä* (sepala clausa) ovat verholehdet, kun makaavat kiinni terässä ja laidoilla toisiansa, Kuv. 58 b; *ylöspäisiä* (s. erecta), kun erillään terästä ovat pystössä; *ulospäisiä* (s. patentia), kuta kuinka terästä ulottuvina; *alaspäisiä* (s. reflexa), kääntyneet terästä pärsäänpäin; *lisäkkeisiä* (s. appendiculata), kannalta lähtevillä ulottuvaisilla eriliuskoilla, Kuv. 7 f; *kannustettuja* (s. calcarata), kun yksi tahi useampi verholehti on kasvettunut oramaiseksi, tyhjäsuisiseksi *kannukseksi* (calcar); *pussimaisia* (s. saccata), kun vasta mainittu kasvettuma on hyvin lyhyt ja tylpää, Kuv. 58 a; *erivärisiä* (s. colorata), ei vehreät. Muuten taidetaan verhosta ja verholehdistä muotonsa vuoksi käyttää samoja selityssanoja, kun terästä ja terälehdistä (joista vasta).

*Terälehti* (petalum), erilehtisen terän kukin eri lehti.

*Kynsi* (unguis), terälehden soukempi kantaosa, Kuv. 58 d.

*Lapa* (lamina), leveämpi osa, Kuv. 58 c, joka saattaa olla ehytlaitainen, halkoinen, liuskainen, hammaslaitainen, nyhälaitainen, ripsinen j. n. e. kuin lehdistä on jo ennen mainittu.

*Ripsuinen* (lamina fimbriata), pitkiin, varsin soukkiin siekaileisiin jakaunut terälapa; *yhdislehtinen* t. *yksilehtinen* (corolla gamopetala), Kuv. 62; *erilehtinen* (c. eleuteropetala), Kuv. 58; *yksi-, kaksi-, kolmi-, neli-, viisi-, monilehtinen terä* (c. mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, polypetala); *epäyhtinen* (c. heteropetala), osiksi eri-, osiksi yhdislehtinen; *tasamukainen* (c. æqualis), liuskoista, pykäleistä tahi lehdistä toinen ei ole toistaan isompi; *epämukainen* (c. inæqualis), vastahakaan edellistä, Kuv. 7 e; *vastakohtainen* (c. irregularis), jonka eri osat, ehkä epämukaisesti muodostuneita, kuitenkin melkein aina ovat niin vastakkaisia, että jos kukka leikataan päästä pitkittäin halki, puoliskot oikealla ja vasemmalla puolella tulevat tarkoin vastaamaan toisiansa, joka sitä vastoin ei voi tapahtua kukan yli- ja aliosassa, niiden erilaisen muodostumisen suhteen, e. m. herne- ja huulikukissa; *suunnallinen* (c. regularis), joka on sekä tasamukainen ja vastakkainen, e. m. sirenin kukka, Kuv. 51 a, 90.

*Torvimainen* (c. tubulosa), yhdislehtinen terä, jonka laide on melkein erottamaton torvesta\*), Kuv. 60 a; *pikarimainen* (c. cyathiformis l. cylindrico-campanulata), vähän avarammalla laiteella, Kuv. 61; *maljamainen* (c. cupuliformis), kuin avosisuinen pallonpuolisko; *suppilomainen* t. *tuuttimainen* (c. infundibuliformis), tuutin- tahi tratintapainen, Kuv. 62; *kellomainen* (c. campanulata),

\*) *Torvi*, *laide* ja *nielu* ovat terässä kuin edellisellä sivulla on verhostaki mainittu.

Kuv. 56 B; *palleroinen* (c. globosa), Kuv. 63; *munapyöreä* (c. oviformis); *kukkaromainen* (c. urceolata), *munapyöreä*, suumalon alta supistunut, Kuv. 64; *kulho-* t. *hattumainen* (c. hypocateriformis), terän torvi lyhyt ja laide litteämäisesti levennyt, Kuv. 59; *ratasmainen* (c. rotata), vielä lyhemmällä torvella k. ed. ja erillisemmällä lehdillä, Kuv. 90, 92; *kielekkeinen* (c. ligulata), kun yhdislehtisen, epämukaisen terän torvi on pillimäinen litteämäisellä laidepuoliskolla, Kuv. 48 c, d; *huulimainen* t. *kaksihuulinen* (c. labiata l. bilabiata), kahdella *huuliksi* (labia) verratulla liuskalla vastatusten, joista toinen, *alahuuli* (labium inferius), Kuv. 57 a, toinen *ylihuuli* (labium superius) usein kaarevasti hedetten päälle *kuvertunut* (fornicatum), jolloin sitä sanotaan *kypäräksi* (galea), Kuv. 57 b; *am-mottava* (c. ringens), siirottavilla huulilla ja avonaisella nielulla, Kuv. 57; *naamattava* (c. personata), kun nielu alahuulen turpoumasta on suljettu, jota turpoumaa sanotaan *laeksi* (palatum). Usein on huulikukkain torvi tyveltä *kyhmymäisellä* t. *pussimaisella lisäkkeellä* (c. basi gibbosa l. saccata), taikka on se *kannustettu* (c. calcarata).

*Ruusumainen* (c. rosacea), suunnallinen terä viidellä levyt-lapaisella, lyhytkynsisellä erilehdellä, renkaamaisesti liittäytyneet verhon suumaloon; *yhdiskantainen* t. *malvamainen* (c. malvacea), suunnallinen, viisilehtinen terä lyhyillä toinen toiseensa ja heteisiin kiinni kasvettuneilla kynsillä; *ristimäinen* (c. cruciata), suunnallinen, nelilehtinen terä selvästi erotetuilla kannoilla, Kuv. 58; *neilikkimäinen* (c. caryophyllacea), suunnallinen, viisilehtinen terä pitkulaisilla kynsillä tuppimaisessa verhossa, Kuv. 91; *huulikkeinen* (c. labiosa) ja *vastohuulikkeinen* (inverse labiosa), epämukaisia teriä viidellä erilehdellä; *perhomainen* t. *hernekukkainen* (c. papilionacea), viidellä epämukaisella terälehdellä, kolme päälläpuolen erillistä ja kaksi alempana yhteen kasvettunutta, Kuv. 66. Erillisistä lehdistä sanotaan päälimmäistä ja leveintä (a) *purjeeksi* (vexillum), sivulehtiä (b) *siiviksi* (alæ) ja kahta yhteen kasvannutta alimaista (c) *venhoksi* (carina), jonka sisässä heteet ovat ja joka on *kaksikynsinen* (biunguiculata). Välistä venholehdet eivät olekaan yhteen kasvaneet, jossa tapauksessa niitä sanotaan *laitalehdeiksi* (petala carinalia) ja koko terää *perhottavaksi* (c. subpapilionacea).

*Liljamainen* (perigonium liliaceum, corolla liliacea l. flos liliaceus), kupu kuudella suunnallisella erilehdellä kahdessa kerassa taikka kynsistä yhdessä; *epäsuuntainen* (perigonium orchideum), kupu kuudella vastakohtaisella lehdellä kahdessa kerassa eli rivissä, joista sisäkerran yhtä, hyvin erimuotoista lehteä sanotaan

*huuleksi* (labellum) ja toisia siitinten ympärillä olevia *kypäriksi* (galea). Tavallisesti on huulella myös *kannus* (calcar), Kuv. 89 a.

*Heinäkukka* (flos gramineus l. perigonium glumaceum); siinä on vuoroittain kälpeitä lehdyköitä, nimeltänsä *akanat* (glumæ), varsinaiten kukkaosain, hedetten ja emin, ympäri kuperoitunut, e. m. rukiilla, ohralla, kauralla ja kaikilla muilla heinäkasveilla, Kuv. 67, 68.

*Kaleet* t. *suojuskanat* (glumæ exteriores, eli yhteisesti gluma) ovat ne ulkopuolimaiset *akanat tähkylän* (spicula) tyvellä, Kuv. 67 aa. Niitä on tavallisesti kaksi, välistä vaan yksi, kun toinen kokoon kurtistunut, ja niiden sisäpuolella on milloin yksi, milloin kaksi tahi useampaa kukkaa, jonka mukaan tähkylää sanotaan *yksi-*, *kaksi-*, *monikukkaiseksi* (spicula uni-, bi-, multiflora).

**Muist.** — On ennen, ehkä väärin, luultu näiden suojuskanain vastaavan täydellisempään kukkain verholle, jonka tähden niitä myös on nimetty välistä *verhoakanoiksi* (glumæ l. valvulæ calycinæ), välistä *ulkokehäksi* (perianthium externum).

*Helpeet* t. *kukkakanat* (glumellæ l. paleæ) ovat ne kaksi sisämaista *akanaa* itsensä kukkasen ympärillä, Kuv. 67 b, 68 b. Niistä on se *ulkopuolimmainen* tahi oikeastansa *alimainen* (palea exterior) tav. suurempi ja vahvempi *vihneen* t. *siikasen* (arista) nimisellä, keski-suonen pidennyksellä selkäpuolellansa, Kuv. 68 c, jonkalainen pidennys kaleissaki usein tavataan. *Sisempi* tahi oikeammin *ylempi helve* (palea interior) on aina hentosempi ja tavallisesti kaksikärkinen päästä, Kuv. 65 b, 68 a.

**Muist.** — Helpeitä on välistä arveltu heinäkukan teräksi ja nimetty *teräakanoiksi* (valvulæ corollinæ), tahi *sisäkehäksi* (perianthium internum). Myös on niitä ynnä sisällisten siitintensä kanssa sanottu *heinäkukkaseksi* (flosculus), ja koko tähkylää *kukaksi*.

Vihne lähtee milloin *tyveltä* *akanaa*, milloin *keskeltä*, *niskalta* tahi *päästä* ja on sikäli *tyvivihne* (arista basillaris), *selkävihne* (ar. dorsalis), *niskavihne* (ar. infraapicularis), *latvavihne* (ar. terminalis l. apicularis), ja itsekkö vihne on miten milloinkin *suora*, *polviiva*, *kierteinen* (tortillis), *ulottava* (exserta), *tähkäsisäinen* (inclusa) j. n. e.

*Kauna* t. *teräakana* (glumellula l. lodicula), pari kolme pienosta, kuulakkaa *akanaa* siitinten tyvipuolella, Kuv. 65 aa. Ne ovat heinäkukkain *teränaiheita*, ei kuitenkaan kaikissa tavattavia. Ennen arveltiin niitä *mesipiteiksi* (nectarium) ja nimitettiin myös *mesivareiksi* (squamæ nectariferæ).

*Sukainen kupu* (perigonium setosum) ja *kupusukat* (setæ perigoniales), Kuv. 69 a, kuuluvat sarakasvien selitykseen. Niillä tavallisesti on kuusi tahi useampaa hapsimaista sukua siitinten ympäri. Mitenkä suat peittävät tahi ei peitä siementä, sanotaan sitä *sukaiteilleiseksi* (setis perigonii stipatum l. cinctum) tahi *suattomaksi* (nudum l. setis orbatum).

*Pullakkomainen* (perig. urticulare l. urceolatum) on sarakasvien kupu, kun se kukkimisen jalestä muuttuu *pullakon* (utriculus) näköiseksi hedelmäksi,

Kuv. 70 a, b. Mesipiteeksi tahi verhoksi arveltuna on seki ennen saanut toisen nimen *mesipullakko* (nectarium urceolatum), tahi *verhopullakko* (calyx utriculatus).

Samoin kuin jo ennen on verhosta sanottu, voipi myös terä olla *lyhytaikainen*, *menehtyvää*, *kuihtuva* j. n. e.

*Sikiäispääallinen* t. *latvaperäinen* (flos epigynus l. superus) on kukka, kun yhdislehtisen kehän tahi kuvun alipuoli on niin kiinni kasvettunut emin ympäri, että sen valtoin ylipuoli, laide, terä (tahi kupu) ja heteet näyttävät ikään kuin sikiäimen päältä lähteviksi; *sikiäisalainen* t. *pohjaperäinen* (flos hypogynus l. inferus) sitä vastoin on se kukka, jonka kehä tahi kupu eivät ole sikiäimeen kiinni kasvettuneet, ja sentähden näyttävät sen alle asettuneiksi; *sikiäisympäröitsevä* t. *ympäriperäinen* (flos perigynus l. semisuperus), kun kehä ja heteet ovat niin yhdistyneet erilliseen — ei verho- tahi kuputorveen kiinni kasvettuneeseen — sikiäimeen, että näyttää, kun olisivat kiinni ympäri emin tyvää.

*Kukanaihos* (æstivatio l. præfloratio) merkitsee kukan lehtiösain asentoa poimissa eli kukanalussa ennen puhkeamistansa, joka sen poikkileikkauksesta parhain nähdään. Eri laatunsa suhteen on kukanaihoksen poimi-ala, niinkuin edellä mainittu lehtiaihoksenki silmikkoala, parhaasta päästä: *laitavierinen* (æstivatio valvata), kun verhon tahi terän lehtialut ovat laidottain toinen toisensa viressä; *paanuttu* (æst. imbricata), kun lehden laidat vuoroin peittävät toinen toisensa, jossa tapauksessa se taitaa olla: *limikierteinen* (æst. contorta), kuki lehdenalku peittää laidallansa vierellisen lehden; *poimuinen* (æst. plicativa); *viisindäinen* t. *viisikerroksinen* (æst. quincuncialis); *kurttuinen* (æst. corrugativa), lehdenalut ovat sekä pitkin että poikkipäin ilman järjestyksettä rypistyneet, e. m. *unikkokukassa*; *purjepeitteinen* (æst. vexillaris), hernekukkain lehtiaihos, jossa purje peittää siivet, siivet venhon; *kypäripeitteinen* (æst. galearis l. cochlearis), huulikukan lehtiaihos, jossa kaikki muut laideliuskat ovat kypärin sisään kääriytyneet.

*Hede* (stamen); heteissä, kukan enimmäen muuttuneissa lehdennoissa, erotetaan kolme eri osaa: *Palho*, *Ponsi* ja *Siitepöly*.

*Palho* (filamentum), heteen tavallisesti rihmahoikka ponnien alainen osa, Kuv. 71 aa. Välistä palhoa ei olekkaan, ja silloin sanotaan pontta *palhottomaksi* (anth. sessilis). Muuten palho on miten miki *rihmainen*, *orainen*, *nuijamainen* (f. clavatum), liereä ja paksulatvainen; *levedkantainen* (f. basi dilatatum) ja *levedälatvainen* (f. apice dilatatum), ala- tahi ylipäästä levennyt; *terädmäinen* (f. petaloideum), terälehten-moinen; *kaksipäinen* (f. bifurcum) ja *kolmipäinen* (f. tricuspidatum).

*Ponsi* (anthera), Kuv. 71 b, c, d, heteen päällinen ja tärkein eri osa, jossa siitepöly valmistuu. Sillä on tavallisesti kaksi pikuruista *lokeroa* (loculamentum) ja niiden välissä palhon pidenyksenä *ponsikalvo* (connectivum). Tavallisesti ovat lokerot soikeita ja *rinnakkaisia* (loculamenta parallela), Kuv. 71 dd, harvemmin ovat ne enemmän tai vähemmän toisistaan *ulontuvia* (l. divergentia). Ylen harvoin tavataan ponsi *yksilokeroisena* (a. unilocularis) ja vieläki harvemmin *nelilokeroisena* (a. quadrilocularis).

*Sivuluomainen* (a. lateraliter dehiscens) on ponsi, joka avauu ja luopi siitepölynä sivusta tahi *sivuluomasta* (rima) milloin *ulospäin* (extrorsum), milloin *sisäänpäin* (introrsum); *latvaluomainen* (a. apice dehiscens), avauva ja luova siitepölynä päästä joko poikittelaisesta halkeamasta tahi yhdestä eli useammasta reiästä (porus); yksilokeroinen ponsi on tavallisesti *poikittain avauva* (a. transversim dehiscens). *Poikittelainen* (a. horizontalis l. incumbens) on ponsi, kun on keskikohdasta poikkipuolin palhon päässä kiinni, jolloin se usein myös on *kiekkuva* (a. versatilis), Kuv. 71 c; *kaksisarvinen* (a. bicornis) ja *kaksipäinen* (a. bicuspidata), kahdella sarvenmoisella tahi muulla eri *lisäkkeellä* (appendix).

*Siiteponsinen* (stamen fertile l. perfectum) on hede täysinäisellä, siitepölyisellä ponnella; *joutoponsinen* (st. sterile l. imperfectum), jonka ponsi ei tee siitepölyä; *vajaponsinen* t. *ponneton* (staminodium), jolla pontta ei ole ollenkaan. Samoin kuin edellisellä sivulla on sanottu verhosta, kehästä ja kuvusta, taitavat myös heteet olla *sikiäis-päällisiä*, *-alaisia* (t. *-pohjaisia*) ja *-ympäröitseviä* t. *latva-*, *pohja-* ja *ympäriperäisiä*.

*Määrälukuisia* (stamina definita) ovat heteet, joita aina on yhtä monta yhdessä lajissa, eikä päälle kahdenkymmenen; *epäluukuisia* (st. indefinita), yli kahdenkymmenen; *yksi-*, *kaksi-*, *kolmi-*, *monirivisiä* (st. uni-, bi-, tri-, multiserialia), kun heteet lähtevät yhdessä tahi useammissa riveissä; *erillisiä* (st. libera), sekä palholtaan että ponnella erin toisistaan, Kuv. 71; *yhtyneitä* (st. connata), jollain tavalla yhdistyksessä keskenänsä; *yhdispalhoisia* (st. filamentis connata), yhteen kasvaneilla palhoilla; *yksi-*, *kaksi-*, *kolmi-*, *monikuntaisia* (st. mon-, di-, tri-, polyadelpa), yhdispalhoisina yhdessä, kahdessa, kolmessa tahi useammassa kimpussa; *yhdisponsisia* (st. antheris connata), ponnet yhteen kasvettuneet kuin torveksi, joka puhkeaa ja luopi siitepölyn sisäänpäin, Kuv. 48 g; *liiteponsisia* (st. antheris coherentia), ponnet kiinni toisissansa ilman yhteen kasvamatta; *tasapitkiä* (st. aequalia); *eripitkiä* (inæqualia); *kaksivaltiaita* (st. didynama), neljästä heteestä on kaksi pidempää, kaksi lyhympää; *kolmivaltiaita* (st. tridynama), kuudesta heteestä on kolme pidempää, kolme lyhympää; *nelivaltiaita* (st. tetradyn-

nama), kuudesta heteestä on neljä pidempää, kaksi lyhympää; *viirivaltiaita* (st. pentadynama), kymmenestä heteestä on viisi pidempää, viisi lyhympää; *parivaltiaita* (st. diplodidynama), viidestä heteestä ovat kaksi ylimäistä pisimmät, kaksi keskimäistä vähän lyhemmät ja alimainen yksinäinen hede lyhin; *torvisisäisiä* (st. inclusa), kun eivät ulotu terän torvesta esille.

*Siitepöly* (pollen), ponnassa tavattava järin hieno jauhomainen, tavallisesti keltainen tohu mitä pienimpiä, ympäri pölyäviä rakkosia eli *siitehiukkoja* (grana pollinis), joiden sisässä on vetelää jäläistä ainetta, nimeltänsä *siiteneste* (fovilla). Emiheteisien t. Kämmeekkäisien (orchidaceæ) kukissa liittyvät kaikki itsekunki lokeron siitehiukat yhdeksi *pölymyhkyksi* (massa pollinis). Kämmeekällä ja eräillä muilla likisukuisilla kasveilla hoikkenee pölymyhky alaspäin hienoksi peräksi eli *hännykäksi* (caudicula), päättyvä jäläisellä, nuppimaisella nystyrällä, jota sanotaan *pidättimäksi* (retinaculum).

*Pohjus* (receptaculum) on se kuta kuinka turpea, usein litteäksi levennyt varren osa tahi kukkaperän pää, jolla itse kukan ja hedelmän erityiset osat makaavat, Kuv. 71 e. Tätä oikeastaan sopii arvella valmistumattomain, hyvin lyhentyneitten ja kutistuneitten varsinivelten muodostumaksi, jonka tähden pohjuksella makaavat kukkaosat ovatki kiehkuramaisesti toinen toisensa sisäpuolella, vaikka, jos ajateltaisiin nämät kutistuneet varsinivelet pidentyneiksi, niinkuin Kuvassa 10 d e f g on tehty, samat kukkaosat tulisivat olemaan päällitysten, ei sisätysten. Vaillinaisissa kukissa on se ainoastaan *hedepohjus*, täysinäisissä myös *teräpohjus*.

*Pielukseksi* (torus) sanotaan vahvemmakeksi kasvanutta ja käsnämäiseksi paisunutta, vallintapaisesti emin ympärillä olevaa pohjusta, e. m. vahterin kukassa; *emipieleksi* (gynophorum l. gynopodium), kun se pohjusosa, jonka päällä emi likeisimmästi seisoo, on pidennyt, niin että näyttää, ikään kuin olisi emi peräkäs, e. m. kohokin kukassa.

*Verhovarainen* on pohjus yhteen kasvettuneena verhon kanssa, *verhoheteisissä* (calycifloræ) kasveissa; *itsevarainen*, joka ei ole yhdistyksessä verhon eikä terän kanssa, *pohjaheteisissä* (thalamifloræ); *terävarainen*, kun on yhdessä terän kanssa, *teräheteisissä* (corollifloræ).

*Emi* (pistillum), kukan sisimmäinen osa hedetten ja koko kehän keskellä. Sillä on kolme eriosaa: *Sikiäin*, *Vartalo* ja *Luotti*.

*Sikiäin* (germen l. ovarium), emin tavallisesti turpeampi alusosa, joka sitten siittyneenä valmistuu hedelmäksi, Kuv. 71 f. Siinä on päällimmäisnä yksi eli useampaa *sikiäislehteä* (carpophyllum), Kuv. 73 d, ja niiden sisällä *siemenaiheet* (ovula) *napasuonestaan* funiculus umbilicaris) *istukassa* (placenta) kiinni, Kuv. 72 b.

*Kukanalainen* (germen inferum) on sikiäin latvaperäisessä kukassa, *kukanpäällinen* t. *-sisäinen* (g. superum) pohjaperäisessä ja *puolialainen* (g. semiinferum) ympäriperäisessä kukassa. *Yksilokeroiseksi* t. *-pesäiseksi* (g. uniloculare) sanotaan sikiäintä, kun se on tekeynyt joko yhdestä laidottain vastatusten kiertyneestä ja ummistuneesta sikiäislehdestä, taikka niin, että kaksi tahi useampaa sikiäislehteä ovat sivulaidoistaan toinen toistensa kanssa yhteen juottuneet, Kuv. 73 a. Jälkimmäisessä tapauksessa voidaan sikiäislehtien alkuperäinen luku helposti selittää sikiäimen poikkeileikkauksesta, kuin myöski niille vastaavain tavallisesti erilleen jääneitten vartaloin ja luottein luvusta. *Kaksi-*, *kolme-*, *monipesäinen* sikiäin (g. bi-, tri-, pluriloculare) syntyy sillä tavoin, että sikiäislehtien sivulaidat, kääntyneinä eli kiertyneinä sisäänpäin ja yhteenjamoutuneina keskipaikalla sikiäimen sisustaa, jakavat sen yhtä moneen *pesään* eli *lokeroon* (loculamentum), kun niitä itsiäki on, Kuv. 73 b. Lokeroin *välkelmut* (dissepimenta) ovat niin muodoin alkuperäisyyttänsä kahdenkertaiset, vaikka useimmiten kuitenkin näyttää, kun olisi niiden ohut kelmu vaan yhdenkertainen.

*Siemenaihe* (ovulum l. gemmula) on nuppimainen hipale, yhteydessä istukan kanssa joko hiushienon *napasuonen* (funiculus umbilicalis) kautta, taikka suorastansa, jolloin se on *napasuoneton* (ovulum sessile), Kuv. 73 c. Tavallisesti ovat siemenaiheet istukassa kahdessa rivissä eli *kaksirivisesti* (ovula biserialia), välistä kuitenkin ei kun *yksirivisesti* (o. uniserialia). Sikäli kun erinäinen siemenaihe on kiinni sikiäimen pohjussa tahi ylempänä latvaa vasten, sanotaan se olevan *pystyinen* (o. erectum) tahi *riippuva* (o. pendulum). Valmistuneella siemenaiheella on untuvainen *sydän* (nucleus) ja sen päällä *siemenkalvo* (integumentum), joka on yksi- tahi kaksikertainen, ylen harvoin kokonaan puuttuva.

*Vartalo* (stylus), emin keskimäinen, rihmahoikkainen osa, jonka latvassa luotti istuu, ja joka tyveltään muuttuu sikiäimeksi, Kuv. 71 g. Vartalon läpi kulkee päästä päähän reikä, *vartaloputki* (canalis stylinus), jonka kautta muuten kokonaan umpinaisen sikiäinkolo on yhteydessä ulkoilman kanssa.

*Latvaperäinen* (stylus terminalis) on sikiäimen päästä lähtevä vartalo; *sivuperäinen* (st. lateralis) ja *pohjaperäinen* (st. basilaris), kun lähtee sikiäimen sivulta tahi pohjasta. Tavallisesti on vartalo kuta kuinki *rihmamainen* (st. filiformis) eli *liereä* (st. cylindricus); *nuijamainen* (st. clavatus); *keilamainen* (st. conicus) enimmäissä sarjakukissa, joissa sen turpeata aliosaa sanotaan *vartalojalaksi* (stylopodium).



*Luotti* (stigma), emin latvaosa, joka vastaan ottaa ponnesta lähtevän siitepölyn, jota varten se pinnaltaan on nystyräinen tahi nystykarvainen, Kuv. 71 h.

Luotti on miten milloinkin; *hapsimainen* (stigma filiforme), Kuv. 60 b; *hahtuvamainen* (st. aspergilliforme), *töyhtöinen* (st. penicilliforme), *sulkamainen* (st. plumosum); *terälehtimäinen* (st. petaloideum), e. m. kurenmiekalla; *nuppinainen* (st. capitatum), Kuv. 58 e; *kokonainen*, *liuskainen* eli *jakoinen*; *litteä* tahi *palleroinen*; *torvimainen* (st. tubulosum); *löpkipäinen* (st. perforatum), epäselvällä vartaloputkeen kulkevalla aukolla päässänsä; *tahkulainen* (st. lamellatum), yhdeksi tahi useammaksi *tahkulaksi* (lamella) liitteynyt; *ristimäinen* (st. cruciatum), ristimäisesti neljäksi jakaunut; *sätejakoinen* (st. radiatum), vartaloton, tähtimäinen luotti; *latvaperäinen* ja *sivuperäinen*, mikäli istuu vartalonsa päässä tahi kylässä; *johteinen*, joka juoksee alaspäin kahdenpuolen vartaloa; *vartaloton* (st. sessile), kohdastaan sikiäimen latvasta lähtevä; *vajounut* (st. immersum), sikiäimen sisään painunut vartalon luotti.

Muist. — Sikiäislehtien päinä jäävät luotit usein erilleen, josko emin aliosat ja vaikka vielä vartaloki ovat aivan yhteen toinen toisensa kanssa kasvettuneet, ja osoutuvat sillä tavoin, kuinka monta sikiäislehteä ennen yhteenkasvettumista on ollut. Tässä tilassa vastaa tavallisesti luotissa sen kaksi eri osusta, *luottihaurukat* (crura stigmati), itsekkönsä erityiselle sikiäislehdelle.

*Siitintukku* (gynostemium l. androstylium), kun hedepalhot ovat emin vartalon kanssa niin yhteenkasvettuneet, että ponsi tulee olemaan suorastaan eteenpäin kääntyneen luotin päällä, niin kuin emiheteiskasveilla.

*Siitinlakka* (stylostegium l. gynostegium), ponnet kiinni kasvettuneet kukan kahteen vartaloon, ja levennyt kilpimäinen luotti niiden päällä.

#### h. — Hedelmästä.

*Hedelmä* (fructus), siittyneestä sikiäimestä valmistunut siemenholho, jolla on kolme eriosaa: *Koppi*, *Istukka* ja *Siemenet*.

*Epähedelmä* (fructus spurius), johon on yhteen kasvettunut hedelmään kuulumatonta lisäkettä lähellisistä kukka- tahi pohjus-osista. Semmoinen epähedelmä tahi *epämarja* (bacca spuria) on e. m. mansikka. Sen mehevä aine ei ole muuta kun tursistunutta pohjusta, jonka sisässä varsinaiset hedelmykset ovat.

*Siemenkoppi* t. *koppi* (pericarpium), sikiäislehdistä kasvettunut ja muodostunut siementen suojuskuori, Kuv. 72, jossa A osottaa poikki leikattua, valmistumatonta, ja B liitteistään auvennutta, valmista koppi. Eri lehtien yhdyntäpaikkaa sanotaan *liitteeksi* t. *saumaksi* (sutura) ja itsiä yhtyneitä lehtiä *laidoiksi* (valvæ l. valvulæ),

joiden mukaan koppi on *yksi-, kaksi-, kolmi-, . . . monilaitainen* (p. uni-, bi-, tri- . . . multivalve).

Kopissa on kolme eri kerrosta: 1<sup>o</sup> *kesi* (epicarpium), hedelmän päällimmäisenä peitteenä, jonka eri laadun ja ulkopeitteen jälkeen hedelmä on: *kalju* (fructus glaber), *härmeä* (fr. pruinosis), *lientä* (fr. pubesens), *piikillinen* (fr. aculeatus); 2<sup>o</sup> *välikalvo* (mesocarpium), joka usein muuttuu *möyheäksi* t. *maltoiseksi* (m. carnosum) tahi *meheväksi* (m. succulentum), tuttu silloin eri nimellensä *malto* (sarcocarpium l. caro), e. m. omenassa; 3<sup>o</sup> *sisäkalvo* (endocarpium), peittävä hedelmän sisuskolon ja enimmäksi osaksi muodostava sen eri lokerot. Usein kovettuu se mallosta tyysten eriäväksi *luuksi* t. *kiveksi* (putamen), e. m. tuomen ja kirsikän marjoissa.

Samoin kuin sikiäin, taitaa myös hedelmä olla: *kukanpäällinen* t. *-sisäinen* (fructus superus); *kukanalainen* (fr. inferus); *puolialainen* (fr. semiinferus); *yksi-, kaksi-, kolmi-, monilokeroinen* t. *-pesäinen* (fr. uni-, bi-, tri-, multilocularis). Itsekukin eri lokero voipi olla *siemeninen* (loculamentum fertile) tahi *tyhjä* t. *siemenetön* (l. sterile), ja koko hedelmä *yksi-, harva-, monisiemeninen* (fructus mono-, oligo-, polyspermus).

*Istukka* (placenta, spermophorum), on se osa, jossa siemenet ovat kiinni istumassa. Se on joko *keski-istukka* (pl. centralis) tahi *laita-istukka* (pl. valvaris), kuin myös *irtonainen* (pl. libera, pl. centralis libera), erin laidoista keskellä kotaa, Kuv. 73 e; *kelmu-säteinen* (pl. centralis radians l. dissepimentalis), keski-istukka josta yltä ympärinsä lähtee välikelmuja laitoihin, jolloin itseä runkoa sanotaan *keskipieleksi* (columella centralis); *laitavierinen* (pl. valvaris haud dissepimentalis), suorastaan kopin laidassa; *keskilaitainen* (pl. parietalis), keskellä laitaa, Kuv. 72 b; *liiteperäinen* (pl. marginalis l. suturalis), pitkin liitteitä; *laitakelmuinen* (pl. valvaris dissepimentalis), laidasta sisäänpäin lähtevillä, säteisillä välikelmuilla, joissa siemenistukat ovat; *keskilaitaiskelmuinen* (pl. parietalis radians), vasta mainitut kelmut lähtevät keskilaidoilta; *väliseinäinen* (pl. intervalvularis), väliseinän tapaisella kelmulla, jossa siemenistukat ovat. Väliseinä toisinaan on keskeltä auki jäänyt, jolloin sitä sanotaan *rakoväliseksi* (dissep. fenestratum).

*Yksikoppinen* (fructus holocarpus), hedelmä ainoastaan yhdellä *komerolla* (paracarpum), joka kuitenkin taitaa olla istukasta lähteneitten, sädejakoisten, välistä muidenki välikelmuin kautta *pesittelevä* (subocularis) tahi *monipesäinen*.

*Keski-istukkaisesti yksikoppinen* (fr. holocarpus centrispermus), yksikoppinen hedelmä keski-istukalla. Jos istukka on eril-

linen, niin hedelmä on yksipesäinen; kelmusäteisenä istukan ollessa, hedelmä tekeyy monipesäiseksi.

*Laita-istukkaisesti yksikoppinen* (fr. holocarpus pleurospermus), yksikoppinen hedelmä laita-istukalla, joka istukka miten milloinkin saattaa olla joko laitavierinen, keskilaitainen, liiteperäinen, laitakelmuinen tai väliseinäinen, ja hedelmä sikäli yksipesäinen, pesittelevä tai monipesäinen.

*Erikoppinen* (fr. schizocarpus), hedelmässä on useampaa eri *hedelmystä* (carpellum, carpidium).

Hedelmukset erikoppisessa hedelmässä ovat kierteisesti ja erin toisistaan, mutta jos ovat kiehkuraisesti, niin välistä kasvavat yhteenki toinen toisiinsa, kuitenkin niin löyhästi, että hedelmän valmistuessa jälleen erivät.

*Lohkohedelmä* (schizocarpium), monisiemeninen hedelmä, jautuva sillä tavoin, että vastaavainen, ei auki lähtevä sikiäinen osa tiukasti sulkee itsekunkin erityisen siemenen. Jakaumisensa eroavaisuudesta sanotaan semmoista hedelmää *kaksi-*, *monilohkoiseksi* (sch. di-, polycoccum) ja sen erityiset lohkot *hedelmyksiksi* t. *pähkylöiksi* (carpellum, coccum, nucula), e. m. mintussa ja pillikkeessä.

*Monikoppinen* (fr. syncarpus), useammasta kiehkuraisesta hedelmuksesta eriyttömästi yhteen kasvettunut hedelmä.

*Yhdiskoppinen* (fr. gamocarpus), monikoppinen hedelmä, jonka pohjus on lihavaksi, nahkeaksi tai puutavaksi peitteeksi hedelmän päälle kasvettunut. Sen siemenet tavallisesti ovat *riippuvia* (semina pendula).

*Yksinäinen* (fr. simplex), itsekukin yksikoppinen hedelmä; *liittoinen* (fr. compositus), eri-, moni-, tai yhdiskoppinen hedelmä.

Kopin ja koppikalvoin eri muodostumisen suhteen erovat hedelmät seuraaviin kolmeen pääläjiin: 1<sup>o</sup> *kuivakuoriset* (fructus aridi), jotka sitte kiinteytensä puolesta ovat joko *kalvomaisia* (fr. membranacei), *nahkeita* (fr. coriacei) tai *puutavia* (fr. lignosi); 2<sup>o</sup> *marjat* t. *marjahedelmät* (fr. baccati), mehevämaltaisia hedelmiä ohuella, enimmäkseen kelmumaisella sisäkalvolla; 3<sup>o</sup> *kuivamarjat* (fr. drupacei), kuta kuinki mehevämaltaisia kovalla, puutavalla kivellä eli luulla sisäissä.

Kuivakuorisia hedelmiä on meillä seuraavat lajit:

*Jyväke* (caryopsis), yksinäisestä, erillisestä tai kukan päällisestä sikiäimestä syntynyt yksisiemeninen, tavallisimmasti suljettu hedelmä. Sen koppi on joko kovin ohut, itsensä siemenkuoren kanssa kokonaan yhteenjuottunut kalvo, niink. rukiilla, kauralla ja muilla heinäkasveilla, taikka myös on se selvästi irti siemenestä, niink. leinikkö-suvulla, jolloin niitä myös on sanottu *hedelmyksiksi* (carpellum). Jälillä olevasta vartalosta jyväke usein näyt-

tää, kuin olisi *otainen* (caryopsis caudata l. rostrata). *Pähkinä-  
mäiseksi* eli *pähkyläksi* (c. nukulacea l. nucula) nimitetään jyvä-  
kettä, kun sen päällyskuori on kova ja murakka, niink. hampulla  
ja tattarella. *Rakkojyväke* (utriculus) on se jyväke, jonka kuiva,  
ohut, kalpea, suljettu tahi epäsääntöisesti aukeneva koppi ei ole  
siemeneen kiintynyt, niink. e. m. savikolla.

*Kuorusjyvä* (achenium), erouva edellisestä lajista ainoastaan  
sen kautta, että se on syntynyt kukanalaisesta sikiäimestä, joten  
sen kopilla on lisäpäällyys siihen kiinnittyneestä verhon eli kuvun  
torvesta, e. m. ohdakkeessa, maitiaisessa, Kuv. 85, 86, 48 f.

*Kehäkkeinen* (achenium coronatum, fructus coronatus) on kuor-  
usjyvä, kun sen latvapäähän on yhteen kasvettuneesta verhosta  
jäänyt pieni ympyräinen *palle* eli *kehäke* (corona), Kuv. 86 a.; *hai-  
venpäinen* (achen. papposum, fructus papposus), kun verho kuorus-  
jyvän latvasta jakauu hienoiksi *haiveniksi* (pappus), Kuv. 48 e f;  
*paljaspäinen* (achen. calvum), verho on niin kuorusjyvää myöten  
kasvettunut, että päässä ei ole kehäkettä eikä haivenia.

*Varreton* (pappus sessilis) on haiven, joka ei millään lailla  
haarau, *varrellinen* (stipitatus), kun tyveltä yhdessä, ylempänä haa-  
rauu, Kuv. 85 b; *vareinen*, *vihneinen* t. *kovasukainen* (aristatus),  
Kuv. 85 a; *pehmysukainen* (setiformis), *hapsimainen*, *sulkajakoinen*  
(plumosus), Kuv. 85 b, *lähtevä* (deciduus), kun pian lähtee, ja *py-  
syvä*, kun pysyy vielä varisneessaki kuorusjyvässä.

*Pähkinä* t. *pähkylämäinen kuorusjyvä* (nux t. achenium nu-  
camentaceum), kun kuorusjyvän koppi on kovettunut, puutava tahi  
vähintäänki nahkea ja selvästi erouva siemenvaipasta, e. m. päh-  
kinäpuun hedelmässä. Pähkinää, jonka kuori on ohuempi, nahkea,  
sanotaan *terhoksi* (glans), ja on se silloin tavallisesti *kehtokannan*  
(cupula) sisässä.

*Kaksoishedelmys* t. *kaksoisjyvä* (diachenium l. achenium bi-  
partibile), kaksisiemeninen kuorusjyvä, joka milloin jääpi aukea-  
matta, niink. mataralla, milloin halkeutuu kahteen osaan, kumpiki  
yhdellä siemenellä, niink. sarjakasveissa, Kuv. 87. *Sarja-* t. *rip-  
puhedelmys* (cremocarpium) halkeutuu täysivalmiina kahdeksi *jyvä-  
puolikkaaksi* (mericarpium), jotka rippuvat hivushienon, tavallisesti  
kaksijakoisen *jyväpidättimen* (carpophorum) päässä, Kuv. 87 a.

*Liite* (commissura), jyväpuolikasten yhdistyspaikka, Kuv. 87  
c; *liitesivu* (latusculum), se sivu, jolla jyväpuolikkaat ovat yhdis-  
tyneet toisiinsa, Kuv. 87 b, 88 d; *selkä* (dorsum), ulkopuolinen  
sivu; *harju* (jugum l. costa), korkeampi, pitkin selkää päästä pää-  
hän kulkeva naarmu, Kuv. 88 aaa, 87 dd.

Harjuja on tavallisesti viisi kummallaki puolikkaalla, nimit-  
tään *keskiharju* (jugum centrale), kaksi *väliharjuja* (juga interme-

dia) ja kaksi *sivuharjua* (juga lateralialia), jotka viimeiset saattavat olla joko *kulmaharjuja* (juga marginalialia) taikka *vieriharjuja* (j. intramarginalialia), kulman vieressä. Välistä on näiden *pääharjojen* (juga primaria), välissä toisia pienempiä *väliharjuja* (juga secundaria).

Harjut milloin ovat *piikkisukaisia*, milloin levenneet obuiksi, lehtimäisiksi kalvoiksi, *siipiharjuiksi* (j. alata) tai *rihmamaisiksi* (j. filiformia). Kun harjua ei näy ollenkaan, sanotaan jyväpuolikasta *sileäksi* eli *harjuttomaksi* (mericarp. ejugatum).

*Harjuväli* t. *vako* (vallecula), on kahden harjun väli paikka jyväpuolikkaassa, Kuv. 88 b; *öljyjuova* (vitta), musta, päältä päin usein näkymätön, pitkin vaon pohjaa kulkeva juova, sisältävä eri makuista ja hajuista haihtööljyä, Kuv. 88 c.

Välistä on useampia *öljyjuovia* yhdessä vaossa, jonka jälkeen vakoa sanotaan *yksi-, kaksi-, kolmi-, monijuovaisiksi* (uni-, bi-, tri-, multivittata). Toisinaan taas on vako *öljyjuovaton* (vallecula evittata).

*Siipihedelmä* (samara), yksi- tai harvasiemeninen kuiva hedelmä, jonka kopilla on yksi tai useampia kälpeitä, siipimäisiä lisäkkeitä. Niin tavataan e. m. jalavassa ja saarnessa yksisiipisiä, Kuv. 84, koivussa kaksisiipisiä hedelmiä; vaahterin siipihedelmä halkeaa kahtia, kumpiki puolisko yksisiipinen ja yksisiemeninen, Kuv. 83.

*Tuppilo* t. *tuppihedelmäs* (folliculus l. carpellum capsulare), yhdestä sikiäislehdestä muodostunut, monisiemeninen kuivakuori-hedelmä, siemenet sisällä pitkin liitettä, josta se raottuen puhkeaa, Kuv. 75, 76. Tuppihedelmäksiä tavallisesti on useampia kiekurassa, niink. rentukalla; harvoin ovat ne yksittäin.

*Palko* (legumen), yhdestä sikiäislehdestä alkunsa saanut yksipesäinen, kahdella laidalla aukeneva hedelmä, siemenet yhdessä tai kahdessa rivissä sisämaisessä tai yliliitteessä (mahasaumassa), e. m. herneenpalko, Kuv. 77.

Palko on toisinaan *pesäjakoinen* (leg. subbilocular), kun alinen tai selkäliite on pitkinpäin väliseinäntapaisesti sisäänkään-tyntynyt; *monipesäinen* (l. multilocular), väliseinillä eri siementen välillä; *kiekurainen* (l. cochleatum), kahteen tai useampaan kiekuraan kiertynyt.

*Nivelpalko* (lomentum), jolla tavallisesti joka eri siemenen välillä on *nivel* tai *kannas* (isthmus) ja joka ei aukene liitteistä, vaan katkeaa nivelistä poikki, Kuv. 78; *aukeamaton* (l. indehiscens), joka ei ollenkaan aukene, e. m. apilalla.

*Litu* (fructus siliquosus), kahdesta sikiäislehdestä muodostunut, enemmiten ohuella väliseinällä kahteen lokeroon jakaunut hedelmä, siemenet tavallisesti kahdessa vastakkaisessa rivissä kiinni, toinen ali-, toinen yliliitteessä, ja aukeava alta ylöspäin kahdella

laidallansa jälkeen jäävillä väliseinillä ja liitteillä. Se on kahdenmuotoinen:

*Lisko* (siliqua), kun litu on monikertaisesti, vähintäänki neljä kertaa pidempi kun leveä, Kuv. 79.

*Litukka* (silicula), kun se on yhtä pitkä taikka ei kun kaksi, korkeintaan kolme kertaa pidempi kun leveä, Kuv. 80.

Litukka on *leveävälinen* (silicula latisepta), kun väliseinä on yhtä leveä kun itse lituki ja *kaitavälinen* (s. angustisepta), kun väliseinä on poikkipuolin lidun leveyttä.

*Pähkylälitukka* (silicula monosperma), yksisiemeninen, pyöreä, litteäkö, litteä tahi ohut, puhkeamatta variseva litukka. Leveäksi litistyneenä sitä myös sanotaan *siipilitukaksi* (s. alata).

*Nivellisko* (siliqua lomentacea), kun lisko on nivelpalon lailla jakaunut yksisiemenisiin pesiin, jotka kukin aukeamatta varisevat.

*Kota* (capsula), monisiemeninen ja monilaitainen hedelmä, Kuv. 72, 74. Kota, ennenkun itse varise, luopi siemenensä mikä milläki tavalla *puhkeamasta* (dehiscencia), ja on milloin *päällinen* (c. supera), milloin *alainen* (c. infera); *yksi-*, *kaksi-*, *monipesäinen* (c. uni-, bi-, multilocularis).

*Liiteluomainen* (dehiscencia valvaris), kun kodan laidat liitteistä lähtevät erin toisistaan.

*Rakoluomainen* (d. rimosa), kun liitteisiin ilmautuu erinäisiä rakoja keskikohdalta molemmin puolin; laidat muuten jäävät toisiinsa kiinni.

*Hammasluomainen* (d. dentalis), laidat eriävät latvasta, ei ainoastaan liitepaikoista vaan keskisuontaki myöten.

*Läpiluomainen* (d. porosa), kota saapi pieniä pyöreitä reikiä eli huokoja latvaan tahi sivuihin.

*Kansiluomainen* (d. operculata), kota puhkeaa latvapäästä poikkipuolin niin, että päällimäinen osa, kuin kantena, putoaa pois. Semmoista puhkeamaa sanotaan myös *poikkipiirtoiseksi* (d. circumscissa), Kuv. 74 a.

*Sisäluomainen* (d. septicida), monipesäisen kodan välikelmut eriävät kahdeksi ja puhkeavat sisään päin.

On muistettava, että välikelmut alkuisin ovat kahdesta sikiäislehdestä yhteen kasvettuneet, jonka tähden jälleen taitavatki kahdeksi erit (katso s. 31).

*Laitaluomainen* (d. loculicida), monipesäisen kodan laidat puhkeavat keskisuonesta ulkopuolitse.

*Laitalähtivinen* (d. septicifraga), kodan laidat eriävät keskieleen kiinnijäävistä välikelmuista ja varisevat pois.

*Marja* (bacca), itsekuki maltoinen tahi mehevä hedelmä, jonka sisuskolon eli lokeroin peitteenä on kelmumainen, pehmeä, ei kovettunut sisäkalvo. Myös marja voipi olla irtoton eli *pääl-*

*linen* (bacca supera), e. m. variksen marja, tahi *alainen* (b. infera) ja niin muodoin yhteenkasvettunut verhon kanssa, e. m. mustikan, karpalon, viinapensaan ja tikkelin marja. Marja harvoin on *yksi-, kaksisiemeninen* (b. mono, disperma), vaan tavallisesti *monisiemeninen* (b. polysperma); *yksi-, kaksi-, monipesäinen* (b. uni-, bi-, multilocularis) j. n. e. voipi marja myös olla.

*Marjamaisiksi* (fructus baccatus) sanotaan erilaisia hedelmiä pehmeällä, mehevällä sisusaineella.

*Kurkka* (pepo l. peponium), marjamainen, kukan-alainen hedelmä useammalla laita-istukkaisella siemenellä mehevän, turpean aineen, hedelmähillon t. *ydelmän* (pulpa) sisässä.

*Omena* (pomum), puhkeamatta putoava, monisiemeninen ja monipesäinen hedelmä, jonka meheväksi päällysaineeksi verho kukkimisen jälkeen on turpunut ja kiinni kasvettunut, Kuv. 81.

*Kivi-* t. *luuhedelmä, luumarja* (drupa), puhkeamatta variseva hedelmä möyheällä, tavallisesti mehevällä, turpealla päällysaineella eli *mallolla* (caro l. sarcocarpium), Kuv. 82 a, jonka sisäkalvo on kovettunut kivimäiseksi eli luutavaksi kuoreksi, niin kutsutuksi *kiveksi* t. *luuksi* (putamen), Kuv. 82 b, enimmästi yhdellä, mutta välistä useammallaki pesällä ja siemenellä, e. m. kirsikän ja tuomen marjat.

Kivi eli luu voipi olla *yksi-, kaksi-, monipesäinen* (putamen uni-, bi-, multiloculare) taikka on hedelmässä useampaa pientä *kivosta* (pyrena), jolloin sitä sanotaan *kaksi-, monikiviseksi* (drupa di-, polypyrena).

*Yhdismarja* t. *hillukka* (drupa composita), kun keilamaisella istukalla joukottain yhteenkasvettuu pieniä yksisiemenisiä *kivi-hedelmäksiä* (acini), jotka sitte valmistuessa niin yhdessä ollen eriävät, e. m. vaaran- t. vatukkakasveilla.

*Siemen* (semen) kahdella eri osallansa: *Kuori* ja *Sydän*.

*Siemenkuori* (integumentum seminis l. spermodermis); siinä on *pinta* (testa l. membrana exterior) ja *aluskuori* (tegmen l. membrana interior). Edellinen on tavallisesti jäykempi, läpinäkyvätön ja erivärinen, välistä myös muuttunut rustomaiseksi tahi luukovaksi; harvoin on sen päällyskerta möyheä tahi mehevä, jolloin siemen on *marjamainen* (s. baccatum). Pintansa eri laadun mukaan on siemen miten milloinkin *kalju, kiiltävä, pilkullinen, kurttuinen, uurtainen, juovikas, karkea, tupsupäinen* (s. comosum), *koukkukarvainen, siivikäs* (s. alatum) j. n. e. Aluskuori tavallisesti on ohuempi, hienompi ja vaaleampi, välistä myöski paksumpi ja ruosteenkarvainen. Kuorien välillä tavataan toisinaan erinäistä ainetta, *välikerta* (mesospermium), ja muutamats luulevat pinnassa-

kin olevan kaksi kuorikertaa, varsinaisen pinnan ja sen päällä *ke-ton* (epidermis).

*Paljas* (s. nudum) on siemen, joka ei ole sikiäislehden peitteessä, vaan irtonaisena sen päällä, niink. käpykasveissa (coniferæ). Kasveja semmoisilla siemenillä sanotaan *paljassiemenisiksi* (plantæ gymnospermæ).

Muist. — On ennen, ehkä väärin, nimitetty semmoisiaki kasveja paljassiemenisiksi, joiden yksisiemenisen hedelmän, siemenen kiinteästi peittävä, sikiäislehti ei aukea, niink. paljassiemienisten lahkossa Linnein 14 luokassa, kaksivaltiaissa.

Muotonsa vuoksi on siemen *kehrämäinen* (s. discoideum), kun on pyöreänä ja liiteänä; *virnamainen* (lenticulare), pyöreänä tai soikeana ja liiteähkönä; *paljistettu* (marginatum), kun on erilainen viiru ympärillä; *nöhtämäinen* (scobiforme), kun on hyvin pieni, pitkulainen, hilpainen j. n. e.

*Syddän* (nucleus) on kasvialkio, joko kokonansa tai valkuaisen kanssa.

*Valkuainen* (albumen), siemensydämen eriosa, jota ei kuitenkaan kaikissa tavata. Aineensa vuoksi se on tavallisesti valkea ja milloin turpea eli lihava, milloin *rustomainen* (a. cartilagineum), milloin *jauhomainen* (a. farinaceum), *jäläinen* (a. mucilaginosum) j. n. e. Sijansa vuoksi alkion suhteen on se joko *yltätäympäräinen* (a. periphericum), *keskellinen* (a. centrale) tai *vierellinen* (a. laterale).

*Valkuallinen* (semen albuminosum) on siemen, jolla on valkuaista, *valkuaton* (exalbuminosum), jolla ei ole.

*Ide* t. *alkio* (embryo), siemenen pääosa, josta uusi kasvi itäessä ilmautuu. Siinä on kolme erittäin tarkattavaa osaa: *Itime*, *Sirkus* ja *Silmäke*.

*Itime* (rostellum); siihen kuuluu juuriaine eli *juurukka* (radicula), Kuv. 94 a, ja *sirkkaruoti* (cauliculus l. scapellus), Kuv. 94 b, jotka siemenessä yhdistettynä itäessä eriävät, toinen alapäin juuren, toinen ylös varren aluksi.

Alansa vuoksi valkuaisen suhteen, milloin valkuaista tavaan, on alkio *keskikohtainen* (embryo centralis); *syrjähtävä* (e. excentricus), kun se on valkuaisen sisällä, mutta syrjäämpäin sen keskikohdasta; *viereinen* t. *ulkopuolinen* (e. appositus l. externus); *kehivä* (e. periphericus), kun on valkuaisen ympärillä. Oman asunsa suhteen on alkio *suuntainen* (e. orthotropus l. erectus), suorana ja siemenen mukaisena, juurukka siemenen kantaa päin; *vastasuuntainen* t. *takaperäinen* (e. antitropus l. inversus), kun juurukka on siemenen latvaa päin; *kaltto* (heterotropus), joka ei ole siemenen mukaan; *taaskääntöinen* (amphitropus), luokkamaisesti kaaristunut, molemmat päät siemenen napaa päin; *kiekurainen* (e. circinatus), kiertynyt kuin tuohikäpy sisäänpäin.



**Sirkus** (cotyledo), jo siemenessä perustettu itäessä ilmaantuva kasvin sirkkalehti, Kuv. 93 a, 94 cc.

**Sirkkalehtinen** (planta cotyledonea) kasvi, jolle itäessä ilmaantuu sirkkalehti; **kaksisirkkainen** (pl. dicotyledonea), joka itää kahdella vastakkaisella, tahi (niinkuin havupuut) useammalla säteettävällä sirkkalehdellä, jota jälkimäistä saattaisi myös sanoa **monisirkkaiseksi** (pl. polycotyledonea); **yksisirkkainen** (pl. monocotyledonea) kasvi, jolla on vaan yksi sirkkalehti, ylen harvoin kaksi, eikä silloin vastatusten, vaan perätysten.

**Muist.** — Muutamissa harvinaisissa tiloissa on alkio yhtäläistä, tiheää ainetta, jossa ei havaita mitään erinäisyyttä, varsinkin ei sirkkuksia (embryo solidus l. acotyledoneus), e. m. vesiberneellä ja humalavieraalla.

**Nouseva** (cotyledo epigæa), sirkkalehti, joka itäessä nousee maan päälle näkyviin, n. k. tavallisesti kaikkien kaksisirkkaisten; **nousematon** (c. hypogæa), joka jääpi maahan ja muutenki vaillinaiseksi, n. k. tavallisesti yksisirkkaisissa.

**Laitajuuruinen** (embryo pleurorrhizus) on alkio, jonka sirkukset, laidoin siemenen leveyttä myöten, ovat päällystöillänsä vastatusten eli **vastapuoliset** (cotyledones adumbentes) ja juurukka **taaskääntöisenä** (reflexa) pitkin molempain sirkusten laitaa, s. o. **laidallisena** (radicula marginalis l. lateralis), **selkäjuuruinen** (e. notorrhizus), kun sirkukset poikkiteloin siemenen leveyttä ovat päällytysten eli **päällittävät** (c. incumbentes) ja taaskääntöinen juurukka toisen sirkuksen selällä, s. o. **selällinen** (r. dorsalis); **suoralaskuinen** (e. orthoplocus), sirkukset ovat **vastalaskuisia** (c. conduplicatæ) ja juurukka ulkomaisen kulmassa, s. o. **kulmallinen** (r. angularis); **poikkilaskuinen** (e. diplecolobeus), keskeltä taas päin kääntyneellä, s. o. **taaskääntöisillä** (c. medio replicatæ) sirkkuksilla ja selällisellä juurukalla; **kiertosirkkainen** (e. spirolobeus), **sisään kiertyneillä** (c. circumatim involutæ) sirkkuksilla ja selällisellä juurukalla.

**Silmäke** t. **sulkanen** (gemma l. plumula), alkion kolmas osa, josta kasvin varsi lähtee, ja jolla kaksisirkkaisissa on sijansa sirkusten välissä, yksisirkkaisissa sirkustupekkeen sisässä, Kuv. 93 c, 94 d.

**Esikkolehti** (folium primigenum l. primordiale), suoraan silmäkkeestä ilmaantuva ensimmäinen kasvilehti.

**Napa** (hilum), se paikka siementä, josta se napasuonessa tahi istukassa on kiinni ollut. Napapuolta sanotaan **mahaksi** (venter), toista puolta **seläksi** (dorsum), välikohtia **sivuiksi** (latera).

**Napalappu** (strophium), nysterömäinen, käsnäinen lisäke, joka lähtevä napasuonesta tahi istukasta erästen kasvien siemenissä peittää navan.

**Siitereikä** (micropyle l. foramen germinationis), kuorikalvoin pienukainen, usein näkymätön reikä navan päässä, jäännöksenä siitä reiästä, josta siiteneste kulki siemenaiheeseen.

**Napapilkku** (chalaza), se paikka siementä, josta napasuonen nestimet sisääntyvät siemenen aluskuoreen, muutamissa siemenissä, erinomattain suuntaisissa ja takaperäisissä, kohdastaan navan alla, toisissa vähän syrjässä, ja tavallisesti kiinteämpi, vehreä, keltainen tahi ruskea, harvinaisissa tapauksissa siemenen ulkopuolellaki havaittava.

*Napaviiva* (raphe), napasuonen saattama tavallisesti vieripaikkoja korkeampi viiru navan ja napapilkun välillä niissä siemenissä, joissa ovat erillään. Se lähtee aina toiselta puolen napaa, kun siitereikä on toisella.

*Siemenvaippa* (arillus), napasuonen levennys, joka vaippamaisesti osiksi tahi kokonansa peittää siemenen, ei kuitenkaan siihen kiinni kasvettuneena. Välistä lähtee vaippa siitereijän ympärillä tavattavasta, sienettävästä turvoksesta, *siemennyhästä* (caruncula), jolloin sitä sanotaan *valheelliseksi siemenvaipaksi* (arillus spurius). Eräissä kasveissa kehkeytyy vaippa siemenen valmistuessa muodostuen silkkimäiseksi haiventukuksi eli *tupeuksi* (coma), ja siemeniä sanotaan silloin *tupsupäisiksi* (semina comosa l. crinita), e. m. pajussa.

### Kukkain lisäosista.

*Lisäosat* (partes accessoriae), joita ainoastaan eräissä kukissa tavataan.

*Lisäterä* (paracorolla l. paracorona), terän sisäinen ja melkein saman muotoinen kukkalisäke, Kuv. 90 a, 91 a, joka taitaa olla joko *yhdislehtinen* (paracorona gamophylla) tahi *erilehtinen* (p. eleutherophylla l. polyphylla), ja jonka erinäisiä lehtiä sanotaan *lisälehdiksi* (parapetalum).

*Lisälehtinen* (petala coronata), erilehtinen terä pienillä suomumaisilla lehtikalvoilla terälehtien tyviosassa kukan sisällä; *kupurasulkuinen* (faux fornicibus clausa), yhdislehtisen terän nielu, kun siinä on paksumpia kuperia kyhmyjä eli *kupuroita* (fornices), ja *nystysulkuinen* (faux fornicibus subulatus clausa), kun kyhmyt ovat oramaisia; *sulettu* (faux clausa) ja *avoin* (f. pervia l. nuda) osoittavat yhteisesti nieluissa jotain sulkua olevan tahi ei olevan.

*Epä- t. valhehede* (parastemon), heteen kaltainen lisäke, esimerkiksi vilukossa, Kuv. 92 a; *mesinystyrä* (glandula nectarifera); *mesihuokonen* (porus nectariferus); *mesikolo* (fovea nectarifera), milloin *paljas*, milloin *suomukatteinen* (fovea squamata tecta); *mesijuomu* (plica l. stria nectarifera), pitkin terää tahi kupulehteä; *mesikanrus* (calcar nectariferum), kun joku kukkaosa on venynyt pitkämäiseksi, onneksi mesipiteeksi, Kuv. 89 a.

### Saniais- ja Kortekasvien siittimistä.

Niinkuin siitä jo edellä, siv. 23, mainittiin syntyy uusia salasiittiöitä ei siemenistä, vaan *itiöistä* (sporæ), jotka ovat yksinäisiä soluja taikka monisoluisia hiukkoja ja erouvat ihmisiittiöin siemenistä varsinki sen kautta, ettei niissä ole mitään edellä muodostunutta uuden kasvin *alkioa* (embryo). Enimmissä salasiittiökasveissa ovat itiöt erityisten siitinten sisässä, joita sanotaan *itiö-*

*hedelmiksi* t. *-pesäkkeiksi* (sporocarpium l. sporangium). Itäessä kasvautuvat itiöt joko suorastansa soluin eroumisella tahi lisäymisellä nuoriksi taimiksi, niinkuin leväin, jäkäläin ja sienien itiöt tekevät, taikka tulee niistä sillä lailla ensin väliaikainen muodostus, se niin kutsuttu *esialkio* (proembryo l. prothallium), joka, kohta kun varsinaisen kasvisilmäke on siitä puhkeamaan ruvennut, itse vähitellen katoaa, niinkuin sammalkasveissa tapahtuu. Paitsi näitä ilmisiittiöin siittimille vastaavia muodostumisia tavataan salasiittiöissä myös muita osia, joita yhdenarvoisuutensa vuoksi ilmisiittiö-hedeten kanssa sanotaan *ponsikkeiksi* (antheridium). Niiden soluissa on tavallisesti kierteisainetta, joka solulaidan puhkettua ja koko ponsikkeen auvettua lähtee erin ja pyörii vilkkaasti ympärillään olevassa nesteessä. Näitä kierteishaituvia, jotka vastaavat ilmisiittiöin siitepölylle, sanotaan *siitekieräisiksi* (spermatozoida), josta ponsikkeet myös ovat saaneet toisen nimensä: *siitekieräis-osat*. Paitsi näitä siitinneuvoja, joita, jos niin tahtoisi, voisi verrata urospuolisiksi siittimiksi, on täydellisemmissä salasiittiöissä, sanikkaisissa ja sammalkasveissa, tavattu toisenkilaisia siitinmuodostumia, *itiösikiäimet* (archegonia), joita välistä on verrattu naaraspuolisiksi siittimiksi. Niiden tyhjä sisusta on yhtäydessä ulkopuolisen ilman kanssa hienoreikäisen putkilon kautta, jossa siitos kieräisten avulla tapahtuu. Sammalkasveissa nämät itiösikiäimet siittymisen jälkeen muodostuvat itiöhedelmiksi, mutta sanikkaisissa, joissa ne ynnä ponsikeitten kanssa istuvat esialkiolla, kasvautuu niistä siittymisen jälkeen uuden kasvin nuori taimi, jonka ohessa esialkio vähitellen katoaa.

*Saniaiskasveilla* (polypodiaceæ), ovat itiöpesäkkeensä tavallisesti lehtien ulko- eli selkäpuolella pieninä pilkkumaisina ryhminä, joita siitä sopii *pesäryhmiksi* (sori) nimittääkkin, ja joilla aina on vakinainen muotonsa, ollen milloin *ympyräisiä*, milloin *soikeita*, *viivamaisia* j. n. e. Nämät pesäryhmät ovat joko *paljaita* taikka, niinkuin useimmiten tapahtuu, peitetyt ohuella *huntu* (indusium) nimisellä kalvolla, joka tavallisesti on tekeynyt lehden päällyskedestä, välistä lehden taaskääntöisestä laidasta, e. m. sananjalassa. Huntu voipi olla *kilpimäinen* tahi *munuamainen* ja kiinnitetty pienellä sivultapäin lähtevällä varrella eli jalalla pesäryhmän laitaaan tahi laitaapuoleen, taikka on se *pitkulainen* ja *tasasoukkanen* kiinni pitkin pesäryhmän viertä koko toisella laidallansa ja aukeava vastapäisellä laidalla. Se taitaa sitte, mikäli se lähtee irti pesäryhmän sisäiseltä, lehtisuonta vastaan kääntyneeltä puolelta, taikka päin vastoin, olla joko *sisältä irtauva* (intus rumpens) taikka *ulkoa irtauva* (extus rumpens). Toisissa on huntu *maljamainen* ja *ripsu-laitainen* (indusium ciliatum).

Pesäryhmät ovat milloin *hajallisia* (sori sparsi), milloin *ri-vittäisiä* (s. seriati), *erillisiä* (s. distincti), tahi *yhtenäisiä* (s. continui), yhtämittaisessa jaksossa, t. *yhteenjuottuvia* (s. confluentes), nuorempana erillään, mutta valmistumisen jälkeen yhtyneitä suurempiin, lehtipinnan peittäviin aloihin.

Erityiset itiöpesäkkeet, joita löytyy suurin määrin pesäryhmissä, näyttävät hyvin suurentavalla lasilla katsottuna olevan lyhytkaulaisia, ohuenkälpeitä rakkoja eli koduksia, joiden sisässä itiöt ovat. Enimmiten on itiöpesäkkeen ympärillä poikkipuolinen joustava *renkas* (gyrus) vahvalaitaisilla, hyvin kosteen-aroilla soluilla, joka valmistuessa ponnistuen aukaisee itiöpesäkkeen poikkipuolisella raolla, josta itiöpöly ulos leviää. Semmoisia itiöpesäkkeitä sanotaan *rengastetuiksi* (sporangia gyrata). Monessa saniais-kasvissa ovat nämät renkaat vaillinaisesti muodostuneita, ja toisissa niitä ei tavata laisinkaan; edellisten itiöpesäkkeitä siitä syystä sanotaan *epärenkaisiksi* (sporangia spurie gyrata), jälkimmäisten *renkaattomiksi* (sp. agyrata).

*Kortekasveilla* (equisetaceæ) on siitelaitos tähkämäinen yhdistys kilpimäisistä suomuista, joiden aluspuolella on 6—7 rakko-maista, ohutkalvoista itiöpesäkettä, jotka aukeavat sisäänpäin pitkänaisella raolla itiöt ulos laskeissansa. Itsekuki näistä jälkimäisistä on ympärikiedottu kahdella joustavalla kierteisrihmuksella t. *joustimella*, jotka keskikohdaltaan ovat itiössä kiinni ja jotka yhtäkkiä auki ponnahtuen uloslennättävät itiön.

*Liekokasvien* (lycopodiaceæ) itiöpesäkkeet ovat palleroisia tahi munuamaisia ja aukeavat poikkiraolla. Kaikki niissä tavattavat itiöt ovat yhdenmoisia, perin pieniä, jauhomaisia, nelitahkoisia, raepintaisia. *Mähkä*-suvulla (selaginella) on paitsi näitä pieniä tomumaisia itiöitä (microsporæ) myös toisenlaisia, suurempia (macrosporæ), joita on neljin itiöpesäkkeessä. Edellänimitetyissä pienissä itiöissä valmistuu siitekieriäisiä, jonka tähden ne toimensa puolesta ovat ponsikkeiksi arvattavat. *Lahnaruoho*-suvulla (isoëtes) on samoin kahdenlaisia itiöitä, kumpiki laji erityisessä pesäkkeesssä. Nämät ovat kotamaisia, tuppimaisesti laajentuneen lehdenkannan sisällä. Ne pesäkkeet, joiden sisällä ovat suurempia itiöitä (macrosporangia), ovat ulkopuolimaisten, ne toiset (microsporangia) sitä vastoin sisäpuolisten lehtien kannan sisällä. Näidenki kasvien pienemmät itiöt arvattavasti ovat ponsikkeita.

Muist. — Selite-sanat, joita käytetään kasvien *värin*, *hajun*, *maun*, *asuntoaikan* ja muiden kohtain osottamiseksi, ovat kyllä itsestään ymmärrettäviä, jonka tähden taidetaan sillensä jättää.





## I

# LUOKAT, LAHKOT JA SUVUT

Linne'in siitin-järestössä.

---

## 1 LUOKKA.

### YKSIHETEISIÄ.

#### 1 Lahko. — YKSEMISIÄ.

- 1 SALICORNIA. Suolayrtti. — Kukat kolmittain, itsekuki vehreällä, möyheällä, latvalta suljetulla kupusuomulla, liereäksi puikeloksi yhdistyneitä. Heteitä 1—2, ulottavina kuvun 3—4-hampaisesta suomalosta. Luotti 2—3-halkoinen. Hedelmänä yksinäinen, kuvun peittämä rakkojyväke. — Heimo 79.

*Möyheä, lehdetön nivelkasvi meren rannoilla.*

- 2 HIPPURIS. Vesikuusi. — Sikiäimeen kiinnittynyt kupu, tuskin havaittavana palteena sen päässä. Hede sikiäispäällinen. Emi yksinäinen. Hedelmänä kuvun peittämä kuorusjyvä. — H. 64.

*Nivelikäs vesikasvi säteettävillä lehdillä.*

- 3 ZOSTERA. Ajokas. — Kupu, hede ja emit vuoroittain toinen toisensa vieressä irtonaista, litteätä, tasalevyistä puikeloa myöten, jonka ympäri lehti päällyspuolite on kuvertunut tuppimaiseksi koteloksi. Hedelmänä pähkylämäinen jyväke. — H. 4, 1. *Heinämdisiä merikasveja.*

#### 2 Lahko. — KAKSEMISIÄ.

(*Blitum virgatum* 5, 2; *Callitriche* 21, 1.)

---

## 2 LUOKKA.

## KAKSIHETEISIÄ. \*)

## 1 Lahko. — YKSEMISIÄ.

† Yksipuolinen, kalvomainen kehä vaipunut lehtimäisen varsikon t. varsikko-lehden laitaan. [*Laiehtivia, varrettomia, tav. kukattomia kasveja.*]

- 4 LEMNA. Limaska. — Varsikko-lehden laitaraosta ulottava yksilehtinen kupu. Hedelmä rakkomainen, yksipesäinen, harvasiemeninen. — H. 5, 1.

*Pienillä pyöreähkö-litteillä, us. koko veden kalvon kattavilla varsikko-lehdillä, rihammaisilla, vedessä rippuvilla juurilla.*

†† Kehä täydellinen, verholla ja terällä; yhdellä siiksimellä.

- 5 VERONICA. Tätyruoho. — Verho 4-jakoinen. Terä ratas-tahi suppilomainen 4:llä epämukaisella liuskalla. Hedelmänä 2-pesäinen kota. — H. 31, 2.

*Ruohokasvi tav. vastakkaisilla lehdillä; kukat tähkämäisesti, ryppälemäisesti tahi yksinäisiä lehtihangassa.*

- 6 PINGUICULA. Yökönlehti. — Verho 2-jakoinen, pykälius-kainen. Terä yhdislehtinen, ammottava, huulimainen, kannus-tettu. Luotti melk. vartaloton, 2-huulinen. Kota 1-pesäinen, latvaluomainen. — H. 32.

*Ainoastansa aluslehdillä; kukat peräkkäitä, yksinäisiä.*

- 7 UTRICULARIA. Vesiherne. — Verho 2-jakoinen, ehytlus-kainen. Terä yhdislehtinen, naamattava, alahuuli lakkimainen erillisellä tahi yhtyneellä kannuksella. Luotti kilpimäinen pit-kättävällä vartalolla. Kota 1-pesäinen, varistuansa kansiluo-mainen (poikkipiirtoinen). — H. 32.

*Laiehtiva vesikasvi hienojakoisilla lehdillä, harvakukallisella varrella.*

\*) Muihin luokkiin kuuluvia kaksiheteisiä ovat: *Salicornia* 1, 1; *Rhynchospora alba* 3, 1; *Lepidium* 15, 1; *Cypripedium* 20, 2; *Fraxinus* 23, 2.

- 8 CIRCÆA. Velholehti. — Verho ja terä 2-lehtisiä. Hedelmänä 2-pesäinen kota. — H. 63.

*Lehtokasvi vastakkaisilla lehdillä, kukkarypäleillä.*

+++ Kehä täydellinen; hedelmänä neljä pähkylämäistä lohkohedelmystä.

- 9 LYCOPUS. Rantayrtti. — Verho 5-liuskainen. Terä suppilomainen, 4-halkoinen, yhdellä isommalla pykälepäisellä liuskalla. — H. 24, 1.

*Rantakasvi vastakkaisilla lehdillä ja kukkakishkuroilla lehtihangassa.*

## 2 Lahko. — KAKSEMISIÄ.

*(Anthoxanthum 3, 2.)*



## 3 LUOKKA.

# KOLMIHETEISIÄ.

### 1 Lahko. — YKSEMISIÄ.

† Ruohokkeita (ei heinämäisiä).

- 10 VALERIANA. Virmajuuri. — Sikiäimen latvapäässä pieni rengasmaisen kehä yhteen kasvettuneesta verhosta. Terä yhdislehtinen, suppilomainen, 5-halkoinen. Hedelmä yksipe-säinen, yksisiemeninen, peitetty lop. haivensäteiksi jakautu-neella verholla. — H. 17.

*Vastakkaisilla, us. parijakoisilla lehdillä; kukat röyhyissä.*

- 11 VALERIANELLA. Peltokaali. — Verho yhteen kasvettu-nut sikiäimeen, joko pалlettomasti tahi hampaamaiseksi palteeksi. Terä ed. Hedelmä 3-pesäinen, yksisiemeninen, haiveneton. — H. 17.

*Lehdet vastakkaisia, kokonaisia; kukat röyhyissä.*

- 12 IRIS. Kurenmiekka. — Kupu terämäinen, 6-jakoinen, ly-hyttorvinen, ulkopuoliset liuskat isoja, alaspäisiä, sisämaiset pystöisiä. Luotit teräisiä. Kota 3-pesäinen. — H. 13.

*Miekkamaisilla, tupillisilla lehdillä, isoilla liljamaisilla kukilla.*

(*Montia* ja *Koenigia* 3, 3; *Galium trifidum* 4, 1;

*Empetrum* 22, 3).

†† Heinämaisia kasveja, tähkät t. tähkylät liekeitä ym-pärintä limitetyillä tähkäsuomuilla. \*)

- 13 ERIOPHORUM. Niittuvilla. — Tähkäsuomot tasamukaisia. Joka pähkylällä paljo kupusukasia, lop. hyvin pitkiä, villa-maisia, sileitä, valkoisia t. punertavia karvoja. — H. 2, 2.

---

\*) *Cyperacea*-heimon kasveilla ei ole tavallista kehää. Niiden siitinkehänä on vaan joku suomumoinen suojus, joko paljaaltaan taikka karvoilla, sukasilla tahi muilla suomukoilla sisässäänsä. Suojussuomuja sanotaan toisella nimellä *tähkä-suomuiksi*, koska ne muodostavat tähkän, ja niiden sisäisiä karvoja, sukasia ja suomukoita kupukarvoiksi, -sukasiksi ja -suomuiksi, koska ne siittimiä likinnä ovat kuin niiden kehänä.

Muist. — Tämän jaon suvut kasvavat useimmiten vedessä t. veden vaiheilla, välistä muillaki kosteilla paikoilla.

*Tähkät pian valkenevia, us. tuumanpituksilla villakarvoilla.*

- 14 TRICHOPHORUM. Suovilla. — Alin tähkäsuomu jatkunut järeällä, tylopällä, tähkylänpituksella odalla. Joka pähkylällä 4—6 kupusukaista, pidemmät itseä tähkylää. — H. 2, 2.

*Monella tupastavalla, tyveltä suomuisella korrella, ylimmäinen suomu ävimäisesti lehdistyvä; kupusukat valkoisia.*

- 15 RHYNCHOSPORA. Piirtoheinä. — Ne 3—4 alinta tähkäsuomua tyhjiä. Pähkylä sukapeitteinen, vartalon kanta lisäkkeenä päässään; sukasen lyhyitä, karheita. — H. 2, 2.

*Hoikka heinäke lehtisellä korrella, löyhäryhmissä tähkylöillä.*

- 16 HELEOCHARIS. Luikka. — Tyhjiä tähkäsuomuja 0 t. 1—2. Pähkylä k. ed. lisäkkeellä ja sukasilla. — H. 2, 2.

*Korsi lehdetön yksinäisellä latvatähkällä.*

- 17 SCIRPUS. Kaisla. — Tähkäsuomut ed. Pähkylä ilman lisäkkeettä, sukaseton t. lyhyillä, karheilla sukasilla. — H. 2, 2. Korsi ed. tahi lehtinen ja monitähkinäinen.

*(Juncus supinus, effusus ja conglomeratus 6, 1).*

+++ Heinäkasveja kaleettomilla tähkylöillä.

- 18 NARDUS. Ukonparta. — Tähkä hoikka, yhdäppäisillä, 2-helpeisillä tähkylöillä. — H. 1, 1, 1.

*Sitkeä heinä tiheä-tupastavasta juurakosta lähtevillä, sukamaisilla lehdillä ja paljailla korsilla.*

## 2 Lahko. — KAKSEMISIÄ. (Heinäkasveja).

† Tähkylät röyhynä t. haaratähkinä, 1-kukkasisia \*).

\* Tähkylät 2-kaleisia, tihuryhmäisiä, toiskertaisessa liereässä tähkässä; kaleet tasapitkiä.

\*) Ei enemmän, kuin edellisen jaon (*Cyperacea*-heimon) kasveilla on varsinaisilaki heinäkasveilla semmoista terää ja verhoa, kuin muilla ilmsiittiöillä. Tavallisesti on heinäkukalla 2 (harv. 1) helvettä ja niiden sisäpuolella, siintien tyvipuolella, 1—3 pienukaista, us. ilmetöntä kaunaa. Harvoin (*Nardus*-ellaa) kukka kuitenkin on niin selkoinen, vaan tavallisesti, milloin se toisten kukkain kanssa ei ole tähkyläksi yhdistynyt, on sillä helvetten ulkopuolella 2 (harv. 1) kaletta. Täydellisellä heinäkukalla on siis tavallisesti: 1° 2 kaletta (*glumæ*); 2° niiden sisäpuolella 2 helvettä (*glumellæ*); 3° kaunat (*glumellulæ*) siintien tyvellä, ja 4° siittimet.

Kun useampaa kukkaa on yhdistynyt tähkyläksi, niillä jokaisella ei ole kaletta, vaan ainoastaan helpeet ja kounat. Kaleet silloin ovat yhteiset koko tähkylälle sen tyvellä. Enimmillä heinäkasveilla on semmoisia 2-tahi monikukkasisia tähkylöitä. Tavataan välistä yksinäisessä täydellisessä heinäkukassa toisen kukan aihetta, ja sitä vastoin muuttuvat oikeastaan 2-kukkasiset toisen kukan keskeytymisestä välistä 1-kukkasiseksi. Kun siis tarkkaa rajaa ei

- 19 PHLEUM. Tähhäheinä. — Kaleet erillisiä, kumpiki suka-  
maisella selkäsuonen jatkeella; 2 vihneetöntä, jyväkkeen kanssa  
varisevaa helvettä. — H. 1, 1, 3.

*Tankeamainen, 1-tähhäinen heinä.*

- 20 ALOPECURUS. Puntarpää. — Kaleet tyveltä yhdessä, su-  
kajatkeetta; 1 vihneikäs, jyväkkeen kanssa variseva helve. —  
H. 1, 1, 3.

*Edellistä notkeampi heinä.*

•• Tähkylät röyhynä; kaleet melk. tasapitkiä.

- 21 DIGRAPHIS. Helpi. — Kaleet litteämäisesti vastalaskuisia  
terävällä, siivettömällä selällä; helpeet vihneettömiä ja niiden  
tyvipuolella 2 pienukaista, töyhtöistä lisähelvettä (keskeyneitä  
kukkasia). — H. 1, 1, 2.

*Iso, leveälehtinen rantaheinä tihutähkylöisillä röyhyhaaroilla.*

- 22 MILIUM. Tesmä. — Kaleet pyöreäkhö-selkäisiä; ulkohelve  
kehkerän-pullakka, tihkeä (ei kalvomainen), vihneeton, lop. jy-  
väkkeesen kiintyvä. — H. 1, 2, 1.

*Korkea, leveälehtinen lehtoheinä isolla, harsealla, hervakalla  
röyhyllä.*

- 23 CALAMAGROSTIS. Kastikka. — Helpeet kalvomaisia, ty-  
veltä karvaisia, ulkohelve hapsimaisella vihneellä. — H. 1, 2, 1.  
*Kukinto miten milloinkin levedröyhyinen; vihne joko kovin hieno  
ja pieni helpeen latvasta, tahi isompi sen selästä lähtevä.*

- 24 MÜHLENBERGIA. Hajuheinä. — Kaleet vähän helpeitä  
pidemmät, kumpaisetki ruohomaisia (vehreitä), litteämäisiä,  
teräväselkäisiä; ulkohelve ei paljon sisähelvettä isompi, pal-  
jas, lyhyellä, suoralla, latvavihneellä. Luotti helpeen pitui-  
nen tahi pidempi. — H. 1, 2, 1.

*Iso, leveälehtinen lehtoheinä nuokahavalla röyhyllä, litteämi-  
sillä, vehreillä tähkylöillä.*

- 25 ARGOSTIS. Rölli. — Kaleet terävä-kourumaisia; helpeitä 1  
tahi 2 erisuurta, kalvomaista (m. valkoista), paljaat, pidemmät  
luotteja. — H. 1, 2, 1.

*Tähkylät leveämpänä t. soukempana röyhynä; helpeet milloin  
vihneettömät, milloin selkävihneisiä.*

olekkaan yksinäisten kukkain ja tähkyläin välillä, nimitetään yksinäisiäki kukkia  
välistä tähkylöiksi ja niin mainitaan 1- ja monikukkasista tähkylöistä. Niin  
kaleet kuin helpeetkin eivät ole ihan vastakkain, vaan toinen vähän ylempä-  
nä toistansa. Alempi tulee johon kuhun määrään ylempänsä peittämään,  
vähintäänki tyveltä, jonkatähden sitä sanotaan ulko-, ylempää sisäkaleeksi  
ja helpeeksi. Vihneisellä helpeellä ymmärretään aina alempaa helvettä. (Katso  
mitä ed., 27 sivulla, on sanottu Heinäkukasta).

\*\*\* Kaleet jokseenki eripitkiä.

- 26 APERA. Luoho. — Helpeet ruohomaisia (vehreitä), ulkohelvet pitkällä hapsimaisella latvavihneellä. — H. 1, 2, 1.

*Ryhevällä tav. nuokahtavalla röyhyllä; kaleet ja helpeet samantuntuisia; vihne 3—4 kertaa helvettä pidempi.*

*(Anthoxanthum, Colpodium, Glyceria-lajeja seur. jaoissa).*

†† Tähkylät leveässä t. tähkämäisessä röyhyssä, monikukkasisia.

• Tähkylät tyhjillä t. 1-neuvosilla kukilla ynnä 2-neuvoisten kanssa.

- 27 PHRAGMITES. Ruoko. — Kaleet hyvin erillään toisistaan ja toinen paljon toistaan suurempi; sisähelvet monikertaisesti ulkohelvetä pidempi; kukat ylempänä lapakkokarvain keskellä, alimmainen karvaton, tyhjä t. ainoastaan heteellinen. — H. 1, 2, 1.

*2—4-kyynäräinen, tanakka, leveälehtinen vesiheinä, ruosteekarvaisella kukkaröyhyllä.*

- 28 ANTHOXANTHUM. Simake. — Tähkylät 3-kukkasisia, toinen kale kahta pidempi toistansa. Keskimäinen kukka täysineuvoinen, vihneetön; laitakukat 1-akanaiset, tyhjä, vihneelliset. — H. 1, 1, 2.

*Soukalla, m. tähkämäisellä, lop. kellanhohtavalla röyhyllä.*

- 29 SETARIA. Pantaheinä. — Tähkylät 2-kukkasisia hapsimaisen varuksen sisässä, yhtyneet tiheäksi, liereäksi, tähkämäiseksi röyhyksi. Kaleet eripitkiä. Alempi kukka tyhjä kalvo-maisilla helpeillä; ylempi täysineuvoinen ja 2:lla nahkealla helpeellä. — H. 1, 1, 5.

*Yksinäisellä, ulottavista varussukasista karvaisella latvatähkällä.*

- 30 MELICA. Helmikkä. — Kaleet m. yhtäpitkiä, 1- tahi 2-kukkasisia, nuijamaisella aiheella, edellisessä tapauksessa toiseksi, jälkimäisessä kolmanneksi kukaksi. Helpeet vihneettömiä. — H. 1, 2, 2.

*Kukostus joko soukempänä, rypälemäisenä, tahi leveämpänä ja harsempänä röyhyinä.*

- 31 HOLCUS. Mesiheinä. — Kaleet m. tasapitkiä, 2-kukkasisia. Ylempi kukka emitön ja vihneisellä ulkohelpeellä; alempi täysineuvoinen, vihneetön. — H. 1, 2, 2.

*Lauhea heinä pitkulaisella, tiheimäisellä röyhyllä.*

- 32 HIEROCHLOE. Maarianheinä. — Kaleet tasapitkiä, 3-kukkasisia; ylimmäinen kukka 2-neuvoinen, ne 2 muut emitömät. — H. 1, 1, 2.

*Röyhy munanmoinen; kaleet ja helpeet kalvopäisiä.*

*(Avena elatior, Enodium seur. jaoissa).*

•• Kaikki kukat 2-neuvoisia, selvävihneisiä (paitsi *Avena elatior*, jolla tav. on yksi emitön kukka).

- 33 AVENA. Kaura. — Tähkylät 2—7-kukkasisia. Ulkohelpe päästä 2-halkoinen (paitsi *A. elatior*'issa), polvikkaalla selkävihneellä. — H. 1, 2, 2.

*Levenneellä, väl. soukalla t. tähkämäisellä röyhyllä; ulkohelpeen liuskat eräissä sukamaisissa. — A. elatior'issa on ylempi kukka us. vihneetön, alempi emitön.*

- 34 VAHLODEA. Rusolatva. — Kaleet m. tasapitkiä, 2-kukkasisia, pidemmät kukkia. Ulkohelpe tankea, rustomainen, eheäpäinen, hienokärkisellä, järeällä selkävihneellä. Karvoja kukkain ympäri tyvellä. — H. 1, 2, 2.

*Liitteälehtinen tunturi-heinä hervakalla, ruosteekarvaisella röyhyllä.*

- 35 AIRA. Lauha. — Kaleet m. tasapitkiä, 2—3-kukkasisia. Helpeet ohuita, kalvomaisia, ulkohelpe eheällä t. hienohampaisella päällä ja hapsimaisella selkävihneellä. — H. 1, 2, 2.

*Tav. kaitalehtisiä, röyhyisiä heiniä.*

- 36 DACTYLIS. Koiranruoho. — Kaleet 3—7 kukkasisia, epämuokaisia, lyhemmät kukkia; ulkohelpe terävä-venhoinen lyhyellä latvavihneellä, sisähelpe halkokärkinen. — H. 1, 2, 3.

*Tähkylät yhdäppäin röyhyn haaroihin ryhmityneet; lehtitupet alempana 2-särmäisiksi litistyneet.*

- 37 FESTUCA. Nata. — Ulkokale 1-suoninen, lyhempi monisuonista sisäkaletta, molemmat teräväselkäisiä. Ulkohelpe liereäselkäinen, latvavihneinen (harv. vihneetön), sisähelpe 2-liuskainen. (Kukkaa 3—15). — H. 1, 2, 3.

*Monivuotinen, us. aaluvainen heinä, tav. pystöllä, harv. nuokahavalla tahi hervakalla röyhyllä.*

- 38 BROMUS. Kattara. — Kaleet 3—monisuonisia; ulkohelpe liereäselkäinen latvan-alaisella vihneellä. (Kukkaa 5—15). — H. 1, 2, 3.

*Vuosinainen, oikeittain aaluvaton heinä joksikin isoilla tähkylillä röyhyssä.*

*(Triodia seur. jaoissa.)*

••• Kaikki kukat 2-neuvoisia, vihneettömiä t. epävihneisiä.

- 39 TRIODIA. Hina. — Kaleet 3—4-kukkasisen tähkylän pitui-

set; ulkohelve liereä-selkäinen, pykälepäinen, tylpäkät hammas pykälessä ja 2 karvatöyhtöä tyvellä. — H. 1, 2, 2.

*Tav. rentona maassa; soukka kukkarypäle latvassa 5—8:lla lyhyellä ja paksulla tähkylällä.*

- 40 FLUMINIA. Piuru. — Kaleet erisuuria, vähän lyhemmät 4—5-kukkasista tähkylää; ulkohelve resahampainen päästä, 2 karvatöyhtöä tyvellä. — H. 1, 2, 2.

*Iso, kaislamainen, röyhylatvainen vesiheinä.*

- 41 BRIZA. Räpelö. — Kaleet ontevia, leveämmät pyöreämaiselta päältänsä, monikukkasisia; ulkohelve syvän onteva, herttakantainen. — H. 1, 2, 3.

*Harsea, röyhyinen kukostus, rippuvilla m. herttamaisilla tähkylillä.*

- 42 ENODIUM. Siniheinä. — Kaleet eripitkiä, suippoja, eheitä, tav. 3:lla keilamaisella, erillisellä kukalla, ylimmäinen tav. pienempi, tyhjä ja pian lähtevä; ulkohelve liereä-selkäinen, epäselvästi 3-suoninen, tylppäpäinen, ei kalvomainen. — H. 1, 2, 3.

*Korsi tankea, m. solmuton; röyhy punerva-sininen.*

- 43 COLPODIUM. Lapinhilpi. — Kaleet ed., 1—2:lla jotenkin erillisellä, pitkulaisella kukalla; ulkohelve liereä-selkäinen, epäselvästi 3-suoninen tylppäkalvoisella päällä. — H. 1, 2, 3.

*Tankea, leveälehtinen tunturiheinä soukalla tav. ruosteenkarvaisella röyhyllä.*

- 44 CATABROSA. Hilpi. — Kaleet eripitkiä, tylppä- tahi resapäisiä 1—2:lla (harv. 3:lla) erillisellä, pitkulaisella kukalla; ulkohelve 3-suoninen resaisella t. viistetyllä kalvomaisella päällä. — H. 1, 2, 3.

*Lahkea, ihan vehreä, suuruuteensa leveälehtinen heinä.*

- 45 GLYCERIA. Sorsanheinä. — Kaleet ed., 2—13:lla erillisellä, pitkulaisella, täysineuvoisella kukalla; ulkohelve liereä-selkäinen, 5—monisuoninen, muuten kuin ed. — H. 1, 2, 3.

*Vesi- ja rantaheinä, röyhyllä kukostaissa harsukukkasilla tähkylillä.*

- 46 POA. Nurmikka. — Kaleet m. tasapitkiä (paitsi *P. annua*'ssa), venhomaisia, teräväselkäisiä, 2—monella, lähinäisellä, puikealla kukalla; ulkohelve venhomainen, suippo. — H. 1, 2, 3.

*Yleinen, röyhyllinen niittuheinä aina vihneettömillä, puikeilla tähkylillä.*

(*Festuca, Bromus secalinus* ed. jaossa.)

+++ Tähkylät varuksellisia, ryhmistyneet tähkäksi tahi mykeröksi.

- 47 SESLERIA. Lupikka. — Tähkylät mykerönä tyhjiä, eheillä vurussuomuilansa jokainen. Kaleet äimäpäisiä, 2—3-kukkasisia; ulkokelpeen päässä useampia lyhyitä vihneitä, joista selkäsuonen vihne suurin. — H. 1, 1, 4.

*Tupasheinä palleroisella t. pitkulaisella, sinertävällä tähkällä.*

- 48 CYNOSURUS. Sukapää. — Tähkä yhdäppäinen, tähkylät parittain parijakoisessa varuksessa. Kaleet äimäpäisiä, 2—5 kukkasisia. Ulkohelve äimäppäinen. — H. 1, 2, 3.

*Kukostuksena tasasoukkanen, tiheä, vehreä tähkä yhdäppäisillä tähkyillä.*

(*Setaria* ++ jaossa.)

++ Tähkä nivelikäs; tähkylät varuksettomia.

- 49 LOLIUM. Luste. — Tähkä litteä, 2-tahkoinen; tähkylät 3—monikukkasisia, syrjin (ei lappein) tähkälapakkoon. Kaleita ei kun 1 tähkylän ulkosyrjässä (lapakon puolinen syrjä kaleeton). — H. 1, 2, 4.

*Solmukorsinen heinä sileillä lehdillä ja korrella.*

- 50 ELYMUS. Rantavehnä. — Tähkylät 2—monikukkasisia, 2—4 joka tähkänivelessä; 2 suippopäistä kaletta, molemmat tähkylän ulkopuolella. — H. 1, 2, 4.

*Iso vehnämäinen rantaruoho.*

- 51 BRACHYPODIUM. Aroluste. — Tähkylät monikukkasisia, lyhytperäisiä, 1 kussaki tähkänivelessä; 2 erisuurta kaletta; ulkohelve vihneppäinen. — H. 1, 2, 4.

*Hinterä heinä hoikalla, harsulla tähkällä.*

- 52 TRITICUM. Vehnä. — Tähkylät ed., perättömiä; 2 erisuurta kaletta samoin kuin ulkohelveki sukapäiset t. suattomat. — H. 1, 2, 4.

*Jotenki korkea heinä tiheämmällä t. harseammalla, 2-tahkoisella tähkällä; tähkylät litteitä.*

(*Chenopodium polyspermum* 5, 2.)

### 3 Lahko. — KOLMEMISIÄ.

- 53 KOENIGIA. Kurentatar. — Kehä yksipuolinen, terämäinen, 3-jakoinen ja sen sisällä pähkylähedelmä. — H. 74.

*1—2-tuumainen tunturikasvi tupekkeisilla lehdillä.*

- 54 MONTIA. Hetekaali. — Verho 2-lehtinen. Terä yhdislehtinen, suppilomainen, yhdeltä puolen läpihalkoinen; laide 5-liuskainen. Kota 3-laitainen, 3-siemeninen. — H. 72.

*Vesi- eli hetekasvi vastakkaisilla lehdillä.*

(*Elatine* 8, 4; *Stellaria media* 10, 3.)

## 4 LUOKKA.

## NELIHETEISIÄ.

## 1 Lahko. — YKSEMISIÄ.

† Paljo erikukkasia ryhmässä yhteisellä marrolla monilehtisen kehdon sisällä.

- 55 TRICHERA. Ruusuruoho. — Kehtosuomut m. 2-kertaisena kiehkurana. Terä 4-halkoinen. Kuorusjyvät latvalta epäselvästi kalvopalteiset (ulkoverhon jälkeä) ja kalvon sisäpuolella 8—16 sukamaisiksi säteiksi jakautuneella kehäkkeellä (sisäverhoa). Marto keherä, karvainen. — H. 16.

*Varsilehdet vastakkaisia, tav. parijakoisia; kukkaistot litteitä.*

- 56 SUCCISA. Purtojuuri. — Kehto limitetty. Terä 4-halkoinen. Kuorusjyvät 5-liuskaisella latvapalteeella ja 5-säteisellä kehäkkeellä. Marto keilamainen, suomukas kukkasten väliin jatkuvista kehtosuomuista. — H. 16.

*Lehdet vastakkaisia, eheitä; kukkaistot palleroisia.*

†† Kukat kehdoittomia; sikiäin yhdislehtisen, liuskaisen kehän sisässä.

- 57 SANGUISORBA. Punaluppu. — Kukat tiheänä mykerönä. Kupu erivärinen (punainen) 4-jakoisella laiteella, torvi lop. kovettuva ja koppimaisesti hedelmyksen sulkeva. — H. 66, 2. *Vuorottaisilla, parittaisilla lehdillä.*

- 58 ALCHEMILLA. Poimulehti. — Kupu verhomainen (vehreänkellervä), 8-halkoinen, joka toinen liuska pienempi, harv. näkymätön. Vartalo m. pohjaperäinen. Hedelmänä 1—2 hedelmystä. — H. 66, 2.

*Lehdet pyöreämuaisia, liuskaisia t. jakoisia; kukat pieniä, ryhmäisiä.*

- 59 MAJANTHEMUM. Oravanmarja. — Kupu terämäinen, ratsmainen, 4-jakoinen alaspäisillä liuskoilla. Hedelmänä 2-pesäinen marja. — H. 10, 1.

*Yksikertainen ruoho herttamaisilla lehdillä, kukka-tertuilla.*

- 60 PLANTAGO. Ratamo. — Tähhäkukilla. Verho 4-jakoinen



Terä suppilomainen, 4-halkoinen, paljo lyhempi pitkiä heteitä. Hedelmänä poikkipiirtoinen kota. — H. 34.

*Lehdet jaottomia, (meikäläisissä ainoastaan aluslehtiä).*

(*Gentiana* 5, 1; *Ulmus* 5, 2; *Mentha* 14, 1; *Limosella* 14, 2; *Littorella* 21, 4.)

+++ Terä yhdislehtinen, 4- harv. 3-halkoinen t. -jakoinen, latvaperäinen. Lehtiä 4–10 säteettäin.

- 61 ASPERULA. Maratti. — Terä suppilomainen, selvätorvinen, 3—4-liuskainen. Hedelmänä 2 yhtenäistä hedelmystä. — H. 18.

- 62 GALIUM. Matara. — Terä ratasmainen näkymättömällä torvella, 3—4-halkoinen t. -jakoinen. Hedelmä ed. — H. 18.

++++ Terä erilehtinen.

- 63 CORNUS. Kanukka. — Verho 4-hampainen, sikiäispäällinen. Luotti tylppäpäinen ei vartaloa paksumpi. Luumarja 2-pesäisellä luulla. — H. 36.

*Pensas t. ruohoke vastakkaisilla lehdillä; kukat sarjamaaisessa t. huiskilomaisessa kukotuksessa.*

(*Rhamnus* 5, 1; *Cardamine hirsuta* 15, 2).

## 2 Lahko. — KAKSEMISIÄ.

(*Galium* 4, 1; *Gentiana* 5, 1; *Ulmus* ja *Cuscuta* 5, 2; *Chrysosplenium tetrandrum* 8, 2).

## 3 Lahko. — KOLMEMISIÄ.

- 64 BULLIARDA. Pauni. — Verho 4-halkoinen. Terä 4-lehtinen. Sikiäimiä 4, vartalottomat, lop. sama luku sisäluomaisia hedelmiä. — H. 61.

*Pieni rantaruohoke vastakkaisilla lehdillä, lehtihankaisilla kukilla.*

- 65 POTAMOGETON. Vita. — Kehä yksipuolinen, verhomainen, 4-lehtinen. Sikiäimiä 4, vartalottomat, lop. sama luku nahkealla päällyksellä katetuita pähkylöitä. — H. 4, 2.

*Vesiruoho yksikertaisilla lehdillä ja apulehdillä; kukat tähkässä.*

- 66 RUPPIA. Lima. — Kehätön. Ponnnet palhottomia, 1-lokeroisia, poikkiteloin aukeavia, kaksittain tähkäperän ympärillä pienoisestä suomusta lähteviä. Emiä 3–7, lop. sama luku pitkäperäisiä pähkylöitä. — H. 4, 2.

*Meriruoho ryhmamaisilla tupellisilla lehdillä; kukat tähkässä.*

(*Cerastium semidecandrum* ja *Sagina* 10, 5.)

## 5 LUOKKA.

# VIISIHETEISIÄ.

### 1 Lahko. — YKSEMISIÄ.

† Yksipuolisella kehällä.

- 67 GLAUX. Rannikki. — Kupu kellomainen, 5-halkoinen, erivärinen. Kota kuvunsisäinen, 1-pesäinen, 5-laitainen. — H. 33, 1.

*Pieni rantaruoho vastakkaisilla lehdillä.*

(Ulmus 5, 2.)

†† Kehä täydellinen, verholla ja yhdislehtisellä terällä.

\* 4 pähkylöiksi muuttuvaa lohkohedelmystä verhon pohjassa. *Ruohokkeita erinäisillä, eheillä lehdillä.*

- 68 ECHIUM. Neidonkieli. — Terä lyhyttorvinen viistetyllä, kellomaisella, epämukaisella, 5-halkoisella laiteella. Pähkylät luutavia. — H. 23.

*Tankea, karheakarvainen ruohoke; kukat toiskertaisessa tähkässä.*

- 69 LITHOSPERMUM. Rusojuuri. — Verho m. läpensä 5-jakoinen. Terä tasamukainen, suppilomainen, paljasnieluininen. Tähkylät luutavia. — H. 23.

*Tankeamainen, karheahka, suikealehtinen ruohoke.*

- 70 STENHAMMARIA. Halikka. — Verho ja terä ed. Pähkylät ohuella, kalvomaisella kuorella. — H. 23.

*Lamova, kalju, leveälehtinen rantaruoho.*

- 71 PULMONARIA. Imikkä. — Verho m. liereä, 5-kulmainen, 5-liuskainen. Terä ed., onteva-laiteinen. Pähkylät kaljuja. — H. 23.

*Karheahka-karvainen lehtoruohoke myöhemmin kasvavilla aluslehdillä.*

- 72 SYMPHYTUM. Raunionyrtti. — Verho 5-jakoinen. Terän laide munanmoinen, nielu sulettu pitkällä suomukoilla. Pähkylät kaljuja. — H. 23.

*Karhea, leveälehtinen ruohoke pikarimaisilla kukilla.*

- 73 CYNOGLOSSUM. Koirankieli. — Verho m. tasamukaisesti 5-halkoinen. Terä suppilomainen; nielu kupurasulkuinen. Pähkylät piikkisukaisia, alas litistyneitä, kiinnitetyt latvalta patsasmaiseen vartalotyyveen. — H. 23.  
*Ylempätä harmaahtava samettinukkainen ruohoke.*
- 74 ECHINOSPERMUM. Sirkunjyvä. — Verho ja terä ed.; torvi m. suomusulkuinen. Pähkylät 3-kulmaisia, kiinnitetyt koko sisäkulmallansa patsasmaiseen vartalotyyveen, kulmat piikkisukaisia. — H. 23.  
*Tankeamainen, karkeahka-karvainen ruohoke lemmikki-kukilla.*
- 75 MYOSOTIS. Lemmikki. — Verho ja terä ed. Pähkylät litteämaisiiä ja kaljuja, kiinnitetyt pohjallaan alas litistyneen vartalon tyyveen. — H. 23.  
*Hedelmällään edellisestä suvusta eroava.*
- 76 ANCHUSA. Häränkieli. — Verho ed. Terä suppilomainen, onteva-laiteinen, suoratorvinen; nielu kupurasulkuinen. Pähkylät kulmikkaita, kaljuja, kiinni reiästä pohjassa. — H. 23.  
*Isokko, karheahka ruohoke, joksikin ylenevällä, hoikalla torvella.*
- 77 LYCOPSIS. Rasti. — Köyrytorvinen, muuten ed. — H. 23.  
*Hyvin karheakarvainen peltokasvi.*
- 78 ASPERUGO. Terhi. — Verho lop. epämuukaisesti halkoinen ja litteästi soukistunut kaljuin pähkyläin ympäri. — H. 23.  
*Karheakarvainen, hervakka, takistava ruohoke, verho hanhenjalanmoisesti pähkyläin ympäri litistynyt.*  
\*\* Yksi ainoa, 1-pesäinen kota terän sisällä (kukanpäälinen).  
a — Luotti kokonainen; kota irtonaisella istukalla.
- 79 LYSIMACHIA. Alpi. — Terä kello- tahi ratasmainen, syvään 5-halkoinen. Palhot yhdistyvisiä. Luotti ei erittäin vartaloa turpeampi, poikkipäinen. Kota 5- tahi 10-laitainen. — H. 33, 1.  
*Ruohoke vastakkaisilla t. säteettäisillä lehdillä.*
- 80 NAUMBURGIA. Vesialpi. — Verho ja terä tav. syvään 6-jakoisia. Heteet tav. 6, erilliset, pohjaperäiset. Luotti ja kota ed. — H. 33, 1.  
*Vesiruoho vastakkaisilla lehdillä ja kukkatertuilla.*
- 81 ANDROSACE. Nukki. — Verho 5-hampainen. Terä suppilomainen, m. munanmoisella, nielusta soukistuneella torvella. Heteet torvisisäisiä. Luotti ed. Kota 5-laitainen. — H. 33, 2.  
*Paljasvanainen ruohoke valkosilla sarjallisilla kukilla.*
- 82 PRIMULA. Esikkö. — Verho ed. Terä suppilo- tahi hattumainen soukalla avonaisella torvella; heteet torvisisäisiä. Luotti ed. Kota 5- tahi 10-laitainen. — H. 33, 2.

*Paljarvanainen (väl. vanaton) ruohoke keltaisilla t. sinipunervilla, sarjallisilla kukilla.*

**b** — Luotti 2-halkoinen; kota 2-laitainen, laitevieri-  
sillä istukoilla.

- 83 **MENYANTHES.** Raate. — Verho 5-jakoinen. Terä lyhyttorvinen, väljenevällä, sisältä karvaisella laiteella. — H. 25.  
*Vesiruoho kolmisormisilla lehdillä, kukkaharkoilla.*

- 84 **GENTIANA.** Katkero. — Verho 2—5-halkoinen. Terä pikari-  
tahi suppilomainen, 4—5-liuskainen. Heteet torviperäiset, aina suoraponsiset. Emi vartaloton. — H. 29.

*Vastaislehtinen ruohoke. — Tavataan myös 4-halkoisella kehällä ja silloin 4-heteisenäki.*

- 85 **ERYTHRÆA.** Rantasappi. — Verho 5-halkoinen. Terä suppilomainen, pitkätorvinen, 5-jakoisella, litteähköllä laiteella. Heteet m. torviperäiset, ponnet lop. kierteiset. Vartalo pitkittävä. — H. 29.

*Vastaislehtinen ruohoke ihan punaisilla kukilla.*

\*\*\* Yhdellä kukanpäällisellä, monipesäisellä kodalla.

- 86 **DIAPENSIA.** Uuvana. — Verho 5-jakoinen 2—3-lehtisellä lisäverholla. Terä hattumainen 5-halkoisella laiteella; heteet liuskain välillä. Kota 3-pesäinen. — H. 26.

*Matala, tupastava tunturiruoho aina vehreillä aluslehdillä, 1-kukkaisella vanalla.*

- 87 **AZALEA.** Siekkilö. — Verho 5-jakoinen. Terä kellomainen, heteet pohjaperäisiä. Luotti rengasmainen, poikkipäinen. Kota 2—3-pesäinen. — H. 69, 2.

*Sormenkorkuinen, haarova, alaspainunut tunturipensas.*

- 88 **POLEMONIUM.** Sinilatva. — Verho syvään 5-halkoinen. Terä lyhyttorvinen kellomaisella, 5-jakoisella laiteella. Heteet kilseisellä kannallansa torviperäiset. Luotti 3-halkoinen. Kota 3-pesäinen, 3-laitainen. — H. 26.

*Röyhykukkainen ruohoke parijakoisilla lehdillä.*

- 89 **CONVOLVULUS.** Kierto. — Verho 5-jakoinen. Terä kellomainen, loivaan 5-liuskainen, poimuinen. Luotti 2—3-halkoinen. Kota 2—3-pesäinen. — H. 22.

*Köynnösruoho isoilla lehtihankaisilla kukilla.*

- 90 **DATURA.** Hulluruoho. — Verho vastopikarimainen, 5-hampainen. Terä suppilomainen, isolla, kellomaisella, poimuksella laiteella. Kota 2-pesäinen, 4-laitainen, vahva-orainen. — H. 30.

*Leveälehtinen, isokukkainen ruohoke.*

- 91 **VERBASCUM.** Tulikukka. — Verho syvään 5-halkoinen. Terä m. ratasmainen, lyhyttorvinen, 5-jakoisella laiteella. He-

teet kaarehtavia erillisillä ponsilla. Kota 2-pesäinen, latvaluomainen. — H. 31, 1.

*Pitkä, yksikertainen ruohoke tähkämäisesti ryhmityneillä kukilla.*

- 92 HYOSCYAMUS. Villikaali. — Verho kellomainen, laajenevalla, syvään 5-hampaisella laiteella. Terä suppilomainen kellomaisella, epämukaisella laiteella. Kota kansiluomainen. — H. 30.

*Tahmeakarvainen ruohoke, isoilla liuskaisilla lehdillä.*

- 93 SOLANUM. Koiso. — Verho 5-halkoinen. Terä ratasmainen, 5-halkoinen. Ponnet pitkittäin yhdessä. Hedelmänä 2-pesäinen, mehevä marja. — H. 30.

*Köynneliäs pensaskasvi, tahi ruohoke, röyhyisillä t. sarjamaisilla kukilla varren sivulta.*

(*Erythraea* ed. jaossa: *Rhododendron* 10, 1.)

\*\*\*\* Kukanalaisella sikiäimellä.

- 94 SAMOLUS. Punka. — Verho 5-jakkeinen. Terä hattumainen, lyhyt- ja avara-torvinen 5-jakoisella laiteella. Heteet erillisiä, kannoillaan teräliuskein vastaisia. Luotti kokonainen. Kota 1-pesäinen, latvaluomainen. — H. 33, 1.

*Rantaruoho vuorottaisilla, kokonaisilla lehdillä ja kukkarypäleillä.*

- 95 CAMPANULA. Kello. — Verho 5-jakoinen. Terä kellomainen, 5-liuskainen. Heteet erillisiä, kannoiltaan teräpohjan peittäväillä kilseillä. Luotti 3-halkoinen. Kota 3-pesäinen (tav. läpiluomainen sivulta). — H. 20.

*Kellomaisilta, tav. sinertäviltä kukiltaan tuttu ruohoke.*

- 96 JASIONE. Munkki. — Kukat koppilossa monilehtisellä keholla. Verho ja terä 5-jakoisia. Ponnet tyveltä yhdistyneitä. Kota 2-pesäinen. — H. 20.

*Latvakukkaistoinen ruohoke vuorottaisilla tasasoukilla lehdillä.*

- 97 LOBELIA. Nuottaruoho. — Verho 5-jakoinen. Terä epämukaisella, vinosti 2-huulisella, 5-liuskaisella laiteella. Ponnet yhdistyneitä. Kota 2-pesäinen. — H. 21.

*Vesiruoho yksinäisellä vanalla, ainoastaan kukka-tertullaan vedestä ylhäällä.*

- 98 LONICERA. Kuusama. — Verho erittäin pieni. Terä m. suppilomainen, väljenevä epämukaiseksi, 5-halkoiseksi laiteeksi. Heteet erillisiä. Marjahedelmä. — H. 19.

*Pensaskasvi vastakkaisilla lehdillä.*

(*Viburnum* 5, 3.)

+++ Erilehtisellä terällä.

- 99 VIOLA. Orvonkukka. — Verho 5-jakoinen kannan-alaisilla,

lyhyillä lisäkkeillä. Terä 5-lehtinen, vastakohtainen, kannustettu. Ponnnet yhdessä. Kota 1-pesäinen, 3-laitainen. — H. 52.  
*Apulehtinen ruohoke us. herittamaisilla lehdillä.*

- 100 IMPATIENS. Häpykannus. — Verho 2-lehtinen. Terä 3—5-lehtinen, vastakohtainen, kannustettu. Ponnnet yhdessä. Kota 5-laitainen, pohjasta joustavasti puhkeava. — H. 46.

*Vuorolehtinen ruohoke mehevällä nivelvarrella.*

- 101 RHAMNUS. Paatsama. — Verho lyhyt, pikarimainen, 4—5-liuskainen. Teränä 4—5 pientä, verhoperäistä lehtisuomua. Heteitä 4, 5. Luotti lovipäinen t. monijakoinen. Hedelmänä 2—4-pesäinen ja 2—4-siemeninen luuhedelmä. — H. 59.

*Puu t. pensas liuskattomilla lehdillä, liereillä haaroilla.*

- 102 RIBES. Viinapensas. — Verho pikarimainen t. maljamainen, 5-liuskainen. Terä ed., 5-lehtinen. Vartalo 2-jakoinen t. 2-halkoinen. Hedelmänä 1-pesäinen, monisiemeninen marja. — H. 58.

*Pensaskasvi vuorottaisilla, liuskaisilla lehdillä.*

(*Parnassia* 5, 4; *Erodium* 16, 1; *Geranium* 16, 2.)

## 2 Lahko. — KAKSEMISIÄ.

† Kehä yksipuolinen, verhomainen.

\* Sikiäin lyhyillä, hapsimaisilla vartaloilla; hedelmänä ohuen kalvon sisäinen, kehrämäinen rakkojyväke.

- 103 HERNIARIA. Tyräruoho. — Kupu 5-jakoinen. Heteet 5 ponnellista, 5 ponnnetonta. Siemen löyhästi rakon sisässä. — H. 73.

*Pieni, alas painunut, hajalehtinen ruohoke ryhmistyneillä kukilla.*

- 104 CHENOPODIUM. Savikko. — Kupu ed. Siemenet lappcalaan (ei syrjällään) 5-kulmaisen verhon pohjassa. — H. 79.

*Leveälehtinen ruohoke pienillä kukilla ryhmissä.*

- 105 BLITUM. Muro. — Kupu ed. Siemenet osittain tahi kaikki syrjällään verhon pohjassa. — H. 79.

- 106 SALSOLA. Kilokki. — Kupu erivärinen, 5-lehtinen, lop. lisäkkeellä lehtien selässä. Ide kierteinen. — H. 79.

*Rantaruoho möyheillä, oramaisilla, kärkeillä lehdillä.*

(*Polygonum* 8, 3.)

\*\* Sikiäin litteä 2-halkoisella, sisäpuolelta höyteällä luotilla päässään; hedelmä siivikäs.

- 107 ULMUS. Jalava. — Kupu suppilomainen, liuskainen, erivärinen (punahtava). Litteä, 1-siemeninen siipihedelmä. — H. 77.

*Puukasvi liuskattomilla, jurasahaisilla lehdillä, pienillä, ryh-  
mäisillä kukilla.*

†† Kehänä verho ja yhdislehtinen terä; sikiäin kehän  
sisällä (kukanpäällinen).

- 108 CYNANCHUM. Perhokukka. — Verho 5-halkoinen. Terä  
ratasmainen, 5-jaokkeinen. Heteet patsaamaisesti yhdistyneet  
2-vartalaisen emin ympäri. Sikiäimiä 2; emit yhteisellä, kilpi-  
mäisellä luotilla. Hedelmänä 2 tuppilohedelmystä tupsukar-  
vaisilla siemenillä. — H. 28.

*Ruohokasvi vastakkaisilla, kokonaisilla lehdillä, pieniröyhkyisillä  
kukilla.*

- 109 CUSCUTA. Humalavieras. — Verho 4—5-halkoinen. Terä  
suppilo- tahi kellomainen, 4—5-halkoinen. Heteitä 4—5. Kota  
tyveltä poikkipiirtoinen. — H. 22.

*Rihmamainen, lehdetön, epäperäinen loisio; kukat mykeröisessä  
ryhmässä.*

(*Gentiana* 5, 1.)

††† Terä 5-lehtinen, latvaperäinen. (Verho us. epä-  
selvä.) Hedelmänä 2 yhdistynyttä, lop. tav. toisistaan  
eroavaa jyväpuolikasta. — Sarjakasveja \*).

\* Kukat mykeröinä yksikertaisessa sarjassa.

- 110 SANICULA. Sankula. — Mykeröt sarjassa. Verho 5-lehti-  
nen. Terälehdet sisäkääntöisellä päällä. Hedelmä okainen.  
— H. 37, 2.

*Lehtoruoho 3—5-sormisilla lehdillä, m. lehdettömällä, yksiker-  
taisella varrella.*

\*\* Kukat toiskertaisessa sarjassa peräkkäitä; jyväpuolik-  
kaat liitettä vasten litteitä.

---

\*) Sarjakasveja on iso heimokunta pienillä valkoisilla, harv. keltaisilla t. si-  
nervillä, punertavilla kukilla enimmäen isommassa sarjassa säteettäisillä  
perillä, joiden päässä on toisia kukkia pienemmässä sarjassa (sarju-  
kassa). Niin sarjoilla kuin sarjukoilla on us. 1—monilehtisiä, säteettäisiä va-  
ruksia perän tyvellä. Terälehtiä on 5. Ne ovat us. niin koverapäisiä,  
että näyttävät lovipäisiltä, vastoherttaisilta j. n. e. Hedelmänä on 2 alusta  
yhdyntä, valmiina us. eroavaa jyväpuolikasta. Yhtyneinä kutsutaan niitä  
kaksoishedelmiksi tahi rippuhedelmiksi. Jyväpuolikkaat ovat muu-  
tamissa leveämmät liitteestä, kuin ovat liitteen ja selän väliltä, ja niin muo-  
doin liitteitä eli litistyneitä liitettä vasten tahi puoliliereitäki. Välistä  
ovat ne soukempia liitteestä, taikka kuin syrjittäin yhtyneitä, niin että ne sa-  
moin kuin koko hedelmä ovat sivuun päin litteitä ja korkea-selkäisiä.  
Tavallisesti on jyväpuolikkailla juovia, joissa löytyy hajullista baihtoöljyä.  
Poikki leikatussa jyväpuolikkaassa ne havaitaan mustina pilkkuina. Päältäpäin  
näkyvinä sanotaan niitä öljyjuomuiksi. (Katso mitä ennen, 35:llä sivulla,  
on kaksoishedelmuksesta sanottu).

**a** — Verho selvempi, 5-hampainen. (Terälehdet käyräpäisiä, näköään vastoherttaisia.)

- 111 LASERPITUM. Karvasruoho. — Jyväpuolikkaat puoliliereitä 4:llä leveäsiipisellä harjulla, öljyjuovat niiden alla. — H. 37, 2.

*Iso ruohoke sarja- ja sarjukkavaruksilla; lehdykät hertakkeisia.*

- 112 HERACLEUM. Ukonputki. — Jyväpuolikkaat litteitä, puikeita, selvillä lyhyillä nuijamaisilla öljyjuomuilla 3:n ihan matalan harjun välissä. — H. 37, 2.

*Iso, karhea, sarjavarukseton ruohoke parijakoisilla lehdillä, pariliuskaisilla lehdyköillä.*

- 113 PEUCEDANUM. Suojuuri. — Jyväpuolikkaat litteitä, pitkänpyöreitä, sisällisillä, päältä näkymättömillä öljyjuovilla ja mataloilla, tylpillä harjuilla. — H. 37, 2.

*Kalju, sarjavaruksinen ruohoke, 2—3:sti parijakoisilla lehdillä.*

**b** — Verho puuttuva t. epäselvä-hampainen.

- 114 PASTINACA. Pasternakka. — Terälehdet pitkän-puikeita, venhomaisia, vastakierteisiä. Jyväpuolikkaat litteitä, soikeita selvillä, lähes kantaan asti ulottuvilla öljyjuomuilla varsin matalain harjuin välillä. — H. 37, 2.

*Sarja- ja sarjukkavarukseton ruohoke parijakoisilla lehdillä.*

- 115 CENOLOPHIUM. Tuholatva. — Terälehdet vastopuikeita sisäkääntöisellä päällä. Jyväpuolikkaat pitkän-puikeita, puoliliereitä, terävillä, m. kalvosiipisillä harjuilla, öljyjuovikkaita. — H. 37, 2.

*Sarjukka-, us. sarjavaruksinenki ruohoke 3—5-kertaisesti parijakoisilla lehdillä.*

- 116 SELINUM. Metsäkumina. — Terälehdet vastoherttaisia. Jyväpuolikkaat korkean-kehkeriä (puoliliereitä), korkeilla, terävillä harjuilla, öljyjuovikkaita. — H. 37, 2.

*Sarjavarukseton ruohoke tois- t. kolmisparittaisilla lehdillä ja 6—9-säteisellä sarjalla.*

- 117 ANGELICA. Putki. — Terälehdet pitkän-suikeita, suippoja. Jyväpuolikkaat litistyneitä, soikeita, terävillä, korkeilla harjuilla, öljyjuovikkaita. — H. 37, 2.

*Iso ruohoke tois- t. kolmisparittaisilla, leveäliuskaisilla lehdillä; sarjavarus puuttuva t. menehtynä.*

\*\*\* Sarja toiskertainen; jyväpuolikkaat korkeaselkäisiä.

**a** — Hedelmä palleroinen — soikea, kalju; sarja- sekä sarjukkavaruksitta.

- 118 AEGOPIDIUM. Vuohenputki. — Verho epäselvä. Terä-



lehdet vastoherttaisia. Hedelmä puikea sileillä, korkeilla harjuilla, öljyjuovaton. — H. 37, 2.

*Iso ruoho toistain kolmisormisilla lehdillä, hertakkeisilla lehdyköillä.*

- 119 CARUM. Kumina. — Verho ja terä ed. Hedelmä soikea tylpillä, korkeilla harjuilla, öljyjuovikas. — H. 37, 2.

*Ruohoke pienijakoisilla lehdillä.*

- 120 PIMPINELLA. Anisruoho. — Verho ja terä ed. Hedelmä munanmoinen litteillä, viivamaisilla harjuilla, öljyjuovikas. — H. 37, 2.

*Parijakoislehtinen ruohoke.*

**b** — Hedelmä palleroinen — soikea, kalju; sarjukkavarukset monilehdekkeisiä.

- 121 CICUTA. Keiso. — Verho 5-hampainen. Terälehdet vastoherttaisia. Hedelmä palleroinen leveillä, sileillä harjuilla ja niiden välisillä öljyjuomuilla. — H. 37, 2.

*Iso sarjavarukseton vesiruoho, tois-, kolmisparittaisilla, pitkäliuskaisilla lehdillä.*

- 122 CONIUM. Katko. — Verho epäselvä. Terälehdet ed. Hedelmä munanmoinen, kurtteisilla, korkeilla harjuilla, öljyjuovaton. — H. 37, 1.

*Korkea ruohoke punapaikullisella varrella, monilehtisillä varuksilla, kolmisparittaisilla lehdillä.*

- 123 HALOSCIAS. Rantaputki. — Verho 5-hampainen. Terälehdet vastopuikeita sisäkääntöisellä päällä. Hedelmä soikea, korkeaharjuinen, öljyjuovikas. — H. 37, 2.

*Sarjavaruksinen rantaruoho toistain kolmisormisilla lehdillä, leveillä lehdyköillä.*

- 124 ENANTHE. Pahaputki. — Terälehdet vastoherttaisia. Verhon 5 selvää hammasta lop. otasina uurtouvoavaisen, soikean, öljyjuovikkaan hedelmän päässä. — H. 37, 2.

*Pystöinen, sarjavarukseton vesiruoho.*

- 125 SIUM. Sorsanputki. — Verho 5-hampainen. Terälehdet vastoherttaisia. Hedelmä pitkän-soikea, tylppäharjuinen, öljyjuovikas. — H. 37, 2.

*Pystöinen, sarjavaruksinen vesiruoho parijakoisilla lehdillä.*

- 126 ÆTHUSA. Hukanputki. — Verho epäselvä. Terä ed. Hedelmä munanmoinen venhomaisilla, korkeilla harjuilla, öljyjuovikas. — H. 37, 2.

*Kültävä, kalju, sarjavarukseton ruohoke 3-lehtisellä, alaskaarevalla sarjukkavaruksella.*

(*Selinum* ed.)

**c** — Hedelmä m. munanmoinen, karvainen t. piikkisukainen.

- 127 **LIBANOTIS**. Peuranjuuri. — Verho 5:llä pitkättävällä hampaalla. Terälehdet vastoherttaisia. Hedelmä odaton, yleensä höyteä, tylppäharjuinen, öljyjuovikas. — **37, 2.**

*Ruohokasvi tiheillä kuperilla, siementen valmistuessa m. ontevilla sarjoilla, kokonaisilla varuslehdillä.*

(*Sanicula* ed.)

**d** — Hedelmä suikea — tasasoukkainen.

- 128 **ANTHRISCUS**. Koiranputki. — Verho epäselvä. Terälehdet vastopuikeita t. hertahtavia. Hedelmä lyhyellä, kaljulla odalla, harjuton ja öljyjuovaton. — **H. 37, 1.**

*Sarjavarukseton ruohoke, harvasäteisillä sarjoilla, monilehtisellä sarjukkavaruksella.*

- 129 **CHÆROPHYLLUM**. Metsäkirveli. — Verho epäselvä. Terä ed. Hedelmä suikea, kalju, harjuton ja odaton, öljyjuovikas. — **H. 37, 1.**

*Sarjavarukseton, karheahka ruohoke.*

- 130 **MYRRHIS**. Saksankirveli. — Verho epäselvästi 5-hampainen. Terälehdet vastoherttaisia. Hedelmä suikea, kalju, korkea-venhoisilla, onsilla harjuilla, öljyjuovaton. — **H. 37, 1.**

*Sarjavarukseton ruohoke isoilla, monikertaisesti jakoisilla lehdillä, tuumanpituilla hedelmillä.*

(*Oenanthe* ed.)

### 3 Lahko. — KOLMEMISIÄ.

- 131 **VIBURNUM**. Heisi. — Verho 5-hampainen. Terä yhdislehtinen, 5-halkoinen, kellomainen. Kukat viuhkossa, laidalla isompina, litteinä, neuvottomina. Luotit vartalottomia. Hedelmänä 1-pesäinen ja 1-siemeninen marja. — **H. 17.**

*Pensaskasvi vastakkaisilla, liuskaisilla lehdillä.*

(*Polygonum aviculare* 8, 3; *Stellaria media* 10, 3.)

### 4 Lahko. — NELIEMISIÄ.

- 132 **PARNASSIA**. Vilukko. — Verho 5-jakoinen. Terä 5-lehtinen. Vartaloton. Mesivareita (epäheteitä) 5, nupillisilla karvoilla laidassa. Hedelmänä 1-pesäinen kota. — **H. 53.**

*Aluslehtinen, 1-kukkasinen ruohoke 1:llä varsilehdellä.*

### 5 Lahko. — VIISI — KYMMENEMISIÄ.

- 133 **ARMERIA**. Ruohoneilikkä. — Kukat kehdotsisäisenä kukkaistona. Verho pikarimainen, kalvomainen, 5-hampainen. Terä

syvään 5-jakoinen. Hedelmänä 1-siemeninen, puhkeamatta variseva rakkojyväke. — H. **35**.

*Tupasruohoke rihmamaisilla lehdillä, 1-kukkaistoisella vanalla.*

- 134 DROSERA. Kihokki. — Verho 5-jakoinen. Terä 5-lehtinen. Kota 1-pesäinen, monisiemeninen. — H. **53**.

*Paljasvanainen suoruohoke nystykarvaisilla lehdillä.*

- 135 SIBBALDIA. Närvänä. — Verho 10-halkoinen, joka toinen liuska pienempi. Terä 5-lehtinen. Hedelmykset kuivalla, litteällä pohjuksella. — H. **66**, 3.

*Pieni tunturiruoho kolmisormisilla lehdillä, pienillä kukkasilla.*

(*Linum* **16**, 1.)

#### 6 Lahko. — MONIEMISIÄ.

- 136 MYOSURUS. Hiirenhäntä. — Verho 5-lehtinen, kannanalaisella jatkolla. Terä 5-lehtinen mesikololla lehtien kynnessä. Paljo (pieniä, siemenen näköisiä) hedelmyksiä häntämäisellä pohjuksella. — H. **41**, 1.

*Pieni 1-kukkasinen ruohoke rihmamaisilla aluslehdillä.*

## 6 LUOKKA.

# KUUSIHETEISIÄ.

### 1 Lahko. — YKSEMISIÄ.

† Liljakasveja \*) terämaisella (erivärisellä) kuvulla, 3-pesäisellä, kuvunsisäisellä sikiäimellä.

137 ALLIUM. Laukka. — Kukat sarjassa kalvolehtisen kotelon sisällä. Kupu 6:lla, väl. hedepohjaiselta kannaltaan vähän yhdistyneillä lehdillä. Ponnet selin palhon päässä. Luotti kokonainen. — H. 10, 2.

138 GAGEA. Käenrieska. — Kupu 6-lehtinen. Ponnet pohjallaan palhossa, pystöisiä. Emi vartalolla ja liuskaisella luotilla. Siemenet litteitä. — H. 10, 2.

*Kukat suojuslehtisessä sarjakeessa; vana lehdetön.*

139 CONVALLARIA. Kielo. — Kupu yhdislehtinen, kello- tahi torvimainen, 6-liuskainen. Luotti kokonainen, 3-kulmainen. Marjahedelmä. Lojottavalla juurakolla (ei sipulilla). — H. 10, 1.

*Varsi lehdetön, kukat tertussa, tahi lehtivartinen ja kukat lehti-hangassa.*

†† Kukat paksussa puikelossa tiheäryhmäisiä.

140 CALLA. Vehka. — Kotelo 1-lehtinen, sisäpuolelta erivärinen (valkea). Kehätön. (Heteitä epälukuisia, pohjustetut sikiäinten ympärille). Hedelmät marjamaisia, ryhmitettynä puikelossa. — H. 5, 3.

*Vesikasvi herttamaisilla lehdillä.*

141 ACORUS. Kalmojuuri. — Koteloton. Puikelo tappimainen. Kehä yksipuolinen, verhomainen, 6-lehtinen. Kota 3-pesäinen. — H. 5, 2.

*Vesikasvi miekkamaisilla lehdillä; puikelo vanan sivulla.*

---

\*) Kaikilla liljoilla on ehyet, tav. kaljut, kaitaiset lehdet; kupu erivärinen ja sen lehdet tahi liuskat vastapäin heteitä, ei vuoroittain. Paitsi Kielolla (*Convallaria*) on niillä kaikilla suomuinen sipuli.

+++ Ruohomaisia kasveja 6-lehtisellä, verhomaisella (vehreällä t. ruosteenkarvaisella) kuvulla.

- 142 JUNCUS. Vihvilä. — Emi vartalolla ja 3:lla hapsimaisella luotilla. Kota monisiemeninen, 3-pesäinen ja 3-laitainen, laitain keskeltä lähtevillä välikelmuilla. — H. 6.

*Heinäkasvi puuttuvilla t. rihmamaisilla lehdillä ja toiselta puolen halkinaisilla lehtitupilla.*

- 143 LUZULA. Piippo. — Kota 1-pesäinen, välikelmuton, 3-siemeninen; muuten kuin ed. — H. 6.

*Litteälehtinen heinäke kokonaisilla lehtitupilla.*

++++ Verholla ja tav. terälläki varustettuna.

- 144 PEPLIS. Luhtakaali. — Verho kellomainen, poimuinen, 12-hampainen, joka toinen hammas pienempi, us. epäselvä. Terä puuttuva t. 6-lehtinen. Vartalo kovin lyhyt, pyöreäluottinen. Kota monisiemeninen. — H. 62.

*Vastaislehtinen, lamova t. laijehtiva ruohoke lehtihankaisilla kukilla.*

(*Naumburgia* 5, 1; *Trientalis* 7, 1.)

## 2 Lahko. — KAKSEMISIÄ.

- 145 OXYRIA. Hapro. — Kehä yksipuolinen, verhomainen, 4-lehtinen, 2:lla lehdellänsä kasvava ja peittävä kalvosiipisen, litteän pähkylän; 2 töyhtöistä luottia. — H. 74.

*Tunturiruoho herttamaisilla aluslehdillä.*

(*Ulmus* 5, 2; *Polygonum* 8, 3.)

## 3 Lahko. — KOLMI — KUUSEMISIÄ.

- 146 RUMEX. Hierakka. — Kehä yksipuolinen, verhomainen, 6-lehtinen, 3:lla lehdellänsä kasvava ja peittävä 3-kulmaisen pähkylän; 3 töyhtöistä luottia. — H. 74.

*Hajalehtinen ruohoke tupekkeilla nivelissä. — Parilla kaksikotisella lajilla.*

- 147 TRIGLOCHIN. Suolake. — Kupu verhomainen 3:lla ulkoja 3:lla sisälehdellä, itsekunki sisällä 1 m. palhoton ponsi; 3 t. 6 vartalotonta emiä. Hedelmänä 3 t. 6, 1-siemenistä hedelmystä. — H. 8, 1.

*Vanaruoho rihmamaisilla aluslehdillä; kukat tähkimäisessä rypäleessä.*

- 148 TOFIELDIA. Karhunheinä. — Kukat 3-halkoisella varuksella. Kupu terämäinen, 6-lehtinen. Palhot ja vartalot selviä; 3 monisiemenistä, tyveltä yhdistynyttä kotaa. — H. 7.

*Tiikkäkukkasinen ruohoke pienillä miekkamaisilla aluslehdillä.*

- 149 VERATRUM. Pärskäjuuri. — Eräät kukat keskeytyneitä, 1-neuvoisia. Varuslehdetön; 3 tyveltä vähän yhtynyttä kootaa; muuten kuin ed. — H. 9.

*Iso leveälehtinen tunturiruoho, isoilla kukilla rypäleissä.*

- 150 SCHEUCHZERIA. Leväkkö. — Kupu terämäinen, 6-lehtinen. Ponnet tasasoukkia selvillä palhoilla; 3—6 vartalotonta emiä; 3—6 pullakkaa, 1—2-siemenistä hedelmystä. — H. 8, 1.

*Terttukukkasinen vesiruoho puoliliereillä lehdillä.*

*(Elatine 8, 4.)*

#### 4 Lahko. — MONIEMISIÄ.

- 151 ALISMA. Sarpio. — Verho ja terä 3-lehtisiä. Monta 1-siemenistä hedelmystä. — H. 8, 2.

*Paljasvartinen vesiruoho kokonaisilla aluslehdillä.*

## 7 LUOKKA.

**SEITSENHETEISIÄ.**

## 1 Lahko. — YKSEMISIÄ.

152 TRIENTALIS. Metsätähti. — Verho ja terä pohjaan asti 6—7-jakoisia, jälkimäinen tähtimäisesti levinnyt. Kota 1-pesäinen 7—8:lla, pian lähtevällä laidalla. Siemenet keski-istukkaisia, valkeita, pilkutuita. — H. **33**, 1.

*1—2-kukkasinen metsäruohoke m. säteettäisillä lehdillä.*

---

## 8 LUOKKA.

## KAHDEKSAHETEISIÄ.

## 1 Lahko. — YKSEMISIÄ.

† Kukan-päällisellä sikiäimellä.

- 153 DAPHNE. Näsiä. — Kehä yksipuolinen, terämäinen, suppilomainen, 4-halkoinen. Hedelmänä 1-siemeninen luumarjake. — H. 75.

*Matalahko pensas; kukat ryhmässä paljaalla oksalla.*

- 154 CALLUNA. Kanerva. — Verho 4-jakoinen, erivärinen, syvään 4-halkoista terää pidempi (lyhyellä, ulkoverhon näköisellä, 4-lehtisellä suojuksella). Kota kelmusäteinen. — H. 69, 2.

*Matala pensas; haarat pienistä tiheistä lehdistänsä 4-tahkoiset.*

(*Ulmus* 5, 2; *Polygonum* 8, 3; *Elatine* 8, 4; *Montropa* 10, 1; *Acer* 23, 2.)

†† Kukan-alaisella sikiäimellä.

- 155 VACCINIUM. Puola. — Verho 4-halkoinen. Terä kellomainen, 4-liuskainen. Ponnet epäselvillä kannuksilla. Marjahedelmä. — H. 69, 1.

*Lamova pensasto nahkeilla, lakastumattomilla lehdillä.*

- 156 OXYCOCCUS. Karpalo. — Verho 4-hampainen. Terä ratasmainen, 4-jakoinen taaspäisillä liuskoilla. Ponnet 2-sarvisia, kannuksettomia. Marjahedelmä. — H. 69, 1.

*Suikertava, rihmamainen, monivuotinen kasvi pitkäperäisillä kukilla.*

- 157 MYRTILLUS. Mustikka. — Verho kokonainen t. 4-liuskainen. Terä palleromainen t. munanmoinen, 3–5-hampainen. Ponnet 2-sarvisia, 2-kannuksisella selällä. Marjahedelmä. — H. 69, 1.

*Matala, ruohomainen pensas varisevilla lehdillä ja lehtihankaisilla kukilla, väl. 10:llä heteellä.*



- 158 EPILOBIUM. Horsma. — Verho syvään 4-halkoinen lyhyellä, pikarimaisella pohjalla. Terä 4-lehtinen. Sikiäin tasasoukka, lop. liskomainen, 4-laitainen kota tupsukarvaisilla siemenillä. — H. 63.

*Vastais-, ehälehtinen ruohoke punaisilla, harv. valkoisilla kukilla. — Yhden lajin lehdet eivät ole vastakkaisia.*

- 159 OENOTHERA. Helokki. — Verho suppilomainen, pitkätörvinen, 4-jakoislaiteinen. Terä ja kota ed. Siemenet paljaita. — H. 63.

*Vuorolehtinen ruohoke isoilla (keltaisilla) kukilla.*

*(Ulmus 5, 2; Polygonum 8, 3; Monotropa 10, 1;  
Acer 23, 2.)*

## 2 Lahko. — KAKSEMISIÄ.

- 160 CHRYSOSPLENIUM. Linnunsilmä. — Kehä yksipuolinen, 4-halkoinen, sisäpuolelta erivärinen (keltainen). Hedelmänä 2-laitainen, monisiemeninen kota. — H. 60.

*Pieni ruohoke munuamaisilla lehdillä ryhmässä yläpuolella.*

*(Ulmus 5, 2; Polygonum 8, 3; Acer 23, 2.)*

## 3 Lahko. — KOLMEMISIÄ.

- 161 POLYGONUM. Tatar. — Kehä yksipuolinen, terämäinen, syvään 5-jakoinen. Heteitä 5—8. Sikiäin 1—3:lla erisellä t. yhtyneellä vartalolla. Hedelmänä litteä t. 3-kulmainen pähkylä, vastasuuntaisella, viereisellä iteellä. — H. 74.

*Tupekkeinen ruohoke; lehdet joko puikeita — tasasoukkaisia, tai herttamaisia sepokantaisia, taikka herttamaisia köynneliäs-vartisista.*

*(Elatine 8, 4.)*

## 4 Lahko. — NELI — VIISEMISIÄ.

- 162 PARIS. Sudenmarja. — Kupu verhomainen, 4:llä isolla ulko- ja 4:llä rihmamaisella sisälehdellä. Palhot pidenneinä pontta ylemmäksi. Hedelmänä 4-pesäinen marja. — H. 10, 1.  
*Yksikukkasinen ruohoke säteettöisillä, yksikertaisilla lehdillä.*

- 163 ADOXA. Tesmanyrtti. — Verho 2—3-halkoinen, sikiäintä ympäröitsevä. Terä 4—5-halkoinen. Hedelmänä 3—5-pesäinen, mehevä kota. — H. 38.

*Yksikertainen ruuhoke toiskertaisilla lehdillä ja pienillä kukilla m. 4-tahkoisessa mykerössä.*

- 164 ELATINE. Vesirikko. — Verho 3—4-halkoinen. Terä 3—4-lehtinen. Heteitä 3, 6 tahi 8. Luotteja 3, 4. Hedelmänä 3—4-pesäinen kota. — H. 56.

*Pieni rantaruoho vastakkaisilla, yksikertaisilla lehdillä ja lehtihankaisilla kukilla. — Veden alla tav. terälehdetön.*

## 9 LUOKKA.

# YHDEKSÄHETEISIÄ.

### 1 Lahko. — KOLMEMISIÄ.

(*Polygonum bistorta* 8, 3.)

### 2 Lahko. — KUUSEMISIÄ.

165 BUTOMUS. Rimpi. — Kupu terämäinen, 6-lehtinen; 6 monisiemenistä sikiäintä ja kotaa. — H. 8, 3.

*Korea sarjakukkasinen vesikasvi jokirannoilla.*

---

## 10 LUOKKA.

## K Y M M E N H E T E I S I Ä .

## 1 Lahko. — YKSEMISIÄ.

† Terä yhdislehtinen.

- 166 ARCTOSTAPHYLOS. Sianpuola. — Verho 5-halkoinen. Terä munan- t. torvimainen sikiäimen ympärillä. Ponnet 2-kannuksisia. Hedelmänä 5-pesäinen, 5-siemeninen marja. — H. 69, 2.

*Lamova, varpamainen pensaskasvi m. lapiomaisilla lehdillä.*

- 167 ANDROMEDA. Suokukka. — Verho 5-jakoinen. Terä munanmoinen t. kellomainen. Ponnet pyöreämäisiä t. pitkänpyöreitä, 2-kannuksisia. Kota 5-pesäinen, laitaluomainen. — H. 69, 2.

*Pieni pensaskasvi; kukat pitkättävillä perillä.*

- 168 CASSANDRA. Vaivero. — Verho 5-jakoinen 2-lehtisen lisäverhon sisällä. Terä pikarimainen. Ponnet kannuksettomia. Kota ed. — H. 69, 2.

*Matala, vuorolehtinen pensas lehtihankaisilla kukilla.*

- 169 PHYLLODOCE. Kurenkanerva. — Verho 5-jakoinen. Terä munanmoinen. Ponnet liereämäisiä, kannuksettomia. Kota 5-pesäinen, liiteluomainen. — H. 69, 2.

*Pienoinen, soukkalehtinen pensaskasvi peräkkäillä latvakukilla.*

- 170 RHODODENDRON. Lapinruusu. — Verho 5-liuskainen. Terä suppilomainen. Ponnet kannuksettomia. Kota ed. — H. 69, 2.

*Sormenkorkuinen pensaskasvi; lehdet ja kukat haarain päässä.*

(*Vaccinium* 8, 1.)

†† Terä erilehtinen.

- 171 LEDUM. Pursu. — Verho pienen pieni, 5-hampainen (ruskean-höyteä). Terä 5-lehtinen. Ponnet latvasta viistoin 2-reikäisiä. Kota 5:llä pohjasta eriävällä pesällä. — H. 69, 2.

*Kyynärän korkuinen, soukkalehtinen, sarjakukkasinen pensas.*

- 172 PYROLA. Talvilehti. — Verho ratasmainen, 5-jakoinen. Terä ja heteet ed. Kota 5-pesäinen, liiteluomainen. — H. 69, 3.

*Terttukukkasinen ruuhoke paljaalla, tyveltä lehtisellä varrella.*

- 173 MONOTROPA. Mäntykukka. — Verho ja terä pikarimaisia. Laitakukat 8-heteisiä 4:llä verho- ja terälehdellä; latvakukka 10-heteinen ja 5:llä lehdellä. Kaikki kehälehdet keltaisia. Kota 4—5-pesäinen. — H. 69, 3.

*Lehdetön, suomuinen ruuhoke rypäleisillä kukilla.*

(*Geranium* 16, 2.)

## 2 Lahko. — KAKSEMISIÄ.

- 174 SCLERANTHUS. Jäsenheinä. — Kehä yksipuolinen, verhoomainen, yhdislehtinen, 5-hampainen. Hedelmänä kalvopeiteinen rakkojyväke kuvun kovettuneessa pohjassa. — H. 73.

*Pieni, haarainen ruuhoke vastakkaisilla, äimäisillä lehdillä.*

- 175 SAXIFRAGA. Kivirikko. — Verho kellomainen, 5-halkoinen. Terä 5-lehtinen, verhoperäinen. Kota 2-pesäinen, puhkeava 2:n sarvimaisen vartalonsa väliltä; istukka liiteperäinen. — H. 60.

*Vuorolehtinen ruuhoke ehjillä t. liuskaisilla lehdillä.*

- 176 DIANTHUS. Neilikkä. — Verho torvimainen, 5-hampainen, lisäverholla tyvessä. Terä 5:llä pitkä- ja soukkakynsisellä lehdellä. Kota 1-pesäinen, 4-laitainen, keski-istukkainen. — H. 54, 2.

*Jotenkin isokukkasinen ruuhoke soukilla, vastakkaisilla lehdillä.*

- 177 GYPSOPHILA. Raunikki. — Verho kellomainen, 5-liuskainen. Terä 5:llä alaspäin soukkenevalla lehdellä. Kota ed. — H. 54, 2.

*Pienikukkasinen ruuhoke soukilla, vastakkaisilla lehdillä.*

## 3 Lahko. — KOLMEMISIÄ.

- 178 SILENE. Kohoruoho. — Verho pikarimainen t. munamoinen, 5-hampainen. Terä 5:llä pitkäkynsisellä lehdellä. Kota 1-pesäinen, 6-laitainen, keski-istukkainen. — 54, 1.

*Vastais- ja ehylehtinen ruuhoke pikarimaisilla kukilla.*

- 179 STELLARIA. Tähtimö. — Verho 5-jakoinen. Terä 5:llä syvään 2-halkoisella t. 2-jakoisella lehdellä. Kota ed., monilukusilla, pienillä siemenillä. — H. 55, 1.

*Vastais- ja ehylehtinen ruuhoke tähtimäisillä kukilla.*

- 180 HALIANTHUS. Rantakaali. — Verho 5-jakoinen. Terä 5:llä kokonaisella lehdellä; kynnet leveitä, pitkättäviä. Mesi-

nystyrät erittäin isoja vuoroittain hedetten kanssa. Kota 3-laitainen harvalukuisilla (noin 6:lla), isoilla, keski-istukkaisilla siemenillä. — H. 55, 2.

*Rantaruoho vastakkaisilla, leveähkävillä, möyheillä lehdillä.*

- 181 ARENARIA. Arho. — Verho ja terälehdet ed., jälkimäiset ilman selvittä kynsittä ja mesinystyröittä. Kota 6-laitainen monilukuisilla, keski-istukkaisilla siemenillä. — H. 55, 1.

*Pienenläntä ruohoke; lehdet vastakkaisia, leveähköitä, apulehdetömiä.*

- 182 LEPIGONUM. Solmuheinä. — Verho ja terä ed. Kota 3-laitainen; siemenet rengasmaisella palteella. — H. 55, 3.

*Ruohoke vastakkaisilla, rihmamaisilla, apulehtisillä lehdillä.*

- 183 ALSINE. Nätä. — Kukat ja kota ed. Siemenet rengaspalteettomia. — H. 55, 2.

*Pieni apulehdetön ruohoke; lehdet ed.*

*(Cerastium trigynum 10, 4.)*

#### 4 Lahko. — VIISEMISIÄ.

† Kukat yksinäisellä sikiäimellä.

\* Verho pikarimainen t. munanmoinen, liuskalatvainen.

- 184 AGROSTEMMA. Aurankukka. — Verho nahkea 5:llä pitkällä, lehdettävällä liuskalla. Terä 5-lehtinen. Luotit yleensä karheakarvaisia. Kota 1-pesäinen, monisiemeninen. — H. 54, 1.

*Isokukkasinen peltoruoho soukilla, vastakkaisilla lehdillä.*

- 185 VISCARIA. Tervakko. — Verho kalvomainen, 5-hampainen. Terä ed. Kota monipesäinen, monisiemeninen. — H. 54, 1.

*Soukkalehtinen ruohoke ryhmämdisillä kukilla röhyn haaroissa.*

- 186 MELANDRIUM. Ailakki. — Verho ed. Terä 5:llä (2-halkoisella) lehdellä. Kota 1-pesäinen 5:llä, päästä lop. 2-halkoisella laidalla, siten 10-hampainen, monisiemeninen. — H. 54, 1.

*Vastaislehtinen ruohoke; kukat yksinäisiä tahi toishaarukkaisessa röhhyssä.*

- 187 LYCHNIS. Käenkukka. — Verho 5-hampainen. Terä 5:llä (4-halkoisella) lehdellä. Kota 1-pesäinen, 5-laitainen, liiteluomainen, monisiemeninen. — H. 54, 1.

*Soukkalehtinen ruohoke röhhykukinnolla.*

\*\* Verho pohjaan asti jakoinen. (Lehdet vastakkaisia.)

- 188 MALACHIUM. Vata. Terä 5:llä, syvään 2-halkoisella lehdellä. Kota 5:llä, päästä 2-liuskaisella laidalla. — H. 55, 1.

*Isokko, leveälehtinen, hervakka ja hauras ruohoke.*

- 189 CERASTIUM. Härkki. — Terälehdet ed., harv. kokonaisia. Kota päästä tasamukaisesti 10-hampainen. — H. 55, 1.  
*Soikea — tasasoukka-lehtinen ruohoke tähdekkaisillä kukilla. — C. semidecandrum on tav. 5-heteinen jaottomilla terälehdillä, ja toisinnollansa 4-lukuisilla kukka-osilla.*
- 190 SPERGULA. Hatikka. — Terä 5:llä kokonaisella lehdellä. Kota 5-laitainen, liiteluomainen. Siemenet litteitä rengasmaisella palteella. — H. 55, 3.  
*Ruohokkeen lehdet rihmamaisia, ulkonäköään säteettäisiä.*
- 191 SAGINA. Haarikko. — Verho 4—5-jakoinen. Terä 4—5:llä ehyellä lehdellä (väl. puuttuva). Kota 4—5-laitainen, siemenet rengaspalteetta. — H. 55, 2.  
*Pieni ruohoke tav. äimämisillä lehdillä, apulehdittä.*  
*(Adoxa 8 4; Arenaria ciliata 10, 3; Oxalis 16, 2.)*

†† Kukat useammalla sikiäimellä. (Lehdet vuorottaisia).

- 192 SEDUM. Maksaruoho. — Verho ja terä 5-lehtisiä; 5:llä monisiemenisellä hedelmyksellä. — H. 61.  
*Ruohokkeen lehdet ovat paksuja, us. liereitä.*  
*(Geranium 16, 2.)*

## 11 LUOKKA.

# KAKSITOISTAHETEISIÄ.

### 1 Lahko. — YKSEMISIÄ.

- 193 LYTHRUM. Rantakukka. — Verho pikarimainen, 12-hampainen. Terä 6-lehtinen. Kota kukansisäinen, 2-pesäinen. — **H. 62.**

*Tähkäkukkasinen ruohoke vastakkaisilla t. säteettäisillä lehdillä.*

### 2 Lahko. — KAKSEMISIÄ.

- 194 AGRIMONIA. Verijuuri. — Verho 5-halkoinen. Terä 5-lehtinen. Heteitä 12—20. Verhopohja lop. sulkeva 1—2 hedelmystä, latvalta sukapeitteinen. — **H. 66, 2.**

*Tähkäkukkasinen ruohoke vuorottaisilla, parijakoisilla lehdillä.*

### 3 Lahko. — KOLMI-, NELIEMISIÄ.

- 195 EUPHORBIA. Tyräneste. — Kehä yksipuolinen, kellomainen, 8—10-liuskainen, joka toinen liuska terälehtimäinen, litteästi ulospäinen. Heteitä 12—20, eriaikuiset, nivelpalhoiset. Vartaloita 3, halkoluottiset. Kota 3-kyhmyinen, 3-pesäinen, 3-siemeninen. — **H. 71.**

*Sarjakukkasinen ruohoke kokonaisilla vuoroislehdillä.*



## 12 LUOKKA.

## PARIKYMMENTHETEISIÄ.

## 1 Lahko. — YKSEMISIÄ.

- 196 PRUNUS. Tuomi. — Verho 5-halkoinen. Terä 5-lehtinen, kukansisäisellä sikiäimellä. Hedelmänä mehevä t. möyheä luumarja sileällä (ei kolealla) kivellä. — H. 67.

*Pensas tahi puukasvi kokonaisilla, sahalaitaisilla lehdillä.*

(*Cratægus* 12, 2).

## 2 Lahko. — KAKSI — VIISEMISIÄ.

- 197 COTONEASTER. Tuhkapuu. — Verho 5-halkoinen, lop. möyheäliuskainen. Terä 5-lehtinen. Vartaloita 2—3. Hedelmänä lop. marjakkeeksi muuttuva verho ja 2—5 pähkylämäistä, 1-siemenistä, erinäistä pesää (kivosia) avopäisen marjan sisäpuolella. — H. 65.

*Ehytlaitaislehtinen pensas 1—3-kukkasilla rypäleillä.*

- 198 CRATÆGUS. Orapihlaja. — Verho 5:llä ohuella liuskalla. Terä 5-lehtinen. Vartaloita 1—3. Hedelmä ed. 1—3:lla pähkylämäisellä, toisiinsa ja umpipäiseen marjaan kiinteästi yhtyneellä pesällä. — H. 65.

*Liuskalehtinen pensas; kukat sarjamaisessa röyhyssä.*

- 199 SORBUS. Pihlaja. — Verho ja terä ed. Vartaloita 2—4. Hedelmä marjamainen, jauhea 2—4:llä kalvolaitaisella, 2-siemenisellä pesällä. — H. 65.

*Puukasvi syvään sahalaitaisilla, liuskaisilla t. parijakoisilla lehdillä, tiheäröyhyisillä kukilla.*

- 200 PYRUS. Omenapuu. — Verho ja terä ed. Vartaloita 5. Hedelmänä mehevä omena t. peruna 5:llä kalvolaitaisella, 2-siemenisellä pesällä. — H. 65.

*Puukasvi kokonaisilla t. sahalaitaisilla lehdillä; kukat sarjamaisessa huiskilossa.*

## 3 Lahko. — MONIEMISIÄ.

† Verho 5-, harv. 6—7-halkoinen.

- 201 SPIRÆA. Angervo. — Verho 5—7-halkoinen. Terä 5—7-

lehtinen; 5—12 kukansisäistä sikiäintä, lop. sama luku 2—4-siemenisiä tuppihedelmiä. — H. 66, 4.

*Ruoho- tahi pensaskasvi kokonaisilla t. parijakoisilla lehdillä, röyhymäisillä t. harkkomaisilla kukilla.*

- 202 ROSA. Ruusu. — Terä 5-lehtinen. Verho 5-kalkoinen munanmoisella t. palleroisella, lop. marjamaisella, erivärisellä pohjalla peitteenä sisäpuolelle kiintyneitten hedelmysten ympäri. — H. 66, 1.

*Pensaskasvi parijakoisilla, ruotikorvakkeisilla lehdillä.*

- 203 RUBUS. Vatukska. — Verho 5-halkoinen. Terä 5-lehtinen. Sikiäimet kuivalla pohjuksella, lop. 1-siemenisiä, hillukaksi liittyneitä luuhedelmiä. — H. 66, 3.

*Ruoho- tahi pensaskasvi liuskaisilla tahi kolmi — seitsensormisilla, harv. parijakoisilla lehdillä, erillisillä korvakkeilla.*

†† Verho 10-, harv. 8-halkoinen, joka toinen liuska pienempi.

- 204 FRAGARIA. Mansikka. — Terä 5-lehtinen. Marjamaisena hedelmänä (mansikkana) monta sienettävästi turpean, mehevän, erin lähtevän pohjuksen pintaan vajounutta, siemennäköisiä hedelmiä. — H. 66, 3.

*Kolmittaislehtinen ruohoke suikertavilla varsilonkeroilla.*

- 205 POTENTILLA. Hanhenjalka. — Terä 5-, harv. 4-lehtinen. Monta suatonta hedelmystä kuivalla, kehkerällä pohjuksella. — H. 66, 3.

*Keltakukkasinen ruohoke parittaisilla t. sormijakoisilla lehdillä.*

- 206 COMARUM. Kurenjalka. — Terä 5:llä lehdellä (paljo lyhemmät sisäpuolelta ruskeata verhoa). Monta suatonta hedelmystä kuivassa, sienettävästi tursistuneessa pohjuksessa. — H. 66, 3.

*Suoruoho 2—3-parisilla lehdillä, tummanruskeilla kukilla.*

- 207 GEUM. Kellukka. — Terä 5-lehtinen. Hedelmukset pitkällä, luotin jälkeisellä okapäisellä odalla. — H. 66, 3.

*Ruohoke isopäätöisesti parijakoisilla aluslehdillä.*

††† Verho tasamukaisesti 8—10-halkoinen.

- 208 DRYAS. Lapinvuokko. — Terä 8—10-lehtinen. Hedelmukset pitkällä, häntämäisellä odalla. — H. 66, 3.

*Tunturiruoho yksikertaisilla lehdillä, yksinäisellä vanakukalla.*

## 13 LUOKKA.

# MONIHETEISIÄ.

### 1 Lahko. — YKSEMISIÄ.

† Terä 4-lehtinen.

- 209 PAPAVER. Unikko. — Verho 2-lehtinen, lyhytaikainen. Sikiäin nuijamainen — palleroinen kilpimäisellä, vartalottomalla luotilla. Kota sikiäimen muotoinen, 1-pesäinen välikelmuin aiheilla, läpiluomainen luottisyrjän alta. — H. 42.

*Liuskalehtinen, isokukkasinen, valko-maitias ruohoke.*

- 210 CHELIDONIUM. Keltamo. — Verho ed. Sikiäin liereä; luotti 2-liuskainen. Kota liskomainen, 1-pesäinen, välikelmuaiheinen. — H. 42.

*Keltamaitias, liuskalehtinen ruohoke pienemmillä kukilla.*

- 211 ACTÆA. Konnanmarja. — Verho 4-lehtinen, terämäinen, menehtyvä. Sikiäin munanmoinen soikealla, vartalottomalla luotilla. Hedelmänä 1-pesäinen, marjamainen kota 2-rivisesti istuvilla siemenillä. — H. 41.

*Teräkukkasinen, terätkön siimes-ruoho monijakoisilla lehdillä.*

†† Terä 5:llä tahi useammalla lehdellä.

- 212 HELIANTHEMUM. Päivännouto. — Verho 3-lehtinen 2:lla suojuslehdellä. Terä 5-lehtinen. Kota 3-laitainen 1—3:lla monisiemenisellä pesällä. — H. 51.

*Pensasmainen kasvi vastakkaisilla lehdillä.*

- 213 TILIA. Lehmus. — Verho 5-lehtinen, menehtyvä. Terä 5-lehtinen. Vartalo rihmamainen 4—5-halkoisella luotilla. Kota puhkeamatta variseva 4—5:llä, 1-siemenisellä pesällä. — H. 47.

*Herttalehtinen puu suojuksellisella yhteisellä huiskilo-varrella.*

- 214 NYMPHÆA. Lumme. — Verho 4-lehtinen. Terä monirivisesti monilehtinen. Heteet terälehtimäisillä, sikiäimen päällä seisovilla palhoilla. Luotti kilpimäinen, vartaloton. Kota puhkeamatta variseva. Siemenet verkkomaisen kalvon sisäisiä. — H. 40.

*Herttalehtinen vesikasvi isolla, yksinäisellä, valkealla kukalla.*

- 215 NUPHAR. Upukka. — Verho 5-lehtinen. Terälehdet, luotti

ja kota ed., emin pohjuksella seisovilla heteillä. Siemenet verkkomaisetta kalvotta. — H. 40.

*Edellisen kaltainen, keltakukkasinen vesikasvi.*

(*Parnassia* 5, 4; *Delphinium* 13, 2.)

## 2 Lahko. — KAKSI — VIISEMISIÄ.

- 216 DELPHINIUM. Kukonkannus. — Verho iso, terämäinen, erivärinen, 5-lehtinen, ylimmäinen lehti mesikannuksinen. Terä 1- (moni-)lehtinen kannuksella verhokannuksen sisässä. Hedelmiä 1—3. — H. 41, 3.

*Haarainen, kannuskukkasinen ruohoke hienojakoisilla lehdillä. — Meikäläinen laji 1-eminen ja 1:llä terälehdellä.*

- 217 ACONITUM. Ukonhattu. — Verho ed. Ylimmäisen, kypärimäisen lehden sisällä 2 peräkästä sarvi- tahi tuuttimasta terälehteä (mesipidettä). Hedelmiä 3—5. — H. 41, 3.

*Terttukukkasinen ruohoke kourahalkoisilla t. -jakoisilla lehdillä.*

- 218 AQUILEGIA. Akileia. — Verho ed. tasamukaisilla lehdillä. Terä 5:llä, alaspäin yhtä moneksi kannukseksi pidenneellä lehdellä. Hedelmiä 5. — H. 41, 3.

*Ruohoke isoilla toisjakoisilla lehdillä ja isoilla 5-kannuksilla kukilla.*

- 219 PÆONIA. Peijoona. — Verho 5:llä nahkealla, pysyvällä lehdellä. Terä 5:llä tasamukaisella, kannuksettomalla lehdellä. Hedelmänä 2—5 nahkeaa tuppihedelmystä. — H. 41, 4.

*Iso pensastava kasvi toisjakoisilla lehdillä, suurilla koreilla kukilla.*

(*Hypericum* 18, 1; *Stratiotes* 22, 7.)

## 3 Lahko. — MONIEMISIÄ.

† Kehä yksipuolinen terämäinen (terälehtimäinen verho).

- 220 THALICTRUM. Ängelmä. — Kupu 4-lehtinen, lyhytaikuisen. Monta kulmikasta, 1-siemenistä, puhkeamatta putoavaa hedelmystä. — H. 41, 2.

*Ruohokasvi parijakoisilla, lyhyttuppisilla lehdillä, pienillä kukilla rypäleissä.*

- 221 PULSATILLA. Käensilmä. — Kupu erivärinen, 6-lehtinen. Monilukuiset hedelmykset mykerössä, 1-siemenisiä, pitkällä, sulakarvaisilla sukasilla. — H. 41, 2.

*Ruohokasvi parijakoisilla aluslehdillä, isolla vanakukalla ja kienojakoisella varuksella.*

- 222 ANEMONE. Vuokko. — Kupu ed., 5—10-lehtinen 3-lehtisellä varuksella alempana t. verhontapaisesti kukan alla. Hedelmykset ed., suattomat. — H. 41, 2.

*Ed. mukainen ruohoke, mutta 3-liuskaisilla t. 3- (harv. moni-) jakoisilla lehdillä.*

- 223 **CALTHA**. Rentukka. — Kupu ed., 5—6-lehtinen, varukseton. Monta säteettäin yhdistynyttä, monisiemenistä hedelmystä. — H. 41, 3.

*Vesiruoho kokonaisilla, hertakkeisilla lehdillä.*

(*Trollius* seur. jaossa).

†† Kukat verholla sekä terällä.

- 224 **TROLLIUS**. Kullero. — Verho iso, erivärinen, terämäinen, 10—16-lehtinen. Terälehdet pieniä, tuskin heteitä pidemmät kielekkeisiä, mesikoloisella kannalla. Monta monisiemenistä hedelmystä. — H. 41, 3.

*Ruohokasvi 5—7-jakoisilla lehdillä, isoilla palleroisilla kukilla.*

- 225 **FICARIA**. Maapähkänä. — Verho 3-lehtinen. Terä 7—10-lehtinen, suomueitteinen mesikolo lehtien kynnessä. Monta 1-siemenistä, vartalogonta hedelmystä. — H. 41, 1.

*Herttalehtinen ruohoke 1-kukkasisella varrella.*

- 226 **RANUNCULUS**. Leinikkö. — Verho 5- (harv. 3-)lehtinen. Terä 5- (harv. useampi-)lehtinen suomuvaraisella mesikololla lehtikynnessä. Hedelmukset lyhytvartalaisia, muuten kuin ed. — H. 41, 1.

*Ruohokasvi kokonaisilla, soukilla t. miten milloinki monijakoisilla lehdillä.*

- 227 **BATRACHIUM**. Sätkin. — Verho 5-lehtinen. Terä 5- (harv. useampi-)lehtinen paljaalla mesikololla lehtikynnessä. Hedelmukset ed., hienokurtuiset pinnalta. — H. 41, 1.

*Vesiruohoke tav. pienijakoisilla alemmilla lehdillä ja valkoisilla kukilla.*

(*Anemone hepatica* ed. jaossa).

## 14 LUOKKA.

## KAKSIVALTIAITA.

## 1 Lahko. — PALJASSIEMENISIÄ. \*)

Hedelmänä 4 pientä, erillistä pähkylää.

† Verho 5:llä, m. tasamukaisella liuskalla.

• Terän ylihuuli pienempi t. ei erittäin korkeampi alahuulta. (*Mintun* terä m. tasamukaisesti liuskainen.)

228 MENTHA. Minttu. — Terä m. tasamukaisesti 4-liuskainen, 1:llä lovipää liuskalla. Heteet erillään, suoria. — H. 24, 1. *Kukat kiehkuroissa milloin lehtihangassa, milloin tähkässä t. mykerössä; suojuslehdet soukkia.*

229 AJUGA. Akankaali. — Terän ylihuuli pieni, 2-hampainen, alahuuli 3-liuskainen, keskiliuska isoin, lovipäinen. Heteet erillään. — H. 24, 6.

*Pystyinen ruohoke lehtihankaisilla, suojuksettomilla kukkakiehkuroilla.*

230 GLECHOMA. Maahumala. — Ylihuuli vastoherttainen, 2-liuskainen; alahuuli 3-halkoinen, keskiliuska lovipäinen. Ponnet parittain ristissä. — H. 24, 4.

*Herttalehtinen, suikertava ruohoke.*

•• Terän ylihuuli korkea, liuskaton t. loivaliuskainen.

231 ORIGANUM. Meirami. — Verho tasamukaisesti 5-hampainen, karva-sulkuinen. Terän ylihuuli litteähkö, 2-liuskainen; alahuuli tasamukaisesti 3-halkoinen, ehytliuskainen. — H. 24, 2. *Kukat pienissä käpymäisissä, röyhyksi yhtyneissä tähkissä pitkulaisilla suojuslehdillä.*

232 NEPETA. Kissanminttu. — Verho kohollaan 15-suoninen. Terän torvi eteenpäin käyrä; ylihuuli litteä, pykälepäinen, ala-

\*) Tähän kuuluvia kasvisukuja luetaan *Huulikukkaisien* (Labiales) heimoon. Niiden yhdislehtinen terä on torvella ja vastakohtisella, us. 2-huulisella laiteella varustettu. Verhon pohjassa on 4 pientä pähkylää (4-lohkoinen hedelmä) yhteisellä vartalolla. Kaikilla (meikäläisillä lajeilla) on ruohovarsi ja vastakkaiset, harv. liuskaiset lehdet.

huuli 3-halkoinen, sivuliuskat ulospäisiä, keskimäinen levennyt, onteva, nyhälaitainen. — H. 24, 4.

*Kukat ryhmässä vastakkaisilla röyhyhaaroilla; suojukset suikeita.*

- 233 BETONICA. Petonia. — Verho epäsuoninen. Terän torvi eteenpäin käyrä; ylihuuli ehytlaitainen; alahuuli 3-liuskainen, liuskat m. tasapitkiä, keskimäinen leveämpi, ehytlaitainen. — H. 24, 5.

*Kukat tähtäksi ryhmistyneissä kiehkuroissa; suojukset puikeita.*

- 234 LEONURUS. Nukula. — Verho 5-kulmainen. Terän ylihuuli soukka, kuvertunut, ehyt; alahuuli 3-halkoinen, soukaliuskainen, sivuliuskat alaspäisiä. Pähkylät latvapuolelta litteitä, poikkipäisiä, lienteitä. — H. 24, 5.

*Lehdet liuskaisia; kukkakiehkurat lehtihangassa.*

- 235 LAMIUM. Peippi. — Verho 5:llä paksummalla suonella. Terän ylihuuli kuvertunut; alahuulen sivuliuskat epäselviä, isolla vastoherttaisella t. puikealla, varsin soukkatyvisellä keskiliuskalla. Ponnet sivuluomaisia. Pähkylät litteällä, kaljulla latvalla. — H. 24, 5.

*Kukat mykerössä t. kiehkuroissa, puuttuvalla t. sukamaisella suojuksella.*

- 236 STACHYS. Pähkämö. — Verho 5-kulmainen. Terä m. suoratorvinen; ylihuuli kuveriaainen, alahuuli 3-liuskainen, keskiliuska vastoherttainen t. puikea. Ponnet kaljuja, lop. sivulle kallistuvia, sivuluomaisia. Pähkylät päältäpäin pyöreämaisiiä. kaljuja. — H. 24, 5.

*Kukkakiehkurat lähetysten pienehkölehtisessä tähtäessä.*

- 237 GALEOPSIS. Pillike. — Verho 5:llä järeämmällä suonella. Terän ylihuuli kuvertunut; alahuuli ontelolla hampaalla sivuliuskain ja leveän, m. poikkipäisen keskiliuskan välillä. Ponnet karvaisia, poikittain puhkeavia 2:lla tahkulaisella laidalla. Pähkylät ed. — H. 24, 5.

*Kukat hajallisissa t. lähellisissä kiehkuroissa suikeilla suojuksilla. (Dracocephalum seur. jaossa.)*

†† Verho 2-huulinen (s. o. 2:lla isommalla, kokonaisella t. liuskaisella, osalla).

- 238 SCUTELLARIA. Vuohennokka. — Verho kokonaisilla, poikkipäisillä huulilla, ylihuuli litteällä, ontelolla selkäkyhmyllä. Terän ylihuuli kuvertunut, 3-liuskainen; alahuuli kokonainen. — H. 24, 3.

*Rantaruoho parittaisilla kukilla, pitkällä litistyneellä terällä.*

- 239 PRUNELLA. Arohumala. — Verhon ylihuuli leveä, tasamukaisesti 3-hampainen; alahuuli soukempi, 3-liuskainen. Te-

- rän ylihuuli kuvertunut, kokonainen; alahuuli 3-halkoinen. Palhot päästä 2-liuskaisia, toinen liuska ponsikas. — H. 24, 3.  
*Kukkakiehkurat tiheässä mykerössä munuamaisella suojuksella.*
- 240 DRACOCEPHALUM. Ampiaisyrtti. — Verhon ylihuuli 3-liuskainen paljon leveämmällä keskiliuskalla; alahuuli 2-jakoinen. Terän ylihuuli lovipäinen; alahuuli 3-liuskainen, keskiliuska pidempi. — H. 24, 4.  
*Kukkakiehkurat lähetysten, väl. tähkämäisesti; suojuksat puikeita.*
- 241 THYMUS. Ajuruoho. — Verhon ylihuuli tasamukaisesti 3-liuskainen; alahuuli 2-jakoinen. Terän ylihuuli lyhyt, suora ja lovipäinen; alahuuli 3-halkoinen, ehytliuskainen. Ponnet erillään. — H. 24, 2.  
*Lamova, varpamainen ruohoke kukka-mykeröillä.*
- 242 CALAMINTHA. Käenminttu. — Ponnet terän ylihuulen alla yhtyviä; muuten kuin ed. — H. 24, 2.  
*Kukat kiehkuroittain, altapuolen kupvalla verholla.*
- 243 CLINOPODIUM. Mäkiminttu. — Verho käyrä; ylihuuli tasamukaisesti 3-kärkinen; alahuuli 2:na sukamaisena liuskana. Terän ylihuuli 2-liuskainen; alahuuli 3-liuskainen lovipäisellä keskiliuskalla. Ponnet ed. — H. 24, 2.  
*Kukkakiehkurat mykeröissä monilla sukamaisilla suojuksilla.*

## 2 Lahko. — KOTASIEMENISIÄ \*).

Hedelmänä 1—2-pesäinen kota.

† Verho 2- tahi 4-halkoinen.

\* Suomupeitteinen, lehdetön loiskasvi; kota 1-pesäinen.

- 244 LATHRÆA. Suomukka. — Verho tasamukaisesti 4-halkoinen, erivärinen. Terän ylihuuli kuveriainen, kokonainen; alahuuli loivaan 3-liuskainen. Luotti yksinäinen. — H. 31, 4.  
*Juurakko jakaunut haaroiksi, peitetyt paksuilla, tahkulaisilla suomuilla; kukat yhdäppäisessä tertussa.*

\*\* Lehtisiä ruohokkeita 2-pesäisellä kodalla. (Lehdet vastakkaisia.)

- 245 EUPHRASIA. Silmäruoho. — Verho 4-halkoinen. Terän ylihuuli kuvertunut, 2-liuskainen, lyhempi 3-halkoista alahuulta; liuskat lovipäisiä. Ponnet terän ylihuulen sisällä,

\*) Paitsi viimeistä *Linnæa*-sukua kuuluvat kaikki kotasiemeniset *Naamakukkaisien* (Personatæ) heimoön. Niillä on terä yhdislehtinen vastakohtaisella, halkoisella laiteella ja kukan-sisäinen, 2-, harv. 1-pesäinen kota.



lokerot valkean-lienteisiä sivulta, eripitkillä lisäkkeillä tyveltä. — H. 31, 3.

*Haaraton t. useammin haarainen ruohoke vaalean-sinisillä- t. vaaleilla kukilla.*

- 246 ODONTITES. Sänkiö. — Verho 4-halkoinen. Terän ylihuuli poikkipäinen ja avonainen, ylipäästään työntävä näkyviin 2:lla tasamukaisella lisäkkeellä varustetut, kaljut ponnet; alahuuli 3:lla ehyellä liuskalla. Siemenet juomuisia. — H. 31, 3.  
*Soukkalehtinen ruohoke; kukat yhdessä tähkässä.*

- 247 BARTSIA. Punakko. — Verho ja terä ed. Ponnet ed. yleensä valkean-lienteitä. Siemenet useammalla leveällä kalvopalteella. — H. 31, 3.  
*Tunturi- tahi suoruoho haarattomalla varrella, lyhyellä lehtisellä latvatähkällä.*

- 248 RHINANTHUS. Laukku. — Verho ja terän ylipuolinen, kypärimäinen, etunokasta 2-hampainen huuli sivultapäin litistyneitä. Ponnet valkean-lienteitä. Siemenet monilukuiset, litteät. — H. 31, 3.  
*Ruohokasvi keltaisilla kukilla tähkässä.*

- 249 MELAMPYRUM. Maitikka. — Verho 4-halkoinen. Terän ylihuuli kuvertunut, kokonainen ylöskäänteisellä laidalla; alahuuli 3-liuskainen. Ponnet löyhästi yhdessä. Siemenet koveria, sileitä, 1 tahi 2 pesässään. — H. 31, 3.  
*Kukat tähkässä isoilla suojuشهدillä t. parittain lehtihangassa.*

- 250 CASTILLEJA. Kastilja. — Verho 2-halkoinen, liuskat lovipäisiä. Terän ylihuuli pitkulainen, soukka, teräväselkäisesti kuvertunut; alahuuli pienoinen 3:lla hyvin lyhyellä, ontevalla liuskalla. Ponnet ylihuulen alla. Siemenet monilukuiset hennoisella verkkopinnalla. — H. 31, 3.  
*Tihedtähkäinen, soukkalehtinen ruohokasvi tav. haarattomalla varrella.*

†† Sikiäin 5-liuskaisen verhon sisällä. — *Sceptrum* ja *Pedicularis* väl. moniliuskaisella verholla.

- 251 SCEPTRUM. Valtikka. — Terä syvään 2-huulinen, sulettu yhteen kääntyneillä huulilla; ylihuuli kypärimäinen, alahuuli 3-liuskainen. Kota palleromainen, laitaluomaisesti puhkeava. Siemenet väljällä, poimuksella, läpikuultavalla, verkkomaisesti pilkutulla kuorikalvolla. — H. 31, 3.  
*Isokukkasinen, komea suokasvi parihalkoisilla aluslehdillä, m. lehdettömällä varrella.*

- 252 PEDICULARIS. Kuusio. — Verho 5-halkoinen t. 5-hampainen. Terä avonainen, muuten kuin ed. Kota soikea t. mu-

nanmoinen, vinopäinen, puhkeava kehkerältä sivulta. Siemenet epätasaisella t. pilkutulla kuorella. — H. 31, 3.

*Suo- t. tunturiruoho vuorottaisilla, parihalkoisilla lehdillä.*

- 253 LIMOSELLA. Mutayrtti. — Terä kellomainen, m. tasamukaisesti 5-halkoinen. Luotti kokonainen. Kota 1-pesäinen. — H. 31, 2.

*Pieni vesiruoho juuresta lähtevällä kukkaperällä.*

- 254 LINARIA. Kannusruoho. — Terä 2-huulinen, sulettu alahuulen kuvertuneella tyviosalla; ylihuuli pysty, 2-halkoinen; alahuuli mesikannuksinen. Kota 2-pesäinen, epäsääntöisesti latvaluomainen. — H. 31, 2.

*Soukkakannuksisista kukista tuttu ruohoke.*

- 255 SCROPHULARIA. Syyläjuuri. — Terä palleroinen lyhyellä, 5-halkoisella laiteella, mesipiteetön. Kota 2-pesäinen. — H. 31, 1.

*Vastaislehtinen, isohko ruohoke pienillä, palleroisilla kukilla.*

+++ Verho sikiäinen päällä.

- 256 LINNÆA. Vanamo. — Verho 5-jakoinen. Terä kellomainen, m. tasamukaisesti 5-liuskainen. Hedelmänä ensin 3-, lop. 1-pesäinen, 1-siemeninen kota. — H. 19.

*Vastaislehtinen, suikertava metsäruohoke parittaisilla kukilla.*

## 15 LUOKKA.

## NELIVALTIAITA. \*)

## 1 Lahko. — LITUKKAISIA.

## Lyhytlituisia.

† Hedelmä (pähkylä-litukka) variseva puhkeamatta, nimittäin koko litukka kerrallaan t. kuki pesä erittäin.

- 257 NESLIA. Ohraheinä. — Litukka palleroinen (verkkomaisesti kolea), alusta 2-pesäinen, kalvomaisella, menehtyvällä välikelmulla, lop. 1-siemeninen. Siemenet selällisellä juurukalla. — H. 44, 5.

*Pystyinen ruohoke pienillä, keltaisilla kukilla; litukat pitkissä rypäleissä.*

- 258 BUNIAS. Ukonpalko. — Litukka munanmoinen, vino ja epätasainen, suippo, vinomaisesti 2-pesäinen, 2-siemeninen. Siemenet vastakierteisillä sirkuksilla ja selällisellä juurukalla. — H. 44, 1.

*Runsaskukkasinen, tankea ja karhea ruohoke; kukat keltaisia.*

- 259 CAKILE. Rantasinappi. — Litukka 2-lla päällittäisellä pesällä, päällimäinen pitkättävä, 4-kulmainen, suippo, variseva liitteestä. Kumpiki pesä 1-siemeninen laidallisella juurukalla. — H. 44, 1.

*Lamova, merenrantainen ruohoke sinervän-punaisilla kukilla.*

---

\*) Tämän luokan kaikki kasvit ovat *Ristikukkaisien* eli *Litu-hedelmäisten* (Cruciferae l. Siliquosae) heimoa. Terälehdet, jotka harvoin puuttuvat, ovat aina 4 ristimäisesti vastattain. Verho myös on 4-lehtinen, tav. terän kanssa menehtyvä. Kukat rypäleessä. Lehdet hajallisia, ei vastakkaisia. Hedelmänä 2-pesäinen, 2-laitainen litu, jota sanotaan litukaksi, jos se ei ole yli 2 t. 3 kertaa levyyttänsä pidempi ja liskoksi monta kertaa pidempänä ollessaan. Siemenet istuvat vuoroperäisesti lidun kummassaki liitteessä tav. 1-rivisesti, harv. 2-rivisesti. Niissä on ainoastaan ide 2:lla sirkuksella ja piikkimäisellä laidallisella t. selällisellä, harv. kulmallisella juurukalla. Poikkipäin leikatussa siemenessä laitaajuuruinen ide näyttää olevana: = ○, selkajuuruinen: ||○ ja suoralaskuinen t. kulmaajuuruinen ○ ≧.

- 260 ISATIS. Morsinko. — Litukka pitkulainen t. nalkkimainen. litteä, lop. 1-pesäinen ja 1-siemeninen. Siemenet selällisellä juurukalla. — H. 44, 5.

*Ehytlehtinen, merenrantainen, harv. peltoruohoke keltaisilla kukilla, rippuvilla litukoilla.*

(*Raphanus* seur. lahkossa.)

†† Litukka puhkeava 2:lla laidalla ja soukalla välikelmulla (kaitavälinen litukka).

- 261 LEPIDIUM. Nousuruoho. — Litukka soikeanpuikea t. leveämpi ja hertakkeinen 1-siemenisillä pesillä. Juurukka selällinen. — H. 44, 6.

*Pienikukkainen, tav. terälehdetön ruohoke.*

- 262 CAPSELLA. Lutukka. — Litukka vastaherttainen t. nalkkimainen, poikkipäinen, kalvolaiteeton, monisiemeninen. Juurukka selällinen. — H. 44, 6.

*Vähähaarainen ruohoke m. 3-kulmaisilla litukoilla.*

- 263 THLASPI. Taskuheinä. — Litukka pyöreä t. vastoherttainen, litteähkö, kalvolaitaisilla, monisiemenisillä pesillä. Juurukka laidallinen. — H. 44, 6.

*Vähähaarainen ruohoke syvän lovipäisillä, kalvosipisillä litukoilla.*

- 264 SUBULARIA. Äimäruoho. — Litukka soikea, ehytpäinen, venhomaisilla, siivittömillä, monisiemenisillä pesillä. Siemenet kulmallisella juurukalla. — H. 44, 7.

*Pienoinen ranta- tai vesiruoho äimämaisilla lehdillä.*

††† Litukka ed., leveävälinen.

- 265 COCHLEARIA. Kuiriruoho. — Litukka soikea t. palleroinen, pullakka, puhetessa välikelmuun jäävällä vartalolla, 2—monisiemenisillä pesillä. Siemenet laidallisella juurukalla. — H. 44, 7.

*Valkeakukkainen, kalju, merenrantainen ruohoke.*

- 266 CAMELINA. Kitupellava. — Litukka vastomunanmoinen t. perunamainen, pullakka, puhetessa laitoihin jäävällä vartalolla otana. Siemeniä monta selällisellä juurukalla. — H. 44, 7.

*Keltakukkainen ruohoke; lehdet nuolikantaisia, vähän sepiviä.*

- 267 ALYSSUM. Harmio. — Palhot hampaamaisella lisäkkeellä. Litukka (pyöreä t.) pitkänpyöreä pitkättävällä vartalolla, 2—monisiemenisillä pesillä. Juurukka laidallinen. — H. 44, 7.

*Lehtinen, harmaanlientä ruohoke valkeilla kukilla.*

- 268 DRABA. Kynsimö. — Heteet (väl. 4) ilman lisäkkeettä; litukka pitkänpuikea t. soikea, litteähkö hyvin lyhyellä, väl.

epäselvällä vartalolla päässä, monisiemenisillä pesillä. Siemenet ed. — H. 44, 7.

*Pienempi ruohoke valkeilla t. keltaisilla kukilla.*

(*Nasturtium* seur. lahkossa.)

## 2 Lahko. — LISKOISIA.

Pitkälituisia.

† Lisko 2-laitainen, pitkittäin puhkeava.

\* Lisko 4-kulmainen venhomaisilla laidoilla.

- 269 HESPERIS. Illakko. — Verholehdet kiinteiset. Luotti 2:lla pystöisellä, tahkulaisella liuskalla. Lisko tasasoukka. Siemenet 1-rivisiä selällisellä juurukalla. — H. 44, 3.

*Ruohoke kokonaisilla, saahampaisilla lehdillä, keski-isoilla, sinipunervilla t. valkeilla kukilla.*

- 270 ERYSIMUM. Ukonnauris. — Verho ed. Luotti lovipäinen epäselvällä vartalolla. Lisko tasasoukka, varsin nelitahkoinen. Siemenet sileitä, pitkulaisia, muuten kuin ed. — H. 44, 3.

*Keltakukkasinen, jotenki soukkalehtinen ruohoke.*

- 271 ALLIARIA. Palkolaukka. — Verho ed. Luotti ehyt, poikkipäinen hyvin lyhyellä vartalolla. Lisko ed. Siemenet mutkitellen uurtuisia, liereitä; muuten kuin ed. — H. 44, 3.

*Herttalehtinen, valkeakukkasinen siimes-ruohoke.*

- 272 BARBAREA. Kanankaali. — Verho ed. Luotti m. ehyt, vähän pitkättävällä vartalolla. Lisko tasasoukka, pitkättävä, 4-tahkoinen, litteähkö. Siemenet 1-rivisiä laidallisella juurukalla. — H. 44, 4.

*Liuskalehtinen, keltakukkasinen ruohoke.*

- 273 MELANOSINAPIS. Sinappi. — Verho ulospäinen. Luotti eheähkö pitkättävällä vartalolla. Lisko lyhyt, täysi-nelitahkoinen, otamaisella vartalolla. Siemenet 1-rivisiä kulmallisella juurukalla. — H. 44, 2.

*Liuskalehtinen ruohoke lyhyillä, varsinytöisillä, 6–8-siemenisillä liduilla.*

\*\* Lisko liereä t. litteä, keherä-laitainen.

α — Laidat ilman selvättä selkäsuonetta.

- 274 DENTARIA. Hammasjuuri. — Verholehdet visusti kiinteiset. Lisko tasasoukan suikea, paksukelmuinen, lyhytvartaloinen. Siemenet 1-rivisiä laidallisella juurukalla. — H. 44, 4.
- Lehtoruoho parijakoisilla lehdillä, sipuli-umpuilla ylemmissä lehtihangoissa, sinipunervilla kukilla.*

275 **CARDAMINE.** Krassi. — Verho ylöspäinen. Lisko pitkätävä, tasasoukka joustavasti puhkeavilla t. taaskierteisillä laidoilla, kalvomaisella välikelmulla. Siemenet ed. — H. 44, 4. *Parijakoislehtinen ruohoke valkeilla, harv. sinipunervilla kukilla. — Yksi laji jaottomilla lehdillä.*

276 **NASTURTUM.** Nenätti. — Verho ed. Litu lyhyt (pyöreä t. 2—5:n levyytensä pituinen), litteähkö. Siemenet m. 2-rivisiä laidallisella juurukalla. — H. 44, 4. *Lyhytliuvinen ruohoke jakoisilla lehdillä, keltaisilla (1 laji valkeilla) kukilla.*

**b** — Lisko selvällä selkäsuonella ja pitkättävällä, otamaisella vartalolla (monta kertaa liskon levyyttä pidempi).

277 **BRASSICA.** Kaali. — Verho tav. kiinteinen. Lisko järeäsuoninen. Siemenet 1-rivisiä, palleroisia kulmallisella juurukalla. — H. 44, 2.

*Keltakukkasinen peltokasvi sepokantaisilla lehdillä.*

278 **SINAPIS.** Narsku. — Verho ulospäinen. Lisko 3—5-suonisilla laidoilla. Siemenet ed. — H. 44, 2.

*Keltakukkasinen, liuskalehtinen peltoruohoke; liskot pitkällä, leveällä odalla.*

**c** — Lisko selvällä selkäsuonella ja lyhyellä vartalolla (ei pidempi lidun levyyttä).

279 **TURRITIS.** Pölkkyyheinä. — Verho kiinteinen. Terä pysty-laiteinen; lisko pitkä, litteähkö, kaksisärmikäs. Siemenet 2-rivisiä laidallisella juurukalla. — H. 44, 4.

*Pitkä ruohoke sepokantaisilla lehdillä, vaalean-keltaisilla kukilla.*

280 **ARABIS.** Pitkäpalko — Verho ed. Lisko pitkä litistyneillä, suorilla laidoilla, m. eheällä luotilla ja näkymättömällä vartalolla. Siemenet 1-rivisiä laidallisella juurukalla. — H. 44, 4.

*Ehyt- tahi liuskalehtinen ruohoke valkeilla, harv. punertavilla kukilla.*

281 **EUTREMA.** Lapinpalko. Verholehdet soikeita, ontevia, tylppäpäisiä. Liskot suikulaisia, teräväselkäisiä näkymättömällä vartalolla, pienoisella, typäkällä luotilla. Siemenet 2-rivisiä, sileitä selällisellä juurukalla. — H. 44, 2.

*Valkeakukkasinen ruohoke pitkänsoikeilla, ehytlaitaisilla lehdillä.*

282 **SISYMBRIUM.** Pernaruoho. — Verho ylöspäinen. Lisko pitkättävä, m. liereä 3-suonisilla, suorilla laidoilla, ehyellä t.

lovipäisellä luotilla, lyhyellä vartalolla. Siemenet 1-rivisiä selläällä juurukalla. — H. 44, 3.

*Keltakukkasinen ruohoke jakoisilla t. liuskaisilla lehdillä.*

++ Lisko variseva kokonaan t. nivel-osittain, ei pitkittäin puhkeava.

- 283 RAPHANUS. Retikka. — Verholehdet kiinteisiä. Lisko pitkulainen t. tasasoukka, liereä (lop. nivelmäisesti kutistunut siementen välillä). Siemenet kulmallisella juurukalla. — H. 44, 1.

*Peltoruoho parikaarteisilla lehdillä; kukat vaalean-keltaisia, us. sinipunervilla suonilla.*

## 16 LUOKKA.

## YKSIKUNTAISIA.

## 1 Lahko. — VIISIHETEISIÄ.

- 284 LINUM. Pellava. — Verho ja terä 5-lehtisiä. Heteet 5, kaikki siitteisiä; vartaloita ja luotteja 5. Kota odaton 5:llä 2-halkoisella laidalla, 10-pesäinen, 1:llä siemenellä kussaki päässä. — H. 49, 3.

*Ruohokasvi soukilla, hajallisilla lehdillä.*

- 285 ERODIUM. Kurennokka. — Verho ja terä ed. Heteitä 5 ponsikasta, 5 vajaponsista, aivan vähän yhdistyneillä palhoilla. Hedelmäksiä 5 kiehkuroittain, 1-siemeniset, siementen lähtiessä köynnöskierteisillä, hapsimaisilla vartaloilla emi-odan päässä kiinni. — H. 49, 1.

*Sarjakukkarinen ruohoke jakoisilla t. liuskaisilla lehdillä.*

(*Lysimachia* 5, 1; *Geranium pusillum* seur. lahkossa).

## 2 Lahko. — KYMMENHETEISIÄ.

- 286 GERANIUM. Kurenpolvi. — Terä ja verho 5-lehtisiä. Emi odallinen, 5 luottinen. Palhot ed. Hedelmäksiä 5 kiehkuroittain, 1-siemeniset, siementen lähtiessä taaskierteisillä, hapsimaisilla vartaloilla emi-odan päässä kiinni. — 49, 1.

*Liуска- tahi jakolehtinen ruohoke tav. parittaisilla kukilla.*

- 287 OXALIS. Käenkaali. — Verho 5-jakoinen. Terä 5:llä vähän yhdis-kantaisella lehdellä. Palhot miten milloinkin yhdistyviset. Emi 5-vartaloinen, odaton. Kota 5-pesäinen, monisiemeninen; siemenet möyheällä lisäkkeellä. — H. 49, 2.

*Pieni ruohokasvi kolmisormisilla lehdillä.*

(*Ononis* ja *Anthyllis* 17, 3.)

## 3 Lahko. — MONIHETEISIÄ.

- 288 MALVA. Malva. — Verho 5-halkoinen, 3-lehtisellä lisä-verholla. Terä 5-lehtinen. Vartalot monilukuisia. Hedelmäkset 1-siemenisiä, odattomia, tiheästi yhdystyneet kehrämäiseksi kiehkuraksi. — H. 48.

*Ruohoke liuskaisilla lehdillä.*



## 17 LUOKKA.

# KAKSIKUNTAISIA.

### 1 Lahko. — KUUSIHETEISIÄ.

- 289 FUMARIA. Emäkki. — Verho 2-lehtinen, lyhytaikuinen. Terä 4:llä epämukaisella lehdellä, umpipäinen; yksi lehti lyhyellä, pussimaisella kannuksella. Palhot yhdistyneet kahteen kimppuun, kumpiki 3:lla ponnella. Hedelmänä m. palleromainen, pähkylämäinen, 1-siemeninen, puhkeamatta variseva luumarjake. — H. 43.

*Haarainen ruohoke yksikertaisella, rihmamaisella juurella, monijakoisilla lehdillä ja kukkarypäleillä.*

- 290 CORYDALIS. Kiurunkannus. — Verho 2-lehtinen, lyhytaikuinen. Terä ja heteet ed. Hedelmänä monisiemeninen, 2-laitainen, litumainen kota. — H. 43.

*Haaraton ruohoke sipulimaisella nukulalla ja toiskertaisella juurella, 1—2:lla monijakoisella varsilehdellä ja kukkarypäleillä.*

### 2 Lahko. — KAHDEKSAHETEISIÄ.

- 291 POLYGALA. Linnunruoho. — Verho 3:lla pienellä ja 2:lla isolla siipimäisellä, erivärisellä lehdellä. Terä 5:llä, toinen toistensa ja hedetten kanssa yhdistyneellä (päästä ripsipalteisella) lehdellä. Kota litteä, lovipäinen, 2-pesäinen. — H. 45.

*Terttukukkasinen ruohoke kokonaisilla, soukilla lehdillä.*

### 3 Lahko. — KYMMENHETEISIÄ. \*)

† Kaikki palhot yhdis-tyvisiä (ei yksikään erilläinen).

- 292 ONONIS. Orakko. — Verho syvään 5-halkoinen. Venho otakärkinen. Vartalo kalju. — H. 68, 5.

*Liereöhaarainen kasvi kolmisormisilla lehdillä.*

---

\*) Tähän lahkoon kuuluu koko *Hernekukkaisien* heimo (Papilionaceæ). Niillä on 4 epämukaista, miten milloinkin yhdistynyttä terälehteä, nimittäin yksi *venhon-* niminen alapuolella, toinen leveämpi, *purje*, vastapäätä, ja 2 sivulehteä, *sivelt*. Hedelmänä on niillä 2-laitainen palko siemen-istukalla ylimäisessä, suoremassa liitteessä.

- 293 ANTHYLLIS. *Masmalo.* — Verho pullakka, 5-hampainen, lop. pal'on sulkeva. Venho käyrä, suippo. — H. 68, 5.  
*Ruohoke parittaisilla lehdillä ja kukkamylkeröillä.*

†† Alimaiset 9 palhoa yhdistyneitä, ylimmäinen erillään.

\* Lehdet päätöparisia.

- 294 HEDYSARUM. *Lapinnätkin.* — Verho 5-hampainen. Terä isolla, tylpäkällä, siipiä paljon pidemmällä venholla. Palko moninivelikäs 1-siemenisillä, kehrämäisillä nivelväleillä. — H. 68, 2.

*Ruohokasvi useammalla kukalla pitkulaisessa tertussa.*

- 295 ASTRAGALUS. *Kurenherne.* — Verho 5-hampainen. Venho tylpäkkä. Pal'on ala- (maha-)liitteestä sisään lähtevä, soukempi t. leveämpi, vaillinainen välikelmu. — H. 68, 3.

*Ruohokasvi mykerömaisilla kukkatertuilla.*

- 296 PHACA. *Peuranvirna.* — Verho ja terä ed. Palko kokonaan välikelmuton. — H. 68, 3.

*Keltakukkainen tunturiruoho 4—5-parisilla lehdillä.*

- 297 OXYTROPIS. *Keulankärki.* — Venho koukero-otainen päästä; muuten kuin ed. — H. 68, 3.

*Ruohokasvi moniparisilla lehdillä.*

\*\* Lehdet tasaparisia.

- 298 OROBUS. *Linnunherne.* — Verhon 2 ylimäiset hampaat epämukaiset ja lyhemmät kun ne 3 alimaiset. Luotti tasasoukka, kehkerä, päältäpuolen lieminkäinen, alapuolelta kalju. — H. 68, 1.

*Päätölehden sijasta sukamainen ota t. kärhen aihe.*

- 299 LATHYRUS. *Nätkelmä.* — Verhon 2 ylihampaat lyhemmät. Luotti m. tasasoukka, päältä litteä ja karvainen, alta kalju. — H. 68, 1.

*Lehdet, paitsi L. maritimus'ella, 1—3-parisia; hapsimainen kärhi lehden päässä.*

- 300 VICIA. *Virna.* — Verho ed. Luotti m. tasasoukka, litteä, alta tahi molemmin puolin höyteä. — H. 68, 1.

*Lehdet kärhipäisiä.*

- 301 ERVUM. *Virvilä.* — Verho 5-liuskainen; ylihampaat vähän lyhemmät. Luotti liereä, päästä palleroinen, lienteä. — 68, 1.  
*Hento, pienikukkainen ruohoke.*

\*\*\* Lehdet kolmisormisia.

- 302 MELILOTUS. *Mesikkä.* — Verho 5-hampainen. Terä tyl-

päkällä venhollansa purje-kiinteinen, lyhyt-aikainen. Palko munanmoinen, suora, 1—2-siemeninen, pidempi verhoa, lop. puhkeava. — H. 68, 4.

*Ruohoke pienillä, keltaisilla t. valkeilla kukilla tertuissa.*

- 303 TRIFOLIUM. Apila. — Verho ed. Terä pysyvä, muuten kuin ed. Palhot tasapaksuja. Palko 1—4-siemeninen, puhkeamatta variseva, verhon t. kuihtuneen terän peitteinen. — H. 68, 4.

*Kukat tav. tiheässä mykeröissä.*

- 304 LOTUS. Maite. — Verho 5-liuskainen. Venho otakärkinen. Palhot latvapuolet laajenneet. Palko tasalevyinen, liereä ja suorahko, monisiemeninen, verhoa pidempi. — H. 68, 4.

*Kukat yksitellen t. mykeröimisessä tertussa.*

- 305 MEDICAGO. Mailanen. — Verho ed. Venho tylpäkkä. Palhot äimämäisiä. Palko käyrä, kuutava t. kiekurainen, verhoa pidempi. — H. 68, 4.

*Kukat miten milloinkin tiheissä tertuissa, harv. mykeröissä.*

## 18 LUOKKA.

**MONIKUNTAISIA.**1 Lahko. — **MONIHETEISIÄ.**

- 306 **HYPERICUM.** Kuismo. — Verho 5-jakoinen. Terä 5-lehtinen. Palhot tyveltä 3:ssa tahi 5:ssä kimpussa. Hedelmänä 3-pesäinen, monisiemeninen kota. — H. 50.  
*Vastaislehtinen ruohoke 3:lla vartalolla.*
-

## 19 LUOKKA.

## YHDYSKUKKAISIA. \*)

## 1 Lahko. — YKSISOPUISIA.

Kaikki siittimelliset erikukkaset täysineuvoisia.

(*Polygamia aequalis* L. paitsi *Centaurea*). \*\*)

† Kukkaiston kaikki erikukkaset kielekkeisiä. \*\*\*)

• Kuorusjyvät sulkahaivenilla. †)

307 TRAGOPOGON. Pukinparta. — Kehto 1-rivinen 8—12:lla tasakorkealla lehdykällä. Kuorusjyvät varrellisella haivenella. Marto paljas. — H. 15, 3.

*Soukkalehtinen ruohoke lehtimäisillä kehtosuomuilla.*

\*) Tämän luokan kasvit ovat heimoansa *Yhdisponsisia* (*Synanthereæ*) eli *Yhdyskukkaista* (*Compositæ*). Edellisen nimensä ovat saaneet siitä, että erikukkaisien 5 ponnat ovat yhteen kasvettuneet, jälkimäisen siitä, että on koko joukko pienoisia, perättömiä erikukkasia yhteisellä lavalla eli marrolla ja monilehtinen kehto niiden ympärillä. Kaikkia semmoisia erikukkasia yhteensä sanotaan kukkaistoksi. Erikukkasilla on ainoastaan terä erillinen ja selvä hedelmän (kuorusjyvän, achenium) päässä, ja teräpohjan ympärillä verho, jonka laide on jakautunut hienoiksi haiveniksi eli sukasiksi. Välistä näitä haivenia eli sukasia ei kuitenkaan tavata, taikka on niiden sijasta kuorusjyvän päässä verhosta syntynyt kalvomainen palle eli kehäke, jolloin kuorusjyvää sanotaan kehäkkeiseksi. (Katso mitä edelläpäin, siv. 21, on Kehdosta ja Kukkaistosta mainittu).

\*\*) Muutamain kasvisukuin eri lajit ovat miten milloinkin yhdisponsisia, vaikk'ei-vät kuulu tähän luokkaan eli heimoon. Semmoisia sukuja ovat: *Solanum*, *Jasione*, *Lobelia*, *Viola* ja *Impatiens*, jotka tavataan edellisessä viisiheteisten luokassa.

\*\*\*) Erikukkaset ovat joko kielekkeisiä, kun laide on yhtenä, litteänä, pitkätävänä, toispuolisena liuskana, tahi torvimaisia eli pillikkeisiä, kun niillä on lyhempi, tav. tasahalkoinen laide. Eräissä suvuissa on samassa kukkaistossa molemmanlaisia erikukkasia, pillikukkasia keskellä (kehrällä) ja kielikukkasia laidalla, esimerk. päivänkukalla. Jälkimäisiä sanotaan myös sädekukkasiksi, koska ovat kuin säteinä toisten ympärillä, ja koko semmoista kukkaistoa kutsutaan myös sädekukkaistoksi.

†) Haivenet, jotka kuin työhtönä tavataan kuorusjyvän päässä, ovat välistä yksikertaisia, isontimella katsottaisa sileitä, josko karheitaki. Välistä niillä taas on sul'an tapaan sivuhaivenia kylessä. Kuorusjyvää sanotaan edellisessä tapauksessa hapsihaiveniseksi, jälkimäisessä sulkahaiveniseksi. Sulka-haivenet enimmäten ovat varrettomia, mutta muutamissa kasveissa hedelmän valmistuessa selvävartisista, välistä pitkävartisiaki.

- 308 SCORZONERA. Sikojuuri. — Kehto limitetty leveillä, kalvolaitaisilla somuilla, lisäkehdoton. Hedelmähaiven varretton. Marto paljas. — H. 15, 3.

*Kehdon ulkosuomet lyhemmät ja leveämmät sisäisiä.*

- 309 HYPOCHÆRIS. Häränsilmä. — Kehto limitetty. Kehrakukkasiem kuorusjyvät varrellisella haivenella. Marto vareinen. — H. 15, 3.

*Varsi m. lehdetön; vareet helposti marrosta lähtevät.*

- 310 LEONTODON. Voikukka. — Kehto limitetty, soukkasuumuinen, lisäkehdoton. Kuorusjyvät varrettomalla haivenella. Marto paljas. — H. 15, 3.

*Varsi lehdetön, 1-harvakukkaistoinen.*

- 311 PICRIS. Kitkerö. — Kehto 1-rivinen tasakorkeilla somuilla, hervakoita lisäkehtosomuja tyvellä. Kuorusjyvät ja marto ed. — H. 15, 3.

*Röyhykukkaistoinen, lehtivartinen ruohoke.*

•• Kuorusjyvät hapsihaivenilla.

- 312 TARAXACUM. Maitianen. — Kehto tasakorkeilla, vähän yhdis-tyvisillä somuilla, lisäkehtosomuja tyvellä. Kuorusjyvät pitkävartisella haivenella. Marto paljas. — H. 15, 3.

*Yksikukkaistoinen ruohoke pitkällä, juurakosta alkain pillisellä vanalla.*

- 313 LACTUCA. Vuohenkaali. — Kehto liereäkhö limisuumuisella tyvellä. Kuorusjyvät varrellisella haivenella. Marto paljas. — H. 15, 3.

*Lehtinen ruohoke pienillä keltakukkaistoilla.*

- 314 SONCHUS. Valvatti. — Kehto paksumpi tyveltä, yleensä limisuumuinen. Kuorusjyvät litistyneitä pehmeillä, villamaisilla, löyhälähtöisillä haivenilla. Marto paljas. — H. 15, 3.

*Keltakukkaistoinen ruohoke liuskaisilla t. isohampaisilla varsi-lehdillä.*

- 315 MULGEDIUM. Herukka. — Kehto liereäkhö limisuumuisella tyvellä. Kuorusjyvät litistyneitä suorilla, tankeamaisilla, selvästi karheilla hapsihaivenilla. Marto paljas. — H. 15, 3.

*Lehtinen ruohoke sinisillä kukkaistoilla.*

- 316 HIERACIUM. Keltanunnu. — Kehto limisuumuinen. Kuorusjyvät liereitä t. monikulmaisista, tasapaksuja, varrettomalla haivenella kuin ed. Marto paljas. — H. 15, 3.

*Keltakukkaistoinen ruohoke monikoppiloisella varrella, harv. lehdettömällä eli 1-koppiloisella vanalla.*

- 317 CREPIS. Keltto. — Kehto yksirivinen, vähän ulospäisiä lisäkehtosomuja tyven ympäri. Kuorusjyvät latvalta soukempia,

varrettomalla, pehmytkarvaisella haivenella. Marto paljas. — H. 15, 3.

*Keltakukkaistoinen, lehtivartinen, harv. vanallinen ruohoke.*

\*\*\* Kuorusjyvät haivenettomia.

- 318 LAPSANA. Linnunkaali. — Kehto yksirivinen 8—10:lla tasakorkealla, venhomaisella suomulla, pienukaisella lisäkeh-dolla. Marto paljas. — H. 15, 3.

*Lehtinen ruohoke pienillä, keltaisilla kukkaistoilla.*

†† Kaikki erikukkasat pillikkeisiä, täysineuvoisia.

\* Kehtosuomut teräviä, useemmiten pistäviä.

- 319 LAPPA. Takiainen. — Kehto m. palleroinen okakärkisillä suomuilla. Kuorusjyvät sukamaisilla, karheilla haivenilla. Marto vareinen. — H. 15, 2.

*Isolehtinen ruohoke pehmeisiin aineisiin kiinni tarttuvalla keh-dolla.*

- 320 CARLINA. Kurho. — Kehto maljamaisesti levennyt; ulkosuo-mut suora-piikkiset päästä ja laidoilta; sisäsuomut erivärisiä, varuttomia. Kuorusjyvät hapsihaivenisia. Marto kokonaisilla tahi monihalkoisilla, äimämäisillä vareilla. — H. 15, 2.

*Ohdakeruoho vaalean-keltaisilla kukkaistoilla.*

- 321 CIRSIUM. Ohdake. — Kehto palleroinen t. munanmoinen suora-otaisilla, terävillä, tav. pistävillä suomuilla. Kuorusjyvät sulkahaivenisia. Marto hapsimaisilla vareilla. — H. 15, 2.

*Kukkaistot punaisia, punasinervitä, harv. keltaisia.*

- 322 CARDUUS. Karhiainen. — Kehto ja marto ed. Kuorusjyvät karhea-hapsisilla haivenilla. — H. 15, 2.

*Ohdakekasvi punaisilla t. punasinervillä kukkaistoilla.*

\*\* Kehtosuomut pehmeämpiä.

- 323 SAUSSUREA. Lääte. — Kehto liereähkö, limisuomuinen. Haivenet erilaisia, keskimäiset pehmeitä sulkamaisia, ympärillä lyhempiä sukamaisia. Marto sukavareinen. — H. 15, 2.

*Pehmythöyteenen tunturiruoho; ponnet tyveltä pitkähapsisia.*

- 324 EUPATORIUM. Punalatva. — Kehto pienillä limisuo-muilla. Terä hyvin loivaliuskaisella laiteella ja pitkillä ulotta-villa, hapsimaisilla luoteilla. Kuorusjyvät liereäköitä t. kul-mikkaita karhealla hapsihaivenella. Marto paljas. — H. 15, 1, 3.

*Tiheidryhyinen ruohoke pienillä kukkaistoilla ja vastakkaisilla, 3-jakoisilla lehdillä.*

- 325 BIDENS. Rusokki. — Kehto tasakorkeilla suomuilla, iso lisäkehto pohjalla. Kuorusjyvät 2—4:llä tankealla sukasella latvan ympäri. Marto litteä, vareinen. — H. 15, 1, 1.

*Kostealla alalla t. vedessä kasvava ruohoke vastakkaisilla leh-  
dillä, yksinäisillä kukkaistoilla.* — B. cernua väl. sädekuk-  
kaistoilla.

(*Senecio*, *Aster* ja *Matricaria* seur. lahkossa).

+++ Laitakukkaset neuvottomia (isompia). (*Polygamia  
frustranea* L.)

- 326 CENTAUREA. Kaunokki. — Kehto limitetty. Laitakuk-  
kaset isommat viistoisella, monihalkoisella laiteella, neuvot-  
tomia. Marto sukavareinen. — H. 15, 2.

*Kehto m. palleroinen, resalaitaisilla suomuilla.*

## 2 Lahko. — EPÄSOPUISIA.

Kehräkukkaset täysineuvoisia; laitakukkaset ainoastaan emillä. \*)

(*Polygamia superflua* L. paitsi *Filago*).

+ Kaikki kukkaset pillikkeisiä.

- 327 TANACETUM. Pietaryrtti. — Kehto puolipalleroinen, li-  
misuomuinen. Harvat laitaiset emikukkaset 3-liuskaisia, täy-  
sineuvoiset 5-liuskaisia. Kuorusjyvät kalvomaisella kehäkkeel-  
lä, haivenettomia. Marto paljas. — H. 15, 1, 1.

*Lehdet monesti jaksaisia; kukkaistot huiskilomaisessa röyhässä.*

- 328 ARTEMISIA. Maruna. — Kehto maljamainen t. pikarimai-  
nen, limisuomuinen. Emikukkaset pienukaisella, liuskattomalla  
terällä seoin 2-neuvoisten kanssa. Kuorusjyvät haivenettomia  
ja kehättömiä. Marto paljas t. karvainen. — H. 15, 1, 1.

*Monijakoislehtinen ruohoke; kukkaistot pieniä, tav. tertuissa.*

- 329 GNAPHALIUM. Jäkkärä. — Kehto limisuomuinen, lisä-  
kehdoton. Emikukkaset laidassa monirivisiä. Kuorusjyvät ja  
marto ed. — H. 15, 1, 1.

*Soukkalehtinen ruohoke pienillä kukkaistoilla ryhmissä.*

- 330 ANTENNARIA. Kämpälä. — Hede- ja emikukkaset eri kas-  
veissa (kaksikotisia). Kuorusjyvät päästä paksummilla hai-  
venhapsilla. Marto paljas. — H. 15, 1, 1.

*Yhdellä, tiheällä kukkaisto-huiskilolla latvassa.*

- 331 FILAGO. Tulenlento. — Kehto keilamainen tasakorkeilla  
suomuilla ja tav. 5-lehtisellä lisäkehdolla. Emikukkaset hap-

\*) Täysineuvoiset kukkaset keskeytyvät välistä 1-neuvoisiksi, jonka tähden kuk-  
kaistot tulevat kaksikotisiksi ja sekasopuisiksi.



simaisia, haivenettomia, kehtosuomuihin ja harvalukuisten varretten välissä. Kehräkukkasien kuorusjyvät hapsihaivenisia. — H. 15, 1, 1.

*Vaalean tahi harmaan-höyryä ruohoke pienillä kukkaistoilla ryhmissä.*

(*Petasites* seur. jaossa).

†† Kehräkukkaset pillikkeisiä, laita- tahi sädekukkaset kielekkeisiä.

\* Kuorusjyvät hapsihaivenisia; kehto m. yksirivinen tasapitkillä somuilla.

- 332 ARNICA. Arnika. — Kehto 2-rivisillä, tasapitkillä somuilla. Sädekukkaset päästä syvään 3—4-hampaisia, ponnottomilla palhoilla nielussa. Marto vareeton, kalsea. — H. 15, 1, 1.

*Vastaislehtinen ruohoke isoilla keltakukkaistoilla.*

- 333 CINERARIA. Tuhko. — Kehto 1-rivinen monilukuisilla tasapitkillä somuilla, lisäkehdoton. Sädekukkaset 3—4-hampaisia, palhottomia. Marto paljas, kalju. — H. 15, 1, 1.

*Huiskilo-kukkaistoinen ruohoke puikeilla t. suikeilla lehdillä.*

- 334 TUSSILAGO. Leskenlehti. — Kehto ja marto ed. Kukkaisto monirivisillä, pitkittävilä, emillisillä sädekukkasilla, 2-neuvoisilla kehräkukkasilla. — H. 15, 1, 3.

*Suomuvartinen, 1-kukkaistoinen ruohoke, lop. isoilla aluslehdillä.*

- 335 PETASITES. Ruttojuuri. — Kehto ja marto ed. Muutamissa kukkaistoissa erinäisillä kasveilla enimmiten emikukkasia, toisissa enin osa täysineuvoisia; sädekukkaset lyhyitä t. ei ollenkaan. — H. 15, 1, 3.

*Monikukkaistoinen ruohoke; varsi ja lehdet ed.*

- 336 LIGULARIA. Nauhus. — Kehto 1-rivisillä somuilla, 2-lehtisellä lisäkehdolla. Sädekukkaset 1-rivisiä, soukkia, 3-hampaisia; kehräkukkaset 5-hampaisia. Marto litteä ja paljas. — H. 15, 1, 1.

*Paljasvartinen, harvalehtinen ruohoke; kukkaistot tav. yksinäisessä ryppälessä.*

- 337 SENECIO. Peltovilla. — Kehto tasakorkeilla, ruskeapäisillä somuilla, lisäkehdollinen. Marto paljas. — H. 15, 1, 1.

*Pariliuskaislehtinen ruohoke (harv. kokonaisilla lehdillä), keltaisilla kukkaistoilla röhkyssä.*

•• Kuorusjyvät hapsihaivenisia; kehto limisuomui-  
nen.

- 338 INULA. Hirvenjuuri. — Sädekukkasen pitkättäviä, monilukuisia. Ponnet 2:lla sukasella tyvessä. Kuorusjyvät tasamukaisilla haivenilla. Marto paljas. — H. 15, 1, 2.

*Keltakukkaistoinen, pystyvartinen ruohoke.*

- 339 SOLIDAGO. Piisku. — Sädekukkasen harvalukuiset (6—9), samanväriset kehräkukkasien kanssa (keltaisia). Ponnet sukasettomia. Kuorusjyvät kulmikkaasti liereitä. Marto paljas, pilkullinen. — H. 15, 1, 2.

*Pystyvartinen ruohoke; kukkaistot harkossa.*

- 340 ASTER. Asteri. — Sädekukkasen 1-rivisiä, monilukuiset, toisenväriset kun kehräkukkasen (sinisiä t. valkeita). Ponnet sukasettomia. Kuorusjyvät litteitä. Marto paljas, kolea. — H. 15, 1, 2.

*Merenrantainen ruohoke soukilla, möyheähköillä lehdillä.*

- 341 ERIGERON. Kallioinen. — Sädekukkasen monirivisiä, hyvin soukalla, kielekkeisellä laiteella, toisenväriset kun kehräkukkasen (punertavia t. valkoisia). Kuorusjyvät litteähköitä. Marto pilkullinen. — H. 15, 1, 2.

*Soukkalehtinen ruohoke, yksinäisillä t. tertuisilla kukkaistoilla.*

••• Kuorusjyvät haivenettomia; marto pitkällä suomuilla.

- 342 ACHILLEA. Kärsämo. — Kehto munanmoinen. Sädekukkasen lyhyellä laiteella (ei paljoa pidempi, kun leveäki). — H. 15, 1, 1.

*Kukkaistot m. tasakorkeassa röyhyssä t. huiskilossa.*

- 343 ANTHEMIS. Sauramo. — Kehto litteä t. maljamainen. Sädekukkasen pitkättäviä. — H. 15, 1, 1.

*Haaravartinen ruohoke; haarat yksinäisellä kukkaistolla.*

•••• Kuorusjyvät haivenettomia; marto paljas.

- 344 TRIPLEUROSPERMUM. Harakanhattu. — Kehto eripitkillä, limittäisillä, kalvolaitaisilla suomuilla. Kuorusjyvät 3-harjuisia, 2:lla pyöreähköillä, selkäpuolisella kololla latvan alla. Marto lop. keilamainen, tiheä-sisuinen. — H. 15, 1, 1.

*Haarainen ruohoke hienojakoisilla lehdillä; kehtosuomut tav. mustalaitaisia.*

- 345 MATRICARIA. Saunakukka. — Kehto ed. Kuorusjyvät

5-nurtoiset, kolottomat. Marto lop. keilamainen, tyhjäsuisinen. — H. 15, 1, 1.

*Haarainen ruohoke kuin ed.; kehtosuomut valkealaitaiset.*

- 346 CHRYSANTHEMUM. Päivänkukka. — Kehto ed. Kuorusjyvät 5- tahi useampiharjuiset, kolottomat. Marto lop. kehkerä. — H. 15, 1, 1.

*Lehdet kokonaisia t. leveäliuskaisia.*

---

## 20 LUOKKA.

## EMIHETEISIÄ. \*)

## 1 Lahko. — YKSIHETEISIÄ.

† Ponsi pystyssä, koko kannallaan kiinteässä yhdistyksessä vartalon kanssa, liikkumaton.

• Huuli kannusmaisella t. pussimaisella mesipiteellä.

- 347 ORCHIS. Kämmekekä. — Huuli miten milloinkin liuskainen, kannustettu. Ponsilokerot altapäin yhtyneet, nystyrämäisenä rakkona luotin päällä ja sen sisässä niiden 2:n pölymyhkyin erilliset hännykät. — H. 14, 5.

*Kumpiki pölymyhky liuskaisella hännykällä, joka erittäin taitaan yhteisestä rakosta ulos vetää.*

- 348 GYMNADENIA. Kirkiheinä. — Huuli leveä, 3-halkoinen, kannustettu. Pölymyhkyin hännykät lähinäisiä, ilman rakotia; luotti niiden alla. — H. 14, 5.

*Kukat pitkättävässä tähkässä; juurimukulat halkinaisia.*

- 349 PLATANThERA. Lehdokki. — Huuli kokonainen, tasasoukka, kannustettu. Pölymyhkyin hännykät kumpiki nystyräsänsä kahdenpuolen luottia kiinni. — H. 14, 5.

\*) Tämän luokan kasvit kuuluvat yhteensä *Kämmekekäisien* (Orchideæ) heimoon.

Ponsi ja emi niillä ovat yhdistyneet siitintukuksi ilman tarkkaa palhon ja vartalon erotusta. Luottina on pienoinen, tahmea kolo tukun etupuolella ponnien alla.

Jaossa † on ponsi pystyssä 2:lla lokerolla ja niiden sisässä nuijamaiset siitepöly-myhkyt. Jaossa †† ponsi on selvästi emistä erotettu ja useammassa suvussa kannen tapaan liikkuva.

Kupu on tav. erivärinen, terämäinen, 3:lla ulkopuolisella ja 3:lla sisämäisellä lehdellä. Jälkimäisistä on yksi erimuotoinen, eteen- t. ulos-, harv. ylöspäin kääntynyt. Sitä sanotaan huuleksi ja sen tyvellä on eräissä suvuissa kannuksen, pussin t. kolon tapainen mesipide.

Hedelmänä on 1-pesäinen, 3-laitainen, laidoista puhkeava kota hyvin pienukaisilla siemenillä. Nuorempana t. sikiäimenä on se (välistä sen perä) tav. niin vääntynyt, että kuvun huuli on alaspäin. Eräissä harvoissa suvuissa on se vääntymätön ja huuli silloin ylöspäin. Missä erittäin toisin ei sanota, on huuli aina alaspäin kääntynyt.

*Kahdella m. vastakkaisella, harv. 1:llä lehdellä; mukulat kokonaisia.*

- 350 CÆLOGLOSSUM. Maariankämmä. — Huuli tasasoukka, liuskapäinen, pussimaisella mesipiteellä. Pölymyhkyin hännykät rakotta. — H. 14, 5.

*Juurimukulat kämmenjakaisia; kukat vehreän-kellerviid.*

•• Huuli selvättä mesipiteettä.

- 351 OPHRYS. Orho. — Kupu avonainen. Huuli 4-liuskainen. Pölymyhkyin hännykät erillään kumpiki rakossansa. — H. 14, 5. *Hajallisilla, kärpäisen muotoisilla kukilla; juurimukulat kokonaisia.*

- 352 CHAMÆORCHIS. Orhukka. — Kupu kypärämäisesti sulettu. Huuli ehyt. Pölymyhkyt ed. — H. 14, 5.

*Pieni tunturiruohoke kokonaisilla mukuloilla ja tasalevyisillä lehdillä.*

- 353 HERMINIUM. Mesikukka. — Kupu ammottava. Huuli 3-liuskainen, kannalta maljamaisesti onteva. Pölymyhkyin hännykät erillisiä. — H. 14, 5.

*Keltakukkainen ruohoke palleromaisella mukulalla.*

†† Ponsi erillään, selvänä siitintukun osana ja miten milloinkin liikkuva.

\* Huuli syvällä, kannus- tai pussimaisella mesipiteellä.

- 354 CALYPSO. Neidenkenkä. — Huuli iso, kenkämäinen, etupuolisella laiteella ja kaksoiskannuksella. Siitintukku pitkä, lehdekkeisellä lisäkkeellä. — H. 14, 2.

*Yksilehtinen ruohoke 1:llä isolla lehdellä ja sipulimaisella juurakolla.*

- 355 EPIPOGIUM. Metsän-emä. — Huuli 3-liuskainen ylöspäisellä, pussimaisella mesipiteellä. Pölymyhkyt pitkällä hännyköillä, yhtenäisiä, pian varisevassa, kansimaisessa ponnassa. — H. 14, 4.

*Lehdetön, suomukas, harvakukkainen ruohoke pähkuroivalla, haarovalla juurakolla.*

•• Huuli matalalla t. epäselvällä mesipiteellä.

- 356 GOODYERA. Yövilkka. — Huuli kokonainen maljamaisella mesipiteellä. Ponsi eri peräkkeellä siitintukun selässä. Luotti kilpimäinen, 2-sarvinen. — H. 14, 4.

*Tyveltä monilehtinen ruohoke rihmamaisella juurakolla, soukka-tähtäinen.*

- 357 CEPHALANTHERA. Valkku. — Huuli sivupykäleillä jaettu ontevaksi kannaksi ja kokonaiseksi lapaliuskaksi. Siitintukku suora, tasasoukka, pitkättävä (vähintään 4-kertaisesti levyyt-tänsä pidempi). Pölymyhkyt m. tasapaksuja. Sikiäin perä-tön, vääntynyt. — H. 14, 4.  
*Pystykukkasinen ruohoke miekkamaisilla t. suikeilla lehdillä, rihmakkeisella juurakolla.*
- 358 EPIPACTIS. Neidenvaippa. — Huuli ed. Siitintukku ly-  
hyt. Pölymyhkyt nuijamaisia. Sikiäin vääntyperäinen. — H.  
14, 4.  
*Lehdet useampia puikeita t. suikeita; juurakko rihmakkeinen;  
kukat vähän rippuvia.*
- 359 LISTERA. Kaksikko. — Huuli halkopäinen. Siitintukku  
lyhyt, suomumaisella jatkeella ponnien takana. — H. 14, 4.  
*Kahdella, m. vastakkaisella, leveällä lehdellä, rihmakkeisella juu-  
rakolla.*
- 360 NEOTTIA. Pesäke. — Huuli ed. Siitintukku pitkättävä,  
päätyvä ponnella. — H. 14, 4.  
*Lehdetön, suomukas ruoho, kimputulla juurakolla.*
- 361 MALAXIS. Suovalkku. — Huuli ehyt, ylöspäinen. Siitin-  
tukku perin lyhyt kansimaisella ponnella latvassa. Pölymyh-  
kyt yhtyneitä, nuijamaisia, 2-jakoisia. — H. 14, 3.  
*Tyvettä 1—3-lehtinen ruohoke sipulimaisella juurakolla ja mo-  
nilukuisilla, pienillä kukilla tähtkässä.*
- 362 CORALLORRHIZA. Harajuuri. — Huuli loivilla sivupy-  
käleillä, ehyellä lavalla. Siitintukku pitkättävä, vähän edes-  
käyrä, päästä kalvopalteinen, pitkittäin onteva. Ponsi ed.;  
lokerot poikittain 2:lla pienemmällä lokerolla, kumpiki palle-  
roisella pölymyhkyllä. — H. 14, 3.  
*Lehdetön, suomukas ruohoke pahkuroivalla, haatrovalla juura-  
kolla.*

## 2 Lahko. — KAKSIHETEISIÄ.

- 363 CYPRIPIEDIUM. Käenvirsu. — Kupu 5-lehtinen (2 ali-  
maista lehteä yhdessä). Huuli kenkämäisesti pullistunut. Pon-  
net kahdenpuolin kilpimäisessä luotissa kiinni. — H. 14, 1.  
*Leveälehtinen ruohoke 1:llä, harv. 2:lla isolla kukalla.*

## 21 LUOKKA.

## YKSIKOTISIA.

## 1 Lahko. — YKSIHETEISIÄ.

- 364 ZANNICHELLIA. Haura. — Hedekukat kehättömiä; heteet pitkättävällä palholla. Emikukat 4—7-llä sikiäimellä, kuki vartalolla ja kilpimäisellä luotilla. Hedelmänä 4—7 kuutavaa pähkylää. — H. 4, 2.

*Vesikasvi apulehdillä ja rihmakkeisilla, vuorottaisilla lehdillä.*

- 365 CALLITRICHE. Vesitähti. — Kehätön tahi 2:lla terämaisellä (valkealla) suojuksella kehänä. Emikukat 4-kulmaisella sikiäimellä ja 2:lla rihmakkeisella vartalolla. Hedelmänä 4-pesäinen, 4-siemeninen, puhkeamatta variseva kota. — H. 85.

*Vesiruoho vastakkaisilla lehdillä, apulehdetön.*

(*Zostera* 1, 1; *Typha* 21, 3; *Pinus* 21, 6; *Najas* 22, 1).

## 2 Lahko. — KAKSIHETEISIÄ.

(*Lemna* 2, 1; *Typha* 21, 3).

## 3 Lahko. — KOLMIHETEISIÄ.

- 366 KOBRESIA. Sarake. — Tähkylät yksinäisessä tähkässä t. monta ryhmistynyttä, toiskertaista tähkää; ed. tapauksessa on joka tähkylässä yksi hede- ja 1 emikukka — jälk. tapauksessa ovat tähkylät emikukkaisia tähkän tyvipuolella ja hedekukkaisia tähkän latvassa. Hedekukat 1:llä, emikukat 2:lla suomulla. Hedelmänä 3-kulmainen pähkylä. — H. 2, 1.

*Saran näköinen tunturiheinä rihmamaisilla lehdillä.*

- 367 CAREX. Sara. — Kukat tähkässä. Hedekukat 1:llä tähkäsuomulla, kehättömiä. Emikukat 1:llä tähkäsuomulla ja pullakkomaisesti muodostuneella kupusuomulla, laskeva latva-suomalostansa sisällisen vartalon 2—3 luottia ulos ja lop. muodostuva pähkylämäisen jyväkkeen peitteeksi. — H. 2, 1.

*Heinämainen kasvi tav. venhollisilla lehdillä. — Pähkylämäisen hedelmän peite nimitetään laji-selityksissä pullakoksi.*

- 368 TYPHA. Osmankäämi. — Hede- ja emikukat erillään 2:ssa liereässä eri tähkässä korren ympärillä; hedetähkä emitähkän päällä. Kukat kehättömiä hapsimaisten sukasten sisällä. Ponsia tav. 2—3, yhteisellä palholla. Hedelmänä pitkäperäinen pähkylä. — H. 3.

*Korkea vesiruoho miekkamaisilla lehdillä, tiheillä, varstamaisilla t. telamaisilla tähkillä.*

- 369 SPARGANIUM. Palpakko. — Hede- ja emikukat erillään palleroisissa mykeröissä. Hedekukat epälukuisilla suojusuomuilla; emikukat 3—4:llä nalkkimaisella suomulla. Hedelmä pähkylämäinen, tav. perätön. — H. 3.

*Vesiruoho monella palleromaisella tähkällä; hedetähkät emisten päällä.*

(*Eriophorum* 3, 1.)

#### 4 Lahko. — NELIHETEISIÄ.

- 370 URTICA. Nokkonen. — Hedekukat yksikertaisella, verho-  
maisella, 4-jakoisella kehällä. Emikukkain kehä myös yksikertainen 2:lla isommalla ja 2:lla perin pienellä lehdellä, lop. peittävä pienen pähkylän. — H. 78.

*Poltinsukainen kasvi pienillä kukilla röyhyissä.*

- 371 LITTORELLA. Raani. — Hedekukat 4-jakoisella verholla; terä suppilomainen 4-jakoisella laiteella. Emikukat (perättöminä aluslehtien hangoissa) verhottomia, jonka sijasta on 2—3-lehtinen varus; terä yhdislehtinen, kalvomainen, 2-liuskainen. Hedelmä pähkylämäinen. — H. 34.

*Pieni rantaruohoke äimämäisillä lehdillä; hedekukka pitkäperäinen.*

- 372 ALNUS. Leppä. — Hedekukat norkoissa kilpimäisillä yhdysuomuilla, 3 kukkaa joka suomun aluspuolella; kehä 4-jakoinen. Emikukkain norkot lyhyitä limittäisillä, 2-kukkaisilla, lop. puutavilla, pieneksi kävyksi muodostuvilla suomuilla. — H. 82.

*Puu tai pensaskasvi, kukkiva lehdettömänä aikana.*

#### 5 Lahko. — VIISIHETEISIÄ.

(*Bryonia* 21, 7; *Atriplex* 23, 1.)

#### 6 lahko. — MONIHETEISIÄ.

Useammalla kun 5:llä heteellä.

† Ruohokkeita.

- 373 SAGITTARIA. Keiholehti. — Verho ja terä 3-lehtisiä.



Heteitä ja emiä paljo. Hedelmänä monta litteämäistä, 1-siemenistä hedelmystä ryhmässä palleroisella pohjuksella. — H. 8, 2.  
*Paljasvartinen vesiruoho kukilla kiehkuroittain.*

- 374 CERATOPHYLLUM. Karvalehti. — Kehän sijasta verho-  
mainen, monilehtinen varus. Heteitä 12—20, m. palhottomia.  
Emi 1, äimämäisellä vartalolla. Hedelmänä 1-siemeninen päh-  
kylä. — H. 86.

*Vesiruoho säteettöisillä, pienijakoisilla lehdillä.*

- 375 MYRIOPHYLLUM. Ärviä. — Verho 4:llä, väl. epäselvällä  
hampaalla sikiäimen päässä. Terä 5:llä lyhyt-aikuisella leh-  
dellä. Heteitä 4—8. Sikiäin 4-kyhmyinen, 4:llä höyteällä  
luotilla, lop. jakauva 4:hän pähkylämäiseen lohko-hedelmük-  
seen. — H. 64.

*Vesiruoho kampalaitaisilla lehdillä, pienillä kukilla kiehkuroissa  
t. tähkäksi läheneviä.*

†† Puita ja pensaita; hedekukat norkossa.

- 376 QUERCUS. Tammi. — Hedekukkais-norkko liereä; kupu verho-  
mainen, maljamainen, 5—12-jakoinen, 5—12:lla heteellä. Emiku-  
kan suojus limisuomuinen, lop. yhteen kasvettava pikariksi (keh-  
tokannaksi) pähkinän alle; vartalo 1, maljamaisella luotilla.  
Hedelmänä pähkinä (terho). — H. 80.

*Iso puu mutkaliuskaisilla lehdillä yhtenä aikana kukkain kanssa.*

- 377 CORYLUS. Pähkinäpuu. — Hedekukkais-norkko liereä 3-  
liuskaisilla suomuilla, keskiliuska suurin, peittävä sivuliuskat;  
kehätön; heteitä 8:n paikoilla, lähteviä norkkosuomuin alta.  
Eminorkkoin suomut 2-kukkaisia; vartaloita 2. Hedelmänä  
pähkinä suurten, liuskaisten varuslehtien sisässä. — 80.

*Pensaskasvi toissahaisilla lehdillä kukkiva ennen lehtimistä.*

- 378 BETULA. Koivu. — Hedekukkais-norkko liereä kilpimäi-  
sillä yhdyssuomuilla, 1 kukka joka suomun alla 3-lehtisellä  
varuksella; heteitä 4—6, halkopäiset, 1:llä ponsilokerolla joka  
liuskassa. Emikukkais-norkko limisuomuinen, suomut litteitä  
lop. menehtyviä, jokainen 3:lla sikiämellä, lop. siipihedelmällä.  
— H. 82.

*Puu tai pensaskasvi sahalaitaisilla, kukan-aikuisilla lehdillä.*

- 379 PINUS. Petäjä. — Hedekukkais-norkot monilukuisilla pon-  
silla, jokainen eri suomussa, kehättömänä. Eminorkot (kä-  
vyt) limisuomuisia, suomut lop. kasvettuaan puutavia, itseku-  
ki 2:lla pähkylämäisellä, paljaalla siemenellä. — H. 84.

*Aina vehriäviä havupuu.*

## 7 Lahko. — YHDISHETEISLÄ.

Heteet osittain yhdistyneitä.

380 BRYONIA. Koirannauris. — Verho 5-liuskainen, latva-peräinen; terä 5-jakoinen; heteitä 5, 3-kuntaisina (1 irtonainen). Vartalo 3-jakoinen. Hedelmänä marjake 5—6:lla litteähköllä siemenellä. — H. 57.

*Ruohokasvi kouramaisilla lehdillä ja rihmakkeisilla, varresta lähtevillä kärheillä.*

---

5-nurtoiset, kolottomat. Marto lop. keilamainen, tyhjäsisuinen. — H. 15, 1, 1.

*Haarainen ruohoke kuin ed.; kehtosuomut valkealaitaiset.*

- 346 CHRYSANTHEMUM. Päivänkukka. — Kehto ed. Kuorusjyvät 5- tahi useampiharjuiset, kolottomat. Marto lop. kehkerä. — H. 15, 1, 1.

*Lehdet kokonaisia t. leveäliuskaisia.*

## 20 LUOKKA.

## EMIHETEISIÄ. \*)

## 1 Lahko. — YKSIHETEISIÄ.

† Ponsi pystyssä, koko kannallaan kiinteässä yhdistyksessä vartalon kanssa, liikkumaton.

• Huuli kannusmaisella t. pussimaisella mesipiteellä.

- 347 ORCHIS. Kämmekekä. — Huuli miten milloinkin liuskainen, kannustettu. Ponsilokerot altapäin yhtyneet, nystyrämäisenä rakkona luotin päällä ja sen sisässä niiden 2:n pölymyhkyin erilliset hännykät. — H. 14, 5.

*Kumpiki pölymyhky liuskaisella hännykällä, joka erittäin taitaan yhteisestä rakosta ulos vetää.*

- 348 GYMNADENIA. Kirkiheinä. — Huuli leveä, 3-halkoinen, kannustettu. Pölymyhkyin hännykät lähinäisiä, ilman rakotia; luotti niiden alla. — H. 14, 5.

*Kukat pitkättävässä tähtäessä; juurimukulat halkinaisia.*

- 349 PLATANThERA. Lehdokki. — Huuli kokonainen, tasa-soukka, kannustettu. Pölymyhkyin hännykät kumpiki nystyräsässä kahdenpuolen luottia kiinni. — H. 14, 5.

\*) Tämän luokan kasvit kuuluvat yhteensä Kämmekekäisien (Orchideae) heimoon.

Ponsi ja emi niillä ovat yhdistyneet siitintukuksi ilman tarkkaa palhon ja vartalon erotusta. Luottina on pienoinen, tahmea kolo tukun etupuolella ponnien alla.

Jaossa † on ponsi pystyssä 2:lla lokerolla ja niiden sisässä nuijamaiset siitepöly-myhkyt. Jaossa †† ponsi on selvästi emistä erotettu ja useammassa suvussa kannen tapaan liikkuva.

Kupu on tav. erivärinen, terämäinen, 3:lla ulkopuolisella ja 3:lla sisämäisellä lehdellä. Jälkimmäisistä on yksi erimuotoinen, eteen- t. ulos-, harv. ylöspäin kääntynyt. Sitä sanotaan huuleksi ja sen tyvellä on eräissä suvuissa kannuksen, pussin t. kolon tapainen mesipide.

Hedelmänä on 1-pesäinen, 3-laitainen, taittoista puhkeava, usein pienukaisilla siemenillä. Nuorempana t. sikiä se (väli) tav. niin vääntynyt, että kuvun huuli on alaspäin kääntynyt. Tässä on se vääntymätön ja huuli silloin ylös kääntynyt. Tällöin on huuli aina alaspäin kääntynyt.

5-nurtoiset, kolottomat. Marto lop. keilamainen, tyhjäsuisinen. — H. 15, 1, 1.

*Haarainen ruohoke kuin ed.; kehtosuomut valkealaitaiset.*

- 346 CHRYSANTHEMUM. Päivänkukka. — Kehto ed. Kuorusjyvät 5- tahi useampiharjuiset, kolottomat. Marto lop. kehkerä. — H. 15, 1, 1.

*Lehdet kokonaisia t. leveäliuskaisia.*

## 20 LUOKKA.

## EMIHETEISIÄ. \*)

## 1 Lahko. — YKSIHETEISIÄ.

† Ponsi pystyssä, koko kannallaan kiinteässä yhdistyksessä vartalon kanssa, liikkumaton.

• Huuli kannusmaisella t. pussimaisella mesipiteellä.

- 347 ORCHIS. Kämmekekä. — Huuli miten milloinkin liuskainen, kannustettu. Ponsilokerot altapäin yhtyneet, nystyrämäisenä rakkona luotin päällä ja sen sisässä niiden 2:n pölymyhkyin erilliset hännykät. — H. 14, 5.

*Kumpiki pölymyhky liuskaisella hännykällä, joka erittäin taitaan yhteisestä rakosta ulos vetää.*

- 348 GYMNADENIA. Kirkiheinä. — Huuli leveä, 3-halkoinen, kannustettu. Pölymyhkyin hännykät lähinäisiä, ilman rakotta; luotti niiden alla. — H. 14, 5.

*Kukat pitkättävässä tähkässä; juurimukulat halkinaisia.*

- 349 PLATANThERA. Lehdokki. — Huuli kokonainen, tasasoukka, kannustettu. Pölymyhkyin hännykät kumpiki nystyräsänsä kahdenpuolen luottia kiinni. — H. 14, 5.

\*) Tämän luokan kasvit kuuluvat yhteensä *Kämmekekäisien* (Orchideæ) heimoon.

Ponsi ja emi niillä ovat yhdistyneet siitintukuksi ilman tarkkaa palhon ja vartalon erotusta. Luottina on pienoinen, tahmea kolo tukun etupuolella ponnin alla.

Jaossa † on ponsi pystyssä 2:lla lokerolla ja niiden sisässä nuijamaiset siitepöly-myhkyt. Jaossa †† ponsi on selvästi emistä erotettu ja useammassa suvussa kannen tapaan liikkuva.

Kupu on tav. erivärinen, terämäinen, 3:lla ulkopuolisella ja 3:lla sisämäisellä lehdeellä. Jälkimmäisistä on yksi erimuotoinen, eteen- t. ulos-, harv. ylöspäin kääntynyt. Sitä sanotaan huuleksi ja sen tyvellä on eräissä suvuissa kannuksen, pussin t. kolon tapainen mesipide.

Hedelmänä on 1-pesäinen, 3-laitainen, laidoista puhkeava koto hyvin pienukaisilla siemenillä. Nuorempana t. sikiäimenä on se (välistä tav. tav. niin vääntynyt, että kuvun huuli on alaspäin. Eräissä ha. sa on se vääntymätön ja huuli silloin ylöspäin. Näin

huuli aina alaspäin kääntynyt.

5-uurtoiset, kolottomat. Marto lop. keilamainen, tyhjäsuisinen. — H. 15, 1, 1.

*Haarainen ruohoke kuin ed.; kehtosuomut valkealaitaiset.*

- 346 CHRYSANTHEMUM. Päivänkukka. — Kehto ed. Kuorusjyvät 5- tahi useampiharjuiset, kolottomat. Marto lop. kehkerä. — H. 15, 1, 1.

*Lehdet kokonaisia t. leveäliuskaisia.*

---

## 20 LUOKKA.

## EMIHETEISIÄ. \*)

## 1 Lahko. — YKSIHETEISIÄ.

† Ponsi pystyssä, koko kannallaan kiinteässä yhdistyksessä vartalon kanssa, liikkumaton.

• Huuli kannusmaisella t. pussimaisella mesipiteellä.

- 347 ORCHIS. Kämmeekkä. — Huuli miten milloinkin liuskainen, kannustettu. Ponsilokerot altapäin yhtyneet, nystyrämäisenä rakkona luotin päällä ja sen sisässä niiden 2:n pölymyhkyin erilliset hännykät. — H. 14, 5.

*Kumpiki pölymyhky liuskaisella hännykällä, joka erittäin taitaan yhteisestä rakosta ulos vetää.*

- 348 GYMNADENIA. Kirkiheinä. — Huuli leveä, 3-halkoinen, kannustettu. Pölymyhkyin hännykät lähinäisiä, ilman rakotia; luotti niiden alla. — H. 14, 5.

*Kukat pitkästävässä tähkässä; juurimukulat halkinaisia.*

- 349 PLATANThERA. Lehdokki. — Huuli kokonainen, tasa-soukka, kannustettu. Pölymyhkyin hännykät kumpiki nystyräsänsä kahdenpuolen luottia kiinni. — H. 14, 5.

\*) Tämän luokan kasvit kuuluvat yhteensä *Kämmeekkäisien* (Orchideæ) heimoon.

Ponsi ja emi niillä ovat yhdistyneet siitintukuksi ilman tarkkaa palhon ja vartalon erotusta. Luottina on pienoinen, tahmea kolo tukun etupuolella ponnien alla.

Jaossa † on ponsi pystyssä 2:lla lokerolla ja niiden sisässä nuijamaiset siitepöly-myhkät. Jaossa †† ponsi on selvästi emistä erotettu ja useammassa suvussa kannen tapaan liikkuva.

Kupu on tav. erivärinen, terämäinen, 3:lla ulkopuolisella ja 3:lla sisämäisellä lehdellä. Jälkimäisistä on yksi erimuotoinen, eteen- t. ulos-, harv. ylöspäin kääntynyt. Sitä sanotaan huuleksi ja sen tyvellä on eräissä suvuissa kannuksen, pussin t. kolon tapainen mesipide.

Hedelmä on 1-pesäinen, 3-laitainen, laidoista pubkeava kota hyvin pienukaisilla siemenillä. Nuorempana t. sikiäimenä on se (välistä sen perä) tav. niin vääntynyt, että kuvun huuli on alaspäin. Eräissä harvoissa suvuissa on se vääntymätön ja huuli silloin ylöspäin. Missä erittäin toisin ei sanota, on huuli aina alaspäin kääntynyt.



*Kahdella m. vastakkaisella, harv. 1:llä lehdellä; mukulat kokonaisia.*

- 350 CÆLOGLOSSUM. Maariankämmä. — Huuli tasasoukka, liuskapäinen, pussimaisella mesipiteellä. Pölymyhkyin hännykät rakotta. — H. 14, 5.

*Juurimukulat kämmenjakoisia; kukat vehreän-kellerviid.*

•• Huuli selvättä mesipiteettä.

- 351 OPHRYS. Orhö. — Kupu avonainen. Huuli 4-liuskainen. Pölymyhkyin hännykät erillään kumpiki rakossansa. — H. 14, 5.  
*Hajallisilla, kärpäisen muotoisilla kukilla; juurimukulat kokonaisia.*

- 352 CHAMÆORCHIS. Orhukka. — Kupu kypärimäisesti sullettu. Huuli ehyt. Pölymyhkyt ed. — H. 14, 5.

*Pieni tunturiruohoke kokonaisilla mukuloilla ja tasalevyisillä lehdillä.*

- 353 HERMINIUM. Mesikukka. — Kupu ammottava. Huuli 3-liuskainen, kannalta maljamaisesti onteva. Pölymyhkyin hännykät erillisiä. — H. 14, 5.

*Keltakukkasinen ruohoke palleromaisella mukulalla.*

†† Ponsi erillään, selvänä siitintukun osana ja miten milloinkin liikkuva.

• Huuli syvällä, kannus- tahi pussimaisella mesipiteellä.

- 354 CALYPSO. Neidenkenkä. — Huuli iso, kenkämäinen, etupuolisella laiteella ja kaksoiskannuksella. Siitintukku pitkä, lehdekkeisellä lisäkkeellä. — H. 14, 2.

*Yksilehtinen ruohoke 1:llä isolla lehdellä ja sipulimaisella juurakolla.*

- 355 EPIPOGIUM. Metsän-emä. — Huuli 3-liuskainen ylöspäisellä, pussimaisella mesipiteellä. Pölymyhkyt pitkällä hännyköillä, yhtenäisiä, pian varisevassa, kansimaisessa ponnassa. — H. 14, 4.

*Lehdetön, suomukas, harvakukkasinen ruohoke pahkuroivalla, haarovalla juurakolla.*

•• Huuli matalalla t. epäselvällä mesipiteellä.

- 356 GOODYERA. Yövilkka. — Huuli kokonainen maljamaisella mesipiteellä. Ponsi eri peräkkeellä siitintukun selässä. Luotti kilpimäinen, 2-sarvinen. — H. 14, 4.

*Tyveltä monilehtinen ruohoke rihmamaisella juurakolla, soukkatähkinäinen.*

- 357 CEPHALANTHERA. Valkku. — Huuli sivupykäleillä jaettu ontevaksi kannaksi ja kokonaiseksi lapaliuskaksi. Siitintukku suora, tasasoukka, pitkättävä (vähintään 4-kertaisesti levyyt-tänsä pidempi). Pölymyhkylt m. tasapaksuja. Sikiäin perä-tön, vääntynyt. — H. 14, 4.

*Pystykukkainen ruohoke miikkamaisilla t. suikeilla lehdillä, rihmakkeisella juurakolla.*

- 358 EPIPACTIS. Neidenvaippa. — Huuli ed. Siitintukku lyhyt. Pölymyhkylt nuijamaisia. Sikiäin vääntyperäinen. — H. 14, 4.

*Lehdet useampia puikeita t. suikeita; juurakko rihmakkeinen; kukat vähän rippuvia.*

- 359 LISTERA. Kaksikko. — Huuli halkopäinen. Siitintukku lyhyt, suomumaisella jatkeella ponnien takana. — H. 14, 4.

*Kahdella, m. vastakkaisella, leveällä lehdellä, rihmakkeisella juurakolla.*

- 360 NEOTTIA. Pesäke. — Huuli ed. Siitintukku pitkättävä, päätyvä ponnella. — H. 14, 4.

*Lehdetön, suomukas ruoho, kimputulla juurakolla.*

- 361 MALAXIS. Suovalkku. — Huuli ehyt, ylöspäinen. Siitin-tukku perin lyhyt kansimaisella ponnella latvassa. Pölymyh-kylt yhtyneitä, nuijamaisia, 2-jakoisia. — H. 14, 3.

*Tyvettä 1—3-lehtinen ruohoke sipulimaisella juurakolla ja monilukuisilla, pienillä kukilla tähtäissä.*

- 362 CORALLORRHIZA. Harajuuri. — Huuli loivilla sivupy-käleillä, ehyellä lavalla. Siitintukku pitkättävä, vähän edes-käyrä, päästä kalvopalteinen, pitkittäin onteva. Ponsi ed.; lokerot poikittain 2:lla pienemmällä lokerolla, kumpiki palle-roisella pölymyhkyllä. — H. 14, 3.

*Lehdetön, suomukas ruohoke pahkuroivalla, haarovalla juura-kolla.*

## 2 Lahko. — KAKSIHETEISIÄ.

- 363 CYPRIPIEDIUM. Käenvirsu. — Kupu 5-lehtinen (2 ali-maista lehteä yhdessä). Huuli kenkämäisesti pullistunut. Pon-net kahdenpuolin kilpimäisessä luotissa kiinni. — H. 14, 1.

*Leveälehtinen ruohoke 1:llä, harv. 2:lla isolla kukalla.*

## 21 LUOKKA.

## YKSIKOTISIA.

## 1 Lahko. — YKSIHETEISIÄ.

- 364 ZANNICHELLIA. Haura. — Hedekukat kehättömiä; heteet pitkättävällä palholla. Emikukat 4—7-llä sikiäimellä, kuki vartalolla ja kilpimäisellä luotilla. Hedelmänä 4—7 kuutavaa pähkylää. — H. 4, 2.

*Vesikasvi apulehdillä ja rihmakkeisilla, vuorottaisilla lehdillä.*

- 365 CALLITRICHE. Vesitähti. — Kehätön tahi 2:lla terämaisellä (valkealla) suojuksella kehänä. Emikukat 4-kulmaisella sikiäimellä ja 2:lla rihmakkeisella vartalolla. Hedelmänä 4-pesäinen, 4-siemeninen, puhkeamatta variseva kota. — H. 85.

*Vesiruoho vastakkaisilla lehdillä, apulehdetön.*

(*Zostera* 1, 1; *Typha* 21, 3; *Pinus* 21, 6; *Najas* 22, 1).

## 2 Lahko. — KAKSIHETEISIÄ.

(*Lemna* 2, 1; *Typha* 21, 3).

## 3 Lahko. — KOLMIHETEISIÄ.

- 366 KOBRESIA. Sarake. — Tähkylät yksinäisessä tähkässä t. monta ryhmistynyttä, toiskertaista tähkää; ed. tapauksessa on joka tähkylässä yksi hede- ja 1 emikukka — jälk. tapauksessa ovat tähkylät emikukkaisia tähkän tyvipuolella ja hedekukkaisia tähkän latvassa. Hedekukat 1:llä, emikukat 2:lla suomulla. Hedelmänä 3-kulmainen pähkylä. — H. 2, 1.

*Saran näköinen tunturiheinä rihmamaisilla lehdillä.*

- 367 CAREX. Sara. — Kukat tähkässä. Hedekukat 1:llä tähkäsuomulla, kehättömiä. Emikukat 1:llä tähkäsuomulla ja pulakkomaisesti muodostuneella kupusuomulla, laskeva latva-suomalostansa sisällisen vartalon 2—3 luottia ulos ja lop. muodostuva pähkylämäisen jyväkkeen peitteeksi. — H. 2, 1.

*Heinämainen kasvi tav. venhollisilla lehdillä. — Pähkylämäisen hedelmän peite nimitetään laji-selityksissä pullakoksi.*

- 368 TYPHA. Osmankäämi. — Hede- ja emikukat erillään 2:ssa liereässä eri tähkässä korren ympärillä; hedetähkä emitähkän päällä. Kukat kehättömiä hapsimaisten sukasten sisällä. Ponsia tav. 2—3, yhteisellä palholla. Hedelmänä pitkäperäinen pähkylä. — H. 3.

*Korkea vesiruoho miekkamaisilla lehdillä, tiheillä, varstamaisilla t. telamaisilla tähkillä.*

- 369 SPARGANIUM. Palpakko. — Hede- ja emikukat erillään palleroisissa mykeröissä. Hedekukat epälukuisilla suojuosuomulla; emikukat 3—4:llä nalkkimaisella suomulla. Hedelmä pähkylämäinen, tav. perätön. — H. 3.

*Vesiruoho monella palleromaisella tähkällä; hedetähkät emisten päällä.*

(*Eriophorum* 3, 1.)

#### 4 Lahko. — NELIHETEISIÄ.

- 370 URTICA. Nokkonen. — Hedekukat yksikertaisella, verho-  
maisella, 4-jakoisella kehällä. Emikukkain kehä myös yksikertainen 2:lla isommalla ja 2:lla perin pienellä lehdellä, lop. peittävä pienen pähkylän. — H. 78.

*Poltinsukainen kasvi pienillä kukilla röyhyissä.*

- 371 LITTORELLA. Raani. — Hedekukat 4-jakoisella verholla; terä suppilomainen 4-jakoisella laiteella. Emikukat (perättöminä aluslehtien hangoissa) verhottomia, jonka sijasta on 2—3-lehtinen varus; terä yhdislehtinen, kalvomainen, 2-liuskainen. Hedelmä pähkylämäinen. — H. 34.

*Pieni rantaruohoke äimämäisillä lehdillä; hedekukka pitkäperäinen.*

- 372 ALNUS. Leppä. — Hedekukat norkoissa kilpimäisillä yhdysuomulla, 3 kukkaa joka suomun aluspuolella; kehä 4-jakoinen. Emikukkain norkot lyhyitä limittäisillä, 2-kukkaisilla, lop. puutavilla, pieneksi kävyksi muodostuvilla suomulla. — H. 82.

*Puu tai pensaskasvi, kukkiva lehdettömänä aikana.*

#### 5 Lahko. — VIISIHETEISIÄ.

(*Bryonia* 21, 7; *Atriplex* 23, 1.)

#### 6 lahko. — MONIHETEISIÄ.

Useammalla kun 5:llä heteellä.

† Ruohokkeita.

- 373 SAGITTARIA. Keiholehti. — Verho ja terä 3-lehtisiä.

5-uurtoiset, kolottomat. Marto lop. keilamainen, tyhjäsisuinen. — H. 15, 1, 1.

*Haarainen ruohoke kuin ed.; kehtosuomut valkealaitaiset.*

- 346 CHRYSANTHEMUM. Päivänkukka. — Kehto ed. Kuorusjyvät 5- tahi useampiharjuiset, kolottomat. Marto lop. kehkerä. — H. 15, 1, 1.

*Lehdet kokonaisia t. leveäliuskaisia.*

## 20 LUOKKA.

## EMIHETEISIÄ. \*)

## 1 Lahko. — YKSIHETEISIÄ.

† Ponsi pystyssä, koko kannallaan kiinteässä yhdistyksessä vartalon kanssa, liikkumaton.

• Huuli kannusmaisella t. pussimaisella mesipiteellä.

- 347 ORCHIS. Kämmekekä. — Huuli miten milloinkin liuskainen, kannustettu. Ponsilokerot alaspäin yhtyneet, nystyrämäisenä rakkona luotin päällä ja sen sisässä niiden 2:n pölymyhkyin erilliset hännäkät. — H. 14, 5.

*Kumpiki pölymyhky liuskaisella hännäkällä, joka erittäin taataan yhteisestä rakosta ulos vetää.*

- 348 GYMNADENIA. Kirkiheinä. — Huuli leveä, 3-halkoinen, kannustettu. Pölymyhkyin hännäkät lähinäisiä, ilman rakotia; luotti niiden alla. — H. 14, 5.

*Kukat pitkättävässä tähkässä; juurimukulat halkinaisia.*

- 349 PLATANThERA. Lehdokki. — Huuli kokonainen, tasa-soukka, kannustettu. Pölymyhkyin hännäkät kumpiki nystyräsänsä kahdenpuolen luottia kiinni. — H. 14, 5.

\*) Tämän luokan kasvit kuuluvat yhteensä Kämmekekäisien (Orchideæ) heimoon.

Ponsi ja emi niillä ovat yhdistyneet siitintukuksi ilman tarkkaa palhon ja vartalon erotusta. Luottina on pienoinen, tahmea kolo tukun etupolella ponnella.

Jaossa † on ponsi pystyssä 2:lla lokerolla ja niiden sisässä siitepöly-myhkyt. Jaossa †† ponsi on selvästi emistä erotettu ja suvussa kannen tapaan liikkuva.

Kupu on tav. erivärinen, terämäinen, 3:lla ulkopuolisella ja 3:lla sisällä lehdellä. Jälkimäisistä on yksi erimuotoinen, eteen- t. ulos-, alaspäin kääntynyt. Sitä sanotaan huuleksi ja sen tyvellä on eräissä kannuksen, pussin t. kolon tapainen mesipide.

Hedelmänä on 1-pesäinen, 3-laitainen, laidoista (hyvin erä) nukaisilla siemenillä. Nuorempana t. sikiäimenä on (hyvin erä) niin vääntynyt, että kuvun huuli on alaspäin. E. (hyvin erä) on se vääntymätön ja huuli silloin ylöspäin. Missä (hyvin erä) on huuli aina alaspäin kääntynyt.

5-nurtoiset, kolottomat. Marto lop. keilamainen, tyhjäsuisinen. — H. 15, 1, 1.

*Haarainen ruohoke kuin ed.; kehtosuomut valkealaitaiset.*

- 346 CHRYSANTHEMUM. Päivänkukka. — Kehto ed. Kuorusjyvät 5- tahi useampiharjuiset, kolottomat. Marto lop. kehkerä. — H. 15, 1, 1.

*Lehdet kokonaisia t. leveäliuskaisia.*

## 20 LUOKKA.

## EMIHETEISIÄ. \*)

## 1 Lahko. — YKSIHETEISIÄ.

† Ponsi pystyssä, koko kannallaan kiinteässä yhdistyksessä vartalon kanssa, liikkumaton.

• Huuli kannusmaisella t. pussimaisella mesipiteellä.

- 347 ORCHIS. Kämmekekä. — Huuli miten milloinkin liuskainen, kannustettu. Ponsilokerot altapäin yhtyneet, nystyrämäisenä rakkona luotin päällä ja sen sisässä niiden 2:n pölymyhkyin erilliset hännäkät. — H. 14, 5.

*Kumpiki pölymyhky liuskaisella hännykällä, joka erittäin taitaan yhteisestä rakosta ulos vetää.*

- 348 GYMNADENIA. Kirkiheinä. — Huuli leveä, 3-halkoinen, kannustettu. Pölymyhkyin hännäkät lähinäisiä, ilman rakotta; luotti niiden alla. — H. 14, 5.

*Kukat pitkättävissä tähtäissä; juurimukulat halkinaisia.*

- 349 PLATANThERA. Lehdokki. — Huuli kokonainen, tasasoukka, kannustettu. Pölymyhkyin hännäkät kumpiki nystyräsänsä kahdenpuolen luottia kiinni. — H. 14, 5.

\*) Tämän luokan kasvit kuuluvat yhteensä Kämmekekäisien (Orchideæ) heimoon.

Ponsi ja emi niillä ovat yhdistyneet siitintukuksi ilman tarkkaa pallon ja vartalon erotusta. Luottina on pienoinen, tahmea kolo tukun etupölylellä ponnella.

Jaossa † on ponsi pystyssä 2:lla lokerolla ja niiden sisässä siitepöly-myhkyt. Jaossa †† ponsi on selvästi emistä erotettu ja suvussa kannen tapaan liikkuva.

Kupu on tav. erivärinen, terämäinen, 3:lla ulkopuolisella ja 3:lla sisällä lehdellä. Jälkimäisistä on yksi erimuotoinen, eteen- t. ulos-, ja päin kääntynyt. Sitä sanotaan huuleksi ja sen tyvellä on eräissä kannuksen, pussin t. kolon tapainen mesipide.

Hedelmänä on 1-pesäinen, 3-laitainen, laidoista ja hyvä (erä) nukaisilla siemenillä. Nuorempana t. sikiäimenä on niin vääntynyt, että kuvun huuli on alaspäin. E. on se vääntymätön ja huuli silloin ylöspäin. Missä on huuli aina alaspäin kääntynyt.



5-uurtoiset, kolottomat. Marto lop. keilamainen, tyhjäsuisinen. — H. 15, 1, 1.

*Haarainen ruohoke kuin ed.; kehtosuomut valkealaitaiset.*

- 346 CHRYSANTHEMUM. Päivänkukka. — Kehto ed. Kuorusjyvät 5- tahi useampiharjuiset, kolottomat. Marto lop. kehkerä. — H. 15, 1, 1.

*Lehdet kokonaisia t. leveäliuskaisia.*

---

## 20 LUOKKA.

## EMIHETEISIÄ. \*)

## 1 Lahko. — YKSIHETEISIÄ.

† Ponsi pystyssä, koko kannallaan kiinteässä yhdistyksessä vartalon kanssa, liikkumaton.

• Huuli kannusmaisella t. pussimaisella mesipiteellä.

- 347 ORCHIS. Kämmeekkä. — Huuli miten milloinki liuskainen, kannustettu. Ponsilokerot altapäin yhtyneet, nystyrämäisenä rakkona luotin päällä ja sen sisässä niiden 2:n pölymyhkyin erilliset hännykät. — H. 14, 5.

*Kumpiki pölymyhky liuskaisella hännykällä, joka erittäin taitaan yhteisestä rakosta ulos vetää.*

- 348 GYMNADENIA. Kirkiheinä. — Huuli leveä, 3-halkoinen, kannustettu. Pölymyhkyin hännykät lähinäisiä, ilman rakotia; luotti niiden alla. — H. 14, 5.

*Kukat pitkittävässä tähkässä; juurimukulat halkinaisia.*

- 349 PLATANThERA. Lehdokki. — Huuli kokonainen, tasasoukka, kannustettu. Pölymyhkyin hännykät kumpiki nystyräsänsä kahdenpuolen luottia kiinni. — H. 14, 5.

\*) Tämän luokan kasvit kuuluvat yhteensä *Kämmeekkäisien* (Orchideae) heimoon.

Ponsi ja emi niillä ovat yhdistyneet siitintukuksi ilman tarkkaa palhon ja vartalon erotusta. Luottina on pienoinen, tahmea kolo tukun etupuolella ponnien alla.

Jaossa † on ponsi pystyssä 2:lla lokerolla ja niiden sisässä nuijamaiset siitepöly-myhkyt. Jaossa †† ponsi on selvästi emistä erotettu ja useammassa suvussa kannen tapaan liikkuva.

Kupu on tav. erivärinen, terämäinen, 3:lla ulkopuolisella ja 3:lla sisämäisellä lehdellä. Jälkimäisistä on yksi erimuotoinen, eteen- t. ulos-, harv. ylöspäin kääntynyt. Sitä sanotaan huuleksi ja sen tyvellä on eräissä suvuissa kannuksen, pussin t. kolon tapainen mesipide.

Hedelmänä on 1-pesäinen, 3-laitainen, laidoista puhkeava kota hyvin pienukaisilla siemenillä. Nuorempana t. sikiäimenä on se (välistä sen perä) tav. niin vääntynyt, että kuvun huuli on alaspäin. Eräissä harvoissa suvuissa on se vääntymätön ja huuli silloin ylöspäin. Missä erittäin toisin ei sanota, on huuli aina alaspäin kääntynyt.

*Kahdella m. vastakkaisella, harv. 1:llä lehdellä; mukulat kokonaisia.*

- 350 CÆLOGLOSSUM. Maariankämmä. — Huuli tasasoukka, liuskapäinen, pussimaisella mesipiteellä. Pölymyhkyin hännykät rakotta. — H. 14, 5.

*Juurimukulat kämmenjakoisia; kukat vehreän-kellerväitä.*

•• Huuli selvättä mesipiteettä.

- 351 OPHRYS. Orho. — Kupu avonainen. Huuli 4-liuskainen. Pölymyhkyin hännykät erillään kumpiki rakossansa. — H. 14, 5. *Hajallisilla, kärpäisen muotoisilla kukilla; juurimukulat kokonaisia.*

- 352 CHAMÆORCHIS. Orhukka. — Kupu kypärimäisesti sullettu. Huuli ehyt. Pölymyhkyt ed. — H. 14, 5.

*Pieni tunturiruohoke kokonaisilla mukuloilla ja tasalevyisillä lehdillä.*

- 353 HERMINIUM. Mesikukka. — Kupu ammottava. Huuli 3-liuskainen, kannalta maljamaisesti onteva. Pölymyhkyin hännykät erillisiä. — H. 14, 5.

*Keltakukkasinen ruohoke palleromaisella mukulalla.*

†† Ponsi erillään, selvänä siitintukun osana ja miten milloinkin liikkuva.

• Huuli syvällä, kannus- tahi pussimaisella mesipiteellä.

- 354 CALYPSO. Neidenkenkä. — Huuli iso, kenkämäinen, etupuolisella laiteella ja kaksoiskannuksella. Siitintukku pitkä, lehdekkeisellä lisäkkeellä. — H. 14, 2.

*Yksilehtinen ruohoke 1:llä isolla lehdellä ja sipulimaisella juurakolla.*

- 355 EPIPOGIUM. Metsän-emä. — Huuli 3-liuskainen ylöspäisellä, pussimaisella mesipiteellä. Pölymyhkyt pitkällä hännköillä, yhtenäisiä, pian varisevassa, kansimaisessa ponnassa. — H. 14, 4.

*Lehdetön, suomukas, harvakukkasinen ruohoke pahkuroivalla, haarovalla juurakolla.*

•• Huuli matalalla t. epäselvällä mesipiteellä.

- 356 GOODYERA. Yövilkka. — Huuli kokonainen maljamaaisella mesipiteellä. Ponsi eri peräkkeellä siitintukun selässä. Luotti kilpimäinen, 2-sarvinen. — H. 14, 4.

*Tyveltä monilehtinen ruohoke rihmamaaisella juurakolla, soukka-tähtäinen.*

- 357 CEPHALANTHERA. Valkku. — Huuli sivupykäleillä jaettu ontevaksi kannaksi ja kokonaiseksi lapalinskaksi. Siitintukku suora, tasasoukka, pitkättävä (vähintään 4-kertaisesti levyyt-tänsä pidempi). Pölymyhkyt m. tasapaksuja. Sikiäin perä-tön, vääntynyt. — H. 14, 4.  
*Pystykukkasinen ruohoke miekkamaisilla t. suikeilla lehdillä, rihmakkeisella juurakolla.*
- 358 EPIPACTIS. Neidenvaippa. — Huuli ed. Siitintukku lyhyt. Pölymyhkyt nuijamaisia. Sikiäin vääntyperäinen. — H. 14, 4.  
*Lehdet useampia puikeita t. suikeita; juurakko rihmakkeinen; kukat vähän rippuvia.*
- 359 LISTERA. Kaksikko. — Huuli halkopäinen. Siitintukku lyhyt, suomumaisella jatkeella ponnien takana. — H. 14, 4.  
*Kahdella, m. vastakkaisella, leveällä lehdellä, rihmakkeisella juurakolla.*
- 360 NEOTTIA. Pesäke. — Huuli ed. Siitintukku pitkättävä, päätyvä ponnella. — H. 14, 4.  
*Lehdetön, suomukas ruoho, kimputulla juurakolla.*
- 361 MALAXIS. Suovalkku. — Huuli ehyt, ylöspäinen. Siitin-tukku perin lyhyt kansimaisella ponnella latvassa. Pölymyhkyt yhtyneitä, nuijamaisia, 2-jakoisia. — H. 14, 3.  
*Tyveltä 1—3-lehtinen ruohoke sipulimaisella juurakolla ja monilukuisilla, pienillä kukilla tähtäissä.*
- 362 CORALLORRHIZA. Harajuuri. — Huuli loivilla sivupy-käleillä, ehyellä lavalla. Siitintukku pitkättävä, vähän edes-käyrä, päästä kalvopalteinen, pitkittäin onteva. Ponsi ed.; lokerot poikittain 2:lla pienemmällä lokerolla, kumpiki pallo-roisella pölymyhkyllä. — H. 14, 3.  
*Lehdetön, suomukas ruohoke pakkuroivalla, haarovalla juurakolla.*

## 2 Lahko. — KAKSIHETEISIÄ.

- 363 CYPRIPEDIUM. Käenvirsu. — Kupu 5-lehtinen (2 ali-maista lehteä yhdessä). Huuli kenkämäisesti pullistunut. Pon-net kahdenpuolin kilpimäisessä luotissa kiinni. — H. 14, 1.  
*Levedelehtinen ruohoke 1:llä, harv. 2:lla isolla kukalla.*

## 21 LUOKKA.

## YKSIKOTISIA.

## 1 Lahko. — YKSIHETEISIÄ.

- 364 ZANNICHELLIA. Haura. — Hedekukat kehättömiä; heteet pitkättävällä palholla. Emikukat 4—7-llä sikiäimellä, kuki vartalolla ja kilpimäisellä luotilla. Hedelmänä 4—7 kuutavaa pähkylää. — H. 4, 2.

*Vesikasvi apulehdillä ja rihmakkeisilla, vuorottaisilla lehdillä.*

- 365 CALLITRICHE. Vesitähti. — Kehätön tahi 2:lla terämaisellä (valkealla) suojuksella kehänä. Emikukat 4-kulmaisella sikiäimellä ja 2:lla rihmakkeisella vartalolla. Hedelmänä 4-pesäinen, 4-siemeninen, puhkeamatta variseva kota. — H. 85.

*Vesiruoho vastakkaisilla lehdillä, apulehdetön.*

(*Zostera* 1, 1; *Typha* 21, 3; *Pinus* 21, 6; *Najas* 22, 1).

## 2 Lahko. — KAKSIHETEISIÄ.

(*Lemna* 2, 1; *Typha* 21, 3).

## 3 Lahko. — KOLMIHETEISIÄ.

- 366 KOBRESIA. Sarake. — Tähkylät yksinäisessä tähkässä t. monta ryhmistynyttä, toiskertaista tähkää; ed. tapauksessa on joka tähkylässä yksi hede- ja 1 emikukka — jälk. tapauksessa ovat tähkylät emikukkaisia tähkän tyvipuolella ja hedekukkaisia tähkän latvassa. Hedekukat 1:llä, emikukat 2:lla suomulla. Hedelmänä 3-kulmainen pähkylä. — H. 2, 1.

*Saran näköinen tunturiheinä rihmamaisilla lehdillä.*

- 367 CAREX. Sara. — Kukat tähkässä. Hedekukat 1:llä tähkäsuomulla, kehättömiä. Emikukat 1:llä tähkäsuomulla ja pulakkomaisesti muodostuneella kupusuomulla, laskeva latva-suomalostansa sisällisen vartalon 2—3 luottia ulos ja lop. muodostuva pähkylämäisen jyväkkeen peitteeksi. — H. 2, 1.

*Heinämainen kasvi tav. venhollisilla lehdillä. — Pähkylämäisen hedelmän peite nimitetään laji-selityksissä pullakoksi.*

- 368 TYPHA. Osmankäämi. — Hede- ja emikukat erillään 2:ssa liereässä eri tähkässä korren ympärillä; hedetähkä emitähkän päällä. Kukat kehättömiä hapsimaisten sukasten sisällä. Ponsia tav. 2—3, yhteisellä palholla. Hedelmänä pitkäperäinen pähkylä. — H. 3.

*Korkea vesiruoho miekkamaisilla lehdillä, tiheillä, varstamaisilla t. telamaisilla tähkillä.*

- 369 SPARGANIUM. Palpakko. — Hede- ja emikukat erillään palleroisissa mykeröissä. Hedekukat epälukuisilla suojusuomuilla; emikukat 3—4:llä nalkkimaisella suomulla. Hedelmä pähkylämäinen, tav. perätön. — H. 3.

*Vesiruoho monella palleromaisella tähkällä; hedetähkät emisten päällä.*

(*Eriophorum* 3, 1.)

#### 4 Lahko. — NELIHETEISIÄ.

- 370 URTICA. Nokkonen. — Hedekukat yksikertaisella, verho-  
maisella, 4-jakoisella kehällä. Emikukkain kehä myös yksikertainen 2:lla isommalla ja 2:lla perin pienellä lehdellä, lop. peittävä pienen pähkylän. — H. 78.

*Poltinsukainen kasvi pienillä kukilla röyhyissä.*

- 371 LITTORELLA. Raani. — Hedekukat 4-jakoisella verholla; terä suppilomainen 4-jakoisella laiteella. Emikukat (perättöminä aluslehtien hangoissa) verhottomia, jonka sijasta on 2—3-lehtinen varus; terä yhdislehtinen, kalvomainen, 2-liuskainen. Hedelmä pähkylämäinen. — H. 34.

*Pieni rantaruohoke äimämaisillä lehdillä; hedekukka pitkäperäinen.*

- 372 ALNUS. Leppä. — Hedekukat norkoissa kilpimäisillä yhdyssuomuilla, 3 kukkaa joka suomen aluspuolella; kehä 4-jakoinen. Emikukkain norkot lyhyitä limittäisillä, 2-kukkaisilla, lop. puutavilla, pieneksi kävyksi muodostuvilla suomuilla. — H. 82.

*Puu tahi pensaskasvi, kukkiva lehdettömänä aikana.*

#### 5 Lahko. — VIISIHETEISIÄ.

(*Bryonia* 21, 7; *Atriplex* 23, 1.)

#### 6 lahko. — MONIHETEISIÄ.

Useammalla kun 5:llä heteellä.

† Ruohokkeita.

- 373 SAGITTARIA. Keiholehti. — Verho ja terä 3-lehtisiä.

Heteitä ja emiä paljo. Hedelmänä monta litteämaisistä, 1-siemenistä hedelmystä ryhmässä palleroisella pohjuksella. — H. 8, 2. *Paljasvartinen vesiruoho kukilla kiehkuroittain.*

- 374 CERATOPHYLLUM. Karvalehti. — Kehän sijasta verho-  
mainen, monilehtinen varus. Heteitä 12—20, m. palhottomia.  
Emi 1, äimämaisella vartalolla. Hedelmänä 1-siemeninen päh-  
kylä. — H. 86.

*Vesiruoho säteettäisillä, pienijakoisilla lehdillä.*

- 375 MYRIOPHYLLUM. Ärviä. — Verho 4:llä, väl. epäselvällä  
hampaalla sikiäimen päässä. Terä 5:llä lyhyt-aikuisella leh-  
dellä. Heteitä 4—8. Sikiäin 4-kyhmyinen, 4:llä höyteällä  
luotilla, lop. jakauva 4:hän pähkylämäiseen lohkohedelmük-  
seen. — H. 64.

*Vesiruoho kampalaitaisilla lehdillä, pienillä kukilla kiehkuroissa  
t. tähtkäksi läheneviä.*

†† Puita ja pensaita; hedekukat norkossa.

- 376 QUERCUS. Tammi. — Hedekukkais-norkko liereä; kupu verho-  
mainen, maljamainen, 5—12-jakoinen, 5—12:lla heteellä. Emiku-  
kan suojus limisuomuinen, lop. yhteen kasvettava pikariksi (keh-  
tokannaksi) pähkinän alle; vartalo 1, maljamaisella luotilla.  
Hedelmänä pähkinä (terho). — H. 80.

*Iso puu mutkaliuskaisilla lehdillä yhtenä aikana kukkain kanssa.*

- 377 CORYLUS. Pähkinäpuu. — Hedekukkais-norkko liereä 3-  
liuskaisilla suomuilla, keskiliuska suurin, peittävä sivuliuskat;  
kehätön; heteitä 8:n paikoilla, lähteviä norkkosuomuin alta.  
Eminorkkoin suomut 2-kukkaisia; vartaloita 2. Hedelmänä  
pähkinä suurten, liuskaisten varuslehtien sisässä. — 80.

*Pensaskasvi toissahaisilla lehdillä kukkiva ennen lehtimistä.*

- 378 BETULA. Koivu. — Hedekukkais-norkko liereä kilpimäi-  
sillä yhdyssuomuilla, 1 kukka joka suomun alla 3-lehtisellä  
varuksella; heteitä 4—6, halkopäiset, 1:llä ponsilokerolla joka  
liuskassa. Emikukkais-norkko limisuomuinen, suomut litteitä  
lop. menehtyviä, jokainen 3:lla sikiämellä, lop. siipihedelmällä.  
— H. 82.

*Puu tai pensaskasvi sahalaitaisilla, kukan-aikuisilla lehdillä.*

- 379 PINUS. Petäjä. — Hedekukkais-norkot monilukuisilla pon-  
silla, jokainen eri suomussa, kehättömänä. Eminorkot (kä-  
vyt) limisuomuisia, suomut lop. kasvettuaan puutavia, itseku-  
ki 2:lla pähkylämaisellä, paljaalla siemenellä. — H. 84.

*Aina vehriöivä havupuu.*

## 7 Lahko. — YHDISHETEISLÄ.

Heteet osittain yhdistyneitä.

380 BRYONIA. Koirannauris. — Verho 5-liuskainen, latva-peräinen; terä 5-jakoinen; heteitä 5, 3-kuntaisina (1 irtonainen). Vartalo 3-jakoinen. Hedelmänä marjake 5—6:lla litteähköllä siemenellä. — H. 57.

*Ruohokasvi kouramaisilla lehdillä ja rihmakkeisilla, varresta lähtevillä kärheillä.*

---



## 22 LUOKKA.

## KAKSIKOTISIA.

## 1 Lahko. — YKSIHETEISIÄ.

- 381 NAJAS. Näkinruoho. — Kupu pullakkomainen siitinten ympärillä ja ylhäältä kutistunut 2—3-liuskaiseksi kaulaksi. Hedekasvin ponsi 1- t. 4-lokeroinen, lop. puhkaiseva kuvun 3—4-ksi liuskaksi. Emikasvin sikiäin vartaloton ja luotiton, lop. muodostuva pähkyläksi kuvun sisässä ja ynnä kuvun kanssa variseva. — H. 11.

*Vesiruoho soukilla, säteettävillä lehdillä; kukat lehtihankaisia.*

## 2 Lahko. — KAKSIHETEISIÄ.

- 382 SALIX. Paju. — Kukat norkoissa t. palmuissa yksikertaisilla limisuomuilla siitinten alla ja 1—2 mesinystyrää kehän sijasta. Kota 2-laitainen, 1-pesäinen, tupsukarvaisilla siemenillä. — H. 81.

*Ehytlehtinen puu t. pensaskasvi; heteitä väl. 1 t. 3, yhdellä lajilla 4—8; luotti 2- tahi 4-halkoinen, harv. eheä.*

*(Fraxinus 23, 2.)*

## 3 Lahko. — KOLMIHETEISIÄ.

- 383 EMPETRUM. Variksenmarja. — Verho ja terä 3-lehtisiä. Luotti kilpimäinen, noin 9-säteinen. Hedelmänä marja, noin 5-siemeninen. — H. 70.

*Ruohomainen pensas neulomaisilla lehdillä, lehtihankaisilla kukilla; toisintees täysineuvoisilla kukilla.*

*(Eriophorum 3, 1; Salix amygdalina 22, 2; Juniperus 22, 8.)*

## 4 Lahko. — NELIHETEISIÄ.

- 384 HIPPOPHAË. Tyrni. — Hedekukan kupu verhomainen, 2-jakoinen. Emikukan kupu nuijamainen, lovipäinen, sarvimaisella, ulottavalla luotilla. Hedelmänä lop. möyheältä kuvulta peitetty pähkylä (epäperäinen luumarja). — H. 76.

*Merenrantainen pensas oraisilla oksilla, kokonaisilla lehdillä.*

*(Rhamnus cathartica 5, 1; Urtica dioica 21, 4; Salix pentandra 22, 2; Myrica 22, 6.)*

## 5 Lahko. — VIISIHETEISIÄ.

- 385 HUMULUS. Humala. — Hedekukan kupu verhomainen, 5-jakoinen. Emikukat käpymäisessä tähkässä, emin ympäri tuuttimaisesti kiertyneillä suomuilla. Vartaloita 2. Hedelmänä kurttuinen, puhkeamatta variseva, 1-pesäinen rakkojyväke. — H. 78.

*Köynnöskasvi kouramaisilla, karkeilla lehdillä.*

(*Ribes alpinum* 5, 1; *Salix pentandra* 22, 2; *Myrica* 22, 6.)

## 6 Lahko. — KUUSIHETEISIÄ.

Heteitä 6:n paikoilla.

- 386 MYRICA. Suomyrtti. — Hede ja eminorkot litteillä, limitäisillä, 1-kukkaisilla suomuilla. Heteitä 4—6, harv. useampaa. Luotteja 2. Hedelmänä käpy pienillä, 1-siemenisillä luumarjakkeilla. — H. 83.

*Pensaskasvi kukostava ennen lehtimistä; lehdet väkevähajuisia.*

(*Rumex acetosa* ja *acetosella* 6, 3.)

## 7 Lahko. — KAHDEKSA — MONIHETEISIÄ.

- 387 POPULUS. Haapa. — Kukat limisuomuisissa norkoissa, joka suomulla yksinäinen tuutti- tahi maljamainen kehäsuomu, jossa siittimet istuvat. Luotteja 2, 2—4-halkoiset. Kota 2-laitainen, 1-pesäinen, tupsukarvaisilla siemenillä. — H. 81.

*Ennen lehtimistä kukkiva puu pyöreillä t. puikeilla lehdillä.*

- 388 RHODIOLA. Ruusujuuri. — Verho 4-jakoinen. Terä 4-lehtinen. Heteitä 8. Emiä 4. Hedelmäksiä 4, sisäänpäin puhkeavia. — H. 61.

*Tunturiruoho keltaisella, hyvähajuisella juurella; kukat tiheässä röyhyyssä.*

- 389 MERCURIALIS. Sinijuuri. — Kupu verhomainen, 3-jakoinen. Heteitä 9—12. Vartalo lyhyt, 2-jakoinen, 2-luottinen. Kota 2-kyhmyinen, 2-pesäinen, 2-siemeninen. — H. 71.

*Vastaislehtinen ruohoke pienillä kukilla tähkässä.*

- 390 STRATIOTES. Sahalehti. — Verho 3-jakoinen. Terä 3-lehtinen. Heteitä 12:n paikoilla. Emi 6:lla, 2-jakoisella vartalolla, 6-kulmaisella, kukan-alaisella sikiäimellä. Mesipiteitä 20:n paikoilla, joutoponsien kaltaiset. Hedelmänä 6-pesäinen, monisiemeninen marja. — H. 12.

*Vesikasvi pitkillä, piikkisahaisilla lehdillä.*

- 391 HYDROCHARIS. Kilpukka. — Verho ja terä 3-lehtisiä. Heteitä 9. Emikukat 6:lla vartalolla, 2-halkoisilla luoteilla ja

- 3:lla rihmakkeisella hede-aiheella. Sikiäin kukan-alainen, lop. 6-pesäinen, monisiemeninen marja. — H. 12.

*Vesiruoho herttamaisesti pyöreähköillä, laiehtivilla lehdillä.*

(*Silene acaulis* 10, 3; *Melandrium* 10, 4; *Rubus chamæmorus* 12, 3; *Salix pentandra* 22, 2; *Myrica* 22, 6; *Acer* 23, 2.)

## 8 Lahko. — YKSIKUNTAISIA.

- 392 JUNIPERUS. Kataja. — Hedekukkina kilpimäisiä suomuja käpymäisessä ryhmässä, joka suomun takakulmassa 3—6 pontta kehättömänä. Emikäpynä limittäisiä suomuja, jotka lop. yhdistyvät kuivaksi, marjamaiseksi, 3-siemeniseksi kävyksi (marjakävyksi). — H. 84.

*Pensas t. pienempi puu oramaisilla neulosilla ja mustansinisellä, marjamaisella hedelmällä.*

- 393 TAXUS. Marjakuusi. — Hedekukissa ponsia 8:n paikoilla, kiehkuroittain kilpimäisten, ruodikkain suomuin alla. Emikukat yksitellen epäselvällä, rengasmaisella pohjuksella; lop. pähkylämäinen hedelmä säteittäin levenneen, möyheän pohjuksen sisässä (luumarjake). — H. 84.

*Pensas t. pienempi puu kahdappäisesti istuvilla, litteillä neulosilla.*

## 23 LUOKKA.

## SEKASOPUISIA.

## 1 Lahko. — YKSIKOTISIA.

Yksineuvoisia kukkia samalla varsikolla kaksineuvoisten kanssa.

- 394 ATRIPLEX. Maltsa. — 2-neuvoiset kukat verhomaisella, 5-jakoisella kuvulla, 5:llä heteellä ja 2-jakoisella vartalolla. Emikukan kupu 2-jakoinen t. syvään 2-halkoinen, litistynyt, jassen sisällä erillinen, syrjällään seisova, litteäähkö siemen, peitetty ohuella, kuorimaisella rakolla (rakkojyväke). — H. 79.

*Ruuhoke pienillä perättömillä, ryhmäisillä, vehreillä kukilla.*

(*Holcus*, *Hierochloë* ja *Avena elatior* 3, 2; *Empetrum* 22, 3;

*Fraxinus* ja *Acer* 23, 2.)

## 2 Lahko. — KAKSIKOTISIA.

Yksineuvoiset kukat eri varsikolla kun kaksineuvoiset.

- 395 FRAXINUS. Saarni. — Kehätön; 2-neuvoiset kukat 2-heteisiä, lyhytpalhoisia, 1-emisiä 2-halkoisella luotilla. Hedekukat 2-heteisiä, palhottomia. Hedelmänä litteäähkö kota, jatkunut siipimäisellä lisäkkeellä. — H. 27.

*Korkea puu vastaisparisilla lehdillä.*

- 396 ACER. Vahteri. — Verho 5-jakoinen. Terä 5-lehtinen. Heteitä 8. Emi 2-luottinen. Hedekukat pitkäpalhoisia keskeytyneellä, m. näkymättömällä emillä. Emikukat pitkättävällä emillä, keskeytyneillä ponsilla lyhyillä palhoilla. Hedelmänä 2-siipinen, 2-siemeninen kota. — H. 39.

*Puu kouraliuskaisilla lehdillä.*

(*Empetrum* 22, 3.)

## 24 LUOKKA.

## SALASIITTIÖITÄ.

## SANIKKAISIA.

† **Equisetaceæ.** Kortekasveja. — Lehdettömiä, nivelvartisias kasveja, tupellisilla nivelillä, kilpisuomuisella latvatähkällä; itiöpesäkkeet suomuin aluspuolella.

- 397 **EQUISETUM.** Korte. — Itiöt 2:lla nuijamaisella joustimella, keskikohdaltaan itiössä kiinni. — H. 87.

*Varsi liereä, uurtainen, haaraton t. sädehaarainen.*

†† **Isoëtaceæ.** — Varrettomia kasveja hyvin lyhyellä, kutistuneella, m. kehrämäisellä juurakolla, josta yksi ainoa lehtikimppu lähtee; pesäkkeet lehtikannan sisäisiä.

- 398 **ISOËTES.** Lahnaruoho. — Pesäkkeet lehtien kannoissa, ulkopuolisissa lehdissä suuremmilla, sisäpuolisissa pienemmillä itiöillä. — H. 90.

*Vesiruoho dimämaisillä, sisästä 4-pillisillä lehdillä sipulimaisesti laajenneella kannalla.*

††† **Lycopodiaceæ.** — Monilehtisellä varrella; pesäkkeet joko lehtihangassa t. limisuomuisessa tähkäsä.

- 399 **LYCOPodium.** Lieko. — Pesäkkeet tasamukaisia, munuamaisia hienoilla, jauhomaisilla itiöillä. — H. 91.

*Tankeilla, neulamaisilla, väl. yhdistyneillä lehdillä.*

- 400 **SELAGINELLA.** Mähkä. — Muutamat pesäkkeet munuamaisia hienoilla itiöillä, toiset 3–4-kyhmyisiä 3–4:llä isomalla itiöllä. — H. 91.

*Pehmeä, tyveltä haarainen ruohoke lehtisillä tähkillä.*

†††† **Polypodiaceæ.** Saniaisia. — Maan-alaisesta juurakosta nousevilla, kiehkuroittain seisovilla lehdillä (*var-sikko-lehdiksi* myös kutsutut), jotka nuorena ovat käpyrämäisesti sisäänkiertyneet; itiöpesäkkeet lehtien ulko- t. aluspuolella eli laidassa.

- Pesäkkeet selvärenkaisia joko täppimäisissä t. viivamaisissa, pienissä ryhmissä lehtien aluspuolella.

401 POLYPODIUM. Imarre. — Pesäryhmät pyöreitä, täppimäisiä, erillään, paljaita. — H. 88.

*Varsikkolehti yksikertainen ja parijakoinen, t. haarukka-ruotinen.*

402 ASPIDIUM. Härkylä. — Ryhmät ed.; kilpimäinen, laidataan irtonainen huntu keskellä ryhmää. — H. 88.

*Varsikkolehti parilehtinen t. toisparinen, piikkisahaisilla liuskoilla.*

403 POLYSTICHUM. Alvejuuri. — Ryhmät ed.; huntu muunais-pyöreähkö, poimulla ryhmän syrjässä kiinni. — H. 88.

*Varsikkolehdet tois-kolmisparisia t. liuskaisia.*

404 CYSTOPTERIS. Loikko. — Ryhmät ed.; huntu maljakkeinen, ryhmän alla kiinni ja ensittäin irtonaisella, kalvomaisella laidallaan sen peitteenä. — H. 88.

*Hento, pehmeä saniainen, pian kutistuvalla, epäselvällä hunnulla.*

405 WOODSIA. Kiviyrtti. — Ryhmät maljamaisten, hapsistuneitten huntujen sisällä, pian yhteenjuottuvia ja koko lehdykän selän peittäviä. — H. 88.

*Pienempi, parijakoinen saniainen; leden aluspuoli lop. ruosteenkarvainen ja höyted yhdistyneistä, hapsisista ryhmistä..*

406 ASPLENIUM. Hiirenporras. — Ryhmät soikeita — tasasoukkia, viivamaisia; huntu samanmuotoinen, pitkin pesäryhmän ulko-reunaa kiinni ja sisältä, lehden suonta päin, irtaava. — H. 88.

407 PTERIS. Sanajalka. — Ryhmät yhtämittaiseen jaksoon yhtyneitä taaskääntöisen lehtilaidan peitteessä. — H. 88.

*Iso, kolmikkomainen saniaiskasvi kolmisparisilla lehdillä.*

- Pesäkkeet selvärenkaisia, erityisten, juurakosta nousevain hedelmä-lehtien ulkopuolella.

408 BLECHNUM. Kampasaniain. — Hedelmälliset lehdet parijakoisia, 2:lla tasasoukalla, rinnakkaisella, pian yhteenjuottuvalla ryhmällä joka liuskassa; tasasoukka huntu peitteenä. — H. 88.

*Varsikkolehdet suikeita, parijakoisia.*

409 ALLOSORUS. Liesu. — Hedelmälehdet monesti toiskertaisia; ryhmät ed., lehtiliuskain taaskääntyneitten laidoin peitteessä ilman erityisettä hunnutta. — H. 88.

*Hienojakoinen saniaiskasvi tunturiseuduilla.*

410 STRUTHIOPTERIS. Kotkansiipi. — Hedelmälehdet parijakoisia; ryhmät taaskääntyneitten, pykälaitaisten lehtiliuskain alla, lop. koko aluspuolen peittäviä. — H. 88.

*Hedelmättömät varsikkolehdet isoja, tuuttimaisesti pienempään hedelmälehtien ympärillä.*

++++ **Ophioglossaceæ.** — Saniaiskasveja 1—2:lla lehdellä erillään yksi- t. toiskertaisesta hedelmä-tähkästä; pesäkkeet renkaattomia.

- 411 **BOTRYCHIUM.** Noidanlukko. — Pesäkkeet perättömiä vieretysten, haaraisessa tähkässä, keskeltä poikittain puhkeavia. — H. 89.

*Varrella 1—2 miten milloinkin monijakoista lehteä.*

- 412 **OPHIOGLOSSUM.** Kärmeenkieli. — Pesäkkeet perättömiä, kahdappaiseen, haarattomaan tähkään yhtyneitä, poikittain puhkeavia. — H. 89.

*Varsi haaraton 1:llä kokonaisella lehdellä ja haarattomalla latvatähkällä.*

## II

# SUOMEN KASVIEN LUONTAINEN JÄRESTÖ \*).

## A. — SIRKKALEHTISIÄ.

Nämät kasvit ilmaantuvat siemenestä sirkuksella ja silmäkkeellä ja kukkivat kaksineuvoisilla siittimillä, josta niitä myös toisella nimellä sanotaan **Ilmisiittiöiksi** t. **Siemen-kasveiksi**. Niissä tavataan selviä nestimiä ja siitä kutsutaan niitä myös **Nestime-kasveiksi**. Lehtipinnassa on niillä pienenisiä aukkoja t. *huokosia*.

Ne jakautuvat kahteen eri kaareen: **Yksisirkkaisiin** ja **Kaksisirkkaisiin**.

## I. — YKSISIRKKAISIA.

Itävät yhdellä sirkkalehdellä; jakautuvat seuraavaan neljään luokkaan: *Heinäkukkioita*, *Puikelokukkioita*, *Liljakukkioita* ja *Hedelmäkukkioita*.

### 1 luokka. — HEINÄKUKKIOITA.

Kukat tähkylöissä vuorottaisilla ulko- ja sisä-akanoilla.

- 1 heimo. GRAMINEÆ Juss. — Tähkylät 2:lla, harv. 1:llä kaleella ja niiden sisällä kukat 2:lla vuorottaisella helpeellä ja 2:lla, harv. 3:lla, pienellä, us. epäselvällä kaunalla siittimiä kaikkein likinnä. Heteet tav. 3, harv. 2. Emi 2:lla vartalolla t. luotilla, harv. 1:llä. Hedelmänä 1-siemenen jyväke \*\*).

\*) E. Fries'in mukaan sillä poikkeamalla, kun *Herbarium Musei Fennici*, Hels. 1859, osottaa.

\*\*) Niin tässä kuin muissaki heimoissa, joissa *valkuaisesta* ei mitään mainita, tavataan sitä aina niiden kasvien siemenissä, jotka heimoon kuuluvat.



1 jako. **Clisantheæ.** — Kukat hetiessä suletuita. Vartalot pitkättäviä kukan päästä ulkonevilla luoteilla.

1 parvi. *Nardeæ.* — Tähkylät perättömiä ja kaleettomia tähkässä.

Suku: *Nardus.*

2 parvi. *Phalarideæ.* — Tähkylät sivulta litistyneitä, 1:llä täydellisellä ja 1—2:lla vaillinaisella kukalla (joko tyhjinä tahi 1-neuvoisina).

Suvut: *Anthoxanthum. Hierochloë. Digraphis.*

3 parvi. *Alopecureæ.* — Tähkylät ed., 1:llä kukalla kaleitten sisällä.

Suvut: *Phleum. Alopecurus.*

4 parvi. *Seslerieæ.* — Tähkylät ed., monikukkaisia, m. yhtä pitkiä isoin kaleittensa kanssa.

Suku: *Sesleria.*

5 parvi. *Paniceæ.* — Tähkylät litteäselkäisiä, toisella puolen kehkeriä, toiselta litteämäisiä, 2:lla kukalla, toinen täydellinen, toinen tav. keskeytynyt t. vaillinainen.

Suku: *Setaria.*

2 jako. **Eyryrantheæ.** — Kukat hetiessä avonaisia. Vartalot lyhyitä, kukan pohjasta ulkonevilla luoteilla.

1 parvi. *Agrostideæ.* — Tähkylät 1-kukkaisia (paitsi *Phragmites*'ella).

Suvut: *Muhlenbergia. Milium. Agrostis. Apera. Calamagrostis. Phragmites.*

2 parvi. *Aveneæ.* — Tähkylät peräkkäitä (röyhynä). Kaleet yhtä pitkät t. pidemmät, kun helpeet.

Suvut: *Melica. Holcus. Vahlodea. Aira. Avena. Triodia. Fluminia.*

3 parvi. *Festuceæ.* — Tähkylät ed. Kaleet helpeitä lyhemmät.

Suvut: *Enodium. Colpodium. Catabrosa. Glyceria. Poa. Briza. Bromus. Festuca. Dactylis. Cynosurus.*

4 parvi. *Hordeineæ.* — Tähkä nivelikäs, tav. perättömillä, nivelpaikkoihin vuoroittain kiinnittyneillä t. vajouneilla tähkylöillä.

Suvut: *Brachypodium. Lolium. Elymus. Triticum.*

## 2 luokka. — PUIKELOKUKKIOITA.

Kupu puuttuva t. 4-lehtinen, suomuinen, hapsinen j. n. e.

Kukat perättömiä.

2 heimo. CYPERACEÆ Juss. — Tähkäkukinto yksikertaisilla, limit-

täisillä tähkäsuomuilla. Emi paljas t. suomukan, hap-sien, sukasiensisällä. Pähkylämäinen hedelmä pystyllä siemenellä.

- 1 parvi. *Cariceæ*. — Kukat erineuvoisia.

Suvut: *Kobresia*. *Carex*.

- 2 parvi. *Scirpeæ*. — Kukat täysineuvoisia. Tähkäsuomut joka puolelta limittäisiä.

Suvut: *Eriophorum*. *Trichophorum*. *Heleocharis*. *Scirpus*. *Rhynchospora*.

- 3 heimo. TYPHACEÆ Juss. — Kukat tähkässä t. mykerössä. Kupu monisuomuihin t. monisukasinen. Pähkylä-hedelmä rippuvalla siemenellä.

Suvut: *Sparganium*. *Typha*.

- 4 heimo. POTAMOGETONACEÆ Fr. — Kukat tähkässä t. litteässä puikelossa; *Zannichellia*lla yksinäisiä lehtihangassa. Heteet 1—4. Sikiäimet 5—6, harv. 1, kuki luotillinen; hedelmä valmiina pähkylän t. kivimarjan tapainen.

- 1 parvi. *Zostereæ*. — Kukat litteässä puikelossa lehdestä käpristyneen kotelon sisällä. Sikiäimiä 1. Kehä puuttuva.

Suku: *Zostera*.

- 2 parvi. *Potameæ*. — Useammalla sikiäimellä.

Suvut: *Zannichellia*. *Ruppia*. *Potamogeton*.

- 5 heimo. ARACEÆ Juss. — Kukat perättömiä, ryhmäisiä koteloisissa t. kotelottomassa puikelossa; ensimmäisessä parvessa lehtimäisen varsikon sisälle vajouneita. Kota-tahi marjahedelmä, variseva puhkeamatta.

- 1 parvi. *Lemneæ*. — Kukat laijektivain varsikkolehtien laidassa. Kupu 1-lehtinen.

Suku: *Lemna*.

- 2 parvi. *Acoroideæ*. — Koteloton. Kupu 6-lehtinen.

Suku: *Acorus*.

- 3 parvi. *Aroideæ*. — Puikelot kotelon sisäisiä. Kukat kehättömiä.

Suku: *Calla*.

### 3 luokka. — LILJAKUKKIOITA.

Kupu 3- tahi 6- (eri- tahi yhdis-)lehtinen, ynnä hedetten kanssa sikiäimen alla.

- 6 heimo. JUNCACEÆ DC. — Kupu verhomainen t. suomumainen, 6-lehtinen. Heteet 6, harv. 3. Vartalo 1, 3-luotti-

nen. Kota 3-pesäinen, monisiemeninen t. 1-pesäinen ja 3-siemeninen.

Suvut: *Luzula*. *Juncus*.

- 7 heimo. NARTHECIAEÆ Fr. — Kupu terämäinen, 6-lehtinen. Heteet 6. Hedelmykset 3-pesäisenä kotana, joko kokonaan yhdistyneet tahi latvalta erilliset, liiteperäisillä laita-istukoilla.

Suku: *Tofieldia*.

- 8 heimo. ALISMACEÆ Juss. — Kupu 6:lla lehdellä, ne 3 ulkopuoliset verhomaisia. Hedelmykset monilukuiset, erillisiä, tahi määrälukuiset, 3—6, miten milloinkin yhdistyneitä ja vasta valmistuneina toisistaan eriäviä. Vartaloita t. vartalottomia luotteja sama luku, kun hedelmyksiäki. Valkuaiseton.

- 1 parvi. *Juncagineæ*. — Kupulehdet verhokkeisia (vehreitä t. kellahtavia). Hedelmykset myötänsä tahi vaan tyveltä yhdistyneitä.

Suvut: *Triglochin*. *Scheuchzeria*.

- 2 parvi. *Alismæ*. — Ulkomaiset kupulehdet vehreitä, sisämaiset terämäisiä. Hedelmykset (monilukuisia) puhkeamatta varisevia, pähkylämäisiä.

Suvut: *Sagittaria*. *Alisma*.

- 3 parvi. *Butomæ*. — Kupulehdet erivärisiä. Hedelmykset kotamaisia, ei kun tyveltä yhdistyneitä, sisäluomaisia.

Suku: *Butomus*.

- 9 heimo. COLCHICACEÆ DC. — Kupu terämäinen 6-jakoisella laiteella. Heteet 6, ulkoluomaisilla ponsilla. Vartalo 3. Kotana 3, myötänsä t. vaan tyveltä yhdistynyttä, keski-istukkaista hedelmystä.

Suku: *Veratrum*.

- 10 heimo. LILIACEÆ Juss. — Kupu terämäinen. Ponnet sisäluomaisia. Vartalo 1 tahi puuttuva. Sikiäin 3-pesäinen, 3-laitainen, monisiemenisillä keski-istukoilla. — Suku *Paris* eroava.

- 1 parvi. *Asparageæ*. — Kupu 6-, harv. 4- tahi 8-, tav. yhdislehtinen. Marjahedelmä. — *Paris* 8:lla, m. erillisellä lehdellä.

Suvut: *Paris*. *Majanthemum*. *Convallaria*.

- 2 parvi. *Asphodeleæ*. — Kupu 6-, eri- tahi yhdislehtinen. Kotahedelmä.

Suvut: *Gagea*. *Allium*.

## 4 luokka. — HEDELMÄKUKKIOITA.

Kupu heteinensä sikiäimen päällä.

- 11 heimo. NAJADACEÆ Link. — Kukat erineuvoisia. Kupu pul-lakkomainen, kiinteästi siitinten ympärillä. Hede 1- t. 4-lokeroisella ponnella. Sikiäin 1-siemeninen, valmistu-neena kuvun peittämä pähkylä.  
Suku: *Najas*.

- 12 heimo. HYDROCHARIDACEÆ Juss. — Kukat tav. erineuvoisia 3:lla terämäisellä ja 3:lla verhomaisella kehälehdellä. Hedelmänä monipesäinen, laita-istukkainen kota.  
Suvut: *Hydrocharis*. *Stratiotes*.

- 13 heimo. IRIDACEÆ Juss. — Kupu terämäinen, suunnallinen, 3:lla ulospäin luomaisella ponnella. Sikiäin 3-pesäinen, monisiemeninen.  
Suku: *Iris*.

- 14 heimo. ORCHIDACEÆ Juss. — Kupu terämäinen, vastakohtai-nen, huuliliuskainen. Heteitä 1, harv. 2, emin kanssa siitintukuksi yhdistyneet. Sikiäin kukan-alainen, 1-pesäi-nen, 3-laitainen, laita-istukkainen.

- 1 parvi. *Cypripediæ*. — Ponsia 2.

Suku: *Cypripedium*.

- 2 parvi. *Vandæ*. — Ponsi yksinäinen, erillinen. Pöly-myhkyt (4:nä tahkulana) vahamaisia, solukkaisella jat-keella luottiin kiinnittyneet.

Suku: *Calypso*.

- 3 parvi. *Malaxideæ*. — Ponsi ed. Pölymyhkyt (palle-romaisia tahi pitkulaisia) vahamaisia, kohdastaan luotin päällä (ilman jatkeetta).

Suvut: *Corallorrhiza*. *Malaxis*.

- 4 parvi. *Neottieæ*. — Ponsi ed. Pölymyhkyt jauhomai-sina t. tahkulaisina, joustavina pirpaleina.

Suvut: *Neottia*. *Listera*. *Epipactis*. *Cephalanthera*. *Goo-dyera*. *Epipogium*.

- 5 parvi. *Ophrydeæ*. — Ponsi 1, kiinteästi emiin yhdis-tynyt.

Suvut: *Herminium*. *Chamæorchis*. *Ophrys*. *Cæloglossum*. *Platanthera*. *Gymnadenia*. *Orchis*.

## II. — KAKSISIRKKAISIA.

Itävät kahdella, harvoin useammalla sirkkalehdellä; eriävät neljään jaksoon: *Terähetiöihin*, *Pohjushetiöihin*, *Verhohetiöihin* ja *Vajakukkioihin*.

### 1 jakso. — Terähetiöitä.

Niiden heteet istuvat yhdislehtisen terän sisäpuolella.

Terähetiöitä on kolme eri luokkaa: *Sikiäisteräisiä*, *Läpiteräisiä* ja *Torviteräisiä*.

### 5 luokka. — SIKIÄISTERÄISIÄ.

Terä nivelellä sikiäimen päässä kiinni.

15 heimo. *SYNANTHEREÆ* Rich. t. *COMPOSITÆ* L. — Kukkaseryhmittäin kukkaistossa yhteisen kehdon sisällä (kopipilona). Heteet 5, yhdislehtisen terän torvessa kiinni, ponsillaan vartalon ympäri yhdistyneet. Hedelmä terän-alainen, yksisiemeninen, erkenemättömällä verholla kuorena (kuorusjyvä). Valkuaiseton. Tämä heimo jakautuu seuraaviin eri jakoihin:

1 jako. *Corymbiferae*. — Kukkaset joko kaikki pillimäisiä, taikka vaan kehrällä pillimäisiä, laidalla kielekkeisiä (sädekukkasia). Vartalo liereä, ei tursea, eikä nivelikäs. Seuraavilla eri parveilla:

1 parvi. *Senecioneæ*. — Vartalo 2:lla tasasoukalla, töyhtöpäisellä liuskalla.

Suvut: *Bidens*. *Chrysanthemum*. *Matricaria*. *Tripleurospermum*. *Anthemis*. *Achillea*. *Tanacetum*. *Artemisia*. *Ligularia*. *Arnica*. *Cineraria*. *Senecio*. *Gnaphalium*. *Antennaria*. *Filago*.

2 parvi. *Astereæ*. — Vartalo 2:lla tasasoukalla, ylemmätä lieminkäisellä liuskalla.

Suvut: *Inula*. *Aster*. *Erigeron*. *Solidago*.

3 parvi. *Eupatorieæ*. — Vartalo nuijamaisilla, ulkopuolelta nystypilkkuisilla liuskoilla.

Suvut: *Eupatorium*. *Petasites*. *Tussilago*.

2 jako. *Cynarocephalæ*. — Kukkaset (Suomen kasveissa) tasamukaisia, pillimäisiä. Vartalo luottia vasten turseampi eli paksumpi, hapsikiehkuralla ympärillään.

Suvut: *Centaurea*. *Saussurea*. *Carlina*. *Carduus*. *Cirsium*. *Lappa*.

3 jako. **Cichorieæ.** — Kaikki kukkaset täysineuvoisia, kielekkeisiä, tasahoikalla, nivelettömällä vartalolla.

Suvut: *Mulgedium. Sonchus. Lactuca. Lapsana. Tragopogon. Scorzonera. Picris. Crepis. Hieracium. Taraxacum. Leontodon. Hypochaeris.*

16 heimo. **DIPSACACEÆ** Juss. — Kukkasia ryhmässä yhteisellä marrolla kehdon sisällä (koppilona). Heteet 4, erillisiä, terän torvesta lähteviä. Erikukkaset kahdenkertaisella verholla, sisämäinen yhdistynyt 1-siemeniseen, lopulta pähkylämäiseen hedelmään.

Suvut: *Trichera. Succisa.*

17 heimo. **VALERIANACEÆ** Fr. — Kukat kehdomattomia. Heteet 5 tahi 3, harvoin ei niinkään monta, erillisiä. Sikiäin 3-pesäinen, vaikka 2 pesää välistä keskeytyy ja ainoastaan 1 siemen valmistuu. Luotteja 3 tahi 1.

Suvut: *Viburnum. Valeriana. Valerianella.*

18 heimo. **RUBIACEÆ** Juss. — Verho kiinnettynyt 2-pesäiseen sikiäimeen, usein näkymättömällä laiteella. Heteet tav. 4. Hedelmänä 2-kyhmyinen kaksoisjyväke, lähtevä puhkeamatta tahi 2-osaista.

Suvut: *Galium. Asperula.*

19 heimo. **CAPRIFOLIACEÆ** Juss. — Verho kiinnettynyt monipesäiseen sikiäimeen, joka valmistuu marjaksi tahi marjamaiseksi kodaksi.

Suvut: *Lonicera. Linnæa.*

## 6 luokka. — LÄPITERÄISIÄ.

Terä läpipohjainen, sikiäis-ympäröitsevä (ei päästä eikä alta lähtevä).

20 heimo. **CAMPANULACEÆ** Juss. — Verho tyvipuolelta kiinnettynyt sikiäimeen. Terä suunnallinen. Heteitä 5. Hedelmänä monipesäinen, monisiemeninen, keski-istukkainen kota.

Suvut: *Campanula. Jasione.*

21 heimo. **LOBELIACEÆ** Juss. — Terä vastakohtaisella laiteella. Heteet yhdistyneillä ponsilla. Muuten k. ed.

Suku: *Lobelia.*

22 heimo. **CONVOLVULACEÆ** Juss. — Verho erin sikiäimestä, sen alta lähtevä. Terä suunnallinen. Heteitä 5, harv. 4. Hedelmänä 2—3-pesäinen kota.

Suvut: *Convolvulus. Cuscuta.*

- 23 heimo. BORAGINACEÆ Juss. — Hedelmänä 4 pähkylää yhteisellä, eheällä vartalolla. Verho ja terä k. ed. Heteitä 5. Suvut: *Symphytum*. *Anchusa*. *Lycopsis*. *Myosotis*. *Lithospermum*. *Stenhammaria*. *Pulmonaria*. *Echium*. *Cynoglossum*. *Echinopspermum*. *Asperugo*.
- 24 heimo. LABIATÆ Juss. — Terä torvimainen, vastakohtaisella laiteella. Heteitä 4, harv. 2. Hedelmänä 4 pähkylää yhteisellä, päästä 2-haarisella vartalolla.
- 1 parvi. *Menthae*. — Terä suppilomainen 4—5:llä erisuurella, mutta melk. tasamukaisella liuskalla. Suvut: *Mentha*. *Lycopus*.
- 2 parvi. *Saturejineæ*. — Terä 2:lla litteällä huulella. Heteitä 4, erillisiä, toinen toistansa ulospäisiä. Suvut: *Origanum*. *Thymus*. *Calamintha*. *Clinopodium*.
- 3 parvi. *Scutellarieæ*. — Terä 2-huulinen, 4:llä yhtäsuuntaisella heteellä ylihuulen alla. Hedelmä-verho litteämaisesti umpipäinen. Suvut: *Scutellaria*. *Prunella*.
- 4 parvi. *Nepeteæ*. — Terä 2-huulinen. Heteet k. ed., ylemmät alemmaita pidemmät. Verho ei litteämainen. Suvut: *Nepeta*. *Glechoma*. *Dracocephalum*.
- 5 parvi. *Stachydeæ*. — Ylemmät heteet alemmaita lyhemmät, muuten k. ed. Suvut: *Betonica*. *Stachys*. *Leonurus*. *Galeopsis*. *Lamium*.
- 6 parvi. *Buguleæ*. — Terän ylihuuli näkymätön tahi pikurainen ja 2-halkoinen. Suku: *Ajuga*.
- 25 heimo. MENYANTHACEÆ Martius. — Terä suunnallisesti 5-liuskainen. Heteitä 5. Kota 1-pesäinen, 2-laitainen, keskilaitaisilla istukoilla. Suku: *Menyanthes*.
- 26 heimo. POLEMONIACEÆ Juss. — Terä ja heteet k. ed. Kota terän sisällä, 3-laitainen ja 3-pesäinen, keski-istukkainen. Suvut: *Polemonium*. *Diapensia*.

## 7 luokka. — TORVITERÄISIÄ.

Terä sikiäimen alta umpipohjaisena lähtevä.

- 27 heimo. OLEACEÆ Link. — Terä suunnallinen, 4-liuskainen, väl. puuttuva. Heteitä 2. Hedelmä 2-pesäinen, 1 t. 2 rippuvaa siementä kummassaki pesässä. Suku: *Fraxinus*.

- 28 heimo. ASCLEPIADACEÆ Juss. — Terä suunnallinen, liuskat poimissa kierteisiä. Heteitä 5, siitepöly yhtenä vahamaisena myhkynä. Luotteja 2. Hedelmänä 2 tuppiloo. Suku: *Cynanchum*.
- 29 heimo. GENTIANACEÆ Juss. — Terä k. ed. Kota 2-laitainen, liiteperäisellä istukalla, väl. 2-pesäinen laitareunain sisäänkääntymisestä. Suvut: *Gentiana*. *Erythræa*.
- 30 heimo. SOLANACEÆ Juss. — Terä suunnallinen, poimissa laskuinen. Heteitä 5. Hedelmänä 2-pesäinen kota tahi marja monella siemenellä ja väliseinäisellä istukalla. Suvut: *Solanum*. *Datura*. *Hyoscyamus*.
- 31 heimo. PERSONATÆ L. — Terä epämukaisesti liuskaisella laiteella. Heteitä 2 tahi 4, harv. 5. Hedelmänä 2-pesäinen kota väliseinäisellä istukalla, harv. 1-pesäinen laitaistukalla.
- 1 parvi. *Verbascæ*. — Ponnet 1-lokeroisia. Kota 2-pesäinen. Suvut: *Verbascum*. *Scrophularia*.
  - 2 parvi. *Antirrhinæ*. — Ponnet 2-lokeroisia ilman tyvilisäkkeitä. Kota 2-pesäinen. Suvut: *Linaria*. *Veronica*. *Limosella*.
  - 3 parvi. *Rhinanthæ*. — Ponnet 2-lokeroisia sukamaisilla tyvilisäkkeillä. Kota 2-pesäinen. Suvut: *Castilleja*. *Bartsia*. *Odontites*. *Euphrasia*. *Rhinanthus*. *Sceptrum*. *Pedicularis*. *Melampyrum*.
  - 4 parvi. *Orobanchæ*. — Ponnet 2-lokeroisia ilman selvittä lisäkkeitä. Kota 1-pesäinen. Suku: *Lathræa*.
- 32 heimo. UTRICULARIACEÆ Link. — Terä vastakohtainen 2-huulisella laiteella, kannusniekka. Heteitä 2. Kota 1-pesäinen irtonaisella istukalla. Suvut: *Utricularia*. *Pinguicula*.
- 33 heimo. PRIMULACEÆ L. — Terä suunnallisella laiteella. Heteet vastakkain liuskoja. Kota k. ed.
- 1 parvi. *Rotacæ*. — Lehtivartisia kasveja. Suvut: *Lysimachia*. *Naumburgia*. *Trientalis*. *Glaux*. *Samolus*.
  - 2 parvi. *Preciæ*. — Varrettomia kasveja juurakosta lähtevällä vanalla ja ruusukkeisillä lehdillä. Suvut: *Primula*. *Androsace*.
- 34 heimo. PLANTAGINACEÆ Juss. — Terä suunnallinen, 4-halkoinen. Heteitä 4 vuoroittain teräliuskein kanssa. Kota keski-



istukkainen, 2- tahi 4-pesäinen, harv. pähkylämäinen, 1-pesäinen ja 1-siemeninen.

Suvut: *Plantago*. *Littorella*.

- 35 heimo. PLUMBAGINACEÆ Juss. — Terä suunnallinen. Heteitä 5 vastakkain teräliuskoja. Kota 1-pesäinen, 1:llä keski-istukasta rippuvalla siemenellä.

Suku: *Armeria*.

## 2 jakso. — Pohjushetiöitä.

Terälehdet useampia, erillisiä. Heteet ynnä terälehtien kanssa istuvat erityisessä pohjuksessa. Pohjushetiöitä on kolmessa eri luokassa: *Pieluspohjaisia*, *Kantapohjaisia* ja *Pielipohjaisia*.

## 8 luokka. — PIELUSPOHJAISIA.

Heteet ja terälehdet lähtevät sikiäis-päällisen tahi -ympäroitsevän, kehrämäisen pieluksen reunasta.

- 36 heimo. CORNACEÆ DC. — Terälehdet 4, poimissa laitavieriset. Sikiäin 2-pesäinen, verhoikiinteinen ja kehrä-peitteinen, valmistuneena 2-pesäinen ja 2-siemeninen kivimarja.

Suku: *Cornus*.

- 37 heimo. UMBELLIFERÆ Juss. — Terälehdet 5, poimissa sisäkierteisiä. Heteitä 5. Sikiäin verho-peitteinen, yhteenkasvanut 2-sta, valmistuneena eriävästä jyväpuolikkaasta (kaksoishedelmys). Emiä 2.

- 1 parvi. *Campylospermæ* (Uurtoliitteisiä). — Jyväpuolikasten liitesivut pitkin-uurtaisia.

Suvut: *Conium*. *Myrrhis*. *Chærophyllum*. *Anthriscus*.

- 2 parvi. *Orthospermæ* (Tasaliitteisiä). — Jyväpuolikasten liitesivut litteitä.

Suvut: *Laserpitium*. *Heracleum*. *Pastinaca*. *Angelica*. *Peucedanum*. *Selinum*. *Cenolophium*. *Haloscias*. *Libanotis*. *Æthusa*. *Enanthe*. *Cicuta*. *Ægopodium*. *Carum*. *Pimpinella*. *Sium*. *Sanioula*.

- 38 heimo. ADOXACEÆ Meyer. — Terälehdet yhdiskantaisia, poimissa laitavierisiä. Heteitä kahta vertaa niin monta, kuin terälehteä, 1-lokeroisilla ponsilla. Sikiäin 4—5-pesäinen, puoliksi kehrä-peitteinen, valmistuneena marjainen kota, 1 siemen kussaki pesässä.

Suku: *Adoxa*.

- 39 heimo. ACERACEÆ DC. — Terälehdet poimissa paanutuita. Sikiäin irtonainen, 2—3-pesäinen, 2 siemenaihetta kus-

saki pesässä, valmistuneena siipihedelmä tahi nahkea kota.

Suku: *Acer*.

### 9 luokka. — KANTAPOHJAISIA.

Heteet ja terälehdet lähtevät sikiäimen ympäriltä tahi kannasta.

40 heimo. NYMPHÆACEÆ DC. — Kukka monilukuisilla, lehtipalhoisilla heteillä ja monikiehkuraisilla terälehdillä. Hedelmänä nahkea, monipesäinen, laita-istukkainen kota.

Suvut: *Nymphæa*. *Nuphar*.

41 heimo. RANUNCULACEÆ Juss. — Kehä yksipuolinen tahi kahdenkertainen vuorottaisilla, hedelmän valmistuessa menehtyvillä verho- ja terälehdillä. Heteet tav. monilukuiset. Hedelmänä monta erillistä, harv. yhdeksi, 1-pesäiseksi marjaksi yhdistynyttä hedelmystä.

1 parvi. *Ranunculeæ*. — Ponnet ulospäin sivuluomaisia; terälehdet mesikololla kynnessä. Hedelmykset pähkylämäisiä, lop. 1-siemenisiä.

Suvut: *Ranunculus*. *Batrachium*. *Ficaria*. *Myosurus*.

2 parvi. *Anemoneæ*. — Ponnet k. ed.; terälehdet mesikolottomia. Pähkylähedelmykset k. ed.

Suvut: *Thalictrum*. *Anemone*. *Pulsatilla*.

3 parvi. *Helleboreæ*. — Ponnet ed.; hedelmykset monisiemenisiä tuppiloita.

Suvut: *Caltha*. *Trollius*. *Aquilegia*. *Aconitum*. *Delphinium*.

4 parvi. *Pæonieæ*. — Ponnet sisäänpäin sivuluomaisia; Hedelmänä monisiemeniset tuppihedelmykset tahi marja.

Suvut: *Actæa*. *Pæonia*.

42 heimo. PAPAVERACEÆ Juss. — Kukat suunnallisella, 2-lehtisellä, lyhytaikuisella verholla ja 4-lehtisellä terällä. Heteet erilliset, monilukuiset. Kota 1-pesäinen vaillinaisilla välikelmuilla, tahi 2-pesäinen.

Suvut: *Papaver*. *Chelidonium*.

43 heimo. FUMARIACEÆ DC. — Verho 2-lehtinen, lyhytaikuinen. Terä vastakohtainen. Heteitä 6 kaksikuntaisina, ponnet 1-lokeroisia. Hedelmänä 1-pesäinen kota.

Suvut: *Corydalis*. *Fumaria*.

44 heimo. CRUCIFERÆ Juss. — Verho ja terä suunnallisia, 4-lehtisiä. Heteitä 6 nelivaltiaina. Lituhedelmä. Valkuaiseton.

Muist. — Keskeymisestä tahi muusta syystä taitaa terälehtiä ja 2 tahi 4-hedettä väl. puuttua ja litu tulla 1-pesäiseksi.

- 1 parvi. *Lomentæ*. — Nivellitu 2:lla tahi useammalla pesällä päällitysten, puhkeamatta variseva kokonaisina tahi osittain nivelissä.  
Suvut: *Bunias*. *Raphanus*. *Cakile*.
- 2 parvi. *Brassicæ*. — Litu pituuttaan halki puhkeava 2:lla laidalla; siemenet selällisen juurukan ympärillä, vastalaskuisilla sirkuksilla.  
Suvut: *Brassica*. *Eutrema*. *Sinapis*. *Melanosinapis*.
- 3 parvi. *Sisymbriæ*. — Litu k. ed.; sirkukset litteitä selällisellä juurukalla.  
Suvut: *Erysimum*. *Sisymbrium*. *Alliaria*. *Hesperis*.
- 4 parvi. *Arabidæ*. — Litu k. ed.; sirkukset litteitä laidallisella juurukalla.  
Suvut: *Dentaria*. *Cardamine*. *Arabis*. *Turritis*. *Barbarea*. *Nasturtium*.
- 5 parvi. *Nucamentæ*. — Litukka valmistuneena 1-pesäinen ja 1-siemeninen, pähkylämäinen.  
Suvut: *Isatis*. *Neslia*.
- 6 parvi. *Lepidineæ*. — Litukka 2-pesäinen soukalla välikelmulla.  
Suvut: *Lepidium*. *Capsella*. *Thlaspi*.
- 7 parvi. *Alyssineæ*. — Litukka 2-pesäinen leveällä välikelmulla.  
Suvut: *Camelina*. *Alyssum*. *Cochlearia*. *Draba*. *Subularia*.
- 45 heimo. POLYGALACEÆ Juss. — Verho ja terä vastakohtaisia. Heteet yhdispalhoisia, ponnet 1-lokeroisia. Kota 2-pesäinen, rippuva siemen kummassaki pesässä.  
Suku: *Polygala*.
- 46 heimo. BALSAMINACEÆ DC. — Verho ja terä vastakohtaisia. edellinen kannustettu. Heteet liiteponsisia. Kota 5-laitainen, joustavasti puhkeavilla laidoilla, keski-istukkainen. Valkuaiseton.  
Suku: *Impatiens*.

### 10 luokka. — PIELIPOHJAISIA.

Heteet lähtevät sikiäis-alaisesta, pilkkumaisesta tahi emipielisestä pohjuksesta.

- 47 heimo. TILIACEÆ Juss. — Verho poimissa laitavierinen, lyhyt-aikuinen; terälehdet paanutuita. Heteet monilukuisia, erillisiä. Hedelmänä monipesäinen, keski-istukkainen kota.  
Suku: *Tilia*.

- 48 heimo. **MALVACEÆ** Juss. — Verholehdet poimissa laitaviersiä; terälehdet limikierteisiä. Heteet monilukuisia, yhdispalhoisia. Hedelmykset useampia, kiehkuramaisesti yhteen kasvettuneet vartalon tyven ympäri. Valkuaiseton. Suku: *Malva*.
- 49 heimo. **GERANIACEÆ** DC. — Verholehdet poimissa paanuita; terälehdet k. ed. Heteet määrälukuisia (5 tahi 10, joista jälkimäisistä 3 tahi 5 väl. ovat ponnettomia), tyveltä yhdispalhoisia. Hedelmänä monipesäinen kota tahi 5 kiehkuroittain yhtynyttä hedelmystä.
- 1 parvi. *Geraniæ*. — Hedelmänä 5 kiehkuramaisesti yhtynyttä, valmistuneena eriävää hedelmystä vartaloillaan pitkän emi-odan päässä kiinni; valkuaiseton. Suvut: *Geranium*. *Erodium*.
- 2 parvi. *Oxalideæ*. — Heteitä 10; kota 5-pesäinen, keski-istukkainen; pesät monisiemenisiä. Suku: *Oxalis*.
- 3 parvi. *Lineæ*. — Heteitä 4—5; kota 8- eli 10-pesäinen yhtä monella välikelmulla, joista joka toinen vaillinainen; pesät 1-siemenisiä; valkuaiseton. Suku: *Limn.*
- 50 heimo. **HYPERICACEÆ** Juss. — Terä suunnallinen. Heteet monilukuisia, tyvestä 3- tahi 5-kimppuisia. Emit useamalla vartalolla. Kota 1- tahi monipesäinen, laitakelmuisilla istukoilla; pesät monisiemenisiä. Valkuaiseton. Suku: *Hypericum*.
- 51 heimo. **CISTACEÆ** DC. — Terä ed. Heteet monilukuisia, erillisiä. Vartalo 1. Kota 1-pesäinen keskilaitaisilla istukoilla tahi monipesäinen keski-istukoilla. Suku: *Helianthemum*.
- 52 heimo. **VIOLACEÆ** DC. — Terä vastakohtainen (kannustettu). Heteitä 5 miten milloinki liiteponsisia. Kota 1-pesäinen laita-istukoilla. Suku: *Viola*.
- 53 heimo. **DROSERACEÆ** DC. — Terä suunnallinen. Heteet määrälukuisia, 5 väl. useampia, erillisiä. Vartalot useampia. Kota 1- tahi vaillinaisesti monipesäinen laita-istukoilla. Suvut: *Parnassia*. *Drosera*.
- 54 heimo. **SILENACEÆ** Braun. — Verholehdet torvenmoisesti yhdistyneet, erillisillä (hampaamaisilla) päillä. Terälehdet tasamukaisia, pitkäkynsisä, ynnä kahdesti niin monen heteen kanssa kiinni emin-alaisessa, pitkättävässä poh-

juksessa (emipielissä). Kota 1:llä tahi useammalla vailinaisella pesällä, ylipuolelta irtonaisella keski-istukalla.

- 1 parvi. *Lychnideæ*. — Kota 3—5-laitainen ja niin monella vartalollaki.

Suvut: *Silene*. *Melandrium*. *Viscaria*. *Lychnis*. *Agrostemma*.

- 2 parvi. *Diantheæ*. — Kota 2-laitainen ja 2-vartaloinen.

Suvut: *Dianthus*. *Gypsophila*.

- 55 heimo. ALSINACEÆ Bartling. — Verholehdet erillisiä. Terälehdet tasamukaisia, lyhytkynsisiä, harv. kynnettömiä. Heteitä yhtä monta tahi kahta vertaa niin monta, kuin verholehtiäki. Kota k. ed. heimossa, mutta peräti irtonaisella istukalla.

- 1 parvi. *Stellarieæ*. — Kota puhkeava kahta vertaa niin monella hampaalla, kuin vartaloita on; apulehdittä.

Suvut: *Malachium*. *Stellaria*. *Cerastium*. *Arenaria*.

- 2 parvi. *Alsineæ*. — Kota yhtä monella laidalla, kuin vartaloitakin on; apulehdittä.

Suvut: *Halianthus*. *Alsine*. *Sagina*.

- 3 parvi. *Lepigoneæ*. — Kalvomaisilla apulehdillä.

Suvut: *Spergula*. *Lepigonum*.

- 56 heimo. ELATINACEÆ Juss. — Verho 3—5-halkoinen. Terä yhtä monilehtinen. Heteitä sama tahi kahdenkertainen luku. Sikiäin 3—5-pesäinen, keski-istukkainen. Valkuaiseton. Suku: *Elatine*.

### 3 jakso. — Verhohetiöitä.

Terälehdet erillisiä, lähtevät ynnä erillisten heteitten kanssa verhovaraisesta pohjuksesta. Kolmella eri luokalla *Nieluheteisiä*, *Pieluheteisiä* ja *Pohjaheteisiä*.

### 11 luokka. — NIELUHETEISIÄ.

Heteet lähtevät ohuen pohjuksen ylireunasta verhon nielussa.

- 57 heimo. CUCURBITACEÆ Juss. — Kukat erineuvoisia, tav. yhdistyneillä terälehdillä. Heteitä 5, osiksi yhdistyneet. Sikiäin 3—5-pesäinen, laita-istukkainen, valmistuneena kurkka- tahi marja-hedelmä.

Suku: *Bryonia*.

- 58 heimo. RIBESIACEÆ Reich. — Terälehdet ja heteet erillisiä, 4 eli 5. Sikiäin 1-pesäinen, valmistuneena marjahedelmä, 2:lla istukalla joka laidassa.

Suku: *Ribes*.

- 59 heimo. RHAMNACEÆ RBr. — Terälehdet ja heteet 4 t. 5

erillisiä, vastakkaisia. Hedelmänä 2—4-pesäinen luumarja 1-siemenisillä pesillä.

- 60 heimo. SAXIFRAGACEÆ Juss. — Verho miten milloinkin kiinnikasvettunut 2-laitaiseen, 1—2-pesäiseen sikiäimeen. Kota puhkeava 2:lla, vartalo-otaisella laidalla.

Suvut: *Saxifraga*. *Chrysosplenium*.

- 61 heimo. CRASSULACEÆ Juss. — Sikiäimet yhtä monta kun terälehdetki, valmistuneena 1-pesäisiä, monisiemenisiä, erillisiä tuppihedelmyksiä, jokainen omalla vartalollaan.

Suvut: *Rhodiola*. *Sedum*. *Bulliarda*.

- 62 heimo. LYTHRACEÆ Juss. — Verho yhdislehtinen, kellomainen tahi pikarimainen, hammaslaitainen. Kota irtonainen, monipesäinen, monisiemeninen, keski-istukkainen. Valkuaiseton.

Suvut: *Lythrum*. *Peplis*.

- 63 heimo. OENOTHERACEÆ Endl. — Verho suppilomainen, torvellaan kiinnittynyt monipesäisen sikiäimen ympärille. Hedelmänä 2—4-pesäinen, keski-istukkainen kota. Valkuaiseton.

Suvut: *Oenothera*. *Epilopium*. *Cirœa*.

- 64 heimo. HALORAGIDACEÆ RBr. — Verho kiinnittynyt 1-tahi monipesäisen sikiäimen ympärille. Terälehdet lyhytakuisia tahi puuttuvia. Hedelmänä yksi t. useampaa pähkylää (lohkohedelmystä), kuki 1:llä rippuvalla siemenellä.

Suvut: *Myriophyllum*. *Hippuris*.

## 12 luokka. — PIELUSHETEISIÄ.

Heteet renkaamaisesti tursuneen pohjuksen (pieluksen) ylireunassa kiinni.

- 65 heimo. POMACEÆ L. — Verholiuskat ja terälehdet 5, ruusumaisia. Heteitä 20 tahi useampiaki. Sikiäimiä 1 tahi useampia, kiinnikasvettuneet verhopohjaan ja ynnä sen kanssa valmistuvia omenahedelmäksi. Valkuaiseton.

Suvut: *Pyrus*. *Sorbus*. *Cratægus*. *Cotoneaster*.

- 66 heimo. ROSACEÆ Juss. — Kukat ruusumaisia. Sikiäimet useampia, erillisiä tahi vajouneet verhopohjaan, valmistuneina 1-tahi harvasiemenisiä, erillisiä hedelmyksiä. Valkuaiseton.

- 1 parvi. *Rosœ*. — Hedelmykset monilukuiset, möyheäksi ja marjamaiseksi valmistuvan verhotorven sisässä.

Suku: *Rosa*.

- 2 parvi. *Sanguisorbeæ*. — Hedelmukset harvalukuiset (1—4), lopulta kovettuvan verhon sisällä.  
Suvut: *Agrimonia*. *Sanguisorba*. *Alchemilla*.
- 3 parvi. *Dryadeæ*. — Hedelmukset monilukuisia, pähkylämäisiä, 1-siemenisiä, verhosta erillisellä pohjuksella.  
Suvut: *Rubus*. *Fragaria*. *Comarum*. *Potentilla*. *Sibbaldia*. *Geum*. *Dryas*.
- 4 parvi. *Spirææ*. — Hedelmukset 5—10, kotamaisia, monisiemenisiä, erillisiä.  
Suku: *Spiræa*.
- 67 heimo. DRUPACEÆ L. — Terä ruusumainen. Sikiäin irtonainen, kukan-päällinen, valmistuneena 1-kivinen marja.  
Suku: *Prunus*.
- 68 heimo. PAPILIONACEÆ L. — Terä vastakohtainen, hernekukkahinen. Palkohedelmä. Valkuaiseton.
- 1 parvi. *Vicieæ*. — Heteitä 9 yhdessä, 1 erillinen (kaksikuntaisia); palko toisesta liitteestänsä puhkeava, 1-pesäinen; sirkukset paksuja, melk. pallopuolikkaisia. — Varsilehdet tasaparisia, suka- tahi kärhipäättöisiä.  
Suvut: *Lathyrus*. *Orobis*. *Vicia*. *Ervum*.
- 2 parvi. *Hedysareæ*. — Heteet kaksikuntaisia; palko variseva kokonaisna tahi nivelittain (nivelpalko). — Varsilehdet päätöparisia.  
Suku: *Hedysarum*.
- 3 parvi. *Astragaleæ*. — Heteet ed.; palko toisesta liitteestänsä sisään kääntynyt, melk. 2-pesäinen, pitkin puhkeava. — Lehdet k. ed. parvessa.  
Suvut: *Phaca*. *Oxytropis*. *Astragalus*.
- 4 parvi. *Trifolieæ*. — Heteet k. ed.; palko 1-pesäinen; sirkukset ohuita. — Varsilehdet 3-sormisia.  
Suvut: *Lotus*. *Medicago*. *Melilotus*. *Trifolium*.
- 5 parvi. *Genisteæ*. — Heteet yksikuntaisia; palko ja sirkukset k. ed. parvessa. — Varsilehdet 3-sormisia tahi keskeymisestä jaottomia.  
Suvut: *Ononis*. *Anthyllis*.

### 13 luokka. — POHJAHETEISIÄ.

Heteet lähtevät pilkkumaisesta tahi näkymättömästä pohjuksesta verhopohjassa.

- 69 heimo. ERICACEÆ Juss. — Kukat täysineuvoisia. Terä miten milloinkin yhdis- tahi erilehtinen. Hedelmänä monipesäinen, keski-istukkainen, monisiemeninen kota tahi marja; vartalo yksikertainen.

- 1 parvi. *Vaccinieæ*. — Hedelmä verhopohjan peitteessä, kukan-alainen.

Suvut: *Myrtillus*. *Vaccinium*. *Oxycoccus*.

- 2 parvi. *Ericææ*. — Hedelmä irtonainen, kukan-päällinen. Siemenet vaipattomia.

Suvut: *Arctostaphylos*. *Andromeda*. *Cassandra*. *Calluna*. *Phyllodoce*. *Azalea*. *Rhododendron*. *Ledum*.

- 3 parvi. *Pyroleæ*. — Hedelmä ed. Siemenet pitkulaisella vaipalla.

Suvut: *Pyrola*. *Monotropa*.

- 70 heimo. EMPETRACEÆ Nutt. — Kukat erineuvoisia. Kehä-osat ja heteet 3-lukuisia. Sikiäin irtonainen, (3-) 9-pesäinen, valmistuva niin monisiemeniseksi marjaksiki.

Suku: *Empetrum*.

- 71 heimo. EUPHORBIACEÆ Juss. — Sikiäin irtonainen, 2—3-pesäinen, keski-istukkainen, valmistuva 2—3-kyhmyiseksi kodaksi, puhkeava yhtä monella laidalla. Siemenet rip-puvia, 1—2 kussaki pesässä.

Suvut: *Euphorbia*. *Mercurialis*.

- 72 heimo. PORTULACACEÆ Juss. — Verho tav. 2-lehtinen. Hedelmänä 1-pesäinen, monisiemeninen, keski-istukkainen kota.

Suku: *Montia*.

- 73 heimo. PARONYCHIACEÆ DC. — Verho 5-jakoinen tahi 5-liuskainen. Vartaloita 2—3. Hedelmänä 1-pesäinen, keski-istukkainen, 1-siemeninen kota.

Suvut: *Herniaria*. *Scleranthus*.

- 74 heimo. POLYGONACEÆ Juss. — Kehä 3—6-jakoinen. Hedelmänä pähkylämäinen, kalvopalteinen tahi kalvoton, 1-siemeninen jyväke.

Suvut: *Polygonum*. *Rumex*. *Oxyria*. *Koenigia*.

#### 4 jakso. — Wajakukkioita.

Kukat vaillinaisia, pohjuksettomia ja sikäli terälehdeittämiäki, ainoastaan yksikertaisella, suomalaisella tahi senkaltaisella kuvulla.

#### 14 luokka. — SUOJUSKUKKAISIA.

Kupu monella, kiehkuroittain yhdistyneellä lehdellä.

- 75 heimo. THYMELEACEÆ Juss. — Kupu torvellinen, poimissa paanuttu. Heteet kahta vertaa useampia, kun kupuliuskat, lähtevät kuvun torvesta. Sikiäin irtonainen, kuvunsisäinen, 1-pesäinen, rippusiemeninen.

Suku: *Daphne*.



- 76 heimo. ELÆAGNACEÆ RBr. — Kupu ed. poimissa paanuttu. Heteet istuvat nielussa. Sikiäin irtonainen, valmistuneena kivimarjan tapainen, mehevän kuvun ja pähkylämäisen, 1-siemenisen hedelmän yhteen kasvettumisesta. Suku: *Hippophaë*.
- 77 heimo. ULMACEÆ Agardh. — Kukat täysineuvoisia. Sikiäin irtonainen, 2-vartaloinen, valmistuneena 1-pesäinen, 1-siemeninen, litteä siipihedelmä. Suku: *Ulmus*.
- 78 heimo. URTICACEÆ Juss. — Kukat erineuvoisia, 1-vartalaisia. Hedelmä pähkylämäinen, 1-siemeninen. Suvut: *Humulus*. *Urtica*.
- 79 heimo. CHENOPODIACEÆ Juss. — Kupu ruohomainen, verhoomainen. Heteet kuvun pohjasta lähteviä. Hedelmänä kalvomainen, 1-siemeninen, puhkeamatta variseva rakkojyväke. Suvut: *Atriplex*. *Blitum*. *Chenopodium*. *Salsola*. *Salicornia*.

### 15 luokka. — NORKKOKUKKAISIA.

Kukat erineuvoisia, yhdistyneet norkoksi, suomalaisella t. senkaltaisella kehällä t. kuvulla.

- 80 heimo. CUPULIFERÆ Rich. — Kukat yksikotisia. Emikukan kehä yhteen kasvettunut 2—6-pesäisen sikiäimen kanssa. Hedelmä valmistuneena keskeymisestä 1-pesäisen, 1-siemeninen pähkinä, yltä yleensä t. pohjallaan norkkosuomuista muodostuneen kehtokannan sisäinen. Valkuaiseton. Suvut: *Quercus*. *Corylus*.
- 81 heimo. SALICACEÆ Rich. — Kaksikotisia. Norkot t. palmut limittäisillä, yksikertaisilla suomuilla, nysterömäisellä t. tuuttimaisella kehä-aiheella välikulmissaan. Hedelmänä 1-pesäinen, 2-laitainen, laita-istukkainen kota, monilukuisilla, tupsupäisillä siemenillä. Valkuaiseton. Suvut: *Populus*. *Salix*.
- 82 heimo. BETULACEÆ Rich. — Yksikotisia. Hedenorkot yhdistyneillä, kilpimäisillä, 1—3-kukallisilla suomuilla. Emi-norkot kehättömillä suomuilla. Sikiäin 2-pesäinen ja 2-siemeninen. Hedelmä kalvopalteinen t. pähkylämäinen, puhkeamatta variseva. Valkuaiseton. Suvut: *Betula*. *Alnus*.
- 83 heimo. MYRICACEÆ Rich. — Norkot yksikertaisilla suomuilla.

Eminorkot pienoisilla suomukkeilla kehä-aiheena. Käpy-hedelmä pienoisilla, 1-siemenisillä kivimarjakkeilla.

Suku: *Myrica*.

84 heimo. CONIFERÆ Juss. — Hedekukat kehättöminä norkkoina t. ryhminä. Emikukat ryhmissä t. yksinäisiä, lop. suomuiseina t. marjamaiseina käpynä yksinäisillä, paljailla siemenillä. — Havupuita.

Suvut: *Pinus*. *Juniperus*. *Taxus*.

## 16 luokka. — KEHÄTTÖMIÄ.

Kukat kehättömiä ja perättömiä lehtihangoissa.

85 heimo. CALLITRICHACEÆ Link. — Heteitä 1. Sikiäin 4-kyhmyinen ja 2-pesäinen, 1:llä siemenellä joka pesässä, 2-vartaloinen.

Suku: *Callitriche*.

86 heimo. CERATOPHYLLACEÆ DC. — Ponnet 12—16, 2-loke-roisia, palhottomia, monilehtisen varuksen sisällä. Sikiäin 1-siemeninen, valmistuneena pähkylämäinen. Vartalo 1. Valkuaiseton.

Suku: *Ceratophyllum*.

# B. — SIRKATTOMIA.

Näillä kasveilla ei ole varsinaisia siemeniä, ainoastaan *itiöitä* (sporæ), jotka eivät idä sirkalehdillä tahi tavallisella alkiolla eli iteellä. Siitä syystä niitä myöski sanotaan **Itiökasveiksi** (Sporophytæ). Koska niillä ei ole ilmeisiä siittimiä, ei heteitä eikä emiä, ovat ne jo aikoja sitte **Salasiittiöin** nimelläki tunnetut. **Solukkoisiksi** (Plantæ cellulares) nimitetään niitä, kun niiden aine, paitsi juuri muutamissa, on pelkkää solukkoa ilman nestimittä.

## III. — ERIVARTISIA.

Joilla on eri juuri ja varsikko, jälkimäinen lehditetty tahi itse lehtimäinen ja vehreä (varsikkolehti).

## 17 luokka. — SANIKKAISIA.

Selvillä nestimillä; erottamattomilla t. epäselvillä siittimillä.

87 heimo. EQUISETACEÆ DC. — Lehdettömiä. Latvassa tähkämäinen hedelmälaite kiehkuroittain seisovilla, kilpimäisillä suomuilla joiden aluspuolella itiöpesäkkeet tavataan mo-

nilukuisilla itiöillä, joista jokaisella on 2 köynnöskier-  
teistä joustinta keskikohdaltaan itiössä kiinni.

Suku: *Equisetum*.

- 88 heimo. POLYPODIACEÆ RBr. — Varsikkolehdet silmikossa  
käppyrämaisesti vastakierteisiä; pesäryhmät niiden alus-  
t. ulkopuolella, harv. laidassa; itiöpesäkkeet joustavalla  
renkaalla ympärillään.

Suvut: *Polypodium*. *Woodsia*. *Aspidium*. *Polystichum*. *Cy-  
stopteris*. *Asplenium*. *Pteris*. *Struthiopteris*. *Allosorus*. *Blechnum*.

- 89 heimo. OPHIOGLOSSACEÆ RBr. — Varsikkolehdet alusta suo-  
ria; hedelmä-laite yksi- t. toiskertaisessa tähkässä; itiö-  
pesäkkeet renkaattomia.

Suvut: *Botrychium*. *Ophioglossum*.

- 90 heimo. ISOËTACEÆ Rich. — Lehdet kiehkuramaisessa kim-  
pussa, äimämaisiiä; itiöpesäkkeet lehtien kannoissa, kah-  
denlaisia: toiset hienommilla, toiset järeämmillä itiöillä.

Suku: *Isoetes*.

- 91 heimo. LYCOPODIACEÆ Sw. — Varsikasveja yksikertaisilla,  
litteillä, limittäisillä lehdillä; itiöpesäkkeet lehtien t. täh-  
käsuomuin hangassa, poikkiluomaisesti puhkeavia.

Suvut: *Lycopodium*. *Selaginella*.

- 18 luokka. SAMMALKASVEJA. — Aine solukkainen, ai-  
noastaan merkiksi nestimiä; siittimet kahdenlaisia: pon-  
sikoita ja itiösikiäimiä.

## IV. — SEKOVARTISIA.

Juuri, varsi ja lehdet seoin, erottamattomia, harvoin vehreitä.

- 19 luokka. LEVIÄ. — Kasvullinen rakento — juuri, varsi ja  
lehdet yhdistettyinä — täydellisemmästi muodostunut, kun  
hedelmä-laite; elävät vedessä ja ottavat siitä ravintonsa.

- 20 luokka. JÄKÄLIÄ. — Kasvullinen rakento k. ed. he-  
delmällistä kohtaan voittopuolella; kasvavat kallioilla,  
kiveillä, puilla, seinillä, harv. maan päällä ja ottavat ra-  
vintonsa ilmasta.

- 21 luokka. SIENIÄ. — Hedelmä-laite voiton päällä kas-  
vullista rakentoa kohtaan; elävät siitä pilaantuneesta,  
mätänävästä aineesta, jonka varassa ovat siinneet ja kas-  
vavat; solukat lehtivehreättömiä.

# SUOMEN KASVIO

luontais-järestössä.

## I. — YKSISIRKKAISIA.

1 heimo. — GRAMINEÆ. Heinäkasveja.

1 jako. — *Clisantheæ*.

1 parvi. — *Nardeæ*.

NARDUS L. Ufonparta. Ängsborst.

N. stricta L. — Tähkä sukamainen, kalju, yhdäppäinen.  
— 2 7.

Kost. niit. tav. (E.—L. Lv.) *Tönkeä, sitkeä, vaikea-niittoinen, sukamainen heinä; juurakko lyhyt kimputuilla lisäjuurilla.*

2 parvi. — *Phalarideæ*.

ANTHOXANTHUM L. Simafe. Vårbrodd.

A. odoratum L. — Röyhy kaita, tähkämäinen t. suikea; neuvottomat sivukukat pyöreämäisiä, tylppäpäisiä, pitkällä selkävihneellä. — 2 5, 6.

Niit. tav. (E.—L. Lv.) *Hyvähajuinen heinä; röyhy lop. keltankiiltävä, väl. isompi ja epätasaisesti ryhminen.*

Muist. — Sangen hyvä ruoho hakamaissa etenki keväällä. Niituilla se on varhain niitettävä, muuten kuihtuu; eikä eläimet myöhemmin siitä huolikkaan. Kylöheinänsä siis on paras sekoittaa se varhaisiin keväkasveihin, jos ei tahdota peräti erinään kylvää.

HIEROCHLOË Gmel. Maarianheinä. Myskegräs.

H. australis RS. Eteläinen maarianheinä. — Röyhy vähän lojottava, haarat kaljuja, paitsi juuri munanmoisten tähkyläin alipuoella karheakarvaisia; helpeet karvalaitaisia, keski-

mäisessä kukassa käyrä selkävihne, alisessa lyhyt niskavihne; lehdet litteitä, kortta leveämmät. — 24 5, 6.

Varjoisilla niit. harv. (T.—K. St. H.) *Aluslehdet pidempiä, yli linjan levyisiä.*

H. borealis RS. Hyvänhajuinen maarianheinä. — Röyhy lojottava, haarat ylt'ylä kaljuja; tähkylät munanmoisia; helpeet karvalaitaisia, vihneettömiä, t. hyvin lyhyellä latvavihneellä; lehdet litteitä, kaksin kortta leveämmät. — 24 5—7. —  $\beta$  firma Nyl.: kukissa lyhyt niskavihne, lehtitupet karheita.

Kosteilla niit. (E.—L. Lv.;  $\beta$  K.) *Hyvänhajuinen heinä ruskeankeltaisilla, kiiltävillä, 2:n linjan pituisilla tähkylöillä, suikertavalla juurella.* — H. odorata Wg. *Holcus odoratus* L.

H. alpina RS. Eapin maarianheinä. — Röyhy suppea, haarat ylt'ylä kaljuja; tähkylät nuorempina pitkulaisia; kumpikin alinen kukka karvalaitainen ulottavalla, polvisella selkävihneellä; lehdet kortta leveämmät. — 24 7, 8.

Tunturitien. harv. (L. Lv.) *Vesalehdet m. rihmamaisia.* — Aira Liljebl. *Holcus* Sv. B.

### DIGRAPHIS Trin. Helpi. Rörflen.

D. arundinacea Trin. — Röyhy kukkiessa avonainen, haarat tiheätähkylöisiä; neuvottomat kukat suomumaisia, pitkäkarvaisia. — 24 7, 8.

Rant. tav. (E.—L. Lv.) 2—3:n kyynärän pituinen, leveä-lehtinen, punerva-röyhyinen heinä. — *Phalaris* L. *Arundo colorata* Sv. B. *Balclutha* Fl. Wett.

### 3 parvi. — Alopecureæ.

PHLEUM L. Tähtäheinä, tähtiö. Timotejgräs.

Phl. alpinum L. Tunturitähtiö. — Tähtä soikea — pitkulainen, liereä; vihne m. poikkipäisen kaleensa pituinen; ylinen lehtituppi pullakka. — 24 7.

Tunturikasvi yl. (Sp. Kp. P.—L. Lv.) *Tähtä lyhempi, mutta paksumpi k. seur., toisinteleava palleroisena ja liereänä, punasinerä; vihne aina karkeahko, harvoin vaan on siinä muutamia karvoja tyvellä.*

Phl. pratense L. Nurmitähtiö. — Tähtä liereä; kaleet poikkipäisiä, karvaselkäisiä; vihne tav. paljon lyhempi kun itse kale; ylinen lehtituppi liereä. — 24 5, 7.

Niit. tav. (E.—P.) 2—5:n vaaksan pituinen, vehreällä m. sormenpituisella tähkällä; mutta kuivissa paikoissa matalampi-kor-

sinen, 1—1½:n tuuman pituisella tähkällä, ja silloin useammin juurimukulalla.

Muist. — Kylv. parhaiten alanko-niittuihin, maan valmistettua sitä ennen m. kuin pelto. Palkitsee hyvin viljeliän kustannukset. Siemenet koota helpommat kun muiden heinälaajien. Joutuvat elokuussa, ja kootaan heinän leikkaamalla ja tappamalla kuin muidenki laihoihin. Puhdistetaan sitte seulomisella, ja kylvetään joko yksin tahi ynnä syys- tahi kevät-touvon kanssa (harvaltaan) 15—20 naulaa tynnyrin alalle. Jyrällä silitellään siten ensin äestetty pelto. Kylväminen käy myös laatuun sannaan seassa.

### ALOPECURUS L. Puntarpää. Ängskafle.

A. geniculatus L. Polvi-puntarpää. — Tähkä liereä, tylppäpäisehkö; kaleet vaan kannalta yhdistyneet, tylppäpäiset, karvaselkäiset, kukan pituiset; korsi tyveltä koheneva, t. epärento; juuri hapsinen, monivuotinen. — 24 6, 7. —  $\beta$  fulvus Sm.: ponnet kellervii; vihne tähkylä-sisäinen t. helvettä vähän pidempi.

Vet. paik. yl.;  $\beta$  tav. vedessä. (E. — L. Lv.) *Tähkä tav. hiirenkarvainen, ponnet vaaleankeltaisia, lop. ruskeita;  $\beta$ :n tähkä vehreänkeltainen, korsi rennompi.*

A. pratensis L. Nurmi-puntarpää. — Tähkä liereä, tylppäpäinen; kaleet yhdessä keskustaan asti, suippoja, höyteä, kukkaa pidemmät; korsi pysty; juurakko monivuotinen. — 24 6, 7. —  $\beta$  nigrescens Ands.: korsi ja lehdet sinivihertäviä; lehtitupit pullakoita. —  $\gamma$  nigricans Horn.: juurakko laajasti suikertava, erinäisillä lehtivesoilla; tähkä lop. musteneva; vihne tähkylän sisäinen.

Kost. niit. (E. — Pc. S. K.;  $\beta$  L. Lv.;  $\gamma$  A. — U. P. Lv.) *Tähkä pehmeän höyteä, usein sormenpituinen,  $\beta$ :n m. kahta lyhempi. — Toisintee pidemmällä tahi lyhemmällä kukkavihneellä.*

Muist. — Hyvä heinälaaji; kylv. parhaiten alankoon hyvään maanlaatuun. Taidetaan niittää varhain ja useamman kerran yhtenä kesänä ja on ehkä paras kaikista kotimaan heinälajeista. Se säilyy heinämadoiltaki, kun muita turmelevat. Hevoiset sitä vanhempana ei mieluisesti syö, pitää siis nuorena niitetämän rehuksi, ennenkun on kypsyttänyt siemenensä, joiden koamiseksi jätetään eri muru.

### 4 parvi. — *Sesleria*.

SESLERIA Scop. Eupiffa. Elfexing.

S. cœrulea Ard. — Tähkä munanmoinen — pitkänpyöreä; täh-

kylät 2—3-kukkahisia, ulkohelpeen latvassa 2—4 lyhyttä vihnettä; lehdet litteitä. — 24 4, 5.

Kost. niit. harv. (A.) *Tähkä pähkinän-kokoinen, sininen, harv. vaaleankeltainen.* — *Cynosurus* L.

#### 5 parvi. — *Paniceæ*.

SETARIA PB. Pantahheinä. Kafvelhirs.

*S. viridis* PB. — Röyhy tähkämäinen, m. liereä; varussu-kaset karheita ylöspäisistä piikeistä. — 7, 8.

Viljelömaissa harv. (U. S. Ke.) *Tähkä vehreä.*

### 2 jako. — *Eyryanthæ*.

#### 1 parvi. — *Agrostideæ*.

MÜHLENBERGIA Schreb. Hajuheinä.

*M. pendula* Trin. — Röyhyssä pitkäveteiset, yhtäällisesti nuokkuvat haarat; lehdet leveitä, liereä-tupellisia, kieleke pitkä-veteinen. — 24 7, 8.

Varj. harv. (U. H. S.) 2—3 jalan pituinen heinä; röyhy 1—2-vaaksainen, ruohonpäinen; lehdet 5—7 linjan levyiset; hyvähajui-nen niinkuin *Milium* ja *Anthoxanthum*. — *Agrostis suaveolens* Blytt. *Blyttia* Fr. *Cinna expansa* Link.

#### MILIUM L. Tsemä. Amur.

*M. effusum* L. — Röyhy iso, lojottava, haarat veltoja, harvakukkahisia, kaljuja; tähkylät munanmoisia; korsi ja lehtitu-pet kaljuja. — 24 7.

Leht. (E. — L. Lv.) 3—4 jalan pituinen, leveälehtinen, hy-vähajui-nen heinä.

Muist. — Kylv. parahiten metsäniituille. Parhaimpia hei-nälajeja, vaan unohdettu niittuviljennössä, kenties sentähden, ettei menesty hyvin aukeilla, kun vaatii varjoa tarpeeksensa.

#### AGROSTIS L. Rööfi. Ängshven.

† Kukassa ainoastaan ulkohelve; sisämäinen vähän t. ei ollenkaan valmistunut: *Trichodium* Mchx.

*A. canina* L. Roröfi. — Röyhy nuorempa velto, ennen ja jälkeen kukkimista supistunut, haarat pitkäveteisiä, karheita ja mo-nikukkahisia; kukilla tav. käyrä selkävihne; aluslehdet rihma-maisia, vastalaskuisia. — 24 6, 7.

Kost. niit. ja lait. tav. (E. — L. Lv.) Röyhy ruskea, var-jopaikoissa väl. keltainen: toisinto pallida.

*A. rubra* Wg. Ruskea rölli. — Röyhy pysty, pidempien alisten haarain takia leveän keilamainen, kukkimisen jälkeen ei supistunut, tav. karhea-haarainen; kukilla käyrä selkävihne; aluslehdet korsilehtiä kaidemmat. — 2 7, 8.

Tunturikasvi kost. paik. (P. L. Lv.) *Jalanpituinen*; röyhy avoin, hiirenkarvainen; aluslehdet leveämmät ja litteämmät kun edell.; tähkylät epäkokoisia. — *A. borealis* Hn. *A. alpina* Wg. *Fl. L.* (eri toisintelo).

†† Kukka kahdella täydellisellä helpeellä: *Vilfa* PB.

*A. vulgaris* With. Turmirölli. — Röyhy harv. lojottava, pidempien keskihaarain takia munanmoinen, kukkimisen jälkeenki yhtä avonainen; kaikki lehdet litteitä, kieleke lyhyt, typäkkä. — 2 6, 7.

Niit. tav. (E. — L. Lv.) *Röyhy* tav. ryhevä, sen sirottavat haarat ja haarukat kaljuja t. karheahkoita; tähkylät hyvin vähäisiä. Sekä tällä että seuraavalla on tav. suikertavia lehtivesoja tyvellä. — *A. stolonifera* α *L. FL. Sv. A. rubra* Wg. *Fl. Ups.*

*A. stolonifera* L. Rönnsyrölli. — Röyhy alisten, pitkäveisteisten haarojen takia leveän keilamainen, kukkimisen jälkeen supistunut; kaikki lehdet litteitä pitkäveiteisellä, pitkulaisella kielekkeellä. — 2 6, 7.

Kost. niit., merenrant. tav. (E. — L. Lv.) *Röyhyn haarat* tav. karheita; paljon toisinteleva. — *A. alba* L. *Sp. pl.*

APERÄ Adans. Suohp. Åkerhven.

*A. spica-venti* PB. — Röyhy ryhevän lojottava, nuokah-tava; vihne monin kerroin helvettä pidempi; ponnet tasakaitaiset, pitkulaiset. — ☉ 7.

Pelt. tav. (E. — P.) *Röyhy iso, vaalean-vehreä, harv. ruskea.* — *Agrostis L.*

Muist. — Kasvaa rikkaruohona laihoissa, kun on pelto kehnosti ruokottu. Kukkaröyhyllä painetaan villaisia vehreäksi, kun painettava ensin peitotaan aluna-vedessä ja sitte keitetään puhtaassa.

CALAMAGROSTIS Roth. Rastiffa. Rörhven.

† Vihne lähtee helpeen tyvipuolelta ja on keskeltä käyrä: *Dejeuxia* PB.

*C. arundinacea* Roth. Mhdefastiffa. — Röyhy pysty, avonainen; kaleet suikeita, suipukoita; kukkavihne ulottava paljon yli kaletten; pohjuksen karvat ulottavia kukan keskustaan. — 2 6.

Kivikkomäissä, tav. (E. — P.) 3—4 jalan pituinen, tönkeä heinä. — *Agrostis L. Arundo* Wg. *C. sylvatica* DC., *H. M. F.*



Muist. — Kylv. eduin kivimäkiin; antaa nuorena hyvää rehua. Mukava piipunpuhdistimeksi.

*C. lapponica* Hn. *Epinfästiffa*. — Röyhy tav. kaita, m. tähkämäinen, pysty; kaleet suikeita, tylppäpäisiä t. lyhytnirkkoja, pidemmät helpaita karvoineen; vihne ja karvat helpeen pituisia t. vähän pidempiä. — 24 7, 8.

Tunturitien. (P. L. Lv.) *Röyhy tuskin sormenpaksuinen, punasinervä, m. kahta isommilla tähkylillä kun seur.; vihne vähemmän käyrä kun muiden osakuntaistensa.*

*C. chalybea* Fr. *Metjäfästiffa*. — Röyhy pysty, avonainen; kaleet leveän suikeita, suippoja, vihneen pituiset, ei paljon kukkaa pidemmät; karvat helpaita lyhemmät. — 24 6, 7.

Kuiv. paik. harv. (Lv.) *Tähkylät vehreän ja ruskean pilkulliset, pienemmät, kun muiden osakuntaistensa; toinen kale vähän pidempi, toinen hiukka lyhempi helpaita, molemmat suippoja, odatomia.* — *Arundo sylvatica*  $\beta$  *Wg.*

†† Vihne suora, helpeen selästä t. niskasta lähtevä.

*C. stricta* Hn. *Suhtafästiffa*. — Röyhy pysty, haarat kukkiessa m. uloskohtaiset, lyhyet; kaleet suikeita, lyhyen suippoja; vihne helpeen pituinen t. vähän pidempi, keskustan alpuolelta lähtevä; karvat helvettä lyhemmät; korsi m. kalju. — 24 6, 7. —  $\beta$  *elatio* Hn.: kahta pidempi, röyhy iso, veltohko.

Kost. niit.;  $\beta$  ruoh. rant. (E. — L. Lv.;  $\beta$  P.) 2—4 vaaksan pit. heinä; röyhy kapea, hiirenkarvainen; lehdet soukkia, pian kipertyviä; korsi väl. karhea ylempätä. — *Arundo stricta* *Timm.* *C. neglecta* *Ehrh., Fr.*

*C. strigosa* Hn. *Sinermöfästiffa*. — Röyhy pysty, soukka ja tiheä, hyvin karheahaarainen; kaleet pitkäsuiippoisia; vihne ja karvat ed.; korsi ylempää karhea. — 24 7, 8.

Rant. harv. (L. Lv.) *On edellisen muotoinen, mutta röyhyn haarat paljon karheampia ja kaleet suiippoisempia; karvat ulottavina yli puolen helvettä, väl. yleemmäksi.*

*C. Halleriana* DC. *Sörmäfästiffa*. — Röyhy lojottava, veltohko ja harsea; kaleet suikeita, nirkkoja; vihne helpeen keskustasta, kukan pituinen niinkuin karvatki, t. vähän pidempi; lehdet soukkia (1  $\frac{1}{3}$ —3-linj.). — 24 7.

Kost. niit., rant. harv. (U. K. Kv. Lv.) *Ei paljon seur. lajista erimnoinen, kuitenkin vähemmällä röhyllä ja tähkylillä; lehdet soukkempia; väl. niin C. lanceolata'n muotoinen, että vihne on pian ainoana erotuksena.* — *C. pseudophragmites*  $\beta$  *Reich.* *C. pulchella* *Bl. N. Fl.*

*C. phragmitoides* Hn. *Suotofästiffa*. — Röyhy lojottava, latvoin nuokkuva; kaleet suikeita, pitkänirkkoja; vihne päästä

2-halkoisten helvetten pituinen t. vähän pidempi, milloin selästä, milloin niskasta t. latvasta lähtevä; karvat helpeen pituisia, kaleita lyhemmät; lehdet leveitä (3—5-linj.). — 2½ 7, 8.

Vuorimaissa j. n. e. (U. St. — L. Lv.) *Iso heinä*; röyhy runsas, ruskean-sinervä, m. 2 linjan pituisilla tähkylöillä, levein lehtineen m. *Phragmites*'en näköinen.

*C. epigeios* Roth. Maafastiffa. — Röyhy pysty; tähkylät tav. ryhmin tönkeitten haarain ulkosivulla; kaleet kaitaissuikeita, äimäkärkisiä; vihne helpeen selässä, lyhempi kun helpeitä pidemmät karvat; korsi tav. karhea. — 2½ 7.

Kuiv. paik. (E. — L. Lv.) *Tönkeä heinä*; röyhy ruskea t. harmaapilkullinen.

††† Latvavihneinen.

*C. lanceolata* Roth. Rehtifastiffa. — Röyhy lojottava, nuokahtava; kaleet suikeita, nirkkoja; ulkohelve hyvin lyhyellä vihneellä latvaliuskainsa välissä t. rahtu alempana; karvat pidemmät sekä helpeitä että vihnettä. — 2½ 7.

Kost. rantatien. yl. (E. — L. Lv.) *Lauhea heinä*; röyhy ed.; korsi alisista lehtihangoista haarova; vihne m. näkymätön, ei koskaan päälle ¼ helpeen pituudesta.

(*C. phragmitoides*).

#### PHRAGMITES Trin. Ruoto. Vass.

*Phr. communis* Trin. — Röyhy iso, siirottava t. lojottava; tähkylät 3—6-kukkahisia; lehdet m. suikeita. — 2½ 7, 8.

Rant., väl. kost. pelt. tav. (E. — L. Lv.) 3—4 kyynärän pituinen heinä, korsi pillimäinen, lehdet sormenleuyisiä; kuivissa paik. paljon matalampi. — *Arundo phragmites* L.

Muist. — Heti jälkeen heinänteon leikattuna on se maukas pehku lehmille, jotka siitä lypsävät hyvin. Sovelias katoksiksi, matoiksi, j. n. e. Kukkaröyhy nuorena, kun on ruskea, kootuna painaa vehreäksi. Röyhyjä sopii myös talvittuneina jäiltä koota ja käyttää makaus-alusten täytteeksi. Ist. siemenillä savisotkoon sekoitetuilla, tahi myös juurilla järviin ja jokiin heitettyillä.

#### 2 parvi. — *Aveneæ*.

##### MELICA L. Helmiffä. Slokgräs.

*M. nutans* L. — Tähkylät yhtäällisessä, nuokkuvassa rypäleessä, 2-lla kaljulla kukalla ja aiheella 3:nneksi; kieleke näkymätön. — 2½ 5, 6.

Kivikkomaissä tav. (E. — L. Lv.) *Tähkylät yhdäppäisiä, ruskeansinervä*.

HOLCUS L. *Heinheinä*. Mjuktätel.

*H. lanatus* L. — Kaleet tylppäpäisiä tav. lyhyellä odalla ulottavasta selkäsuonesta; vihne koukeroinen, ei kaleita pidempi; korsi ja lehtitupet pehmeänhöykeitä; juuri hapsinen. — 2 6, 7.

Kost. niit. metsist. (T. U. S.) *Röyhy tiheä, tav. punerva; koko heinä pehmeä*.

Muist. — On parhaimpia heinälajejamme; taidetaan kylvää pelkkään hietaan; juurittuu nopeasti ja menestyy useinki siinä, missä muu heinä ei kasva. Vahinko vaan, ettei ole juuri kyllä kestävä, ainoasti 3, 4-vuotinen.

VAHLODEA Fr. *Rusolatwa*.

*V. atropurpurea* Fr. — Röyhy harsea pitkäveteisistä, veltoista haaroista; tähkylän vihne lyhempi kaleita; lehdet litteitä. — 2 6, 7.

Tunturi-alustoilla harv. (L. Lv.) *Jalanpituinen, velttoröyhyinen heinä; tähkylät ruskeansinervä*. — *Aira* Wg. *Fl. L. Holcus* Wg. *Sv. B.*

AIRA L. *Sauha*. Ängstätel.

† Tähkylät 2-kukkasisia, ilman 3-nnen kukan aiheetta-  
kaan; vihne polvikas, tyvipuoli kierteinen: *Avenella*  
Koch.

*A. flexuosa* L. *Mödelauha*. — Röyhy tav. lojottava ja nuokkuva, mutkitteleva- ja kalju-haarainen; kaleet hyvin epäkokoiset ja tähkylät tuskin niitä pidemmät, vihne pitkällen ulottava; lehdet rihmamaisia, kieleke pitkulainen, typäkkä. — 2 6, 7. —  $\beta$  *montana*: röyhy soukka, tav. suppea; tähkylät isompia, ruskeansinervä.

Kuiv. nurmikentillä tav. (E. — L. Lv.;  $\beta$  Pe.) *Röyhy tav. iso, kiiltävä, vaaleankeltainen, tähkylät väl. kannalta punasinervä; vesa-lehdet kaljuja*.

†† Tähkylät 3-kukkasisia, tahi 2-kukkasisia ja aiheella  
3:nneksi; vihne m. suora: *Deschampsia* PB.

*A. cæspitosa* L. *Nurmilauha*. — Röyhy velton-lojottava, karheahaarainen; kummallaki kukalla helpeen pituinen vihne, kantaa lähempänä; lehdet litteitä, päälystä hyvin karhea. — 2 6, 7. —  $\beta$  *discolor* Thuill.: erisuurilla kaleilla, ulottavalla vihneellä ja rihmakkeisilla lehkillä.

Niit. tav. (E. — L. Lv.;  $\beta$  T.) *Pitkä, hyvin tupastava heinä, tav. iso-, veltto-, harmaa- t. ruskea-röyhyinen*.

*A. bottnica* Wg. *Rantatauha*. — Röyhy pysty, avonai-

nen, kalju- t. epäkarhea-haarainen; tähkylän kummallaki kukalla vihne lähempänä kantaa, kahta pidempi helvettä; lehdet päältä karheaahkoja, pian kipertyviä. — 2 7, 8.

Merenrant. (T.—P.) 2—3 jalan pituinen, tupastava, väleen kellastuva heinä, kellankiiltävällä röyhyllä; tähkylät kahta isommat kun edellisellä.

A. alpina L. Rapinlauha. — Röyhy ed., kaljuhaarainen; tähkylän alisella kukalla ei paljon helvettä pidempi selkävihne, ylisellä lyhyt latvavihne; lehdet kaljuja, kipertyneitä. — 2 7.

Tunt. (Lv.) 1—2 vaaksan pituinen, kalju heinä, tav. umppu-  
itävällä röyhyllä.

#### AVENA L. Saura. Hafre.

† Monivuotisia juurehisilla lehtivesoilla; tähkylät pys-  
tyjä; kaleet 1—3-suonisia.

\* Tähkylät vähempiä, litteitä, venhomaisilla, niskavih-  
neisillä kaleilla: *Trisetum* Pers. Fr.

A. agrostidea Fr. Rapinfaura. — Röyhy lojottava, har-  
sea, m. kaljuhaarainen, kukkimisen jälkeen m. tähkämäisesti su-  
pistunut; tähkylät 2—3-kukkahisia, toinen kale vähän toista pi-  
dempi; ulkohelpeen pää 2-liuskainen; korsi ylempää ja yliset  
lehtitupet kaljuja. — 2 7.

Tunturitien. harv. (L.) Jalan pituinen heinä vehreänkellertä-  
vällä röyhyllä, harseampi kun seur.

A. subspicata Clairv. Pohjanfaura. — Röyhy aina souk-  
ka, tähkämäinen hienokarvaisilla haaroilla; tähkylät ed.; korsi ja  
lehtitupet pehmytkarvaisia. — 2 7.

Tunturikasvi (L. Lv.) 1—1 1/2 vaaksan pituinen, pehmeän-  
höyteä heinä; tähkä 1—1 1/2 tuuman pituinen, tav. hiirenkarvai-  
nen. — Aira L.

•• Tähkylät isompia, vähemmin litteitä.

A. pratensis L. Nurmifaura. — Tähkylät m. tähkämäi-  
sessä tertussa, 4—5-kukkahisia, paljon pidemmät kun kumpiki 3-  
suoninen kale; kaikilla kukilla selkä- t. niskavihne; lehtitupet  
kaljuja t. karheaahkoita (ei karvaisia). — 2 6, 7.

Niit. (T. U.) Tönkedhkö, kyynärän pituinen heinä hyvin kai-  
doilla vesa-lehdillä; röyhy terttumainen t. eräällä, 1—2-tähkyläi-  
sellä haaralla alempana.

A. pubescens L. Mätfaura. — Röyhy soukka, haarova;  
tähkylät 2—3-kukkahisia, ei paljon kaleita pidemmät; kaikki ku-  
kat niskavihneiset; aliset lehtitupet tav. höyteitä. — 2 6, 7.

Niit. tav. (E. — P.) *Röyhy toiskertaisempi k. ed.*; heinä pehmeämpi ja alhaalta hienohöyryä, harv. kalju; alinen kale muin 1-suoninen, muin 2-lla hienolla sivusuonella.

Muist. — Sama hyöty kun seur.; sopii siis kylvöheinäksi.

A. *elator* L. Heinäfaura. — Röyhy toiskertainen, haaroja; tähkylät 2-kukkahisia, alisessa kukassa tav. vaan heteitä, ei emiä, ja pitkä vihne alipuolella helpeen keskustaa; lehtitupet kaljuja. — 2 6, 7.

Merenrant., niit. (A. T. St.) 2—3 jalan pituinen heinä, jontenki leved- ja litteälehtinen, veltohko-röyhyinen; alinen kale tav. 1-suoninen. — *Arrhenaterum avenaceum* PB.

Muist. — 2-sta tynnyrin-alasta hyvää peltomaata, kylvetynä heinäkauralla, on vuoteensa saatu 22 kuormaa hyviä heiniä ja vähän päälle 1000 naulan siemeniä, joista myös kaupungissa myyden on saatu hyvä voitto. Kun ei tahdota kypsettymään siemeneksi, taidetaan heinä niittää kaksin ottein vuodessa. Nuorempana on se maukkaampaa eläimille. Kylvetään multaiseen, hyvin ruokottuun maahan, joka ei ole vesiperäistä, ynnä tavallisen kauran eli jonkun muun heinäkasvin kanssa. Kasvaa sitte 6, 7 vuotta uudistamatta.

†† Vuosinaisia; tähkylät isoja, lop. rippuvia; kaleet 5—9-suonisia.

A. *strigosa* Schreb. Ufonfaura. — Röyhy yhtäällinen; tähkylät 2—3-kukkahisia, kaletten pituiset; kaikki kukat vihneellisiä; ulkohelvet kalju, 2-äimäisellä päällä; tähkylä-lapakon karvat näkymättömiä. — ☉ 6, 7.

Pelt. harv. (U. H. Ke.) *Seuraavan muotoinen*; tähkylät tav. 2-kukkahisia.

Muist. — Viljennetään Saksanmaalla usein paikoin hietaisessa ja laihaassa maassa, missä muu laiho ei menesty. On vähempi tavallista peltokauraa.

A. *fatua* L. Huffafaura. — Röyhy ulospäisillä, veltoilla haaroilla; tähkylät 2—3-kukkahisia, lyhemmät kaleita; kaikki kukat vihneellisiä; ulkohelvet nirkko, 2-halkoisella päällä, kannalta karvainen. — ☉ 6, 7.

Pelt. harv. (H.) *Tähkät tuuman pituisia, pitkävihneisiä; helpeillä sukamaisia karvoja.*

Muist. — Siemeniä jauhettuna taidetaan katovuosina leiväksi käyttää.

TRIODIA RBr. *šina*. Tandsvingel.

Tr. *decumbens* PB. — Röyhy m. yksikertainen, suppea,

terttumainen; tähkylät 4—8, 3—4-kukkahisia; lehtitupet suuta vasten karvaisia. — 24 6, 7.

Mets. ja lait. (A. — U.) *Korsi rento t. koheneva, harv. pysty.* — *Festuca L. Poa Schrad. Danthonia DC.*

### FLUMINIA Fr. Piuru. Vass-svingel.

Fl. arundinacea Fr. — Röyhy iso, siiro-haarainen; tähkylöissä 3—5 otahammaspäistä kukkaa; korsi pysty, alisilta nivelyltä juurehtiva. — 24 7, 8.

Jok. harv. (T. — K. H.) *Korsi sylen pituinen, ikäänkuin tavallinen Ruoko, mutta vaaleampi ja soukkalehtisempi.* — *Festuca arundinacea Liljebl. F. donacina Wg. F. borealis MK.*

Muist. — Pitää niitettää varhain, tulee muuten liian järeäksi heinäksi.

### 3 parvi. — *Festuceæ*.

#### ENODIUM Gaud. Siniheinä. Blåtåtel.

*E. cæruleum* Gaud. — Röyhy tav. suppea, 2—3-kukkahisilla, vihneettömällä tähkylöillä; korsi pysty, tönkeä, ainoasti yksi nivel tyvessä. — 24 7, 8.

Kost. metsäniit. tav. (E. — L. Lv.) 2—3 jalan pituinen; röyhy sininen, tav. lyhyillä, mutta väl. usean tuuman pituisilla haaroilla. — *Melica L. Molinia Schrank., Hn.*

Muist. — Kukkaröyhy painaa alunoitun liinan vaalean-vehreäksi. Taidetaan eduin istuttaa lammasten suvisyönnökseksi.

#### COLPODIUM Trin. Papinhiipi. Finntåtel.

*C. latifolium* RBr. — Röyhy soukka ja suppea; lehdet suikulaisia pitkällä, kalvomaisella kielekkeellä; korsi vähän kohenevasti pysty. — 24 7, 8.

Tunt. harv. (Lv.) *Ikään kuin edellinen, jonka kanssa on lähintä sukua, mutta leveälehtisempi ja 2—3-nivelisellä, kyynärän pituisella korrella; tähkylöissä harv. 2, tav. vaan 1 kukka, m. tasamukaisilla, vehreillä, useammin ruskean-sinervillä helpeillä.* — *Catabrosa Fr. Cinna Brownii Rupr.*

#### CATABROSA PB. Hiipi.

*C. algida* Fr. Tunturihiipi. — Röyhy ryhmäinen, väl. m. tähkämäinen; tähkylät 1-kukkahisia hyvin pienillä, us. puuttuvilla kaleilla, epäselvästi suonisilla helpeillä. — 24 7, 8.

Tunturipuroilla, harv. (L. Lv.) 1—2 tuuman pit. heinä linjan levyisillä, litteillä lehkillä, hyvin pienillä, tiheäryhmäisillä täh-

*kylvillä yksikertaisessa, tähkämäisessä t. haarovassa röyhyssä. — Agrostis Wg. Phippsia RBr.*

*C. aquatica* PB. *Refihiipi*. — Röyhyn haarat 4—7 yhdessä, tasahajallisia, sirottavia, m. kaljuja; tähkylät 1—3:lla resatylpällä, jurasuonisella kukalla; korsi velto, alempaa rento. — 2 6—8.

Kost. (U. Kv. P. Lv.) *Pehmeä, levytlehtinen, us. laiehtiva heinä. — Aira L. Molinia Wib.*

GLYCERIA RBr. *Sorjanheinä, sorjimo. Vattengröe.*

† Ulkohelve 5-suoninen: *Helochloë* Fr.

*Gl. distans* Wg. *Öjäsorjimo*. — Röyhyn aliset haarat pitkäveteisiä, 3—5 yhdessä, lop. alaskaarevia, karheahkoja; tähkylät pitkulaisia, 2—7-kukkahisia; kukat munanmoisesti pitkulaisia, tylpöpäisiä t. typäköitä; korret tupastavia, kohenevia. — 2 6, 7. — β pulvinata: 1—3 tuuman pituinen lyhyillä, parittaisilla, ei paljon sirottavilla röyhyhaaroilla.

Rant., tien-ojissa. (E. — L. Lv.; β P. Lv.) *Toisintees paljon; röyhy muin tiheä ja suppea, muin harsea ulos- ja alaspäisin haaroin, 2—7-kukkahisin, vehrein t. ruskein tähkylöin. — Poa distans L. P. salina Poll. P. arenaria Retz. Puccinellia Parl.*

†† Ulkohelve 7-suoninen (*Gl. pendulina* ja *Gl. fulva* vaan 1:llä selvällä suonella): *Hydrochloë* Hn.

*Gl. remota* Fr. *Urosorjimo*. — Röyhyhaarat m. hapsimaisia, rippuvia, karheita; tähkylät pitkulaisen tasasoukkia, 4—6:lla harseahkolla, korkeasuonisella, resatylpällä kukalla; lehdet notkeita, molemmin puolin karheita, lyhytkielekkeisiä. — 2 7.

Kost. paik. harv. (U. H. S. K. Kv.) 3—4 jalan pituinen, hento heinä; helpeet vahvasuonisia ja tav. runsasvärisempiä kun seuraavassa. — *Gl. norvegica* Smft.

*Gl. pendulina* Læst. *Öhjänsorjimo*. — Röyhyhaarat kaljuja, m. hapsimaisia ja rippuvia; tähkylät pitkulaisia, 5—7:llä erinäisellä, epäsuonisella kukalla; lehdet tönkeähköitä, kaljuja pitkäveteisellä kielekkeellä; korsi tyvipuolelta juurehtiva. — 2 7.

Rant. harv. (P.) *Kyynärän pituinen, järedhkö, kalju heinä; röyhyn haarat ja latva veltoja; tähkylät kukkiessa 3 linjan pituiset ja 2:n levyiset; helpeet kalvomaisia vehreillä selkäsuonilla, sivusuonet epäselviä t. ei lainkaan. — Arctophila Læstadii Rupr. A. fulva \* pendulina Ands.*

*Gl. fulva* Fr. *Säpinorjimo*. — Röyhy hentomainen erinäisillä, ylt'ympäri ulospäisillä, mutkivilla, kaljuilla haaroilla; täh-

kylät munanmoisia, 2—4-kukkahisia; kukkain tyvellä lyhyitä, tankeamaisia karvoja. — 2 7.

Vet. soilla (Lv.) 2—3 jalan pituinen heinä kellervän-sinervällä röyhyllä ja vähän tankeamaisilla lehdillä; korsi pystyssä, tyveltä m. lehdetön, latvempaa tuppilehtinen. — *Poa fulva* Trin. *P. fulva* var. *lapponica* Nyl. *Arctophila fulva* Ands.

Gl. spectabilis MK. 3förförmo. — Röyhy iso, tasalojottava, hyvin karheahaarainen; tähkylät pitkulaisia, 5—9-kukkahisia; kukat korkeasuonisia, tylppäpäisiä; lehdet leveitä, lyhytkielekkeisiä; korsi pystönäinen. — 2 7, 8.

Ves. harv. (T. U. K. Kv.) Iso, runsasröyhyinen; lehdet m. sormenlevyisiä. — *Poa aquatica* L. *Glyc. aquat.* Wg.

Muist. — Ist. sekä juurella että kylvetään siemenillä karjan-rehuksi; pitää niitettämän varhain, muuten tulee järin karheaksi.

Gl. fluitans RBr. 2förförmo. — Röyhy yhtäällinen, harsea, 1—3:in, m. kaljuin haaroin yhdessä; tähkylät tasasoukkia, m. liereitä, 8—13-kukkahisia; kukat suikeita, tylppäpäisiä, lyhytkärkisiä; kieleke pitkäveteinen; korsi alhaalta rento. — 2 6, 7.

Rant., ojissa tav. (E.—P.) Tav. kyynäräinen heinä, harsuröyhyinen tuuman pituisilla, kaidoilla, aina vehreillä tähkylöillä. — *Festuca* L.

#### POA L. Nurmiffa. Ängsgröe.

† Juuri hapsinen t. tupastava ilman pidemmittä, suikertavitta lehtivesoitta.

\* Röyhyhaarat tav. parittaisia (1—3).

P. annua L. Nylänurmiffa. — Röyhy lavean ulospäinen; tähkylät munanmoisesti pitkulaisia, 3—7-kukkahisia, m. höyteettömiä; kaleet hyvin erikokoisia; korsi pehmeä, litteämäisehkö. — ④ 4—9.

Kyl., tievarsilla tav. (E.—L. Lv.) Vaaksan pituinen, pehmeä, tav. vehreä-röyhyinen heinä.

P. cæsia Sm. Sininurmiffa. — Röyhy tav. lojottava, karhea-haarukkainen; tähkylät pitkulaisia, noin 3-kukkahisia; kukat suikeita, m. höyteettömiä; korsi karheahko, ynnä lehtien kanssa sinivihertävä, nivelet lehtituppien sisäisiä; kieleke pitkäveteinen. — 2 6. 7.

Tunturitien. harv. (Lv.) Paljon toisintelevä; korsi jalan pituinen; röyhy sinivihreä t. punerva, kukkimisen jälkeen supistunut. — *P. aspera* Gaud.

P. alpina L. Tunturi-nurmiffa. — Röyhy pysty, tönkeä, munanmoinen, tihukukkahinen, harittavilla haaroilla; tähkylät le-



veän munanmoisia, 3—6-kukkahisia, puikeitten kukkain väliltä höyteelliset; korsi ja lyhyet lehdet kaljuja. — 2/6, 7.

Tunturitien. tav. (Kv. P. L. Lv.) *Röyhy isoilla punertavilla, väl. umppu-itävillä tähkylöillä; lehdet tav. 1—2, harv. 3 tuuman pituisia.*

•• Röyhy 3- t. useampi-haarainen alisisä nivelissä

*P. nemoralis* L. *Sehtonurmiffa.* — Röyhy soukka, velto, karhea-haarukkainen; tähkylät suikeita, 2—5 kukkahisia, höyteetömiä; lehdet kaitoja epäselvällä kielekkeellä; korsi kalju, paljas-nivelinen. — 2/6, 7.

Leht. tav. (E.—L. Lv.) *Hentonen, vaan usein pitkä heinä, jonka mustat t. ruskeat nivelet harv. ovat lehtituppien sisäisiä.*

*P. serotina* Ehrh. *Rantanurmiffa.* — Röyhy tav. tuuhean lojottava, karhea-haarukkainen; tähkylät munanmoisesti suikeita, 4—6 kukkahisia, kahdenvärisiä; kukat höyteellisiä; tupet ja lehtivesat liereitä; kieleke pitkäveteinen. — 2/7, 8.

Kost. paik., rant. tav. (E.—L. Lv.) *Kasvaa tav. tuppaisissa monilukuisilla korsilla, joiden nivelet tav. ovat lehtituppien sisäisiä; röyhy runsaskukkahinen, nuorempana suppea; tähkyläin kukat vehreitä, ruskea- t. kelta-päisiä.* — *P. angustifolia* Wg. *P. fertilis* Host.

*P. trivialis* L. *Uronurmiffa.* — Röyhy lojottava ja veltohko; tähkylät soikeita, 3-kukkahisia, kukat hienolla höyteellä yhtyneitä, suonisia; lehdet tuskin kahden korren levyisiä, pitkäveteisellä, m. suipolla kielekkeellä; lehtivesat litteämäisiä. — 2/6, 7.

Niit., kost. paik. tav. (E.—L. Lv.) *Korsi tav. karhea, kuitenkin väl. kalju; röyhy tav. vehreä.*

*P. sudetica* Hænke. *Buorinurmiffa.* — Röyhy avonainen t. lojottava, epävelto; tähkylät soikeita, 3-kukkahisia, erillisillä, suonisilla kukilla; lehdet paljon kortta leveämmät; tupet ja erinomattain lehtivesat litteämäisesti 2-särmikkäitä, karheita; kieleke lyhyt. — 2/6, 7.

Kost. lehdoissa, erinom. vuorimais. harv. (E.—P. Kv. Lv.) *2—4 jalan pituinen, pehmeä ja leveälehtinen heinä, vaan väl. lähelevä edellistä lajia.* — *P. sudetica* \* *remota* Fr., Ands.

†† Juuri laajasti suikertavilla vesoilla.

*P. cenisea* All. *Sapinnurmiffa.* — Röyhy lojottava yksinäisillä t. parittaisilla, kaljuilla haaroilla, 1—3:lla soikealla, 3—5-kukkahisella tähkylällä ja suikeilla kukilla; varsilehtiä 2—3, soukia pitkähäköveteisellä kielekkeellä; korsi kalju ja m. liereä. —

24 6, 7. — *β flexuosa*: m. jalan pituinen; röyhy lyhykäinen, pysty, harsea, lop. ulospäisillä haaroilla, alimmaiset pisimmät.

Tunturitien. (L. Lv.) *Jalanpituinen, hoikka, mutta jotenki tanakka, kaitalehtinen heinä harsealla, tähkylävajallisella, tav. ruskean-sinervällä röyhyllä.*

*P. compressa* L. Vittunurmiffa. — Röyhy tav. soukka, yhdäppäinen; haarat 2—5 kiehkurassa; tähkylät 3—9-kukkahisia; korsi tankea, litistetty, sinervä. — 24 6.

Kuiv. paik., muur. harv. (A. T. U.) *Sinertävä, kaitalehtinen, litteäkorsinen heinä, tuskin tuuman levyisellä röyhyllä, tav. soukilla, monikukkahisilla tähkylöillä.*

*P. pratensis* L. Niittunurmiffa. — Röyhy lojottava, 3—6:lla siirottavalla haaralla yhdessä; tähkylät munanmoisia, 3—5-kukkahisia; korsi ja tupet liereitä, kaljuja; kieleke lyhyt ja typäkkä. — 24 6, 7.

Niit. j. n. e. tav. (E.—L. Lv.) *Tav. pitkä, kalju ja runsaskukkahinen heinä, t. tunturitienoissa väl. hento ja kaitalehtinen, kahta vähemmällä tähkylöillä: var. alpestris Fr.*

Muist. — Tämä heinälaji on sitä erittäin kutsuttua hyvää nurmikasta t. nurmiheinää.

(*P. sudetica*.)

#### BRIZA L. Råpelö. Darrgräs.

*Br. media* L. — Röyhy pysty, harittava-haarainen; tähkylät rippuvia, lop. herttamaisia, 7—11-kukkahisia, kaleet alisia helpeitä lyhemmät. — 24 6, 7.

Niit. (A.—K. H. Kp.) *Toisintees isoudessa ja tähkyläkukkien luvussa; jälkimäisiä tav. 7—8.*

#### BROMUS L. Rattara. Losta.

*Br. mollis* L. Nurmifattara. — Röyhy pitkulais-munanmoinen, tiheä, pysty; tähkylät munais-pitkulaisia, tiheäkukkahisia; vihne suora, m. helpeen pituinen; lehdet ja tupet pehmeän höykeitä. — ☉ 6, 7.

Viljelömaissa, mäk. (A.—U.) *Toisintees pehmeänkarvaisilla tähkylöillä, kyynäränpituudesta runsaalla röyhyllä sormenpituisen 1—2:lla tähkylällä: Br. nanus Weig.*

*Br. arvensis* L. Pöörtänä-fattara. — Röyhy lojottava, lop. nuokkuva, 3—8:lla pitkäveteisellä haarukalla yhdessä; tähkylät tasasoukkia, kaljuja, litteämaisä; kukat tiheässä, suoralla, helvettä pidemmällä vihneellä; ulkohelpe leveäniskainen, m. yhtä pitkä sisähelpeen kanssa; lehtitupet lienteitä. — ☉ 6. — *β patulus* MK. röyhy nuokkuva; tähkylät siirottavilla kukilla ja vihneillä.

Vilj. pient. (U. Kp. Kv.;  $\beta$  P.) *Röyhy tav. iso; tähkylät soukkia, tuumanpituisia, enimm. ruskeita; ponnet kullankarvaisia.*

Br. secalinus L. Ruisfattara. — Röyhy lop. nuokkuva, monilukuisin, pitkäveteisin haaroin samassa nivelessä; tähkylät munais-pitkulaisia, tav. kaljuja; kukat valmistuessa erinäisiä, vihneetömiä t. käyräköllä vihneellä, lyhempi kun heti keskustan ali-puolelta leveämpi helpeensä; korsi ja lehtitupet kaljuja. —  $\odot$  6, 7.

Pelt. tav. (E. — P.) *Pitkä heinä paksuilla, vehreillä, lop. painoltansa nuokkuvilla tähkylöillä. — Toisintele isoilla, päälle tuumanpituisilla, monikukkahisilla tähkylöillä.*

### FESTUCA L. Rata. Ängsvingel.

† Lehdet tupen jatkoksessa kaksikorvakkeisia, kielekkeettä; aluslehdet sukamaisia t. rihmakkeisia; ulkokale vähinnäki puolen sisäkaleen pituinen.

F. ovina L. Rönata. — Röyhy soukka, yhtäällinen, pysty, pitkulaisilla, 4—6-kukkahisilla, harsuilla tähkylöillä; helpeet tav. vihneellisiä; kaikki lehdet tasamukaisia, sukamaisia; korsi kulmikas, tupastava, vesoilla ja hapsisella juurella. — 4 6.

Kuiv. paik. tav. (E. — L. Lv.) *1—2 vaaksan pituinen, ka-pealla, ainoasti kukkiessa avonaisella röyhyllä, 2 linjan pituisilla tähkylöillä, jotka tav. ovat vehreitä t. harmahtavia, tunturitienoissa usein punasinervid. — F. violacea Gaud.*

F. rubra L. Rronata. — Röyhyn haarat pystyjä t. siirottavia, suikeilla, 5—9-kukkahisilla tähkylöillä; vihne puolta lyhempi helvettänsä, väl. näkymätön; korsilehdet litteitä, lyhemmät rihmamaisia, vastalaskuisia aluslehtiä; korsi liereä, maakamaran alla suikertavilla vesoilla. — 4 6.

Metsäniit. tav. (E. — L. Lv.) *Korret yksindisempiä kun edellisellä; leveämpi- ja litteämpi-lehtinen.*

†† Kaikki lehdet tasamukaisia, litteitä, kielekkeisiä, korvakkeettomia.

F. pratensis Huds. Rurminata. — Röyhy nuorempana suppea, kukkiessa siirottava, nuokkuva; tähkylät tasasoukkia, 6—10-kukkahisia, vihneetömiä; lehdet tasakaitaisia, epäselvällä kielekkeellä. — 4 7.

Niit. tav. (E. — P. Kv.) *Tähkylät soukkia, m. aina vehreitä — F. elatior L.*

F. arundinacea Schreb. Rantanata. — Röyhy lojottava, nuokkuva; tähkylät leveän suikeita, 3—7-kukkahisia hyvin lyhyellä t. näkymättömällä vihneellä; lehdet tasasoukkia epäselvällä kielekkeellä. — 4 7.

Merenrant. (A. — U.) 4—5 jalan pituinen, isommalla röyhyllä ja leveämmillä, ruskean vehreillä tähkylöillä, kun ed. - - *F. littorea* Wg.

Muist. — On varhain niitettävä, muuten se tulee järin kovaksi heinäksi.

### DACTYLIS L. Röröruoho. Hundexing.

*D. glomerata* L. — Röyhy yhdäppäinen, yksipuolisesti ryhmistyneillä tähkylöillä yksinäisissä, tyveltä paljaissa röyhyhaaroissa; aliset lehtitupet 2-särmikkäitä. — 2/6, 7.

Viljelömaissa tav. (E. — Kp. Pe.) *Iso ja tav. karhealehtinen, usein sinertävä heinä.*

Muist. — On Englantilaisten kiitetty Orchards grass. Taidetaan näyttää kaksin ottein vuodessa. Menestyy parhaiten hyvin multaisessa maassa.

### CYNOSURUS L. Suñapää. Kammexing.

*C. cristatus* L. — Tähkä tasasoukkainen, pysty; tähkylät ilman näkyvittä vihneittä; lehdet tasakaitaisia. — 2/4, 7.

Nurm. harv. (A. U.) *Tähkä tiheä, yhdäppäinen.*

Muist. — On käytetty niittuviljentöön; antaa pehmeätä ja hyvää heinää.

### 4 parvi. — *Hordeineæ*.

#### BRACHYPODIUM PB. Röröruoste. Axsvingel.

*Br. pinnatum* PB. — Tähkylät m. yhdessä jatkossa pysyisenä tähkänä; vihne lyhempi helvettänsä; lehtitupet m. kaljuja. — 2/6.

Kuiv. niit. (A. — K. H. S.) *Tähkylät 1/2—1 tuuman pituiset, hienokarvaisia.* — *Bromus* L. *Festuca* Schrad. *Triticum* Möñch.

Muist. — Kiitetty heinälaji.

*Br. gracile* PB. — Tähkä veltto, harseilla tähkylöillä; vihne helvettänsä pidempi; lehdet ja tupet karvaisia. — 2/6, 7.

Leht. harv. (A.) *Pidempi, veltompi ja karvaisempi kuin ed.* — *Bromus sylvaticus* Sm.

#### LOLIUM L. Ruoste. Repe.

*L. perenne* L. Rörötänöruoste. — Tähkylät pitkulaisia — soikeita, pidemmät kaleita, vihneettömiä; juurakko suikertava, lehtivesainen. — 2/6, 7.

Kuiv. paik., pient. m. harv. (A. — K.) *Tähkä litteämpi k. seur., tav. vähän kierteinen; tähkylät usein kahta pidemmät kaleita.*

Muist. — Parhaiten lihavassa savimaassa kylvöheinänä menestyyvä.

*L. linicola* Sond. Pellamasluste. — Tähkylät tav. pidemmät kaletta; vihne hyvin lyhyt t. näkymätön; juuri hapsinen, vesaton. — ☉ 7.

Pellavasmaissa (A. — K. H. S.) *Hennompi kuin molemmat muut lajit.* — *L. arvense* Schrad.

*L. temulentum* L. Quimaluste. — Tähkylät kaleen pituisia t. lyhempiä, pitkäveteisellä vihneellä; juuri k. ed. — ☉ 6, 7.

Pelt. harv. (St.) *Korkea heinä pitkällä, harsealla tähkällä; vihne tav. 3—4 linj. pituinen.*

Muist. — Ainoa heinäkasvi myrkyllisillä siemenillä, joiden syöminen vaikuttaa pyörtyystä.

### ELYMUS L. Rantamehänä. Elm.

*E. arenarius* L. — Koko heinä sinertävä; tähkylät 3—4 kukkahisia kapean suikeilla, nirkoilla kaleilla; lehdet kourumaisia, pian kipertyviä, tönkeäkarkisia. — ☿ 7.

Sant. rant., erinom. merenrant. (E. — L. Lv.) *2-kyynäräinen heinä nisunmoisella, väl. väki pitkällä tähkällä.*

Muist. — On soveliaain kylvettää juoksevan hiedan kiinnittämiseksi; juuria taidetaan myös hätäleiväksi käyttää. Nuorena se on lampaille ja muulle karjalle mieluinen ruoka.

### TRITICUM L. Mehänä. Vildhvete.

*Tr. repens* L. Suolamehänä. — Tähkä tönkeä, tähkylät lähetysten; kaleet 5-suonisia, tav. äimäpäisiä; helpeet tylppäpäisiä t. suippoja, vihneettömiä t. suora-vihneisiä; lehdet päältä kaljuja, t. yksinäisellä rivillä hienoja sukia pitkin suonia; juurakko laajasti suikertava. — ☿ 6, 7.

Vilj. tav. (E. — L. Lv.) *Toisinteele paljon.* — *Agropyrum PB.*

Muist. — Taidetaan eduin viljentää hyvässä maanlaadussa; jos pieniä juuri-palaisia siihen istutetaan taikka siemeniä kylvetään; viljamaissa se muuten on haitallinen rupu-roho. Sen juuria sopii koota leivän-ainetien sekaan kalliina aikoina. Jauhoja sekä leipää taidetaan niistä valmistaa, kun ovat terveellisiä, eivätkä pahamakuisia.

*Tr. violaceum* Horn. Rapiamehänä. — Tähkä tönkeä, tiheäistuvilla tähkylöillä; kaleet m. poikkipäisiä, lyhytvihneisiä; helpeet suippoja vähän pidemmällä vihneellä; muuten k. ed. — ☿ 6, 7.

Tunturitien. harv. (L. Lv.) *Sinipunervalla tähkällänsä ja vihneen alla poikkipäisillä kaleillansa edellisestä eroava; juurakko puutuva t. pari tuuman pituinen.*

*Tr. caninum* L. Roiranvehnä. — Tähkä velto ja enimm. nuokkuva lähinäisillä tähkylöillä; kaleet 4—5-suonisia, vihne-päisiä; helpillä pitkä, mutkittleva vihne; lehdet kummaltaki puolelta karheita; juuri tupastava, hapsinen. — 2 6.

Leht. (E. — L. Lv.) *Pitkä tupastava, vaaleanvehred heinä, tav. nuokkuva-korsinen ja -täkkäinen.* — *Elymus* L. *Fl. Sv. Agropyrum* RS.

## 2 heimo. — CYPERACEÆ. Sarakasveja.

### 1 parvi. — Cariceæ.

#### KOBRESIA. Willd. Sarake.

*K. scirpina* Willd. — Tähkä yksinäinen, tasasoukka; tähkylät 1:llä hede- ja sen alaisella emikukalla; korsi liereä. — 2 7.

Tunturitien. harv. (L.) 3—10 tuuman pituinen, tupastava. — *Elyna spicata* Schrad. *Scirpus Bellardii* Wg. *Fl. L.*

#### CAREX L. Sara. Starr.

† **Monostachyæ**: Yhdellä ainoalla, yksikertaisella tähkällä.

\* Luotteja 3. — Hedekukat tähkän latvassa, emikukat alempana.

*C. microglochin* Wg. Sufasara. — Tähkä 5—10-kukkahinen; pullakot lop. alaskääntöisiä, suikean-äimämäisiä, latvareiästä ulottavalla, neulamaisella sualla. — 2 6, 7.

Soissa, tunturitien. harv. (L. Lv.) *Sormenpituinen ja seuraavaisen muotoinen, mutta paljon useammilla pullakoilla ja pullakon suumalosta luottien vierestä ulottavalla, korsimaisella sualla.*

*C. pauciflora* Lightf. Siwusfara. — Tähkä 3—5-kukkahinen; pullakot ed., mutta suattomia. — 2 6.

Liejuisissa soissa. (E. — L. Lv.) 2—4:llä alaskääntöisellä, vehreän-keltaisella pullakolla, jolla on kärkenä paksu, ulottava varratalo, jota ei pidä luultaman suaksi niink. edellisellä. — *C. leucoglochin* Ehrh.

*C. rupestris* All. Kalliofara. — Tähkä pitkulainen; pullakot pystönäisiä, pitkulaisia, vastomunaisia, liekeitä, lyhytkärkisiä, ison, kalvolaitaisen tähkäsuomun sisäisiä; juurakko suikertava. — 2 6, 7.

Korkeammissa tunturitien. harv. (L. Lv.) *Tav. sormenpituinen, tasasoukalla t. valmiina m. suikealla tähkällä.*

\*\* Luotteja 2. — Hedekukat tähkän latvassa, emikukat alempana.

*C. capitata* L. Suppifara. — Tähkä munanmoinen t. pal-

leroinen lähinäisillä, munanmoisilla, litteämäisillä, suonisilla pullakoilla; tähkäsuomut lyhyitä, tylppäpäisiä; lehdet kaitoja, kourumaisia. — 2| 6.

Kost. niit. tunturitien. (Kv. P. L. Lv.) 1—2 vaaksan pituinen, herneen kokoisella tähkällä.

C. pulcaris L. Souhifara. — Tähkä tasasoukka t. suikea; pullakot lop. harittavia t. alaskääntöisiä, harsuja, leveän-suikeita, suippoja, suonettomia. — 2| 6.

Kost. niit. harv. (A.) Nuorempana sormen, vanhempana 6—8 tuuman pituinen, tuumanpituksella tähkällä, ruskeilla pullakoilla ja varisevilla tähkäsuomuilla. — C. psyllophora Ehrh.

C. gynocrates Wrmskj. Emifara. — Tähkä tasasoukka t. pitkulainen; pullakot harsuhkoita, pystyjä, munanmoisia m. lie-reitä, monijuomuisia lyhyellä, liereällä, karheahkolla odalla; suomut suippoja; lehdet kannalta kourumaisia, ylempää puolihiereitä. — 2| 7.

Tunt. harv. (Lv.) Sormenpituinen; tähkä 3—4 linjainen, alisena puolena 3—6 emikukkaa; suomut varisevat valmistuessa k. ed. — Kobresia scirpina Fl. D.

(C. dioica var.)

\*\*\* Kaksikotisia, hede- ja emitähkät eri varsikossa.

C. parallela Smft. Neulafara. — Emitähkä tasasoukka, harsuhko-kukkahinen; pullakot munanmoisesti pitkulaisia, pystyjä, suonisia, kaljuja, sileä-laitaisia, ulottavahkolla odalla; tähkäsuomut suippoja; korsi m. kalju. — 2| 6, 7.

Tunt. harv. (L. Lv.) 5—10-tuumainen, kalju- t. yldhältä karheahko-korsinen; emitähkä  $\frac{1}{2}$ —1 tuuman pituinen, kapean liereä, tumpura. — C. dioica  $\beta$  parallela Læst.

C. dioica L. Nimäfara. — Emitähkä soikea, tihukukkahi-nen; pullakot leveän munaisia, suonisia, ulospäisiä, karhea-laitaisia ja -otaisia; suomut tylppäpäisiä; korsi tav. kalju. — 2| 5, 6.

Vetisillä niit. (E. — L. Lv.) Korsi 5—10-tuumainen m. aina kalju; tähkä  $\frac{1}{2}$  tuuman pituinen, vaaleanruskea.

†† Homostachyæ: Tähkä yksinäinen, toiskertaisena tasamukaisista tähkylöistä; luotteja 2.

\* Tähkylät hedekukilla latvassa t. muutamit ainoasti hedekukkahisia.

• — Suikertavalla juurakolla t. vesoilla.

C. incurva Lightf. Räyräfara. — Tähkä palleroinen t. munanmoinen tihuryhmäisillä, yksikotisilla tähkylöillä; pullakot munanmoisesti palleropuoliskoisia kaljulla, otamaisella päällä; korsi

käyrä, nulokulmainen, suikertavalla juurakolla maakamaran alla. — 24 6.

Merenrant. ja tunt. harv. (Lv.) *Korsi* 2—6-tuumainen, pähkkinän kokoisella tähkällä.

*C. chordorrhiza* Ehrh. Suurtara. — Tähkä munanmoinen tihuryhmäisillä, yksikotisilla tähkylöillä; pullakot soikeasti palleropuoliskoisia, lyhyt- ja kaljupäisiä; korret nulokulmaisia, lähteviä maanpintaa suikertavasta, korsimaisesta juurakosta. — 24 6.

Liejuisissa soissa. tav. (E. — L. Lv.) *Merkillinen liejussa maakaavasta juurakostansa, joka on kuin haarovina, usein kyynäränpituuisina korsina, lähettävä nivelistä vaaksanpituuisia, tähkäpäisiä haaroja.* — *C. uliginosa* L. *Herb.*

*C. disticha* Huds. Rantatara. — Tähkä munanmoisesti pitkulainen — tasasoukka m. yksikertaisilla tähkylöillä, alimmais- ja ylimmäiset yksikotisia t. emitähkylöitä, keskimäiset ainoasti hedekukkahisia; pullakot pitkulais-munanmoisia, pitkän suippoja, hyvin kaidalla kalvopalteella keskustan ylipuolelta, vähän pidemmät suippoja suomuja; juurakko suikerrehtava. — 24 5, 6.

Kost. niit., ojavier. j. n. e. harv. (A. T.) 2—4 vaaksan pituinen sarakasvi; tähkät tav. tyveltä harsumpia ja nuokkuvia; toisint. kuitenkin tiheämmillä ja pystyillä,  $1\frac{1}{2}$  tuumaisesta 3 tuuman pituiseen; väl. ovat kaikki yliset tähkylät hedekukkahisia, harvemmin kaikki yksikotisia. — *C. intermedia* Good.

(*C. teretiuscula*).

## **b — Tupastavalla korrella ja juurella.**

*C. vulpina* L. Retunara. — Tähkä lieiä, pitkulainen, kahdesti toiskertainen palleromaisilla, perättömillä tähkylä-ryhmillä; kaikki tähkylät yksikotisia; pullakot munanmoisia, suipukoita, jurasuonisia, kaidalla kalvopalteella, pidemmät sukapäisiä suomuja; juuri tupastava, hapsinen, 3-särmäisillä korsilla. — 24 6.

Soissa, ojissa. (A. — K.) *Kyynäränpituinen, paksu sara 2 tuuman pituisella, m. sormenpaksuisella, lop. ruskealla tähkällä.*

*C. paradoxa* Willd. Röyhyara. — Tähkä veltto, haarova pitkäveteisistä tähkylä-ryhmistä; pullakot munanmoisia, pitkävetteisellä, 2-hampaisella odalla, päätä kohden karhea-kulmaisia, hyvin suonisia, m. yhtä pitkät nirkkopäisten suomuin kanssa; korren tyvessä pitkiä, jousimaisiksi hapsiksi jakauvia suomuja. — 24 6.

Soissa, rant. harv. (A. St. H. K. Kv. P.) *M. kyynärän pituinen, peukalon-pituuisella tähkällä,  $\frac{1}{2}$ —1 tuuman pit. tähkylöillä; pullakot jura-suonisia; suomet korren tyvellä halenneita mustiksi hapsiksi.*



*C. teretiuscula* Good. Siereäfara. — Tähkä pysty, lie-reä t. munanmoinen, kahdesti toiskertainen perättömillä, lähinäisillä tähkyläryhmillä; pullakot munanmoisia pitkävetisellä odalla, lyhyillä suonen-aiheilla tyvessä, suippojen t. tylppäpäisehköjen suomujen pituiset; korren tyvessä pitkiä, eheitä suomuja. — 4 5, 6.

Soissa. (E. — P. Lv.) *Tähkä ei kun tuuman pituinen ja hanhenkynän paksuinen; lehdettömät, runsaan tuuman pituiset, mustat suomet korren tyvessä eivät halkea hapsiksi kuin ed. — C. paniculata* β *Wg. Fl. Sv.*

*C. muricata* L. Safara-fara. — Tähkä lie-reä, pitkulainen tav. yksikertaisilla, palleromaisilla, lähinäisillä, perättömillä tähkylöillä; pullakot harittavia, munanmoisia, lyhytotaaisia, kaidoilla kalvopalteilla, ilman näkyvittä suonitta, pidemmät sukapäisiä suomuja; juuri tupastava, hapsinen; korsi karhea, 3-särmäinen. — 4 5, 6. — β *brunneata*: tumpuran-värisillä suomuilla.

Kuiv. niit. j. n. e. (A. — K. St. H.; β K.) *Tav. 1/2 kyynärän pituinen, hyvän tuuman pituisella, m. aina vehreällä tähkällä; aliset tähkylät hyvin lähinäisiä.*

(*C. tenella*).

•• Tähkylät hedekukkahisia tyveltä, taikka aliset ainoasti emikukkahisia. — Paitsi *C. tenella*.

a — Pullakot leveillä, kalvomaisilla, pitkällen alaspäin karheasahaisilla kulmilla.

*C. leporina* L. Sänönfara. — Tähkä pitkulainen t. soikea 4—6:lla lähinäisellä, soikealla tähkylällä, kaikki hedekukkahisia tyveltä; tähkäsuomet nirkkoja, munanmoisen, tyveen asti leveästi kalvokulmaisen pullakon pituiset; juuri tupas-korsinen. — 4 5, 6.

Kost. niit. tav. (E. — L.) *1—3 vaaksan pituinen, 1—1 1/2 tuumaisella, paksuhkolla tähkällä vaaleanruskeilla, vaalakka-laitaisilla suomuilla.*

b — Pullakot sileillä kulmilla.

*C. lagopina* Wg. Riefonfara. — Tähkä munanmoinen t. soikea noin 3:lla lähinäisellä, soikealla, monikukkahisella tähkylällä, aliset vaan emikukkahisia; pullakot soikeita, suippoja, tylppäkulmaisia, pidemmät tylppäpäisiä suomuja; korsi pysty, kalju t. ylhäältä karheahko. — 4 6, 7.

Tunt. (L. Lv.) *Vaaksanpituinen; tähkä harv. päälle 1/2 tuumainen, ruskea. — C. leporina Fl. D.*

*C. glareosa* Wg. Somerfara. — Tähkä munanmoinen t. pitkulainen noin 3:lla lähinäisellä, soikealla tähkylällä, joista yli-

nen nuijamainen, hedekukkahinen tyveltä; aliset ainoasti emikukkahisia; pullakot suikeita, nirkkoja, monittain jurasuonisia, suomujen pituisia; korsi koheneva, siementen valmistuessa veltosti nuokkuva. — 2½ 6, 7.

Someroisilla merenrant. harv. (U. Pe. P. Lv.) *Korret vaaksanpituisia, hoikkia, lop. harvoin tuumanpituisten, ruskeain tähkkin alaspainamia.*

*C. heleonastes* Ehrh. *Neufajara.* — Tähkä pitkulainen 3—5:llä, lähinäisellä, m. tasamukaisella, soikealla tähkylällä; pullakot pitkän soikeita, suippoja, tylppäkulmaisia, hienosuonisia, vähän pidemmät suomuja; korsi pysty, karhea. — 2½ 6.

Soissa harv. (Kv. P.) 1—2 vaaksan pituinen tuuman pituisella, ruskealla tähkällä.

*C. norvegica* Willd. *Norjanfara.* — Tähkänä 3—6, vähän erinäistä, munanmoisesti pitkulaista t. soikeata, monikukallista tähkylää, ylimäinen nuijamainen, hedekukkia tyvellään, aliset hedekukattomia; pullakot m. palleropuoliskoisia, lyhytotaaisia, leveitten, tylppäpäisten suomujen pituisia; korsi pysty. — 2½ 6.

Soissa, merentien. harv. (T. — Ke. Pe. P. Lv.) *Korsi noin vaaksanpituinen, nulukulmainen; 1—1½ tuumainen, kypsänä vaaleanruskea.*

*C. tenella* Schk. *Hoiffafara.* — Tähkänä 3—6 erinäistä tähkylää, hedekukkineen yläpuolella ja 2—3 pullakkoa alempana; pullakot suomuja pidemmät, m. vastomunaisia t. pitkän pyöreitä, tylppä-päisiä, lyhyt-otaisia, monisuonisia, tylppäkulmaisia. — 2½ 6, 7.

Kost. metsäniit., soissa harv. (E. — P. L. Lv.) *Seuraavan muotoinen, mutta paljon hentoisempi, hapsimaisilla lehdillä; 1—2 hede, eikä juuri useampaa emikukkaa tähkylöissä, väl. vaan yksi kukka kumpaaki lajia. Useampia emikukkia löytyessä ovat hedekukat aina keskellä, niinmuodoin tähkylän latvassa.* — *C. gracilis* Ehrh. *C. disperma* Dew.

*C. loliacea* L. *Suätefara.* — Tähkänä 3—5 erinäistä, 5—12-kukkahista, palleromaista tähkylää; pullakot munanmoisesti pitkulaisia, tylppäpäisiä ja tylppäkulmaisia, lop. harittavia, monisuonisia, suomuja m. kahta pidemmät. — 2½ 6.

Kost. metsäniit. (E. — L. Lv.) *Hento ja kaitalehtinen sarakasvi; tähkä valmistuneenaki vaaleanvehreä.*

*C. tenuiflora* Wg. *Bainvaisfara.* — Tähkänä noin 3 tiheästi lähinäistä, 8—12-kukallista, palleromaista tähkylää; pullakot munanmoisesti pitkulaisia, suipohkoita ja teräväkulmaisia, ei paljon suomuja pidemmät. — 2½ 6, 7.

Kost. paik., tunturitien. harv. (St. Kv. L.) *Edellisen näköi-*

*C. teretiuscula* Good. *Siereä*fara. — Tähkä pysty, lie-reä t. munanmoinen, kahdesti toiskertainen perättömillä, lähinäisillä tähkyläryhmillä; pullakot munanmoisia pitkäveteisellä odalla, lyhyillä suonen-aiheilla tyvessä, suippojen t. tylppäpäisehköjen suomujen pituiset; korren tyvessä pitkiä, eheitä suomuja. — 2½ 5, 6.

Soissa. (E. — P. Lv.) *Tähkä ei kun tuuman pituinen ja hankyndn paksuinen; lehdeettömät, runsaan tuuman pituiset, mustat suomet korren tyvessä eivät halkea hapsiksi kuin ed.* — *C. paniculata* β *Wg. Fl. Sv.*

*C. muricata* L. *Šafara*-fara. — Tähkä liereä, pitkulainen tav. yksikertaisilla, palleromaisilla, lähinäisillä, perättömillä tähkylöillä; pullakot harittavia, munanmoisia, lyhytotaisia, kaidoilla kalvopalteilla, ilman näkyvittä suonitta, pidemmät sukapäisiä suomuja; juuri tupastava, hapsinen; korsi karhea, 3-särmäinen. — 2½ 5, 6. — β *brunneata*: tumpuran-värisillä suomuilla.

Kuiv. niit. j. n. e. (A. — K. St. H.; β K.) *Tav. ¼ kynnärin pituinen, hyvän tuuman pituisella, m. aina vehreällä tähkällä; aliset tähkylät hyvin lähinäisiä.*

(*C. tenella*).

•• Tähkylät hedekukkahisia tyveltä, taikka aliset ainoasti emikukkahisia. — Paitsi *C. tenella*.

• — Pullakot leveillä, kalvomaisilla, pitkällä alaspäin karheasahaisilla kulmilla.

*C. leporina* L. *Šänön*fara. — Tähkä pitkulainen t. soikea 4–6:lla lähinäisellä, soikealla tähkylällä, kaikki hedekukkahisia tyveltä; tähkäsuomet nirkkoja, munanmoisen, tyveen asti leveästi kalvokulmaisen pullakon pituiset; juuri tupas-korsinen. — 2½ 5, 6.

Kost. niit. tav. (E. — L.) *1–3 vaaksan pituinen, 1–1½ tuumaisella, paksuhkolla tähkällä vaaleanruskeilla, vaalakka-laitaisilla suomuilla.*

• — Pullakot sileillä kulmilla.

*C. lagopina* Wg. *Štiefon*fara. — Tähkä munanmoinen t. soikea noin 3:lla lähinäisellä, soikealla, monikukkahisella tähkylällä, aliset vaan emikukkahisia; pullakot soikeita, suippoja, tylppäkulmaisia, pidemmät tylppäpäisiä suomuja; korsi pysty, kalju t. ylähäältä karheahko. — 2½ 6, 7.

Tunt. (L. Lv.) *Vaaksanpituinen; tähkä harv. päälle ½ tuumainen, ruskea.* — *C. leporina* *Fl. D.*

*C. glareosa* Wg. *Šomer*fara. — Tähkä munanmoinen t. pitkulainen noin 3:lla lähinäisellä, soikealla tähkylällä, joista yli-

nen nuijamainen, hedekukkahinen tyveltä; aliset ainoasti emikukkahisia; pullakot suikeita, nirkkoja, monittain jurasuonisia, suomujen pituisia; korsi koheneva, siementen valmistuessa veltosti nuokkuva. — 2½ 6, 7.

Someroisilla merenrant. harv. (U. Pe. P. Lv.) *Korret vaak-sanpituisia, hoikkia, lop. harvoin tuumanpituisten, ruskeain tähkkin alaspainamia.*

*C. heleonastes* Ehrh. *Ἠλεονάστης*. — Tähkä pitkulainen 3—5:llä, lähinäisellä, m. tasamukaisella, soikealla tähkylällä; pullakot pitkän soikeita, suippoja, tylppäkulmaisia, hienosuonisia, vähän pidemmät suomuja; korsi pysty, karhea. — 2½ 6.

Soissa harv. (Kv. P.) 1—2 *vaaksan pituinen tuuman pituisella, ruskealla tähkällä.*

*C. norvegica* Willd. *Νορβηγική*. — Tähkänä 3—6, vähän erinäistä, munanmoisesti pitkulaista t. soikeata, monikukallista tähkylää, ylimäinen nuijamainen, hedekukkia tyvellään, aliset hedekukattomia; pullakot m. palleropuoliskoisia, lyhytotaaisia, leveitten, tylppäpäisten suomujen pituisia; korsi pysty. — 2½ 6.

Soissa, merentien. harv. (T. — Ke. Pe. P. Lv.) *Korsi noin vaaksanpituinen, nulokulmainen; 1—1½ tuumainen, kypsänä vaaleanruskea.*

*C. tenella* Schk. *Ἰοιφάκη*. — Tähkänä 3—6 erinäistä tähkylää, hedekukkineen yläpuolella ja 2—3 pullakkoa alempana; pullakot suomuja pidemmät, m. vastomunaisia t. pitkän pyöreitä, tylppä-päisiä, lyhyt-otaaisia, monisuonisia, tylppäkulmaisia. — 2½ 6, 7.

Kost. metsäniit., soissa harv. (E. — P. L. Lv.) *Seuraavan muotoinen, mutta paljon hentoisempi, hapsimaisilla lehdillä; 1—2 hede-, eikä juuri useampaa emikukkaa tähkylöissä, väl. vaan yksi kukka kumpaaki lajia. Useampia emikukkia löytyessä ovat hedekukat aina keskellä, niinmuodoin tähkylän latvassa. — C. gracilis Ehrh. C. disperma Dew.*

*C. loliacea* L. *Λολιέκη*. — Tähkänä 3—5 erinäistä, 5—12-kukkahista, palleromaista tähkylää; pullakot munanmoisesti pitkulaisia, tylppäpäisiä ja tylppäkulmaisia, lop. harittavia, monisuonisia, suomuja m. kahta pidemmät. — 2½ 6.

Kost. metsäniit. (E. — L. Lv.) *Hento ja kaitalehtinen sarakasvi; tähkä valmistuneenaki vaaleanvehreä.*

*C. tenuiflora* Wg. *Βατωμαίση*. — Tähkänä noin 3 tiheästi lähinäistä, 8—12-kukallista, palleromaista tähkylää; pullakot munanmoisesti pitkulaisia, suipohkoita ja teräväkulmaisia, ei paljon suomuja pidemmät. — 2½ 6, 7.

Kost. paik., tunturitien. harv. (St. Kv. L.) *Edellisen näköi-*

*C. teretiuscula* Good. Sierääfara. — Tähkä pysty, lie-reä t. munanmoinen, kahdesti toiskertainen perättömillä, lähinäisillä tähkyläryhmillä; pullakot munanmoisia pitkäveteisellä odalla, lyhyillä suonen-aiheilla tyvessä, suippojen t. tylppäpäisehköjen suomujen pituiset; korren tyvessä pitkiä, eheitä suomuja. — 2½ 5, 6.

Soissa. (E. — P. Lv.) *Tähkä ei kun tuuman pituinen ja hankyndn paksuinen; lehdettömät, runsaan tuuman pituiset, mustat suomet korren tyvessä eivät halkea hapsiksi kuin ed.* — *C. paniculata* β Wg. Fl. Sv.

*C. muricata* L. Šafara-fara. — Tähkä liereä, pitkulainen tav. yksikertaisilla, palleromaisilla, lähinäisillä, perättömillä tähkylöillä; pullakot harittavia, munanmoisia, lyhytotaisia, kaidoilla kalvopalteilla, ilman näkyvittä suonitta, pidemmät sukapäisiä suomuja; juuri tupastava, hapsinen; korsi karhea, 3-särmäinen. — 2½ 5, 6. — β brunneata: tumpuran-värisillä suomuilla.

Kuiv. niit. j. n. e. (A. — K. St. H.; β K.) *Tav. ¼ kynnärin pituinen, hyvän tuuman pituisella, m. aina vehreällä tähkällä; aliset tähkylät hyvin lähinäisiä.*

(*C. tenella*).

•• Tähkylät hedekukkahisia tyveltä, taikka aliset ainoasti emikukkahisia. — Paitsi *C. tenella*.

a — Pullakot leveillä, kalvomaisilla, pitkällä alaspäin karheasahaisilla kulmilla.

*C. leporina* L. Šänönfara. — Tähkä pitkulainen t. soikea 4–6:lla lähinäisellä, soikealla tähkylällä, kaikki hedekukkahisia tyveltä; tähkäsuomet nirkkoja, munanmoisen, tyveen asti leveästi kalvokulmaisen pullakon pituiset; juuri tupas-korsinen. — 2½ 5, 6.

Kost. niit. tav. (E. — L.) *1–3 vaaksan pituinen, 1–1½ tuumaisella, paksuhkolla tähkällä vaaleanruskeilla, vaalakka-laitaisilla suomuilla.*

b — Pullakot sileillä kulmilla.

*C. lagopina* Wg. Šiefonfara. — Tähkä munanmoinen t. soikea noin 3:lla lähinäisellä, soikealla, monikukkahisella tähkylällä, aliset vaan emikukkahisia; pullakot soikeita, suippoja, tylppäkulmaisia, pidemmät tylppäpäisiä suomuja; korsi pysty, kalju t. ylähäältä karheahko. — 2½ 6, 7.

Tunt. (L. Lv.) *Vaaksanpituinen; tähkä harv. päälle ½ tuumainen, ruskea.* — *C. leporina* Fl. D.

*C. glareosa* Wg. Šomerfara. — Tähkä munanmoinen t. pitkulainen noin 3:lla lähinäisellä, soikealla tähkylällä, joista yli-

nen nuijamainen, hedekukkahinen tyveltä; aliset ainoasti emikukkahisia; pullakot suikeita, nirkkoja, monittain jurasuonisia, suomujen pituisia; korsi koheneva, siementen valmistuessa veltosti nuokkuva. — 4 6, 7.

Someroisilla merenrant. harv. (U. Pe. P. Lv.) *Korret vaak-sanpituisia, hoikkia, lop. harvoin tuumanpituisten, ruskeain tähkkin alaspainamia.*

*C. heleonastes* Ehrh. *Ἠλεωνάστης*. — Tähkä pitkulainen 3—5:llä, lähinäisellä, m. tasamukaisella, soikealla tähkylällä; pullakot pitkän soikeita, suippoja, tylppäkulmaisia, hienosuonisia, vähän pidemmät suomuja; korsi pysty, karhea. — 4 6.

Soissa harv. (Kv. P.) 1—2 *vaaksan pituinen tuuman pituisella, ruskealla tähkylällä.*

*C. norvegica* Willd. *Νορβανθή*. — Tähkänä 3—6, vähän erinäistä, munanmoisesti pitkulaista t. soikeata, monikukkalista tähkylää, ylimäinen nuijamainen, hedekukkia tyvellään, aliset hedekukattomia; pullakot m. palleropuoliskoisia, lyhytotaaisia, leveitten, tylppäpäisten suomujen pituisia; korsi pysty. — 4 6.

Soissa, merentien. harv. (T. — Ke. Pe. P. Lv.) *Korsi noin vaaksanpituinen, nulokulmainen; 1—1½ tuumainen, kypsänä vaaleanruskea.*

*C. tenella* Schk. *Ἰστέλλα*. — Tähkänä 3—6 erinäistä tähkylää, hedekukkineen yläpuolella ja 2—3 pullakkoa alempana; pullakot suomuja pidemmät, m. vastomunaisia t. pitkän pyöreitä, tylppä-päisiä, lyhyt-otaisia, monisuonisia, tylppäkulmaisia. — 4 6, 7.

Kost. metsäniit., soissa harv. (E. — P. L. Lv.) *Seuraavan muotoinen, mutta paljon hentoisempi, hapsimaisilla lehdillä; 1—2 hede, eikä juuri useampaa emikukkaa tähkylöissä, väl. vaan yksi kukka kumpaaki lajia. Useampia emikukkia löytyessä ovat hedekukat aina keskellä, niinmuodoin tähkylän latvassa. — C. gracilis Ehrh. C. disperma Dew.*

*C. loliacea* L. *Λολιέλλα*. — Tähkänä 3—5 erinäistä, 5—12-kukkahista, palleromaista tähkylää; pullakot munanmoisesti pitkulaisia, tylppäpäisiä ja tylppäkulmaisia, lop. harittavia, monisuonisia, suomuja m. kahta pidemmät. — 4 6.

Kost. metsäniit. (E. — L. Lv.) *Hento ja kaitalehtinen sarakasvi; tähkä valmistuneenaki vaaleanvehreä.*

*C. tenuiflora* Wg. *Βαινωσίλλα*. — Tähkänä noin 3 tiheästi lähinäistä, 8—12-kukallista, palleromaista tähkylää; pullakot munanmoisesti pitkulaisia, suipohkoita ja teräväkulmaisia, ei paljon suomuja pidemmät. — 4 6, 7.

Kost. paik., tunturitien. harv. (St. Kv. L.) *Edellisen näköi-*

nen, mutta isommilla, tiheästi korren latvaan kootuilla tähkylöillä. tuskin  $\frac{1}{2}$  tuuman pituisena, m. munanmoisena, aina vaaleanvährednä tähkänä.

(*C. canescens*).

**c** — Pullakot kalvokulmattomia, karheita kulmain yli-puolelta.

*C. helvola* Blytt. *Spallijara*. — Tähkänä noin 5 lähinäistä. tasasoukkaa tähkylää; ylinen hedekukilla tyvessä, emitähkien pituinen; pullakot suomujen pituisia, pitkulais-munanmoisia, otapäisiä, suonettomia. — 24 7.

Tunturitien. harv. (Ke.) *Suuruuden ja näön puolesta kuin seur., mutta enemmän tupastava, levedelehtisempi lyhyillä, kalvo-maisilla suojuksilla.*

*C. microstachya* Ehrh. *Pienipää-jara*. — Tähkänä 3—5 lähinäistä tähkylää; ylinen hedekukilla tyvessä, 2—3 kerroin pitkulaisia emitähkiä pidempi; suomut lyhempiä kun munanmoinen, otapäinen pullakko. — 24 6, 7.

Soissa harv. (U. Kp. P. L. Lv.),  $\frac{1}{2}$  kyyndäräinen, hoikka sara tuuman-pituuisilla tähkillä, ilman näkyvittä suojuksitta; latvatähkä lop. nuijamainen.

*C. elongata* L. *Yttäpää-jara*. — Tähkänä 6—12 erinäisempää, pitkulaista tähkylää; suomut lyhempiä kun pitkulainen, suipukka, molemmin puolin kehkerä ja suoninen, ulospäisehkö pullakko. — 24 7.

Kost. niit. (E. — P.) *Kasvaa tuppaissa monilukuisilla, pitkillä, lop. nuokkuvilla korsilla; pullakot ruskeita.* — *C. multiculmis* Ehrh.

*C. vitilis* Fr. *Settijara*. — Tähkänä 3—8 erinäisempää, soikeata tähkylää; pullakot liketysten, soikeita sirottavalla odalla. ulkopuolin hienolla, suumalosta lähtevällä pinta-poimulla, muuten kehkerät, sisäpuolelta m. litteitä. — 24 6, 7.

Kost. paik. vuorim. (T. U. H. Kp. Pe. — L. Lv.) *Seuraavan, näköinen, mutta pienemmillä, valmiina ruskea-suomuisilla tähkylöillä, varustetut us.  $\frac{1}{2}$ —1-tuumaisilla suojuksilla; pullakot pidempi- ja sirottavampi-päisiä.* — *C. Personii* Sieb. *Hn.* *C. Gebhardi* Hop. *C. canescens*  $\beta$  *alpicola* Wg.

*C. canescens* L. *Sparmijara*. — Tähkänä 3—8, harseahkoa, pitkulaista tähkylää; pullakot hyvin lähinäisiä, soikeita, suippoja tylpillä, m. sileillä kulmilla, ilman poimutta, kehkeriä m. litteällä sisäpuolella. — 24 5, 6. —  $\beta$  *subloliacea*: vähemmillä, erinäisemmillä. palleromaisilla tähkylöillä; pullakot sileäkulmaisia.

Kost. paik., rant. tav. (E. — L. Lv.;  $\beta$  Kv. P. L.) 2—3 vaaksan pituinen, isoissa tuppaissa; tähkä 1—2-tuumainen, kellan- t. harmaanvehreä, harvoin tummempi t. suojuksilla, silloinkin ihan lyhyillä, sukamaisilla. — *C. curta* Good. —  $\beta$  *C. lapponica* Lang. *C. macilenta* Fr.

*C. stellulata* Schreb. Tähtiſara. — Tähkänä 3—5, lop. palleroista, vähän erinäistä tähkylää; pullakot munanmoisia pitkäveteisellä odalla, lop. haarittavia, suomuja kahta pidemmät. — 2 6.

Kost. niit., soissa tav. (E. — P.) 1—1½ vaaksan pituinen herneenkokoisilla, harittavista hedelmistä piikillisillä tähkylöillä, 3-tahkoisella korrella. — *C. echinata* Murr.

*C. remota* L. Hajajara. — Tähkä useilla, hyvin erinäisillä tähkylöillä; kaikki tähkylät yksikertaisia, useammilla pitkä, lehtimäinen suojuksella; pullakot pitkän munanmoisia karhealaitaisella, suomuja vähän pidemmällä odalla. — 2 5, 6.

Leht. harv. (A.) 3 vaaksan pituinen, hoikka sarakasvi pitkävälisillä tähkylöillä ja 3—6 tuuman pituisilla suojuksilla.

*C. cyperoides* L. Myſeröſara. — Tähkylät ryhmässä palleroisena mykerönä, tyveltä hede-, latvemmalta emikukkahisia, pitkäveteisellä, 3-lehtisellä suojuksella; pullakot suikeita, soukistuvia pitkäksi, 2-päiseksi, hienosahaisesti karheaksi odaksi, molemmin puolin kehkeriä, sukapäisten suomujen pituisia. — 2 7, 8.

Vetis. paik. harv. (K.) Lähes jalan pituinen sara soukilla, vaaleanvehreillä, kortta pidemmillä lehdillä, ruskeanvehreillä tähkämykeröillä.

††† **Heterostachyæ:** Useampaa, yksineuvoista tähkää; hedetähkät latvassa, emitähkät alempana niitä \*).

\* Luotteja 2 (paitsi joskus 3): *Distigmaticæ*.

a — Emitähkät 3 t. useampaa kertaa pidemmät perää, t. aivan perättöminä; tähkäsuomut tav. 1-suonisia.

*C. rigida* Good. Tähtiſara. — Emitähkät lähellä tav. yk-sinäistä hedetähkää, soikeita t. nuijamaisesti pitkulaisia, alinen tav. peräkäs; suojuksat kaitoja ja lyhyitä erityisillä korvakkeilla; pullakot soikeita, molemmin puolin korkean kehkeriä, suonettomia ulospäisehköillä, eheällä päällä, suippoja suomuja pidemmät; korsi epäkarhea. — 2 6, 7.

\*) Muutamilla lajeilla, erittäinkin \*\* a-jaossa, ilmaantuu latva- eli hedetähkässä emikukkia ja sitte hedelmiäki latvapuoleltaan; toisilla tavataan väl. emitähkkin päällä hedekukkiaki.



nen, mutta isommilla, tiheästi korren latvaan kootuilla tähkylöillä. tuskin  $\frac{1}{2}$  tuuman pituisena, m. munanmoisena, aina vaaleanvehreä tähkänä.

(*C. canescens*).

c — Pullakot kalvokulmattomia, karheita kulmain yli-puolelta.

*C. helvola* Blytt. Hallijara. — Tähkänä noin 5 lähinäistä. tasasoukkaa tähkylää; ylinen hedekukilla tyvässä, emitähkien pituinen; pullakot suomujen pituisia, pitkulais-munanmoisia, otapäisiä, suonettomia. — 24 7.

Tunturitien. harv. (Ke.) *Suuruuden ja näön puolesta kuin seur., mutta enemmän tupastava, leveälehtisempi lyhyillä, kalvo-maisilla suojuksilla.*

*C. microstachya* Ehrh. Pienipää-jara. — Tähkänä 3—5 lähinäistä tähkylää; ylinen hedekukilla tyvässä, 2—3 kerroin pitkulaisia emitähkiä pidempi; suomut lyhempiä kun munanmoinen, otapäinen pullakko. — 24 6, 7.

Soissa harv. (U. Kp. P. L. Lv.),  $\frac{1}{2}$  kyynäräinen, hoikka sara tuuman-pituksilla tähkillä, ilman näkyvittä suojuksista; latvatähkä lop. nuijamainen.

*C. elongata* L. Pitfäpää-jara. — Tähkänä 6—12 erinäisempää, pitkulaista tähkylää; suomut lyhempiä kun pitkulainen, suipukka, molemmin puolin kehkerä ja suoninen, ulospäisehkö pullakko. — 24 7.

Kost. niit. (E. — P.) *Kasvaa tuppaisissa monilukuisilla, pitkällä, lop. nuokkuvilla korsilla; pullakot ruskeita.* — *C. multiculmis* Ehrh.

*C. vitilis* Fr. Vetti-jara. — Tähkänä 3—8 erinäisempää, soikeata tähkylää; pullakot liketysten, soikeita sirottavalla odalla. ulkopuolin hienolla, suumalosta lähtevällä pinta-poimulla, muuten kehkerät, sisäpuolelta m. litteitä. — 24 6, 7.

Kost. paik. vuorim. (T. U. H. Kp. Pe. — L. Lv.) *Seuraa-van, näköinen, mutta pienemmällä, valmiina ruskea-suomuisilla tähkylöillä, varustetut us.  $\frac{1}{2}$ —1-tuumaisilla suojuksilla; pullakot pidempi- ja sirottavampi-päisiä.* — *C. Personii* Sieb. Hn. *C. Gebhardi* Hop. *C. canescens*  $\beta$  *alpicola* Wg.

*C. canescens* L. Harmijara. — Tähkänä 3—8, harseahkoa, pitkulaista tähkylää; pullakot hyvin lähinäisiä, soikeita, suipuja tylpillä, m. sileillä kulmilla, ilman poimutta, kehkeriä m. litteällä sisäpuolella. — 24 5, 6. —  $\beta$  *sublobiacea*: vähemmällä, erinäisemmällä, palleromaisilla tähkylöillä; pullakot sileäkulmaisia.

Kost. paik., rant. tav. (E. — L. Lv.;  $\beta$  Kv. P. L.) 2—3 *vaaksan pituinen, isoissa tuppaisissa; tähkä 1—2-tuumainen, kellan- t. harmaanvehreä, harvoin tummempi t. suojuksilla, silloinkin ihan lyhyillä, sukamaisilla.* — *C. curta* Good. —  $\beta$  *C. lapponica* Lang. *C. macilenta* Fr.

*C. stellulata* Schreb. Tähtijara. — Tähkänä 3—5, lop. palleroista, vähän erinäistä tähkylää; pullakot munanmoisia pitkäveteisellä odalla, lop. haarittavia, suomuja kahta pidemmät. — 24 6.

Kost. niit., soissa tav. (E. — P.) 1—1½ *vaaksan pituinen herneenkokoisilla, harittavista hedelmistä piikillisillä tähkylöillä, 3-tahkoisella korrella.* — *C. echinata* Murr.

*C. remota* L. Ojajara. — Tähkä useilla, hyvin erinäisillä tähkylöillä; kaikki tähkylät yksikertaisia, useammilla pitkät, lehtimäinen suojus; pullakot pitkän munanmoisia karhealaisella, suomuja vähän pidemmällä odalla. — 24 5, 6.

Leht. harv. (A.) 3 *vaaksan pituinen, hoikka sarakarvi pitkävälisillä tähkylöillä ja 3—6 tuuman pituisilla suojuksilla.*

*C. cyperoides* L. Myrseröjara. — Tähkylät ryhmässä palleroisena mykerönä, tyveltä hede-, latvemmalta emikukkahisia, pitkäveteisellä, 3-lehtisellä suojuksella; pullakot suikeita, soukistuvia pitkäksi, 2-päiseksi, hienosahaisesti karheaksi odaksi, molemmin puolin kehkeriä, sukapäisten suomujen pituisia. — 24 7, 8.

Vetis. paik. harv. (K.) *Lähes jalan pituinen sara soukilla, vaaleanvehreillä, kortta pidemmillä lehdillä, ruskeanvehreillä tähkämykeröillä.*

††† **Heterostachyæ:** Useampaa, yksineuvoista tähkää; hedetähkät latvassa, emitähkät alempana niitä \*).

\* Luotteja 2 (paitsi joskus 3): *Distigmaticæ*.

a — Emitähkät 3 t. useampaa kertaa pidemmät perää, t. aivan perättöminä; tähkäsuomut tav. 1-suonisista.

*C. rigida* Good. Täntijara. — Emitähkät lähellä tav. yksinäistä hedetähkää, soikeita t. nuijamaisesti pitkulaisia, alinen tav. peräkäs; suojuksat kaitoja ja lyhyitä erityisillä korvakkeilla; pullakot soikeita, molemmin puolin korkean kehkeriä, suonettomia ulospäisehköillä, eheällä päällä, suippoja suomuja pidemmät; korsi epäkarhea. — 24 6, 7.

\*) Muutamilla lajeilla, erittäinkin \*\* a-jaossa, ilmaantuu latva- eli hedetähkässä emikukkia ja sitte hedelmiäki latvapuoleltaan; toisilla tavataan väl. emitähkään päässä hedekukkiäki.

Tunturikasvi tav. (L. Lv.) 1—2 vaaksan pituinen, taneakorinen, pitkällä ja leveillä, tiheästi kimputuilla lehdillä suikertavasta, lehdenjännöksistä suomuisesta juurakosta. Hedelmille ilmautuu usein eräänlaista mustaa sientä, ja ne silloin tulevat isoiksi, palleroiksi.

*C. hyperborea* Drey. Turjanfara. — Emitähkät k. ed., pitkulaiset t. suikeat, pystyjä, m. perättömät; suojukset k. ed.; pullakot pitkän-palleroisia, soikeita, litteämäisiä, epäselvästi siirrotavalla, m. ehyellä suumalolla, lyhemmät tylpäköitä suomuja; korsi sileä. — 24 6, 7.

Rant. harv. (L. Lv.) *Jalan pituinen; korsi sileä, tuuman-pituuisilla emitähkillä, leveän-puikeilla t. vastopuikeilla, päätästä pyöreämmäisillä, mustan-ruskeilla somuilla.* — *C. arctophila* Nyl.

*C. elytroides* Fr. Piffufara. — Emitähkät ed.; suojukset leveitä, kortta pidemmät yhteenjuottuneilla korvakkeilla; pullakot leveän soikeita, pilkullisia; suumalo ed.; suomut pullakoin pituisia, tylppäpäisiä t. lyhytkärkisiä; korsi karseahko. — 24 6, 7.

Kost. paik. harv. (P. L.) *Leveämmillä suojuksilla ja hedeimmillä k. ed.; suomut us. lyhyellä, äimämmäisellä käreillä.* — *C. saxatilis* var. *facciformis* Læst.

*C. aquatilis* Wg. Bessifara. — Hedetähkiä 2 t. useampia; emitähkät perättömiä t. lyhytperäisiä, pystyjä, liereitä, tav. latvalta paksummat; suojukset lehtimäisiä, pidemmät tähkistöä; tähkäsuomut lyhempiä kun palleron-soikeat, litteähköt, lyhytpäiset, ehytsuomalaiset pullakot; korsi nulukulmainen, sileä; lehdet kourumaisia. — 24 6.

Rant. (E. — L. Lv.) *Kyynäräinen, sinertävä sara 2—3-tuumaisilla, tav. nuijamaisilla tähkillä; suomut ruskeita; pullakot vaaleahkoita ilman näkyvittä suonitta, t. yhdellä järeämmällä ihan syrjässä.*

*C. limula* Fr. Rantafara. — Hedetähkiä tav. yksinäinen, pitkäperäkäs; emitähkät m. liereitä, pystyjä, alimmainen tav. lyhytperäinen; suojukset soukkia erityisillä korvakkeilla; pullakot pitkulaisia, suippoja, litteitä, m. ehyellä suumalolla, epäsuonisia, m. yhtäpituisia kun tylppäpäiset suomut; korsi karhea. — 24 6, 7.

Kost. paik. harv. (L. Lv.) *Jalan pituinen 1½ tuuman pituisilla, mustasuomuisilla tähkillä; juurakko suikertava järeillä vesoilla.* — *C. acuta* β *ripensis* Læst.

*C. vulgaris* Fr. Piffufara. — Hedetähkiä 1—2; emitähkät lähinäisehköitä, pystyjä, liereitä; suojukset lehtimäisiä, tav. tähkistöä lyhemmät erityisillä lehtikorvakkeilla; pullakot soikeita, pyöröpäisiä, kehkeriä, tav. pidemmät tylppäpäisiä suomuja; lehdet kourumaisia; korsi karhea. — 24 5, 6. — β *juncella* Fr.:

pullakot suonikkaita; lehdet kaitaisia, pitkiä, lop. rihmamaisesti kipertyneitä; korsi hoikka.

Kost. paik. tav. (E. — L. Lv.;  $\beta$  E. — L. Lv.) *Tav. 1—2 vaak-san pituinen monilukuisilla toisinnoilla, muotoontuvilla muin edel-lisiin muin seuraaviin;  $\beta$  tupastava, hoikilla korsilla, lehdillä ja tähkillänsä eroava.*

C. *tricostata* Fr. Kolmiharju-sara. — Hedetähkiä 2 t. useampia, emitähkät m. perättömiä, pystyjä, liereitä; suojukset tähkistön pituiset; suomet lyhemmät leveän soikeita, tylppäpäi-siä pullakoita; pullakot 3:lla järeällä suonella; korsi 3-särmäinen, karheakulmainen; lehdet venhomaisia, hapsiksi jakauvilla tupilla. — 2/6.

Rant. harv. (U. Kv. Lv.) *Viilo- ja Piukkasaran välinen muodostuma, kuitenkin likempänä jälkimäistä.*

C. *acuta* L. Wiilosara. — Hedetähkiä ed.; emitähkät pe-rättömiä t. lyhyt-peräisiä, nuokkuvia, liereitä; pullakot suikeita, molemmin puolin kehkeriä, suipohkoita; korsi 3-särmäinen, kar-heakulmainen; lehdet ed. — 2/6. —  $\beta$  *colorata*: kellahtava; täh-kät pystyjä, perättömiä, punervia. —  $\gamma$  *personata* Fr.: tähkät vaaleita, kaitoja, veltosti nuokkuvia, 2—4 tuuman pituisilla ja pi-demmilläki perillä; korsi m. sileä.

Rant. tav. (E. — L. Lv.;  $\beta$  Lv.;  $\gamma$  A. U. Kv.) *3—4 vaaksan pituinen, tupastava sarakasvi, toisinteleva sangen paljo.*

C. *prolixa* Fr. Saajasara. — Emitähkiä 3—4, aliset pe-räkkäitä, rippuvia, liereitä, ylisten päässä useimmiten hedekukkia; hedetähkät k. ed.; suojukset lehdikkäitä, leveitä, kortta pidemmät; pullakot leveän soikeita, suippopäisiä, molemmin puolin litteäh-köitä, jurasuonisia, lyhemmät nirkkopäisiä suomuja; korsi 3-sär-mikäs; lehdet leveitä, litteitä, nuokkuvia; juuri tupastava. — 2/6.

Rant. harv. (U.) *Tähkät veltosti nuokahtavia; suojukset lehti-korvakeilla; pullakot nuorempina keilamaisia; suomet mustanrus-keita.*

C. *turfosa* Fr. Tupasara. — Hedetähkiä 1—2; emitäh-kät erinäisiä, pystyjä, kaidan-liereitä; suojukset lehtimäisiä, tav. tähkistöä lyhemmät; pullakot soikeita, epäsuonisia, suippoja ulot-tavasta suomalosta, tav. pidemmät suippoja suomuja; lehdet kai-toja, venhomaisia, litteälaitaisia; korsi kalju t. karheahko. — 2/4, 5.

Soissa harv. (U. P.) *1½—2 jalan pituinen sara soukilla leh-dillä ja korsilla, kasvava osittain tупpaissa, osittain hajallisemmasti aaluvaiden.*

C. *cæspitosa* L. Mätäsara. — Hedetähkiä yksinäinen lä-hinäisillä, perättömillä, pystyillä, pitkulaisilla emitähkillä; suo-

jukset tav. lyhyitä t. epäselviä, äimämäisiä; pullakot soikeita, tylppäpäisiä, epäselvällä odalla tuskin ulottavasta suomalosta, suonettomia, ei paljon suomuja pidemmät; lehdet kaitoja, venhomaisia uloskierteisillä laidoilla; korsi karhea. — 2½ 5, 6.

Kost. niit. tav. (E. — L. Lv.) *Kasvattaa mättäitä alankooniituille ja kukostaa varahin jo vaaksanpituuisena, mutta kasvassitte kyynäränki pituiseksi, ehkä hoikkana ja kaitalehtisenä, 3—4:llä, korren suhteen vähäisellä, tuskin tuumanpituuisella tähkällä ylimässä latvassa, harvoin 1 tuuman toisistaan.*

C. stricta Good. Piuffafara. — Hedetähkiä 2 t. useampia: emitähkät m. perättömiä, pystyjä, pitkulaisia, liereitä; suojukset tähkistöä lyhemmät; suomut lyhemmät soikeita, lyhytpäisiä, ehytsuomalaisia, suonisia pullakoita; korsi 3-särmäinen, karheakulmainen; lehdet venhomaisia verkkomaisesti jakauvilla tupilla. — 2½ 6.

Rant. (U. — Pe. Kv.) *Kyynäräinen, isoissa tuppaisa kasvava sara, Viilosaran muotoinen, mutta eroava tiheämmillä tähkillä, litteämmillä hedelmillä, ja erinomattain tupilla, jotka, kun korresta vedetään, sisäpuolelta repevät seittimäiseksi verkoksi. — Toisinteele ½—2 tuuman pituisilla tähkillä.*

(*C. vesicaria* var. *pulla*).

**b** — Emitähkän perät puolen tähkän pituiset t. pidemmät (paitsi *C. salina* γ *subspathacea*); tähkäsuomut 3-suonisia.

C. salina Schk., Wg. Suolafara. — Hedetähkiä 2 t. useampia; emitähkät suikeita, liereitä, pystyjä, kaljuin peränsä pituisia; suomut pitkällä, äimämäisellä käreällä t. tylppäpäisiä pitkän-soikean, lyhytpäisen, lovi-suomalaisen pullakon pituiset t. pidemmätki; korsi kalju. — β *mutica* Wg.: tähkät erinäisempiä; perät pitkäveteisiä, vähän karheahkoita; suomut tylppäpäisiä t. hyvin lyhytkärkisiä; korsi tav. karhea. — γ *subspathacea* Wrmskj. hedetähkä tav. yksinäinen; emitähkät lyhytperäisiä, väl. perättömiä; pullakot pitkäveteisellä suomalolla. — 2½ 6, 7.

Merenrant. (P. Lv.; γ Lv.) *1—1½ vaaksan pituinen; tähkät ja perät, kumpaisetki tuuman pituisia. — C. salina α cuspidata* Wg. Fl. L. — γ *C. discolor* & *C. reducta* Nyl.

C. halophila Nyl. Ruijanfara. — Hedetähkät ed.; emitähkät liereitä, latvalta paksumpia, hajallisia, kaljuja, periään vähän pidemmät; pullakot vastomunanmoisia lyhyellä, eheällä suomalolla, 2 kerroin lyhempiä kun suikeat, nirkkopäiset suomut; korsi kalju. — 2½ 7, 8.

Merenrant. harv. (Lv.) *Vesisaran näkkinen, m. kyynärän pi-*

tuinen litteillä, leveillä lehdillä ja isoilla lehtimäisillä, tähkistön pituisilla suojuksilla. Luultavasti vaan edellisen lajin toisintelo.

*C. spiculosa* Fr. Tähtylä-jara. — Emitähkiä 2—4 pystyillä, pitkäveiteisillä perillä, tyveltä harsukukkahisia, liereitä; suojukset lehtimäisiä, korvakantaisesti sepiviä, ei pidemmät tav. 2 hedetähkiä; pullakot pitkän-munanmoisia, tyveltä hienosuonisia, litteämäisiä, puolta lyhemmät puikeita, tumman-ruskeita, sahakärkisiä suomuja.

Merenrant. harv. (Lv.)  $1-1\frac{1}{2}$  jalan pituinen korsi, tyveltä särmikäs, hapsiksi jakautuvain, ruosteenhohtavain tuppien sisässä, ylempää karhea; perät sileitä; emitähkät tyveltä soukempia,  $1-1\frac{1}{2}$  tuuman pituisia ja 2 linj. levyisiä; pullakot leveämmät suomua; juuri tupastava.

*C. maritima* Müll. Merijara. — Hedetähkiä 2 t. useampia; emitähkät pitkäperäisiä, lop. rippuvia, liereitä; tähkäsuomut typäkästi muuttuvia karheaksi suaksi, paljon pidemmäksi kun itse suomut sekä vastomunanmoinen, epäsuoninen pullakko. — 4 6.

Kivisillä merenrant. harv. (Pe. P. Lv.)  $1-1\frac{1}{2}$  jalan pituinen, vaalea-tähkäinen sara, pian varisevilla, 2—3 kerroin suomujen sukua lyhemmillä pullakoilla.

(*C. acuta, vulgaris*).

\*\* Luotteja 3 (paitsi *C. paludosa* ja *C. vesicaria* var. pulla): *Tristigmaticæ*.

a — Hedetähkiä yksinäinen, tav. emikukilla latvassaan.

*C. Buxbaumii* Wg. Suhtajara. — Tähkät m. perättömiä, erinäisehköitä, pystyjä, pitkulaisia — vastomunanmoisia, otakärkisillä somuilla; pullakot pitkän-soikeita, tylppäpäisiä, suonisia, hienosti karhea-pilkkuisia. — 4 6.

Vet. niit. (E. — L. Lv.) 2—3 vaaksan pituinen, lyhyt- ja paksutähkäinen.

*C. alpina* Sw. Tunturijara. — Tähkät ryhmin latvassa, perättöminä t. lyhytperäisinä, palleroisia t. pitkulaisehkoita; pullakot soikeita, suippoja, hienosti karheapilkkuisia; korsi pysty, hoikka, ylempää tav. karheahko. — 4 6.

Tunturitien. (P. L. Lv.) Korsi  $1-2$  vaaksan pituinen, 2—3:lla, ei paljon hennettä isommalla tähkällä ryhmin latvassa; suomut mustia. — *C. Vahlis Schk., Hn.*

*C. atrata* L. Ruostajara. — Tähkät peräkkäitä, lähinäisiä, suikeita, tav. nuokkuvia, suipposuomuisia; pullakot soikeita, tylppäpäisiä, lyhytkärkisiä, hienosti karheapilkkuisia; korsi ylempää karhea. — 4 6, 7.

**Tunturikasvi.** (L. Lv.) *Jalanpituinen, levedelehtinen sara isohkoilla, mustasuomuisilla, lop. painosta nuokkuvilla latvatähkillä.* — *Toisinteleä soukemmilla korrella ja lehdillä, pystyisellä tähkällä, jotenkin edellisen muotoisena.*

**D** — Hedetähkä yksinäinen, ainoasti hedekukkahinen; pullakot lienteitä.

*C. globularis* L. *Pallofara.* — Emitähkät hajallisia, perättömiä, munanmoisia; suojukset kaitoja, lehtimäisiä, pitkiä, sepokantaisia; pullakot munanmoisia, suippoja, höyteitä, suomuja pidemmät; korsi hoikka, hyvin soukilla lehdillä. — 2 6.

Kost. ja mättäisissä mets. (E. — L. Lv.) 2—3 *vaaksan pituinen, hieno, hinterä ja pehmeä sara; korren tyvellä pitkällen ylös vaalean-ruskeita suomuja; alimmainen suojuslehti aina tähkänsä pidempi, tav. useinki kerroin.* — *C. tomentosa* Fl. D.

*C. pilulifera* L. *Wirnafara.* — Emitähkät lähinäisehköitä, perättömiä, palleroisia; suojukset tupettomia, m. äimämäisiä, alimmainen vähän pidempi tähkää; pullakot palleroisia, suippoja, lieminkäisiä, otapäisten suomujen pituisia. — 2 6.

Kivisissä mäkitaimissa. (A. — U. St. H.) *Korsi kaareva; emitähkät hernetten kokoisia.* — *C. filiformis* Fl. D. *C. Oederi* Retz. ed. 1.

*C. ericetorum* Poll. *Ranerwifara.* — Emitähkät lähinäisiä, perättömiä, pitkulaisen palleroisia, suomumaisilla t. vähän äimäpäisillä, m. tupettomilla suojuksilla; suomut pyöreämäisillä; kalvolaitaisilla latvoilla, liereän, vastomunanmoisen, höyteän pullakon pituisia. — 2 5.

Mäkitaimissa (E. — P. Lv.) *Tähkät tumpuroita, hedetähkä m. nuijamainen; suojukset hyvin lyhyillä, väl. epäselvillä, mustilla tupilla kannassa; tähkäsuomut tav. hienosti karvalaitaisia.* — *C. ciliata* Willd.

*C. præcox* Jacq. *Rewätfara.* — Emitähkät lähinäisehköitä, lyhytperäisiä, pitkulaisia; suojukset äimämäisiä, tav. lyhyt-tuppisia; suomut suippoja, m. palleromaisen, suipohkon, höyteän pullakon pituisia. — 2 5.

Mäkitaimissa harv. (A. T.) *Tähkät vaalean-ruskeita otapäisillä suomuilla.*

*C. montana* L. *Wuorifara.* — Emitähkät lähinäisiä, munanmoisia; suojukset äimämäisiä, molemmiin puolin laajentuneella, kalvomaisella kannalla; pullakot kaidemmasta pohjasta lähtien vastomunaisia, suippoja, 3-kulmaisia, höyteitä. — 2 5.

Leht. harv. (A.) *Vaaksan pituinen, pehmeä sara tumpuroilla, kiiltävillä suomuilla korren tyvessä; tähkät mustia.* — *C. collina* Willd.

*C. ornithopoda* Willd. Rämpylä-fara. — Emitähkät hede-  
tähkän ylittäviä, lähinäisiä, tuppisisäisillä perillä, harvakukkahis-  
ia; pullakot vastomunaisia, 3-kulmaisia, suippoja, hienokarvaisia,  
suipohkoita suomuja pidemmät; korren tupet lehdettömiä t. suka-  
maisella lehdykällä. — 2/ 5.

Kost. niit. vuorten alla, harv. (A.) *Tähkät vaalean-värisiä, tuskin 1/2 tuuman pituisia, 3—6-kukkahisia; korsitupet m. vehreitä, lyhyellä sukamaisella lehden-aiheella.* — *C. pedata* All. *C. digitata* β *Wg. Gottl. Fl.*

*C. digitata* L. Sormifara. — Emitähkät ed., pidemmillä perillä, kun lehdettömät suojustupet, tasasoukkia, monikukkahisia; pullakot ed., typäkkäin suomujen pituisia; korren tupet kun ed. — 2/ 6.

Varjoisissa mäissä (E. — P. Kv.) *Emitähkät tuuman pituisia, mustia, 7—10-kukkahisia; korren tyvessä ruskeita lehtituppia.*

*C. pediformis* Mey. Salfajara. — Hedetähkä peräkäs, emitähkän kokoinen t. ylittävä; emitähkät pitkävälisiä, tasasouk-  
kia, monikukkahisia, kahdesti pidemmillä perillä kun äimämaisella lehden-aiheella varustetut suojustupet; pullakot vastomunaisia, lyhytotaisia, lieminkäisiä, suomujaan tuskin pidemmät; korsi tyveltä lehtinen. — 2/ 5.

Vuorimaissa, harv. (St.) *Puolen kyynärän pituinen.*

• — Hedetähkä yksinäinen, ainoasti hedekukkahinen; emitähkät pystyjä; pullakot kaljuja. (Suojukset tupellisia).

*C. livida* Wg. Waalea-fara. — Emitähkät pitkävetisellä perällä, pystyjä, pitkulaisia, harvakukkahisia; suojukset soukkia, tupellisia, alimmainen 2—3 kertaa tähkät ylittävä; pullakot pitkänpalleroisia, molemmin puolin keherämaisiiä, hienopilkkuisia, vaalean-harmaita, epä-otaisia, m. tylppäpäisiä, pidemmät pyöreähköitä, tylppiä suomuja; lehdet pystyjä, sinivehreit, soukkia. — 2/ 6, 7.

Liejusoissa, harv. (Pe. L.) *Jalan pituinen, tankea- ja kaljukorsinen sara; emitähkät noin 7-kukkahisia; suomet vehreitä, laidalta musevia; pullakot vehreän-sinerviä.*

*C. panicea* L. Wehnä-fara. — Emitähkät erinäisiä, harseltaan monikukkahisia, ulottavilla perillä; suojukset litteitä ja lyhyitä, pitkäkö-tuppisia; pullakot pulleita, m. palleroisia t. pitkänpyöreähköitä, lyhyellä, ulospäisellä, viistetyllä, vaikka ehyellä käreällä; lehdet ja tylppäkulmainen, kalju korsi sinivehreit. — 2/ 6. — β *sublivida* Hn.: lehdet ja suojukset kahdesti kaidemmat, jälkimäiset 2—3 kertaa pidemmät kun tähkäperä; tähkä ja pulakot kahdesti vähemmät.



Kosteilla niit. (E. — L. Lv.;  $\beta$  Kp.) *Sinisen voivahko*, *jalan pituinen sara*; *pullakot palleroisia t. pitkänmunaisia ilman selvättä odatta.*

*C. sparsiflora* Steud. *Harjufara*. — Pullakot munanmoisia, suonettomia, kehkerästi 3-kulmaisia, ulospäisellä, viistetyllä, lovipäisellä odalla, pidemmät puikeita, tumpuroita, tylpähköitä suomuja; lehdet selvän-vehreitä, litteitä; muuten k. ed. —  $\frac{1}{2}$  6.  $\beta$  borealis Fr.: hedetähkä tav. suorakulmaisesti alaspäinen; kodat lyhempi- ja suurempi-otaisia.

Kost. mets. (E. — L. Lv.;  $\beta$  P.) *Edellisestä eroava pidemmällä ja hoikemmalla korrellaan, vähän leveämmillä ja pidemmillä lehdillään, suipommilla ja kulmikkailla pullakoilla*. — *C. vaginata* Tausch., *Hn. C. panicea*  $\beta$  *sparsiflora* Wg.

*C. pedata* Wg. *Barmafara*. — Emitähkät lähinäisiä, lyhytperäisiä, harsealtaan 3—6-kukkahisia, lyhyin äimämäisin, m. tupettomin suojuksin; pullakot m. palleroisia, kärekkäitä, halkoisella suumalolla. —  $\frac{1}{2}$  6, 7.

Tunturikasvi harv. (L. Lv.) *1—3 tuuman pituinen sara, 2—3 linjan pituisilla, m. tasasoukilla, pystönäisillä tähkillä, helposti varisevilla somuilla ja pullakoilla.*

*C. Oederi* Ehr. *Ryhmufara*. — Emitähkät lähinäisiä, palloeroisia — pitkulaisia; suojuukset litteitä, lehtimäisiä, hedetähkää pidemmät; pullakot harittavia, vastomunaisia lyhyellä, otamaisella, suoralla kärellä; lehtilaidat litteitä t. sisäkääntöisiä. —  $\frac{1}{2}$  6.

Merenrant. ja soissa (E. — Pe. Lv.) *Tav. matala, mutta väl. pitkä kuin seur., ehkä tähkät vähempiä, väl. ei paljon isommat herneittä, lop. m. keltaisia; hedetähkä tav. näkyvästi perätön*. — *C. divisa* & *C. demissa* Fl. D.

*C. flava* L. *Keltafara*. — Emitähkät lähinäisiä, soikeita. tuppisäisillä perillä; suojuukset ed.; pullakot vastomunaisia äimämäisillä, alaskaarevilla odilla; lehdet venhomaisia, uloskääntöisillä laidoilla; korsi 3-särmäinen. —  $\frac{1}{2}$  6.

Suoniit. tav. (E. — L. Lv.) *Kellanvehreä sara, 8—12-tuumaisella korrella, lop. m. keltaisilla tähkillä, hedetähkä tav. perätön t. lyhytperäinen*. — *Sekä tämä että edellinen laji toisinteleä emikukilla hedetähkän latvassa: var. acrogyna.*

*C. extensa* Good. *Scuffafara*. — Emitähkät ed., lyhyitä. pitkulaisia; suojuukset pitkiä, rihmakkeisesti kourumaisia, lyhyt-tuppisia; suomut tylppäpäisiä, lyhytkärkisiä; pullakot soikeita, otakärkisiä; korsi kalju. —  $\frac{1}{2}$  6.

Merenrant. harv. (A.) *2—3 vaaksan pituinen, tupastava soukilla lehdillä ja suojuksilla, jotka ovat käyriä ja paljon pidempiä kun lyhyt tähkistö.*

*C. distans* L. *Wälfara*. — Emitähkät pitkulaisia; perät k. ed.; suomut ed., karhealla sukakärellä; pullakot leveän-soikeita, selv. monisuonisia, lyhyellä, karhealla odalla; korsi 3-kulmainen, kalju. — 2½ 6.

Meren rant. harv. (A.) *Tühkät sangen pitkävälisiä, alinen tav. korren tyveltä lähtevä, vehreillä pullakoilla; suomut vaaleanruskeita vehreillä, ulottavalla selkäsuonella.*

(*C. Buxbaumii*).

**d** — Hedetähkä yksinäinen, ainoasti hede-kukallinen; emitähkät lop. rippuvia; suojukset hyvin lyhyillä, ruskea-, t. musta-laitaisilla tupilla. (Pullakot kaljuja.)

*C. irrigua* Sm. *Raätfara*. — Pullakot keherämäisiä, tav. lyhemmät suomujen pitkäveteistä kärkeä; lehdet litteitä, selvän-vehreitä, 2—3 kertaa leveämmät 3-tahkoista, karheata kortta; muuten kuin seur. — 2½ 6.

Soissa ja vet. niit. (E. — L. Lv.) *Tuskin eroava seuraavasta muulla kuin lehdillään; tähkäsuomut tav. tumpurammat ja pullakkoa pidemmät.*

*C. limosa* L. *Sejufara*. — Emitähkät m. suikeita, tiheäkukkaisia; suojukset kaitalehtisiä, hyvin lyhyt-tuppisia; suomut vähän soukempia kun soikea, tylppäpäinen, litteämäinen pullakko; lehdet venhomaisia, sinertäviä, kaitoja, tuskin kahdesti leveämmät kun 3-tahkoinen, karhea korsi. — 2½ 6, 7.

Vetelissä soissa (E. — L. Lv.) *8—12-tuumainen sara, ½—¾ linjan levyisillä, vehreän-hallavilla lehdillä; tähkäsuomut ruskeita vaalean-sinisillä pullakoilla.*

*C. rariflora* Sm. *Raätfara*. — Emitähkät pitkulaisia, harva- ja harsukukkaisia; suojukset lyhyitä, m. äimämäisiä, 3 kertaa laajuuttansa pidemmillä tupilla; suomut tylppäpäisiä, isoja, soikean, tylppäpäisen pullakon sulkevia; korsi tylppäkulmainen, kalju. — 2½ 6, 7.

Tunturisoissa ja nevaisissa merenrant. (Kv. L. Lv.) *Vaaksan pituinen vähemmillä, tav. 6-kukkaisilla, tähkällä kun edell.; suomut tumpuroita. — C. limosa β Wg.*

**e** — Hedetähkä yksinäinen, ainoasti hedekukilla (paitsi *C. fuliginosa*); emitähkät lop. nuokkuvia t. rippuvia; suojukset vehreillä tupilla. (Pullakot kaljuja.)

*C. ustulata* Wg. *Pafofara*. — Emitähkät lähinäisiä, m. soikeita, rippuvia, tiheäkukkaisia; suojukset m. äimämäisiä, harv. tuppea pidemmät; pullakot pitkulaisia, suippoja, litteämäisiä, lovipäisellä suomalolla. — 2½ 7.

Tunturikasvi (L. Lv.) Tähdät  $\frac{1}{2}$  tuuman pituisia; suomut ja pullakot tumpuroita, jälkimäiset vaaleammilla kulmilla; hedetähkissä harv. emikukkia. — *C. atrata* L. Herb.

*C. laxa* Wg. Belftöfara. — Emitähkät erinäisiä, kaitaisen suikeita, tiheäkukkaisia; suojukset lehtimäisiä, pitkätuppisia; suomut tylppäpäisiä, pullakon pituisia; pullakot pitkulaisia, tylppäpäisiä, ulottavalla, m. eheällä suomalolla. — 24 7, 8.

Vetel. soissa tunturien. harv. (L.)  $1-1\frac{1}{2}$  vaaksan pituinen ja hentoinen sara, varsin kaitalehtinen; hyvin *C. limosa* n kaltainen, mutta suojukset  $\frac{3}{4}$  tuuman pituisia ja korsi kaarimaisesti lenko.

*C. pallescens* L. Ralpea-fara. — Emitähkät erinäisiä, soikeita, tiheäkukkaisia, lop. nuokkuvia, hyvin lyhyt-tuppisilla suojuksilla ja nirkoilla suomuilla; pullakot liereitä, vastomunaisia, tylppäpäisiä, ehytsuomalaisia. — 24 6.

Niit. tav. (E. — P. Kv.) Lehdet hienokarvaisia; tähdät vehreitä, lop. ruskeamaisia.

*C. fuliginosa* Hop. Rotti-fara. — Hedetähkä emikukilla latvassa; emitähkät lähinäisiä, vähän suikeita, rippuvia, tiheäkukkaisia, alinen usein pitkältä erinänsä; suojukset m. äimämäisiä, harv. tuppea pidemmät; pullakot m. suikeita ja kulmikkaita, pitkällä, otamaisella, laidalta karheasahaisella kärellä; suumalo 2-hampainen. — 24 7.

Tunturikasvi, harv. (L.) Palosaran muotoinen, mutta kaidemmilla ja vaaleammilla tähdillä, joista ylimmäinen m. aina yksikotinen; korret kovin tupastavia, alaskaarevilla lehdillä, m. kaikki juuressa. — *C. frigida* Wg. Fl. Sv. *C. misandra* RBr., Bl. N. Fl.

*C. capillaris* L. Siirenfara. — Emitähkät erinäisehköitä, m. tasasoukkia, harseasti 6—10-kukkaisia, nuokkuvia t. rippuvia pitkällä perillä; suojukset kaitoja, pitkätuppisia; suomut tylppäpäisiä, lop. varisevia; pullakot soikeita, epäselvästi 3-kulmaisia, äimämäisellä päällä ja epäselvästi 2—3-liuskaisella suomalolla. — 24 6.

Kost. niit. (A. K. P. Kv. L. Lv.) Nuorempana vaaksan-pituinen, hoikka sara  $\frac{1}{2}$  tuuman pituisilla, vehreillä tähdillä ja valkeahkoilla suomuilla.

*C. pseudocyperus* L. Sehti-fara. — Emitähkät liereitä, tiheäkukkaisia, rippuvia, piikilliset harittavista t. alaspäisistä, munanmoisista, pitkä-otaisista, suonisista pullakoista; suumalo 2-kärkinen; suomut äimämäisiä; suojukset lehtimäisiä, hyvin lyhyt-tuppisia. — 24 6, 7.

Rant. soissa, harv. (A. U. H. S. Ke.) Iso leveälehtinen sara, usein 2 tuuman pituisilla, vehreillä tähdillä.

Muist. — Sopisi viljennettä suoniituissa.

**f** — Hedetähkät useampia; pullakot lienteitä.

*C. hirta* L. *Kälfufara*. — Emitähkät suikeamaisesti lie-reitä, pystyjä, hyvin erinäisiä, peräkkäitä, aliset pitkätuppisia; pullakot munanmoisia, suippoisia, syvähalkoisella, 2-kärkisellä suumalolla, yltä yli karvaisia; lehdet litteitä, venhomaisia. — 24 6.

Savi- ja santa-maassa, harv. (A. — K.) *Toisint. 1—3 vaaksan pituisena, pitkäsuikeroisella juurakolla ja usein karvaisilla lehdillä, varsinki tupella.*

*C. filiformis* L. *Rihmafara*. — Emitähkät suikeamaisesti liereitä, pystyjä; pullakot munanmoisia, suippoisia, haarapaisella suumalolla, lienteitä; korsi rihmamainen, hyvin tylppäkulmainen; ne m. tupettomat suojukset ja lehdet kourumaisia, rihmamaisia. — 24 6, 7.

Rant., suoniit. (E. — L. Lv.) *Kyynäräinen, rihmamainen, tupastava sara päälle tuuman pituisilla, ruskeilla tähkillä.* — *C. lasiocarpa* Ehrh.

**g** — Hedetähkiä tav. useampia kun yksi; pullakot kaljuja.

*C. ampullacea* Good. *Pullofara*. — Emitähkät liereitä, aliset peräkkäitä; suojukset lehtimäisiä; suomut äimämäisiä; pullakot m. palleroisia, pulleita, äkisti supistuneella odalla ja haara-paisella suumalolla; korsi tylppäkulmainen, sileä; lehdet kouru-maisia. — 24 6. —  $\beta$  rotundata Wg.: tähkät pitkulaisia, pystyjä, m. perättömiä; suojukset soukkia; suomut leveämpiä, tylp-päpäisiä; pullakot lyhyt-otaisia syvälovisella suumalolla.

Rant. tav. (E. — L. Lv.;  $\beta$  L. Lv.) *Eroava seur. lajista si-leältä korrelta, kourumaisilta lehdiltä ja odaksi supistuneilta pul-lakoilta.*

*C. vesicaria* L. *Vapinfara*. — Emitähkät k. ed.; suojuk-set lehtimäisiä; suomut suippoja, lyhemmät kun munanmoinen, pullea, vähitellen lyhyeksi odaksi soukkeneva, harvasuoninen pul-lakko; suumalo 2-kärkinen; korsi ohuesti 3-särmäinen; lehdet venhomaisia. — 24 6. —  $\beta$  *virens* Nyl.: mustanvehreä ruskean-musevilla pullakoilla; suomut musevia, tylppiä. —  $\gamma$  *pulla* Good. tähkät munanmoisia; pullakot 2—3-luottisia, pullean palleroisia; suomut tylpäköitä, tumpuria.

Vet. paik. tav. (E. — L. Lv.;  $\beta$  Lv.;  $\gamma$  L. Lv.) *Iso, leveä-lehtinen sara; pullakot vehreitä, lop. vaaleanruskeita, tunturitie-noissa mustempia.* —  $\gamma$  *C. saxatilis* L., *Hn. C. fusca* Schk.

Muist. — Lappalaiset pitävät pehmeäksi muokattuna pak-kaista vastaan kengissä; se heillä sukkaa onki.

*C. lævirostris* Fr. *Otafara*. — Emitähkät ja suojukset ed;

suomut suikeita; pullakot m. palleroisia, hyvin pulleita, äkisti soukkenevia pitkäveteiseksi odaksi, syvään haarapäisellä suumalolla; korsi ylempänä karheakulmainen; lehdet venhomaisia. — 24 6.

Vet. rant. harv. (St. S. — Kv. P.) *Isoimpia saraheiniä*,  $\frac{1}{2}$  tuuman levyisillä, m. litteillä lehdillä, paksuilla emitähkillä; pullakot isoja, ohuita, rakkomaisia, m. kätkien ne kaidat suomut, joilla usein on pari hienoa sukua päässä. — *C. rhynchophysa* Mey.

*C. paludosa* Good. Suofara. — Emitähkät liereitä, aliset lyhytperäisiä; suojukset lehtimäisiä, tupettomia; suomut äimäpäisiä, m. lyhemmät soikeita, lyhyt-otaisia, jurasuonisia pullakoita; suumalo 2-hampainen; korsi ohuesti 3-särmäinen; lehdet venhomaisia. — 24 6.

Vet. paik. harv. (Ke.) 3—4 jalan pituinen, sinivihreä, ikään kuin iso *C. acuta*; lehtitupet jakuvia seittimäisiksi hapsiksi, kun korresta vedetään. — *C. acutiformis* Ehrh.

*C. riparia* Curt. Rantafara. — Emitähkät peräkkäitä, liereitä; suojukset leveälehtisiä; suomut äimäpäisiä, tav. pidemmät puikeata, lyhytkärkistä, tiheäsuonista pullakkoa, jonka suumalo haarapainen; korsi 3-tahkoinen; lehdet venhomaisia. — 24 6.

Rant. harv. (T. U. H.) *Isoin kaikista Pohjan sara-lajeista*. — *C. crassa* Ehrh.

## 2 parvi. — *Scirpeæ*.

ERIOPHORUM L. Niittumilla. — Ängsull.

† Tähkä aina yksinäinen.

*E. russeolum* Fr. Ruusena niittumilla. — Tähkä pitkulainen; suomut ainoasti laidalta läpikuultavia, lyhytsuiippoja; ponnet tasasoukkia; korret enimm. yksinäisiä, suikertavilla vesoilla. — 24 5, 6.

Soissa tunturitien. (L. Lv.) Tähkä lähes tuuman pituinen punertavalla t. ruskean-kellervällä villalla ja mustanharmailla suomilla. — *E. Chämissonis* Mey.

*E. capitatum* Host. Löppypää niittumilla. — Tähkä m. palleromainen; suomut suiippoja, ne aliset 1—3 paljon isompia, sujusmoisia; ponnet pitkulaisia; korret ed. — 24 5, 6.

Tunturitien. (P. L. Lv.) Tähkä nuorempana munanmoinen, mustanruskea valkealla t. hiukan punertavalla villalla. — *E. Scheuchzeri* Hoppe, Hn.

*E. vaginatum* L. Tupiäs niittumilla. — Tähkä munanmoinen kalvomaisilla, läpikuultavilla, äimäpäisillä, m. tasamukaisilla suomilla; ponnet tasasoukkia; korret tupastavia, rihmaisella juurella. — 24 5.

Korpisoissa, tav. (E. — L. Lv.) *Tähkä* tav. tuuman pituinen mustanharmailla suomilla ja valkealla villalla; korsi tupilla, joista vaan tyvelliset ovat lehdestäviä.

*E. callithrix* Cham. Tupsuinen niittuilla. — *Tähkä* paleromainen läpikuultamattomilla, tylppäpäisillä, m. tasamukaisilla suomilla; ponnet ja korsi ed. — 2 5, 6.

Soissa tunturitien. harv. (P. L. Lv.) *Tähkä* paljon pienempi k. ed., musevilla suomilla ja huiskilomaisella, typätyllä, hiukan punertavalla villalla.

### †† Useammalla tähkällä.

*E. gracile* Koch. Soiffa niittuilla. — *Tähkä*perät karheahkoita; lehdet 3-tahkoisia, lyhemmät korren nivelvälejä. — 2 6.

Suoniit. (E. — L. Kv.) *Paljon* hentoisempi seuraavia lajeja, ja vähemmällä sekä vehreäisemmällä tähkällä. — *E. triquetrum* Hoppe.

*E. latifolium* Hop. Veneälehtinen niittuilla. — *Tähkä*perät karheita; lehdet litteämaisiiä, suikulaisia, yliset lyhempiä kun korren nivelvälit. — 2 6.

Suoniit. harv. (A. — K. H. P. Kv.) *Pidempi* ja selvemmin vehreä kasvi, lyhemmillä ja leveämmillä lehdillä kun seuraava. — *E. polystachion* β *L. E. pubescens* Sm.

*E. angustifolium* Roth. Souffalehtinen niittuilla. — *Tähkä*perät kaljuja; lehdet kaitaisia, venhomaisia, tav. pidemmät korren nivelvälejä. — 2 5, 6.

Suoniit. tav. (E. — L. Lv.) *Toisintele* kaidemmin ja leveämmin lehdin, useammalla ja harvemmalla, väl. yksinäiselläki tähkällä. — *E. polystachion* α *L. E. polyst.* Wg.

Muist. — Karja alkukevällä syöpi jotenki mieluisesti, mutta ei niin pitkemmälle kesää. Villaa taidetaan käyttää topingiksi ja muun villan seassa langaksiki kehrätä; kelpaa myös kynttilän sydämmiksi.

### TRICHOPHORUM Pers. Suomilla. Mossatof.

*Tr. alpinum* Pers. Soittopää-suomilla. — *Tähkä* pitkulainen; kupusukaset hapsimaisia, lop. monin kerroin tähkää pidemmät; korsi 3-tahkoinen, karhea. — 2 6, 7.

Suoniit. (E. — L. Lv.) *Tähkä* täysikasvaneitten karvojen kera yhteensä m. tuuman pituinen, muodoltaan kuin pieni *Eriophorum*. — *Eriophorum* *L. Limnochloë* Drey.

*Tr. cæspitosum* Hn. Tupaštawa suomilla. — *Tähkä* munanmoinen; kupusukaset pähkylää pidemmät, mutta lyhemmät tähkää; korsi liereä, sileä. — 2 6, 7.

Soissa (St. U. K. — L. Lv.) *Tähkä nuorempana m. pitkulainen*, kypsänä usein palleroinen. — *Scirpus L. Limnochloë Reich.*

### HELEOCHARIS RBr. Suiffa. Knappsäf.

† Luotteja 3; pähkylä 3-kulmainen t. liereä.

*H. acicularis* RBr. Späfiluiffa. — Tähkä munanmoinen t. pitkulainen, isommilla ulkosuomuilla; pähkylä m. liereä, kohosilla viivoilla ja munanmoisella lisäkkeellä; korsi neulan hienoinen, kulmikas; juurakko tupastava ja suikertava. — ☉ 5—8.

Rant. tav. (E. — P. Kv. Lv.) 1—3 tuuman pituinen, m. hapsimainen. — *Scirpus L.*

†† Luotteja 2; pähkylä virnamaisesti litteä.

*H. uniglumis* Link. Rutaluiffa. — Tähkä pitkulainen pitkänpuikeilla suomuilla, alimmainen suomu tyhjä, sepivä koko tähkäpohjan; pähkylät munanmoisella lisäkkeellä; juurakko suikertava. — 4 5, 6.

Merenrant. tav. (A. — K. St. — P. Lv.) Tav. vähempi ja hoiempi seuraavaa lajia; tähkä musevan-ruskea. — *H. palustris* \* *Hn.*

*H. palustris* RBr. Suoluiffa. — Tähkä suomuineen ed.; alimmaiset 2 suomit lyhempiä ja neuvottomia; pähkylän lisäke ja juurakko ed. — 4 5, 6.

Vet. rant. tav. (E. — L. Lv.) Toisint. vaaksan pituisesta kynnäräiseen; 2 alimpaa tähkäsuomua vastakkaista ja yhtyneinä tähkäpohjan sepiviä. — *Scirpus L.*

### SCIRPUS L. Ratsla. Säf.

† Korsi haaraton, yksi ainoa tähkä latvassa: *Limnochloë Reich.*

*Sc. pauciflorus* Lightf. Rorpifaisla. — Tähkä munanmoinen; ulkosuomut isompia, yli puolen tähkän pituisia; luotteja 3; korsi paljas selvällä, typäkällä, lehdettömällä tupella tyvessä. — 4 6, 7.

Kost. rant. (E. — P. Kv.) 2—6 tuuman pituinen. — *Sc. baethryon Ehrh.*

†† Korsi haaraton usealla tähkällä ryhmässä.

• Tähkät viuhkottain ryhmissä.

*Sc. lacustris* L. Särwifaisla. — Tähkät munanmoisia, ryhmistyneitä, peräkkäitä ja perättömiä; tähkäsuomut lovipäisiä, odaksi ulottavalla selkäsuonella; korsi liereä, tupettavilla suo-

muilla ja lehdenaiheilla tyvessä. — 2½ 7. — β glaucus: hentoisempi ja sinivihreämpi, useammin 2-luottinen.

Järvenrant. vedessä, tav.; β mer. (E. — L. Lv.; β E. — P.) 2-kyynäräinen ja sitäki pidempi; β tav. vähempi, musevampi ja pienemmillä tähkärühmillä: *Sc. glaucus* Sm. *Sc. Tabernaemontani* Gmel.

Muist. — Käyt. katon-katteeksi ja leikataan syksyisin karjanruuksi. Kun se keskikesän aikana kootaan, hyvin kuivataan, varotaan sannasta ja tungetaan sitävarten tehtyihin rautatorviin sydeksi poltettaa, saadaan siitä niinhyvin maalareille kuin kirjainpainajille soveliaasta mustetta. — Koreja, mattoja, uittimia taideetaan siitä myös tehdä.

*Sc. maritimus* L. Merifaiäla. — Tähkät munanmoisia ryhmissä, muin yhteisillä perillä, muin ilman; tähkäsuomut 3-otaisia; korsi lehtinen, ohuesti 3-särmikäs. — 2½ 7.

Merenrant. vedessä (A. — U. St. Pe.) Kyynäräinen suikertavalla, tav. mukulaisella juurakolla.

Muist. — Juurakat leivän-aineeksi katovuosina soveliaat.

*Sc. sylvaticus* L. Urofaiäla. — Tähkäviuhko monikertainen, ryhmistyneillä tähkillä peräkkäissä mykeröissä; korsi pysty, lehtinen, tylppämäisesti 3-kulmainen. — 2½ 7.

Vet. niit., ojissa (E. — P. Kv.) Kyynäräinen isolla, lojottavalla viuhkolla; lehdet m. sormenlevyisiä.

Muist. — On hyvä viljennettää alanko-paikoissa karjanruuksi.

•• Tähkylät toiskertaisena, 2-tahkoisena, yhteisenä tähkänä: *Blysmus* Panz.

*Sc. rufus* Schrad. Rufofaiäla. — Tähkylöitä 3—8, harvakkaisia; pähkylät pitkulaisia, suippoja; su'at ylhäältä karheita, välistä puuttuvia; lehdet liereitä, päältä venhomaisia. — 2½ 6, 7.

Merenrant. harv. (T. — Ke. Lv.) Tähkä punaruskea; juuri suikertava. — *Schenus* Huds.

*Sc. compressus* Pers. Vitteäfaiäla. — Tähkylöitä 8 t. useampia, monikukkaisia; pähkylät leveän-soikeita, otamaisella päällä; kupusu'at karheita alaspäisillä piikeillä; lehdet litteitä, vähän venhomaisia. — 2½ 6.

Kost., heinäisissä paik. harv. (A.) Tähkät vaalean-ruskeita. — *Schenus compressus* L. *Carex uliginosa* L.

RHYNCHOSPORA Vahl. Piirtoheinä. Myr-agh.

*Rh. fusca* RS. Ruškea piirtoheinä. — Viuhko paljon varusta lyhempi; kupusu'at karheita ylöspäisistä piikeistä; lehdet kaitoja, kourumaisia. — 2½ 6.



Soissa, harv. (A. H. K.) *Tähkät ruosteenkarvaisia*. — *Schæ-  
nus L. Rh. alba*  $\beta$  Vahl.

*Rh. alba* Vahl. *Baffea* piirtoheinä. — Tähkyläviuhko ei pal-  
jon varusta lyhempi; su'at karheita alaspäisistä piikeistä; lehdet  
kaitoja, veuhomaisia; korsi 3-kulmainen. — 24 6.

Soissa (E. — Pe. Kv.) *Tähkylät nuorempina valkeita, van-  
hempina ruskeamaisia*. — *Schænus L.*

### 3 heimo. — TYPHACEÆ. Osmankäämisiä.

SPARGANIUM L. *Palpaffo*. Igelknopp.

† Lehdet kantaan saakka litteitä.

*Sp. minimum* Fr. *Bähäpalpaffo*. — Tähkälapakko haa-  
raton, aliset 2—3 emitähkää peräkkäitä, yliset erinäisiä, pe-  
rättömiä; hedetähkä, yksinäinen latvassa; hedelmät perättömiä, tylp-  
päpäisiä, m. odattomia; lehdet tav. lyhempiä, pystyjä. — 24 7, 8.  
—  $\beta$  *natans*: varsi ja lehdet pitkäveteisiä, laiehtivia. — \* *hyper-  
boreum* Læst.: alinen emitähkä tav. pitkäperäinen, yliset 2—3  
tähkää perättömiä, tiheästi lähinäisiä.

Järvenrant., matalassa ved. tav. (E. — L. Lv.; \* L. Lv.)  
*Päälaji pysty, lyhytlehtinen; \* hyperb. hoikka ja hentoinen.*

†† Lehdet kannalta 3-tahkoisia.

*Sp. fluitans* Fr. *Reflupalpaffo*. — Tähkälapakko haara-  
ton, alempana 1—2 peräkkäitä, ylempänä monta tiheästi ryhmis-  
tyneitä, perättömiä emitähkiä, ja tav. yksinäinen hedetähkä lat-  
vassa; hedelmät vähitellen lyhykkeiseksi odaksi soukkenevia. —  
24 7.

Mehtäsoiss. harv. (U. St. H. S. Pe.) *Tankeavartinen, leveillä,  
pystyillä t. veltoilla ja laiehtivilla lehdillä*. — *Sp. glomeratum* Beurl.,  
*Læst.*

*Sp. simplex* Huds. *Suorapalpaffo*. — Tähkälapakko haa-  
raton, alempana erinäisillä, peräkkäillä emitähkillä ja 3—6:lla  
hedetähkällä latvassa; hedelmät äkisti soukkenevia odaksi. — 24 7.  
—  $\beta$  *natans*: varsi ja lehdet pitkäveteisiä, laiehtivia.

Ves., järv. tav. (E. — L. Lv.) *Hoikempi kun ed., us. laieh-  
tiva pitkillä, koko veden kalvon peittäväillä, nauhamaisilla lehdillä*:  
*var.  $\beta$* . — *Sp. erectum*  $\beta$  L. *Sp. erectum* Wg. —  $\beta$  *Sp. natans*  
*Auctt.*

*Sp. ramosum* Huds. *Saarapalpaffo*. — Tähkälapakko haa-  
rova; haaroissa perättömiä emitähkiä alempana, ja monilukuisia  
hedetähkiä latvassa; lehdet kannalta 3-särmäisiä. — 24 7. —  $\beta$

natans: varsi hoikempi ja veltompi; lehdet pitkäveteisiä, laiehtivia.

Vesikaivannoissa, ojissa;  $\beta$  syvissä soiss. järv. (E. — P. Kv.) *Isoin kaikista lajeista;  $\beta$ :an lehdet us. monen kyynärän pituisia, 1—2 linjan levyisiä. — Sp. erectum  $\alpha$  L. —  $\beta$  Sp. natans L. Herb., Fr., H. M. F.*

#### TYPHA L. Osmantäämi. Kafveldun.

*T. angustifolia* L. Souffa osmantäämi. — Tähdät erinäisiä; lehdet soukkia, miekkamaisia, vähän kouruisia, korren pituisia. — 24 7.

Vedessä (A. U. St. H. S. Kv.) 4—5 jalan pituinen vesikasvi; lehdet 2—3 linjan levyisiä; tähtkään välillä tav. 1—2 tuumaa.

Muist. — Haivenia käyt. topingiksi. Astiamiehille kelpaa lehdet saumain tivistämiseksi. Myös mattoja, sideköysiä j. n. e. saadaan niistä.

*T. latifolia* L. Sfo osmantäämi. — Hede- ja emitähkä lähinäisiä; lehdet leveän miekkamaisia, korren pituisia. — 24 7.

Vedessä (A. — K. Pe. P.) *Edellisen pituinen, tuuman levyisillä, litteillä lehdillä; täkkä kahta paksumpi kun edellisellä.*

Muist. — Sama hyöty k. ed.

### 4 heimo. — POTAMOGETONACEÆ. Vitakasveja.

#### 1 parvi. — Zostereæ.

##### ZOSTERA L. Ajofoa. Bandtång.

*Z. marina* L. Sfo-ajofa. — Lehdet selvästi monisuonisia, tasasoukan kotelon levyisiä; kotelon kumpiki kieli ylempää typpäkkä; pähkylät selväjuomuisia. — 24 7.

Meressä (Lv.) *Lehdet pitkiä, heinämäisiä, noin 2 linjan levyisiä.*

*Z. angustifolia* Horn. Bähä-ajofa. — Lehdet epäselvillä sivusuonilla; kotelon kielet pyöreämäisiä päästä; muuten k. ed. — 24 7.

Meressä, harv. (U. Lv.) *Vähempi k. ed., luultavasti vaan sen toisintelo; noin linjan levyisillä lehdillä. — Z. marina  $\beta$  Fl. D.*

#### 2 parvi. — Potameæ.

##### ZANNICHELLIA L. Saura.

*Z. polycarpa* Nolte. Rantaaura. — Pähkylät perättömiä, epähampaisella selällä; vartalo puolta pähkylää lyhempi. — ☉ 6, 7.

Matalassa ved., tav. meressä t. sen tien. (A. — Ke. St. Pe. Lv.)  
*Varsi ja lehdet hapsimaisia.* — *Z. palustris* L.

*Z. pedicellata* Fr. Merihaura. — Pähkylät lyhytperäisessä sarjassa, selväperykköisiä kalvomaisella, hampaisella selällä; vartalo m. pähkylän pituinen. — ☉ 6, 7.

Meressä, harv. (T. St. U. P.) *Pähkylät tunnettavina jotenki pitkistä peryköistänsä ja vartaloistansa, isommat kun ed.* — *Z. pedunculata* Reich. *Z. palustris* β *pedic.* Wg.

#### RUPPIA L. Lima.

*R. rostellata* Koch. Bino lima. — Ponnet m. palleroisia; pähkylät tyveltä kupuvia, äkisti soukkenevia hyvin vinopäiseksi, monta kertaa pidemmillä perillä. — 2/ 7, 8.

Meressä harv. (T. U.) *Meri- t. hapsi-vitan* (Pot. *marinus l. pect.*) näköinen, jouhimaisilla lehdillä, kuta kuinki vinoisilla pähkylöillä. — *R. maritima* L. Herb.

*R. brachypus* Gay. Lyhytperäinen lima. — Ponnet pitkänpalleroisia; pähkylät munanmoisia, vähän vinoisia, perättömiä t. lyhyillä, korkeintaan 4 kertaa pähkylää pidemmillä perillä. — 2/ 7, 8.

Meressä, harv. (T.) *Pähkylät isompia ja kovemmallalla kuorella k. ed., tav. peränsä pidemmit.*

#### POTAMOGETON L. Bita. Vattennate.

† Lehdet sangen soukkia, pitkän kaitaisia — hapsimaisia.

\* Lehdet apulehtisellä tupella sepokantaisia (tähkät hyvin erinäisillä kiehkuroilla).

*P. marinus* L. Merivita. — Lehdet jouhimaisia, suippoja, yksisuonisia; pähkylät \*) sileitä, tylpällä pyöreämaisella selällä, pienoisia, kuivina kurttuisia. — 2/ 7.

Selvemmässä ved., erinom. meressä (T. St. U. H.) *Pähkylät vähempiä kun hampunsiemenet, vedessä sileät, kuivina kurttuiset. Kukoistaa aina veden alla, jotta ei koskaan kohoa pinnalle.*

*P. pectinatus* L. Oupfivita. — Lehdet kaitaisia — jouhimaisia, suippoisia, enemm. 1-suonisia; pähkylät sileitä, selkä pyöreän tylppämäinen, kuivaneena venhomainen. — 2/ 7.

Järv., ojissa, etenki suolaisessa vedessä (A. — Ke. St. — P.) *Vanhemmat lehdet usein kyllä leveämpiä, 3-suonisia; pähkylät kypsinä vähempien hernetten kokoiset. Kukoistaa veden päällä.*

*P. zosteraceus* Fr. Ajoaß-vita. — Lehdet hamaan lyhyeksi odaksi soukkenevaan päähän kaitaisia, 5-suonisia; yliset ja

\*) Nimittäin tuoreina, jonkalaisia aina tarkoitetaan, missä kuivista ei erittäin mainita.

nuoremmat paljon kaidempia ja suippoisempia, 3- tahi 1-suonisia. — 2/ 7, 8.

Mer. harv. (T.) *Lehdet linjan levyisiä, 3:lla isommalla suonella.*

•• Lehdet tupettomina varressa, erillään apulehdistä.

*P. rutilus* Wlfg. Jouhivita. — Tähkät harsukukkaisia, vähän pitkulaisia, perää lyhemmät; lehdet rihmamaisia, pitkään soukistuvalla päällä, 3-suonisia; varsi puoliliereä. — 2/ 7.

Vedessä, harv. (Kv.) *Hieno kun seur. laji, mutta paljon tukevammilla ja lähinäisemmillä lehdillä; harva- (6-7-) kukkaisilla tähkällä, pienillä, pyöreä-selkäsillä ja m. suippokantaisilla pähkylöillä.*

*P. pusillus* L. Pientivita. — Tähkät tiheitä, lop. pallero-maisia t. soikeita, lyhemmät m. liereätä ja tasapaksua perää; lehdet rihmamaisia, otapäisiä, 3-suonisia, usein epäselvillä sivusuonilla; varsi hapsimainen, epäselvästi litteämäinen. — 2/ 7.

Kuljuissa, ojissa (E. — P. Lv.) *Paljon hienompi seuraavaisia; lehdet tuskin 1/2 linjan levyisiä; varsi m. jouhimainen; tähkät pieniä, nuorempina pitkulaisia, mutta tiheitä; valmiina eivät isommat herneitä.*

*P. mucronatus* Schrad. Otalehti-vita. — Tähkät harsuja, liereitä, 4-6-kukkaisia, lyhemmät litteämäistä, ylhäältä leveämpää perää; lehdet kapean kaitaisia, tylppäpäisiä lyhyellä odalla; varsi litteämäinen. — 2/ 7.

Vedessä, harv. (A. T. Kv.) *Tähkät aina soukkia, 1/2-1 tuuman pituisia, kukkiessa m. perien pituiset, sitte tav. kahta lyhemmät.* — *P. compressus* Sm. *P. Friesii* Rupr. *P. Oederi* Mey., Beurl.

*P. obtusifolius* MK. Tylppä vita. — Tähkät lop. soikeita, tiheästi monikukkaisia, tasapaksuin, litteäähköin peräinsä pituisia; lehdet tasasoukkia, tylppäpäisiä, 3-5-suonisia; varsi litteäähkö, rihmamainen. — 2/ 7.

Järv. harv. (St. U. H. S. Ke.) *Lehdet linjan levyisiä.* — *P. gramineus* Sm. *P. compressus* Wg.

*P. zosterifolius* Schum. Ritteä vita. — Tähkät liereitä, 10-12-kukkaisia, kahta t. useammin kerroin lyhemmät kun varsi; lehdet tasasoukkia, suippoja, juomuisesti monisuonisia; varsi litteä, lehtimäinen. — 2/ 7.

Järv. harv. (Ke. P.) *Lehdet runsaan linjan levyisiä, 4-7 tuuman pit.; tähkät tuuman pituisia.* — *P. laticaulis* Wg. *P. compressus* Fr.

†† Lehdet suikeita t. leveämpiä (3 linj. — 2 tuumaa).

\* Kaikki lehdet kalvomaisia, ruodittomia t. hyvin lyhyillä ruodeilla.

*P. crispus* L. Riharavita. — Lehdet puoliseppoisia, kaitai-

sia, aaltolaitaisia, hienosahaisia; pähkylöillä sarvimainen ota. — 24 7.

Järvissä, harv. (A.) *Tähkylät lyhyitä, harvakukkaisia; lehdet selväsahaisia. Toisint. lähinäisillä lehdillä, joiden välillä varsi on vähän polvitteleva.*

*P. perfoliatus* L. *Änferiaan mita.* — Lehdet herttakaantaisia, varsisepoisia, puikeita — pitkulaisia, ehytlaitaisia, litteitä; pähkylät munanmoisia, litteämäisiä, tylppäselkäisiä. — 24 7.

Järvissä, tav. (E. — L. Lv.) *Lehdet tav. puikean pitkulaisia, väl. m. pyöreitä (toisint. rotundifolius), tahi juoksevassa vedessä suikeita, aina herttakantaista.*

Muist. — Ankerias väl. elustelee sen suojaassa.

*P. praelongus* Wulf. *Önminwita.* — Lehdet vähän suikean-kaitaisia (nuorempain syksyhaarain pitkulaisia), tylppäpäisiä, litteitä, ehytlaitaisia, sepokantaisia; tähkäperät tasapaksuja; pähkylät kehräpuoliskoisia, m. yhtyneet suorilla sisäsivuillaan, terävävenhoisia. — 24 7, 8.

Syvemmissä järv. (A. H. P.) *Iso, usein tuuman levyisillä, 6—10 tuuman pituisilla, päästä tav. lakkimaisesti soikistuneilla, pyöreätylppäisillä lehdillä; tähkäperät pitkiä; tähkät ja pähkylät isoja.*

*P. lucens* L. *Öelowita.* — Lehdet leveän suikeita, lyhyeksi ruodiksi soukustuvilla kannoilla, otapäisiä, hyvin hienosti otasahaisilla laidoilla; tähkäperät ylöspäin paksunevia; pähkylät tylppävenhoisia. — 24 7, 8.

Syvemmissä järv. (U. H. Kv. P.) *Lehdet 1—1½ tuuman levyisiä, väl. tylppäpäisiä pienellä odalla, tahi pitenee keskisuoni lyhemmäksi t. pidemmäksi, dimämmäiseksi pääksi; väl. havaitaan syksyhaaroissa lehden lapa niin hiukan kasvettuneena, että tuskin muuta kun suoni on koko lehdestä järellä.*

•• Yliset laiehtivat lehdet ruodikkaita, tav. paksumpia, aliset ruodittomia, kalvomaisia.

*P. nitens* Web. *Öitfo-mita.* — Laittolehdet vähän nahkeamaisia, kantaa ja päätä kohden suipukoita; aliset puolisepoisia, tasasoukkia, suippoja, tav. kourumaisia, kaarevasti alaspäisiä; tähkäperä latvempaa vähän paksumpi; pähkylät terävähkö-selkäisiä. — 24 7.

Järv., juoks. ves. harv. (H.) *Lop. haarova, tumman vehreä; tav. leveä-lehtisempi k. seur.; laittolehdet, jotka usein puuttuvat, pidempiä ja soukempia kun seur. lajilla.* — *P. gramineum* Wg. *Fl. Sv.*

*P. gramineus* L. *Ruohowita.* — Laiehtivat lehdet nahkeita, soikean puikeita, tylppäkantaista; aliset ruodittomia, kapean suikeita, suippoja; tähkäperä latvempaa nuijamaisesti laajennut;

pähkylät tylppäselkäisiä. — 2/7. —  $\beta$  heterophyllus Schreb.: laittolehdet pitkärutisia, tylppäpäisiä; aliset puolta pienempiä; vehreämpi.

Ojissa ja matalammissa ves. (E. — L. Lv.) *Laittolehdet välistä puuttuvat, välistä ovat yksindän järellä kuivaneissa paikoissa.*

*P. nigrescens* Fr. Rufo-wita. — Kaikki lehdet kalvomaisia, läpikuultavia, yliset soikeita, suippokantaisia, rutiansa lyhemmät; pähkylät munuais-palleroisia, kuivina 3-venhoisia; muuten kuin seur. laji. — 2/7, 8.

Ves. harv. (S. P. Lv.) *Seuraavasta lajista eroava ainoastaan ohuemmilla ja pidemmillä, pikemmin mustenevilla, kun punetuilla latvalehdillään.* — *P. rufescens* var. *Læst.*

*P. rufescens* Schrad. Rufo-wita. — Laittolehdet vähän nahkeamaisia, pitkulaisia, tylppäpäisiä, suippokantaisia; aliset kaidasta kannasta pitkän-sukeita, tylppäisiä; tähkäperä tasapaksu; pähkylät litteämäisiä, terävä-selkäisiä. — 2/7.

Järv. ja juoksevassa ved. (E. — L. Lv.) *Lehdet 1/2—3/4 tuuman levyisiä ja 3—6 tuuman pituisia, pian punetuivia, etenkin yliset.* — *P. fluitans* Sm.

*P. salicifolius* Wulfg. Pajumita. — Laittolehdet soikeita, tylppäkantaisia, rutiansa pidemmät; aliset sepiviä, leveän suikeita, suippoja; tähkäperä tasapaksu. — 2/7, 8.

Ves. harv. (L.) *Laittolehdet k. seur. lajilla, us. puuttuvia, aliset kalvomaisia, sormenlevyisiä, 3—8 tuuman pituisia.* — *P. gramineus* var. *lanceolatus* Læst. *P. lanceolatus* Reich.

\*\*\* Kaikki lehdet selvästi, tav. pitkäveteisesti ruodikkaita, yliset laiehtivia.

*P. natans* L. Ahmenwita. — Yliset lehdet nahkeita, laiehtivia, soikeita t. pitkänpyöreitä, aliset pian menehtyviä järeille jättäen pitkät rutinsa; pähkylät tylppäselkäisiä. — 2/7. —  $\beta$  *sarganifolius* Læst.: yliset lehdet kapean suikeita, aliset tasasonkilla, usean jalan pituisilla, kalvomaisilla ruodeilla.

Seisovassa ved. tav. (E. — L. Kv.;  $\beta$  P. L.) *Alemmaiseta, pian menehtyvät lehdet kaidempia, mutta m. yhtä taneita kun ylemmäisetki. Kuivaneissa paikoissa m. ihan varretton (toisinto: acaulis Fr.)*

Muist. — Ahvenet ja muut kalat elustelewat sen suojassa.

*P. polygonifolius* Reich. Tatar-wita. — Kaikki lehdet pitkärutisia, laittolehdet m. nahkeita, pitkulaisia, aliset suikeita; pähkylät k. ed. — 2/7.

Ojissa, harv. (A.) *Paljon toisintelewa; väl. lyhyellä, suiker-tavalla varrella, ainoastaan ylimmäisillä, leveämmillä lehdillä varustettu.* — *P. oblongus* Viv.

5 heimo. — *ARACEÆ*. Vehkaisia.1 parvi. — *Lemneæ*.*LEMNA* L. Eimašfa. Andmat.

*L. trisulca* L. Ristilimašfa. — Ruodikkaissa lehtiryhmissä tav. 3 suikeata varsikkolehteä ristimäisesti. — ☉ 6, 7.

Vedessä (E. — P. Kv.) *Enemmän osan vuotta veden alla.* — *Staurogeton Schleid.*

*L. minor* L. Wähälimašfa. — Varsikkolehdet pyöreämaisiiä, molemmin puolin litteitä, yhdellä ainoalla juuri-hapsella. — ☉ 6—8.

Vedessä, tav. (E. — P. Kv.) *On useammin kukkiessa, kun toiset.* Muist. — Ruuaksi hanhille ja kaloille.

*L. gibba* L. Rupušimašfa. — Varsikkolehdet pyöreämaisiiä, päältä litteitä, alta maljamaisesti pullakoita, vaaleampia, ihan yhdellä juuri-hapsella. — ☉ 6—8.

Vedessä, harv. (A.) — *Telmatophace Schleid.*

*L. polyrrhiza* L. Šfolimašfa. — Varsikkolehdet pyöreämaisiiä, molemmin puolin litteitä, itsekuki altapuolen lähtevällä juurihapi-kimpulla. — ☉.

Vedessä, harv. (T. Ke.) *Kahta isompi kuin 2 edellistä, alta punainen.* — *Spirodela Schleid.*

Muist. — Mieluinen ruoka hanhille ja ankoille, myöski kouruille j. n. e. kala-lammikoissa.

2 parvi. — *Acoroideæ*.*ACORUS* L. Šaimojuuri. Kalmus.

*A. calamus* L. — Puikelon ylempänä vana lehtimäinen, sangen pitkä. — 2 7, 8 vehreäkelt. kuk.

Rannoissa, harv. (T. U.) *Lehdet miekkamaisia; puikelo sormenpituinen, koteloton. Koko kasvi, etenki juurakko, väkevän ryytima-kainen.*

Muist. — Juurta kiitetään vatsaa vahvistavaksi ja terveelliseksi suussa pitää tarttuvaisten tautien aikana; taidetaan myös ulkomaan ryytien asemesta käyttää ruokiin. Lehtiä ei syö yksikään eläin.

3 parvi. — *Aroideæ*.*CALLA* L. Wešfa, fuomešfa. Missne.

*C. palustris* L. — Puikelo pitkulainen litteässä kotelossa; lehdet herttamaisia. — 2 6.

Soissa (E. — P. Kv.) *Kotelo sisälti valkea; hedelmä punamarjaisen kävyn näköinen.*

Muist. — Juuret kelpaavat leivän-aineksi kato-vuosina.

## 6 heimo. — JUNCACEÆ. Vihviläisiä.

LUZULA DC. Piippo. Bladtåg.

† Röyhyviuhko t. töyhtö monikukkaisilla, tiheillä, mykerömäisillä tähkillä.

*L. spicata* DC. Tähkäpiippo. — Kukat ryhmin haarovana, nuokkuvana tähkänä; kupulehdet kalvopäisiä, neulamaisella, kottaa pidemmällä odalla; korsilehdet harsukarvaisia. — 2 7.

Tunturikasvi, tav. (P. L. Lv.) *Tähkä tuuman pituinen, velto; lehdet kaitoja; toisint. lyhyellä, suppealla, pystönäisellä tähkällä: L. conglomerata* Mielichh. — *Juncus* *L.*

*L. hyperborea* RBr. Sapinpiippo. — Tähkä yksinäinen, pallero- t. munanmoinen, harv. 2—3 tähkää pystöisillä perillä; suojussuomut m. lehtimäisiä, kaljuja; kupulehdet suippoja, m. pallero- maisen kodan pituisia; korsilehdet levyisiä, litteitä, ynnä tuppien kanssa kaljuja. — 2 7, 8.

Tunturitien. harv. (Lv.) *Vaaksan pituinen, tankea; kaljuilla ja leveillä lehdillään seuraavasta lajista eroava. — L. campestris* *β nivalis* Læst. *L. arctica* Bl. *L. nivalis* Beurl.

*L. arcuata* Wg. Senfopiippo. — Tähkät palleromaisia, tav. 4—8-kukkaisia, m. hapsimaisilla, kaarevasti ulospäisillä perillä; suojussuomut pääpuolelta pitkäkarvaisia; kupulehdet otakärkisiä, pidemmät kun m. palleroinen kota; korsilehdet kaitoja, kourumaisia, m. kaljuja. — 2 7, 8.

Tunturi-tien. (L. Lv.) *Paljon hentoisempi ja vähemmällä kukilla kun seuraava; lehdet väl. muutamilla harvinaisilla laitakarvoilla.*

*L. campestris* DC. Sälöpiippo. — Tähkät munanmoisia, sarjattaisa epäpitkillä, suorilla perillä; kupulehdet ed.; suojussuomut resaliuskaisia (ei paljon t. ei lainkaan karvaiset); lehdet litteitä, runsaskarvaisia. — 2 5, 6. — *β pallescens* Wg.: tähkät pienempiä, vaalean-ruskeita; perät ja suomut pitkättäviä; korsi litteä-mäinen. — \* *multiflora* Lej.: kupulehdet äimämäisempiä; palhot lop. noin ponna pituisia; juuri hapsinen.

Niittumäissä, mets. tav. (E. — L. Lv.; \* E. — L. Lv.) *Pää-lajin ponnet monin kerroin palhoa pidemmät. — Juncus* *L.*

†† Töyhtö haarovilla kukkaperillä, yksinäisillä t. vaan harvoilla kukilla kussaki ryhmässä.

*L. parviflora* Desv. Tähkäfuffa-piippo. — Töyhtö kaari- maisesti ulospäisillä, monikukkaisilla haaroilla ja peräkkäillä, yksinäisillä, t. 2—3:lla ryhmäisillä kukilla; suojussuomut resaliuskaisia, karvattomia; lehdet soikeita, kaljuja; korsi lehtinen ylös asti. — 2 7.



**Tunturikasvi, harv. (L. Lv.)** *Kukat hyvin pieniä, m. kaikki pidemmällä t. lyhemmällä perykällä; korsi 2—3v aaksan pituinen, us. 1/2 tuuman levyisillä lehdillä.*

**L. Wahlenbergii Rupr.** *Lumpura-piippo.* — Töyhtö ja kukat ed.; suojussuomut resa- ja karvalaitaisia; lehdet suikulaisia, kaljuja t. harsukarvaisia tupen suulla; korsi latvapuolelta paljas t. 1:llä kaitaisella, röyhyn lähisellä lehdellä. — 24 7, 8.

**Tunturikasvi (Lv.)** *Pienempi ja kaitalehtisempi edellistä, vähän isommilla, mustanruskeilla kukilla. Parhaana tunnusmerkkinä ovat karvaripsuiset suomet.* — *L. spadicea Hn. ed. 5. L. parviflora B Wg. L. glabrata Fr.*

**L. pilosa Willd.** *Remätppiippo.* — Töyhtöhaarat harittavia, muin yksikertaisia ja 1-kukkaisia, muin 2—3-kukkaisia; kota munanmoinen, tylppäpäinen, pidempi suippoja kupulehtiä; korsilehdet suikeita, karvaisia. — 24 5, 6.

**Mets. tav. (E. — L. Lv.)** *Jalan pit. korrella, us. 4 linjan levyisillä lehdillä ja isommalla kodalla, kun muut lajit.* — *Juncus L. L. vernalis DC.*

### JUNCUS L. Bihwilä. Täg.

† **Korsi nivelettömillä lehdillä; kukat latvassa t. haarain sivussa.**

• **Siementen päällä läpikuultava kalvo; kukat mykerömäisissä ryhmissä.**

**J. biglumis L. Raffio-bihwilä.** — Korsi alempaa lehtien, lehdet äimämäisiä; 1—2 kukkaa äimämäisen, pystyn ja kukkia pidemmän suojuslehden sisällä; kupulehdet tylppäpäisiä, lyhemmät pitkulaista, lanttopäistä kotaa. — 24 7.

**Korkeammissa tunturi-tien. (L. Lv.)** *Sormen pituinen, hyvin harv. 2-mykeröinen; kukat vähän sivullepäin pystystä suojuslehdestä, joka tav. on kukkia pidempi; kota m. nuijamainen, ruskea, keltakulmainen.*

**J. triglumis L. Rosmiffio-bihwilä.** — Korsi ed. 1:llä, 2—4-kukkaisella mykeröllä latvassa; kupulehdet lyhemmät pystyä, vähän tylppäpäistä, lyhyt-otaista kotaa. — 24 6.

**Tunturi-tien. tav. (L. Lv.)** *Edellisen muotoinen lyhyillä, harv. keltaisia kukkia pidemmällä suojuksilla.*

**J. stygius L. Rimpibihwilä.** — Korsi ja lehdet rihma- maisia, jälkimäisiä tav. 2, toinen ylempänä korren keskustaa, toinen tyvellä; kukka-mykeröitä 2—3, vähän pitkällen erinneitä, 2—3-kukallisia; kota munais-pitkulainen, suippo, pidempi suippoja kupulehtiä. — 24 6, 7.

**Soissa, harv. (E. — L. Lv.)** *Välistä 1/2 kyynäräinen, ehkä kuk-*

*kiva alempana, aina hentoinen, vaalean-ruskeilla t. kellakkaisilla mykeröillä, lyhyillä äimämaisilla suojuslehdillä ja isoilla kodilla.*

*J. castaneus* Sm. Rusföwihwilä. — Korsi tankea, alemmaa monilehtinen; lehdet kourumaisia; mykeröitä 1—2, monikukallisia, tav. yhdellä pitkäveteisellä, pystyllä suojuslehdellä; kota ed. — 2½ 7.

Tunturi-tien. harv. (Lv.) *Ennen kukkimista Niittuvilla-heidin muotoinen; mykeröt mustanruskeita, enemm. lyhemmät suojuslehteä; kodat isoja, mustanruskeita.*

*J. trifidus* L. Rolsmijafö-wihwilä. — Korren tyvellä tuppia lyhyillä äimämaisilla lehdeksillä, ylempänä 2—3 pitkää, rihmamaista suojuslehteä ja 1—4, lehtihankoihin ryhmistynyttä kukkaa; kupulehdet m. lyhemmät pitkulaista, tylppää kotaa. — 2½ 7.

Tunturitien., tav. (P. L. Lv.) *Korsi ja lehdet rihmamaisia, edellinen alemmaa paljas, kuitenkin on samassa tuppaaassa ylimmäisen tupen lehden-aihe väl. kasvanut 1—2 tuuman pituiseksi lehdeksi.*

\*\*\* Siemenet ilman näkyväistä kalvoa; kukat latvatöyhtössä.

*J. bufonius* L. Ronnanwihwilä. — Korsi toishaarukainen t. haaraton, perättömillä kukilla latvassa ja sivuissa; lehdet rihmamaisia, kourumaisia; kota pitkulainen, tylppäpäinen, suippoisia kupulehtiä lyhempi. — ☉ 7.

Kost. paik. tav. (E. — L. Lv.) *1—6 tuuman pituinen; juuri hapsinen.*

*J. bulbosus* L. Sipuliwihwilä. — Korsi alapuolelta harvatehtinen; lehdet rihmamaisia, kouruisia; kupulehdet pyöreäntylppiä, palleroista kotaa lyhemmät. — 2½ 6, 7. — β *Gerardi* Lois. kota 3-kulmaisempi ja suippo.

Sant. ja kost. paik.; β merenrant. (A. — K.; β E. — P. Lv.) *Toisintees 3—13 tuuman pituisena, suikertavalla juurakolla, joka on selvempi ja vähemmin tupastava J. Gerardilla, jonka jälkimmäisen kukat myös ovat ruskeampia ja vähän isompia kun pää-lajin. — J. compressus* Jacq., H. M. F. — β *J. bottnicus* Wg. Fl. L.

†† Korsi solmunivelisillä lehdillä \*); kukat latvassa.

*J. supinus* Mönch. Rentowihwilä. — Korsi hentoinen, sipulimainen juurelta; lehdet hyvin epänivelisiä, juovalla päälystässä; mykeröitä 1—6, osittain peräkkäitä, osittain perättömiä; ulkomaiset kupulehdet suippoja, sisämäiset tylppäpäisiä, m. tylpä-

\*) Solmut tunnetaan, kun lehti vedetään läpi sormien ja kuivassa tilassa usein näkyvätki.

kän kodan pituisia — 2½ 6, 7. —  $\beta$  repens: korsi rento t. laitto, juur-rehtiva, lehtihankaisilla kukilla.

Kost. paik. (A. — U. H. Kv.) 3—6 tuuman pituinen vaaleamaisilla, vehreän-ruskeilla mykeröillä. — *J. uliginosus* Roth.

*J. alpinus* Vill. Notipää-miwilä. — Korsi pysty; lehdet epänivelisiä; työttö ei erittäin toiskertainen, m. pystyhaarainen; kaikki kupulehdet tylppäpäisiä, ainoasti ulkopuoliset lyhyellä odalla päässä t. lähinnä sen alla, suippoa kotaa lyhemmät. — 2½ 6, 7.

Kost. paik. (E. — L. Lv.) Korsi 6—12 tuuman pituinen, hoikka, tuntureissa monikukkaisilla, mustilla mykeröillä. — *J. nodulosus* Wg. *J. ustulatus* Hop. *J. fuscoater* Schreb.

*J. articulatus* L. Niwelmiwilä. — Korsi koheneva t. rento; lehdet litteähköitä, selvänivelisiä; työttö toiskertainen, ulospäisillä haaroilla; kupulehdet tasapitkiä, ulkomaiset otakärkisiä, sisämaiset tylppäpäisiä, lyhempiä kun otapäinen kota. — 2½ 6, 7.

Kost. paik. tav. (E. — L. Kv.) Val. lähes kyynäräinenki, väl. paljon lyhempi; kodat m. mustia ja kiiltäviä. — *J. lamprocarpus* Ehrh.

*J. acutiflorus* Ehrh. Suippomiwilä. — Korsi pysty; lehdet m. liereitä, selvänivelisiä; työttö toistain—kolmiskertainen; haarat ed.; kaikki kupulehdet lyhyesti otakärkisiä, muuten k. ed. — 2½ 6, 7.

Rant. erinom. mer. harv. (A. U. K.) 3—4 vaaksan pituinen, us. monikertaisella työttöillä. — *J. articul.  $\beta$  sylvaticus* L.

+++ Korsi kukilla sivussa latvan alla, lehdetön (ainoasti tuppia t. lehden-aiheita tyvellä).

*J. filiformis* L. Souhimiwilä. — Kukat harseassa, m. yksikertaisessa työttössä, hennon, rihmamaisen korren keskitienoilla; kota m. palleroinen, suikeita kupulehtiä lyhempi. — 2½ 6, 7.

Vet. paik. tav. (E. — L. Lv.) Kukat ja kodat vehreitä, t. hyvin vaalean-ruskeita, pitkältä hoikan korren latvasta alaspäin; korren tupet väl. lyhyellä lehden-aiheella.

*J. balticus* Willd. Rantamiwilä. — Kukat monilukuisia. työttö 3—4:llä, eripitkällä, monikukkaisella perällä; korsi sileä; kota pitkänpalleroinen, tylppämäinen, otapäinen; kupulehdet leveän suikeita. — 2½ 7.

Merenrant. ja tunturi-rämeissä (Ke. Pe. P. Lv.) Korsi vehreä ja jotenki tankea, epäjuomuin; kukat ja kodat ruskeita, paljon isommat kun seuraavissa. — *J. glaucus  $\beta$  littoralis* Wg. *Fl. Sv.*

*J. effusus* L. Röyhymiwilä. — Kukat monilukuisia toiskertaisessa, leveässä työttössä hienojuomuisen korren sivulla; heiteitä 3; kota valmiina vähän lanttopäinen, nyylätön. — 2½ 7.

Vet. paik. (E. — K. St. S. Pe.) *Töyhtö tav. vehreä, 1—2 tuuman pituinen, 4—6 tuumaa korren latvan alempana; korsi hie-*  
*nommilla juomuilla k. seur.*

*J. conglomeratus* L. *Äeräpää-wihwifä.* — Kukat sangen monilukuisia, ryhmin palleromaisessa mykerössä t. lyhythaaraisessa töyhtössä uurtojuomuisen korren sivulla; heteitä 3; kota ed., nyyllällä vartalon alla. — 4 7.

Vet. paik. (E. — P. Kv.) *Korren latva 4—6 tuumaa ylem-*  
*pänä ruskeaa kukkaryhmä.*

Muist. — Korresta tulee kauniita pöytäpeitteitä; sen siuksesta hyviä kynttilän ja lampun sydämmiä.

## 7 heimo. — NARTHECIACEÆ.

TOFIELDIA Huds. *Äarhunjheinä.*

*T. borealis* Wg. — Kukkaperät suojuksettomia, tyvellään kuvusta erinäisen, 3-halkoisen varuksen sisällä; vartalot sangen lyhyitä. — 4 6, 7 vaaleankelt. k.

Tunturitien. (P. Kv. L. Lv.) *3—6 tuuman pituinen; tähkä*  
*1/2 tuumainen; varus suojuksen asemesta.* — *Anthericum calyculat.*  
*β L. T. alpina* Sternb. *T. palustris* Huds.

## 8 heimo. — ALISMACEÆ. Sarpiokasveja.

1 parvi. — **Juncagineæ.**

TRIGLOCHIN L. *Suolafe. Sälting.*

*Tr. maritimum* L. *Ranta-suolafe.* — Luotteja 6; kodat (yh-  
tyneet lohkohedelmukset) 6-pesäisiä, munanmoisia, uurtuisia. —  
4 6, 7 vehr. k.

Merenrant. tav. (A. — Ke. St. — P. Kv. Lv.) *Kukat täh-*  
*kässä; lehdet paksun rihmamaisia.*

Muist. — Menestyvät hyvin viljennettynä karjan ruuaksi.

*Tr. palustre* L. *Suo-suolafe.* — Luotteja 3; kodat 3-pe-  
säisiä, m. tasasoukkia, kapeammat tyveltä; juuri hapsinen. — 4  
6, 7 vehr. k.

Suoniit. tav. (E. — L. Lv.) *Pienempi edellistä.*

SCHEUCHZERIA L. *Äewäffö.*

*Sch. palustris* L. — Kukat harseassa tertussa; lehdet äi-  
mämäisiä, soukkia, puoliliireitä, vähän kourumaisia. — 4 6.

Vesinevoissa (E. — L. Lv.) *Kukat pieniä, kellakkaisia, isoilla*  
*rippuvilla ponsilla ja useilla herneen kokoisilla hedelmyksillä.*

2 parvi. — **Alismæ.**SAGITTARIA L. *Seihosehti*. Pilört.

*S. sagittifolia* L. — Lehdet nuolikantaisia pitkäveteisillä, suippomaisilla liuskoilla; vana yksikertainen härkylä-haarisella röyhyllä, hedekukat ylempänä ja emikukat alempana. — 2 7, 8 valk. k. —  $\beta$  tenuior: kukat vähempiä; lehdet laiehtivia, pitkäveteisiä, liuskattomia t. vallan lyhytliuskaisia.

Ves. tav. (E. — P. Kv.;  $\beta$  T. S. — Kv. Lv.) *Ensi aluslehdet kaitaisia ja heinämäisiä, seuraavaiset pitkulaisia ja laiehtivia lyhyillä, tuskin ulospäisillä kantaliuskoilla; lehdet vasta kukan aikana nuolikantaisia.*

Muist. — Arvellaan vahingolliseksi eläimille. Juuret ovat sipulimaisia, syötäviä, ja viljennetään sentähden Kiinassa.

ALISMA L. *Scarpio*. Svalting.

*A. plantago* L. — Kukat härkylä-haarisessa röyhyssä; lehdet puikeita, väl. vähän herttakantaisia, suippoja; hedelmykset pyöröpäisiä, kiehkuroittain litteämaisissä ryhmissä. — 2 7 valk. t. punerv. k. —  $\beta$  graminifolium: lehdet kaitaisia, pitkiä, heinämäisiä.

Ves. tav. (E. — P. Kv. Lv.;  $\beta$  U. P.) *Toisintees vällistä herttamaisemmilla lehdillä.*

Muist. — Ei ole terveellinen eläimille.

3 parvi. — **Butomeæ.**BUTOMUS L. *Rimpi*. Blomvass.

*B. umbellatus* L. — Vana sarjakukilla; kaitaisilla, alemmaa 3-kulmaisilla lehdillä. — 2 7 valk. t. punerv. k.

Vedessä (E. — P. Kv.) *3—4 jalan pituinen isolla, kau- niilla kukkasarjalla.*

Muist. — Juurta monet venäläiskansat käyttävät leivän asemesta.

9 heimo. — **COLCHICACEÆ.**VERATRUM L. *Þärëfäjuuri*. Prustrot.

*V. album* var. *Lobelianum* Bernh. — Kukatertut tiheässä röyhyssä; kupuliuskat sirottavia, nyhähampaisia; lehdet tuppena varren ympäri, soikeita, suippoja. — 2 8.

Kost. paik. tunturi-tien. harv. (Lv.) *2—3 jalan pituinen, isolehtinen ruoho sisäpuoleltaki vaaleanvehreillä kukilla.*

Muist. — Juuri on tuttu aivastus-aineena. Myös käytetään sitä eläinten lääkkeeksi. On vaarallinen varomattomasti vil-

jeltynä. Nuorena kun vanhanakin on itse ruoho eläinten ruuan seassa myrkyllinen hevoisille, lehmille, lampaille, siemenet hanhille ja kanoille. Juurta pienennettynä taidetaan sekoittaa mallasjauhoihin hiirten kuolettamiseksi.

## 10 heimo. — LILIACEÆ. Liljakasveja.

### 1 parvi. — Asparageæ.

PARIS L. Sudenmarja. Trollört.

*P. quadrifolia* L. — Lehdet tav. 4 (harv. 3—6) säteettäin. — 4 5, 6.

Leht. tav. (E. — P. Kv. Lv.) *Varsi haaraton, isolla vehreämmisellä latvakukalla; marja mustansininen.*

Muist. — Kasvi tuoreena nautittuna ulostaa, ja sama voima on sillä kuivana ja pienennettynä, kun jotakin lämmintä sen päälle juodaan. On käytetty vävähtelemisiä ja hinkua vasten. Marjoja murskattuina on kiitetty hyväksi lääkkeeksi, ja marjamehua pyhäistynä silmiin vuorossa.

MAJANTHEMUM DC. Drawanmarja. Ekorrbär.

*M. bifolium* DC. — Kukut tertussa; lehdet herttamaisia, ruodikkaita, vuorottaisia. — 4 6, 7 valk. k.

Kost. metsämaissa, tav. (E. — L. Lv.) *Lehtiä tav. 2; marjat keltaisia, pilkullisia.* — *Convallaria* L. *Smilacina* Desf. *M. convallaria* Web.

CONVALLARIA L. Riefo. Konvalje.

† Kukut torvimaisia, lehtihankaisia: *Polygonatum* Tourn.

*C. multiflora* L. Maarianrieffo. — Perät monikukkaisia; lehdet vuorottaisia, sepokantaisia, kaljuja; varsi liereä. — 4 5, 6.

Leht. harv. (A. — U. St.) *Väl. kyynäränsi pituinen; perät enemm. 3-kukkaisia; kukat valkeita vehreämmisillä hampailla; marjat mustansinisissä.*

*C. polygonatum* L. Kulmikasrieffo. — Perät 1—3-kukkaisia; lehdet vuorottaisia, sepokantaisia; varsi kulmikas. — 4 5, 6.

Mäk. (E. — Pe. Kv.) *Perät enemm. 1-kukkaisia; kukat ja marjat ed.*

Muist. — Juurakot taidetaan kuivattuna, jauhattuna ja vähän muilla jauhoilla sekoitettuna nälkävuosina leiväksi käyttää. Turkin kansalla on se ilmanki tavallinen ruoka-aine keitettynä.

†† Kukut kellomaisia.

*C. majalis* L. Sehmänrieffo. — Vana lehdetön; kukkaterttu yhdäppäinen; aluslehdet leveän-suikeita. — 4 5, 6 valk. k.

Metsämaissa, tav. (E. — P. Kv.) *Kukat hyvälle hajautavia; marjat punaisia.*

Muist. — Juurakkoa on käytetty aivastus-aineeksi väväh-telemisiä vasten, myös leivän-aineeksi katovuosina.

## 2 parvi. — *Asphodeleæ.*

GAGEA Salisb. Räänrieska. Värilök.

G. minima Schult. Räämpä räänrieska. — Sarja peräkäs, harvakukkainen, yksinäisellä leveällä suojuslehdellä; kupulehdet suipukoita; aluslehti yksinäinen, hyvin kaitainen. — 2½ 5, 6 kelt. k.

Viljelöm. (A. — K. St. H. S. Kv.) *Sormen pituinen; aluslehti usein hyvän linjan levyinen, nuorilla joutosipuleilla m. jouhimainen. — Ornithogalum L.*

G. lutea Schult. Sjömpi räänrieska. — Sarja perätön haarattomilla, kaljuilla kukkaperillä; kupulehdet pyöreän-tylpäköitä; aluslehti sipulista lähtevä, yksinäinen, suikulainen. — 2½ 5, 6 kelt. k.

Vilj. harv. (A. — U. St. H.) *Aluslehdet parin linjan levyisiä; kupulehdet m. tuuman pituisia, väl. vähän lyhemmätkin, ei paljon pidempiä kun ed. — Ornithogalum L.*

ALLIUM L. Sauri. Lök.

† Kaikki palhot kokonaisia, äimämäisiä.

A. schœnoprasum L. Ruohosauri. — Sarja m. palleroi-nen, ilman sipuli-umpuita; heteet kupua lyhemmät, äimämäisiä, kannalta leveämpiä; lehdet tav. liereitä, pillikkaita. — 2½ 6, 7 pun. k. — β sibiricum L.: isompi ja järeämpi; lehdet päältäpuolen litteämpiä.

Kallio-tien. etenki merenrant. (A. — Ke. Kv. Lv.; β Kv. Lv.) *Pienoisella, kynän paksuisella sipulilla. — A. sibiricum var. schœno-prasoides Fr.*

Muist. — Yleisesti tuttu ruoka-ryyti. — Lääkkeenä nau-tittu hiuttava, vesityttävä ja puhkuttava, hyödyllinen hengen-ah-dossa, yskässä, leinissä, kerpukissa, horkassa. Iholääkkeenä nos-taa rakkoja, jouduttaa paiseita ja ajoksia. Mehua käytetään savi-puolen voiteeksi.

A. ursinum L. Karhunsauri. — Vana kulmikas; sarja ta-sapäinen, ilman sipuli-umpuita; lehdet litteitä, suikeita, ruodik-kaita. — 2½ 5, 6 valk. k.

Leht. harv. (A.) *Lehdet tuuman levyisiä.*

Muist. — Missä tämä kasvaa, siinä harvoin muu ruoho menestyy. Juurta, ehkä kirpeäki, syödään Siperiassa, Irlannissa

j. m. p., ja lehtiä käytetään kaalein seassa. Myyräin sanotaan tätä kasvia inhoavan. Kun sitä tahi muita sipuleita lehmät syövät, saapi maito ja voi pahan maun.

*A. oleraceum* L. *Sturmilauffa*. — Sarja sipuli-umpuilla, sen kotelo-lehdet pitkällä, 3-kulmaisella odalla; heteet tylppäpäisten, lyhyt-otakärkisten kupulehtien pituiset; varsilehdet puolilie-reitä, karheahkoita, alta kulumikkaasti suonisia. — 2 7, 8 pun. t. ruskeankelt. k.

Niit., vuor. harv. (A. — K. H. S.)

Muist. — Käyt. kaalilaitosten sekaan.

†† Joka toinen palho 3-päinen, ponsi keskiliuskalla: *Porrum* Tourn.

*A. scorodoprasum* L. *Metjälauffa*. — Varsi liereä, sipuli-umppuisella sarjalla; lehdet litteitä 2-särmäisillä tupilla; kupulehtien venho hienonyhermäinen. — 2 7 punasin. k.

Leht. harv. (A.) *Lehdet 2—4 linjan levyisiä*.

Muist. — Käyt. kuin ed.

## 11 heimo. — NAJADACEÆ.

### NAJAS L. *Näfinruoho*.

*N. fragilis* Rostk. *Sauraš näfinruoho*. — Yksikotinen; lehtiä 3 säteettäin, hyvin soukkia, taaskääntöisiä, harseasti otahampaisia, m. pyöreillä, poikkipäisillä, ripsihampaisilla tupilla; hedelmä liereän-pitkulainen pitkällä, haarapäisellä odalla. — ☉ 7—9.

Seisovassa vedessä, harv. (U. H.) *Veden-alainen, 1—2 vaak-san pituinen, hyvin hauras kasvi; varsi tyvestä toishaarukkainen; ponsi 1-lokeroinen, pitkänpyöreä lyhyellä, paksulla palholla; lehdet harv. 2, vastakkaisia*. — *N. minor* All., Koch. *Caulinia* Willd.

*N. flexilis* Rostk. *Notfea näfinruoho*. — Kaksikotinen; lehtiä 5—6 säteettäin, tasasoukkia, latvalta hieno-hampaisia; hedelmä munaisen pitkulainen. — ☉ 7—9.

Järv. harv. (H.) *Vaaleanvehreä, notkeampi kun ed.; lehdet vähän leveämmät, tyveltä ehytläitaisia, ainoasti latvalta sangen hienohampaisia*.

*N. marina* L. *Meri-näfinruoho*. — Kaksikotinen; lehtiä 2—3 säteettäin, kaitaisia, vuorottain vähän mutkahampaisia; hedelmä k. ed. — ☉ 7—9. — *β muricata*: varsi piikkinen, punanivellinen.

Merenlaht. harv. (A. T. U. Pe.; *β* U.) *Tankeampi ja järeämpi k. edd.; kasvaa ja kukkii veden alla; hedekasvi harvinaisempi*;



*ponsi 4-lokeroinen, tav. epäluomainen ja palhoton; mutta jos kasvi otetaan ylös vedestä, nähdään se väl. saavan lyhyen palhon ja avautuvan 4:ksi taaskierteiseksi liuskaksi. — N. major Roth.*

## 12 heimo. — HYDROCHARIDACEÆ. Kilpukkaisia.

HYDROCHARIS L. Kilpuffa. Dyblad.

H. morsus-ranæ L. — Lehdet pyöreitä, herttakantaisia. — 2½ 7 valk. k.

Seisovassa ved. (T. — K. H. S. Kv.) *Kasvi laiehtiva; lehdet tuuman levyisiä, Lumpeen lehden muotoisia; kukat juurakosta lähteviä.*

STRATIOTES L. Sahalehti. Vattenaloë.

Str. aloides L. — Lehdet kaitaisia, venhomaisia, sahamaisesti piikkilaitaisia. — 2½ 7, 8 valk. k.

Seisovassa ved. harv. (H. S. K. Kv. P.) *Lehdet juuresta yltä ympäräisiä, joiden keskeltä kukka-vana nousee; koko kasvi paitsi kukkimisen aikana veden alla.*

## 13 heimo. — IRIDACEÆ. Kurenmiekkaisia.

IRIS L. Kurenmieffa. Svärdsilja.

I. pseudacorus L. — Kupuliuskat kaljuja, sisämäiset tassoukkia, kaidempia ja lyhempiä kun luotit; lehdet litteitä, miekkamaisia. — 2½ 6, 7 kelt. k.

Rannoissa (A. — K. St. — S. Kv.) *Kukat isoja, loistavia: lehdet tuuman levyisiä, noin varren pituisia.*

Muist. — Juurakko tuoreena karvas, tynpeä ja ulostava vähemminki nautittuna. Annos 6—8 herneen vertaa. Kuivana kadottaa enimmäen voimansa ja muuttuu hajahtavaksi. Hyödyttävä vilustus-yskässä, vesitaudissa. Sekoitetaan tav. raparperilla t. ulostin-suolalla. Taikka leikellään tuoretta juurakkoa lohkoiksi, pannaan viiniin tahi hyvään olueen, ja nautitaan siitä sekoia 1—2 ruokalusikallista tarpeen suhteen. Puserrus-mehua taidetaan myös antaa 40—50 tippaa. Alusta aina nautitaan vähemmin, sillä juurakko on kovin ulostavaa. — Juurakosta keittämällä vihrillin seassa saadaan kirjoitusmustetta, kukista viin-etikan kanssa keltaväriä, joka kumilla sekoitettuna kelpaa riittaustöihin.

## 14 heimo. — ORCHIDACEÆ. Kämmeikkäisiä.

1 parvi. — **Cypripediceæ.**

CYPRIPEDIUM. Ränenmirju. Guckuskor.

C. calceolus L. — Kuvun iso pullakka huuli vähän lit-

teämäinen, lyhempi toisia kupulehtiä; varsi monilehtinen, lehdet soikeita, suippoja. — 2 6.

Kost. katveisissa metsäpaik. harv. (S. K. Kv. P. L. Lv.) *Isoimmilla kukilla koko heimossa; huuli iso kun vähäinen peruna. keltainen; toiset kupulehdet 2 tuuman pituisia, ruskeita; varsi tav. 1-, harv. 2-kukkainen; juurakko suikertava.*

## 2 parvi. — *Vandæ.*

CALYPSO Salisb. Steidenfenfä. Jungfrutoffel.

*C. borealis* Sal. — Huulen laide m. munanmoinen, ulottuva yli kannuksen; lehti vanan sipulimaisesti turvenneelta tyveltä lähtevä, yksinäinen, puikea. — 2 5, 6.

Kost. leht. harv. (P.) *Vana 3—6 tuuman pituinen, tupellinen, iso kukka latvassa, jonka huuli ruskean-pilkullinen, toiset kupulehdet vaaleanpunaisia. — Cypripedium bulbosum L. Orchidium arcticum Sw. Norna Wg.*

## 3 parvi. — *Malaxideæ.*

CORALLORRHIZA Hall. Sarajuuri. Korallrot.

*C. innata* RBr. — Tähtkä harvakukkainen, suipoilla kupulehdillä; huuli pitkulainen. — 2 6 kelt. k.

Kost. mets. (E. — L. Lv.) *Vana 6--10 tuuman pituinen, lehdetön, suomuinen; juurakko paljon haarova. — C. nemoralis Sw. C. virescens Drey. Ophrys corallorrhiza L.*

MALAXIS Sw. Suowalffu. Myggblomster.

*M. paludosa* Sw. Bähempi suowalffu. — Huuli puikea, suippo; suojus sikiäimen pituinen; vana monikulmainen; lehtiä 2 t. 3 vastopuikeita. — 2 7, 8 vehreänkelt. k.

Soissa, harv. (A. — U. H. — Kv. Pe.) *2--3 tuuman pituinen; tähkä soukka monilla, hyvän linjan kokoisilla kukilla; vana tyveltä sipulimainen. — Ophrys L.*

*M. monophylla* Sw. Sjömpi suowalffu. — Kupuhuuli pyöreämäinen pitkällä, soukalla päällä; suojus lyhempi sikiäintä; vana 3-kulmainen; lehtiä 1, harv. 2, soikeita. — 2 6, 7 vaaleankelt. k.

Soissa, harv. (U. H. — Kv. P.) *5—8 tuuman pituinen; 1—2, aivan harv. 3, lehtiä vanan sipulimaisesta tyvestä; tähkä pitkä ja soukka monilla, vähän pienemmillä kukilla kun ed. — Ophrys L. Microstylis Lindl.*

4 parvi. — **Neottieæ.****NEOTTIA** L. *Desfäfe. Nästrot.*

*N. nidus-avis* Rich. — Vana lehdetön, suomuinen; kupuhuuli 2-halkoinen ulospäisillä liuskoilla. — 2/ 6, 7.

Metsämaissa, mädäntyneitten lehtien seassa j. n. e. harv. (A. U. H. K.) 6—12 tuuman pituinen, ruskeankeltainen, niinkuin kukatki; juurakko monilukuisilla, paksuilla, m. kuin linnun pesä kimputuilla lisäjuurilla. — *Epipactis* Sw.

**LISTERA** RBr. *Saffiffo.*

*L. cordata* RBr. *Perffafäfffo.* — Varsi kalju, 2:lla m. vastakkaisella, epänelisellä lehdellä; huuli haljennut 2:ksi nirkoksi liuskaksi ja 2:lla pienellä sivuliuskalla kannassa. — 2/ 6, 7 ruskeankelt. k.

Mets. sammalissa (E. — L. Lv.) 5—7 tuuman pituinen, hento, sammalissa suikertavalla juurakolla; tähkä tuuman pituinen. — *Ophrys* L. *Epipactis* Sw.

*L. ovata* RBr. *Soiffafäfffo.* — Varsi lienteä, 2:lla m. vastakkaisella, leveän-soikealla lehdellä; kupuhuuli haljennut 2:ksi kaitaiseksi, tylppäpäiseksi liuskaksi. — 2/ 6, 7 vehreänkelt. k.

Metsäniit. (E. — Pe. Kv.) 1—2 jalan pituinen suikertavalla juurakolla monilukuisilla lisäjuurilla kimpussa; tähkä soukka ja pitkä. — *Neottia latifolia* Rich.

**EPIPACTIS** Crantz. *Neidenwaippa. Knipprot.*

*E. palustris* Cr. *Baffea* neidenwaippa. — Juurakko harvoilla lisäjuurilla, suikertava; huuli herttamainen, pyöreän-tylppäpäinen ja kiherä, toisten kupulehtien pituinen; varsilehdet sui-keita, aliset väl. m. soikeita. — 2/ 7, 8.

Kost. niit. harv. (A.) Kuvun ulkolehdet vehreitä, sisältä punertavia, sisälehdet valkeita t. punervia; sikiäin soukka, lienteä. — *E. longifolia* Reich. fil. *Serapias longifolia* L.

*E. latifolia* Sw. Punainen neidenwaippa. — Juurakko monilukuisilla, kimputuilla lisäjuurilla; kupuhuuli herttamainen, suippo, taaskierteinen, lyhempi toisia kupulehtiä; sikiäin kalju; lehdet puikeita t. leveän-soikeita, yliset suippoisia. — 2/ 7, 8.

Metsämäissä, harv. (A. — K. H. S. Kv.) Iso kasvi, ennen kukkimista nuokkuvilla tähkillä; kukat vaalean-vehreitä t. ruskeamaisia. — *Serapias helleborine* L. Fl. Sv. *S. latifolia* L. Mant. 2.

**CEPHALANTHERA** Rich. *Baffu. Skogslilja.*

*C. ensifolia* Rich. — Huuli tylppäpäinen; suojus lyhempi sikiäintä; lehdet miekkamaisia, suippoisia. — 2/ 6, 7.

Metsäniit. harv. (A.) *Juurakko kimputuilla lisäjuurilla; kukat isoja, valkeita, harv. punaisia.* — *Serapias* Wg. *Ser. grandiflora* L. *Epipactis* Sw.

#### GOODYERA RBr. Ȣōwilffa.

*G. repens* RBr. — Tähkä yhtäällisillä kukilla; kupulehdet suikeita, ulkopuoliset lienteitä; varsilehdet puikeita, verkkosuonisia. — Ȣ 7 valk. k.

Mets. sammalissa (E. — L. Lv.) *Juurakko rihmamaisesti sammalpohjassa suikertava ilman maahan tulematta; tähkä soukka pienillä kukilla; verkkosuonet kuihtuneissa lehdissä selvempiä.* — *Satyrium* L. *Neottia* Sw.

#### EPIPOGIUM Gmel. Metſän-emä. Skogsfru.

*E. aphyllum* Sw. — Vana paljas, lehdettömillä tupilla; juurakko monihaarainen. — Ȣ 7, 8.

Mets. harv. (H. S.) 4—8 tuuman pituinen, vaalean keltaruskea, 2—6:lla isolla, vaaleankeltaisella kukalla ja punervalla kanuksella. — *Satyrium epipog. L. E. Gmelini* Rich.

#### 5 parvi. — Ophrydeæ.

##### HERMINIUM L. Metſifuffa. Desmansblomma.

*H. monorchis* RBr. — Kuvun sisälehdet ulkolehtiä pidemmät, keskeltä äkisti tasasoukaksi pääksi supistuneet; huuli m. suoraan ulospäisillä sivuliuskoilla. — Ȣ 6, 7 vehreän-kelt. k.

Niit. harv. (A.) 3—7 tuuman pituinen, tav. 2:lla suikealla lehdellä tyvessä; varsimukula palleroinen, kukkimisen aikana aina yksindinen. — *Ophrys* L.

##### CHAMÆORCHIS Rich. Orhuffa. Dvergxyne.

*Ch. alpina* Rich. — Huuli puikea; lehdet juurehsia, kaitaisia, noin varren pituisia. — Ȣ 7, 8.

Tunturikasvi, harv. (L. Lv.) 2—3 tuuman pituinen pienillä, kellanvehreillä, kypärimäisesti suljetuilla kukilla, kokonaisilla, pitkänpalleroisilla varsimukuloilla. — *Ophrys* L. *Herminium* Sw.

##### OPHRYS L. Orhø. Flugxyne.

*O. myodes* L. — Kuvun 2 sisälehteä rihmamaista; huuli 3-halkoinen kaidoilla sivuliuskoilla, keskiliuska pitkäveiteinen, levenä ja päästä 2-liuskainen; varsilehdet pitkulaisia t. suikeita. — Ȣ 6, 7.

Kost. niit. harv. (A.) *Varsimukulat palleroisia; tähkä harsea; kukat kaukaa katsoen kärpäisen muotoisia; kuvun sisälehdet*

ruskeita, ulkomaiset vehreitä, huuli nokiruskea, joskus valkea. — *O. muscifera* Huds.

CŒLOGLOSSUM Hn. Maariaufämmä. Pungyxne.

*C. viride* Hn. — Kuvun sisälehdet paljon kaidemmat ulkolehtiä; huuli päästä 3-hampainen, keskihammas lyhempi; lehdet pitkän-soikeita. — 24 6, 7.

Metsäniit. (E. — L. Lv.) *Varsimukulat kämmekkäisiä; kukat kellanvehreitä, suojuksia lyhemmät.* — *Satyrium* L. *Orchis* Sw. *Habenaria* RBr. *Peristylis* Lindl. *Platanthera* Reich. fil.

PLATANTHERA Rich. Lehdoffi. Skogsviol.

*Pl. chlorantha* Cust. Wehreä lehdoffi. — Kannus hoikka, alhaa keskustan paksumpi ja vähän litteämäinen, 2—3 kerroin sikiäintä pidempi; ponnien lokerot kannalta paljo erillään, ylempää toistansa lähempiä; varsi alhaalta 2-lehtinen. — 24 6, 7.

Metsäniit. harv. (A. T.) *Tav. isompi ja leveälehtisempi kuin seur. laji; kukat m. kaksi vertaa niin isoja, vähän vehreämpiä ja hajahtavia; kupulehdet yhdistyviä, ja ponsilokerot kulmittain toinen toiseensa.* — *Pl. montana* Reich. fil.

*Pl. bifolia* Rich. Wallea lehdoffi. — Kannus rihmamainen, m. tasapaksu, 2—3 kerroin sikiäintä pidempi; ponsilokerot rinnakkaisia; varsi kuin ed. — 24 6, 7 valk. k.

Metsäniit. (E. — P. Kv. Lv.) *Varsimukulat haarattomia; lehdet pitkän soikeita; kukat hyvin hajahtavia.* — *Orchis* L. *Satyrium* Wg.

GYMNADENIA RBr. Kirsiheinä. Brudgran.

*G. albida* Rich. Wallea firsiheinä. — Huulen keskiliuska hiukan isompi sivuliuskoja; kannus monin kerroin sikiäintä lyhempi, m. pussimainen; lehdet pitkulaisia, aliset latvapuolet leveämpiä; mukulat kokonaan sormijakoisia. — 24 7.

Kuiv. niit. harv. (P. Lv.) *Tähkä tiheä pienillä, kellan valk. kukilla.* — *Satyrium* L. *Orchis* Sw. *Habenaria* RBr.

*G. conopsea* RBr. Punerwa firsiheinä. — Kuvun huuli tasamukaisesti 3-liuskainen; kannus rihmamainen, paljon pidempi sikiäintä; lehdet kaitaisia — suikeita; mukulat kämmekkäisiä. — 24 6, 7 pun., väl. valk. k. —  $\beta$  *lapponica*: sormen pituinen ja muuten kaikin puolin vähempi; kannus m. kahdesti sikiäintä pidempi.

Niit. (E. — L. Lv.;  $\beta$  P. L. Lv.) — *Orchis* L. *Satyrium* Wg.

ORCHIS L. *Rämmeffä*. Yxne.

† Varsimukulat sormihalkoisia.

*O. maculata* L. *Maarianfämmeffä*. — Huuli 3-liuskainen; kannus m. sikiäimen pituinen; kuvun ulkolehdet ulospäisiä; aliset suojukset kukan pituisia, yliset lyhempiä; varsilehdet pitkulaisia — kieloisia, keskustalta t. latvapuolelta leveämpiä; ylinen lehti tähkästä paljon erillään; varsi täyteinen. — 2 6, 7. —  $\beta$  *curvifolia*: lehtiä 3—4, suikulaisia, kouruisia, taaskääntöisiä; kukka-tähkä harsumpi. —  $\gamma$  *lapponica*: noin sormen pituinen ja 2—3-lehtinen; kukat harvempia, puolen sikiäimen pituisilla kannuksilla.

Kost. niit. (E. — L. Lv.;  $\beta$  Kv. P.;  $\gamma$  P. L. Lv.) Kukat *sini-kiuhaavia* t. *valkeita sinipunervilla pilkuilla*; lehdet *tav. ruskeapilkkuisia*. —  $\beta$  *O. curvifolia* Nyl. —  $\gamma$  *O. lapponica* Reich.

*O. Traunsteineri* Saut. *Souffalehti fämmeffä*. — Huuli pyöreämäinen, matalasti 3-liuskainen, nyhälaitainen; aliset suojuslehdet kukkain pituisia; kuvun ulkolehdet alaspäisiä; varsilehdet kaitaisia, suikeita t. pitkulaisia, keskustalta leveämpiä; ylinen lehti tähkän tyveen ulottuva; varsi pillikäs. — 2 5—7 pun. k.

Kost. niit., soissa, harv. (U. K. Kv. P.) 6—10-tuumainen *isomilla*, *harvemmillä kukilla*, noin  $\frac{1}{3}$  tuuman levyisillä lehdillä; *luultavasti vaan seuraavan toisintelo*. — *O. augustifolia* Reich., *H. M. F.*

*O. incarnata* L., Fr. *Punafämmeffä*. — Huuli ed.; kannus m. sikiäimen pituinen; kuvun 2 ulkolehteä ulospäisiä; suojukset kalvomaisia, monisuonisista, kukkia pidemmät; varsilehdet pystyjä, suikeita, vähän venhoisia; ylinen lehti ja varsi k. ed. — 2 5, 6 pun. k. — \* *cruenta* Müll.: kukat tummanpunaisia; lehdet puikean suikeita, hyvin ruskeapilkkuisia.

Niittumäissä, harv. (A. St. H. K. Kv. Pe. P. — \* A.) *Vaakan pituinen*; huuli kannalta kellertävä; lehdet *tav. pilkuttomia*. — *O. angustifolia* Wimm., *Hn.*

*O. latifolia* L. *Semytlehti fämmeffä*. — Huuli loivaan 3-liuskainen; kannus lyhempi sikiäintä; kuvun 2 ulkolehteä alaspäisiä; suojukset kukkia pidemmät; varsilehdet soikeita t. pitkulaisia, keskustalta leveämpiä; ylinen lehti ja varsi k. ed. — 2 5, 6 pun. k. —  $\beta$  *elatior* Fr.: pidemmällä varrella; lehdet kaidan suikulaisia, pilkullisia, vähän siirottavia.

Kost. niit. ja soissa, harv. (A. St. S. P.;  $\beta$  Kv.)  $\frac{1}{2}$ —1 jalan pituinen; lehdet 1—1 $\frac{1}{2}$  tuuman levyisiä, 3—4 tuuman pituisia, ulospäisiä, *tav. ruskeapilkkuisia*. — *O. majalis* Reich.

†† Varsimukulat pitkulaisia, ainoasti päästä halkoiset.

*O. sambucina* L. *Uhofämmeffä*. — Huuli pyöreämäinen,

loivaan 3-liuskainen, nyhälaitainen; kannus m. sikiäimen pituinen; kuvun 2 ulkolehteä siirottavia; suojukset kalvomaisia, monisuonisia, kukkainsa pituisia; aliset varsilehdet päästä leveämpiä, tylppäpäisiä. — 24 5, 6.

Niittumäissä, harv. (A. T.) *Kukat toisintelevät keltaisina ja sinervänpunaisina, samanvärisillä suojuksilla.*

††† Varsimukulat eheitä.

*O. militaris* L. Ritarin kummeffä. — Huuli jakaunut 3:ksi kaitaiseksi liuskaksi, joista keskimäinen pitkäveteinen, päästä levenevä 2:ksi siipimäiseksi, otaväliseksi liuskaksi, sivuliuskat hapsimaisia; toiset kupulehdet suippoisia; kannus ja puikeat suojukset paljon lyhemmät sikiäintä. — 24 6.

Leht., niit. (A.) *Kukat isoja, punahuulisia, kypärimäisesti suljetuita; kupulehdet sinikiuhaavia; varsilehdet suikean-pitkulaisia, usein yli tuuman levyisiä.*

## II. — KAKSISIRKKAISIA.

15 heimo. — SYNANTHEREÆ. Yhdisponsisia.

1 jako. — **Corymbifera.**

1 parvi. — **Senecioneæ.**

BIDENS L. Ruusoffi. Brunskära.

B. cernua L. Ruusoffi. — Koppilo nuokkuva; kuorusjyvät tav. 4-sukaisia; lehdet kokonaisia, puolisepoisia, suikeita — tasasoukkia, sahalaitaisia. — ☉ 7—9 kelt. k. —  $\beta$  radiata: sädekukkaset pitkävetisiä.

Vet. paik. (E. — P. Se. K.;  $\beta$  St.) *Epäpitkällä varrella.*

Muist. — Ennen kukkimista otettuna ja kuivattuna painaa alunavedessä liotetun villaisen ruskean-kellerväksi.

B. tripartita L. Ruusoffi. — Koppilot säteettömiä, pystöisiä; kuorusjyvät 2—3-sukaisia; lehdet ruodikkaita, tav. 3-halkoisia t. 3-jakoisia, liuskat pykä- ja hammaslaitaisia; varsi haarakas. — ☉ 7, 8 kelt. k.

Vet. paik. tav. (E. — P. Kv.) 2 vaaksan pit., isommilla lehdet monijakoisempia kuin pienemmillä; maku karvaan-, kitkerän- ja ryytisekainen; kukat syksymmiten ruskeita.

Muist. — Sopii paineeksi, kuin edellinenki laji.

CHRYSANTHEMUM L. Päivänfuffa. Prestkrage.

Chr. segetum L. Kelta päivänfuffa. — Lehdet puolisepoisia, kannalta sahalaitaisia, latvalta liuskaisia ja hammaslaitaisia; kehtosuomut leveän-puikeita. — ☉ 7, 8 kelt. k.

Pelt. harv. (S.) *Sinervä kasvi, isoilla kullankeltaisilla kukkaistoilla.*

Chr. leucanthemum L. Valkea päivänfuffa. — Lehdet puolisepoisia, suikeita, sahalaitaisia, kannalta liuskahampaisia, aliset ruodikkaita, lapiemoisia; kehtosuomut suikeita. — 4 7 valk. sädek.

Kuiv. paik. yl. (E. — P. Kv. Lv.) — *Leucanthemum vulgare* Lam.



*Chr. arcticum* L. Lapin päivänfuffa. — Lehdet ehytlaitaisia, soukkia, aliset ruodikkaita, nalkkimaisia, päästä m. 3-liuskaisia; kehtosuomut puikeita. — 2½ 8 valk. sädek.

Kallioisilla merenrant. (Lv.) *Lyhyt, möyheä kasvi 1:llä, edellisen näköisellä koppilolla; enimmäst suomut mustankälpeitä.*

*Chr. bipinnatum* L. Runnu päivänfuffa. — Lehdet vaalean-harmaita, höykeitä, toistain pariosaisia soukilla, us. sahampaisilla liuskoilla; kehto puolipalleroinen myötäisillä, kalpeä-laitaisilla somuilla; sädekukkasat kehräkukkasia lyhemmät, väl. ei ollelkaan. — 2½ 8 kelt. k.

Kuiv. aukeilla paik. harv. (Lv.) *Pystyvartinen, 1- t. harvakoppiloinen, m. Pietaryrtin näköinen ruohoke. — Pyrethrum Willd.*

**MATRICARIA** L. Saunafuffa, Saunio. Sötblomster.

*M. chamomilla* L. Sameli-saunio. — Kukkaistot pitkäperäisiä, säteikkaitä; kehräkukkasat 5-hampaisia; lehdet toistain pariosaisia rihmamaisilla liuskoilla. — ☉ 6, 7 valk. sädek.

Kuiv. kylätien. (E. — Pe. H. S.) *2 vaaksan pit., haaraisella varrella, myöhemmin alas-kääntyvillä sädekukkasilla, hyvällä, väkevän-sekaisella hajulla.*

Muist. — Kukilla on hiestyttävä, lieventävä, vatsanvähvistava voima, hyödylliset horkkaa, äkkyä, väänteitä, ulkotalia, kouristajaa, kivitautia, jälkipureita, emätautia vastaan. Nautitaan joko kuiviltaan hienonnettuna teelusikallinen t. runsaampi erällä (horkassa väliaikana), taikka teenä kiehuvan veden t. juoman kanssa laitettuna, taikka kukkaviinana. Ulkonaisesti käytetään niitä lavemangeiksi vatsan vaivoissa ja kuiviltaan (lämpimiksi) haudekääräksi kaikenlaisia kivistyksiä ja ajetuksia lieventämään ja vanhoja mätähaavojakin parantamaan. — Myös saadaan kukista kaunista keltapainetta.

*M. discoidea* DC. Kehrä-saunio. — Kukkaistot lyhytperäisiä, säteettömiä; kukkasat 4-hampaisia; kuorusjyvät epäkehäkkäisiä; lehdet ed. — ☉ 7, 8 vehr. k.

Pih. ja kat. harv. (T. U. H. S.) *Tav. edellistä haarallisempi, muuten samanhajuinen; marto keilamainen. — Cotula matriarioides Bong.*

**TRIPLEUROSPERMUM** Schultz. Sarafanhattu. Hvitkullor.

*Tr. inodorum* Sch. — Kuorusjyvät kalvopalteisella latvalla; lehdet toistain pariosaisia tasasoukilla, alta litteillä, rihmamaisilla liuskoilla. — β *salinum*: lyhemmillä, möyheähköillä lehtiliuskoilla. — ☉ 6—8 valk. sät.

Pih. ja pelt. yl.; β mer. (E. — L. Lv.; β A. — Ke. Kv. St. — Pe.)

2—3 vaaksan pit., isoilla kukkaistoilla kuin valkea Päivänkukka, ja lehdillä kuin Kameli-saunio. —  $\beta$  matalampi t. lamova pienemmillä kukkaistoilla ja m. liereillä lehtiliuskoilla. — *Matricaria* L. *Pyrethrum* Sm. —  $\beta$  *Tr. maritimum* (L.) Hn.

### ANTHEMIS L. Sauramo. Åkerkullor.

*A. tinctoria* L. Keltasauramo. — Marto lop. kehkerä; kuorusjyvät kalvomaisella, eheällä kehäkkeellä; lehdet parijakoisia; lehdykät parihalkoisia t. syväsahaisia, alta myötäkarvaisia — 2 6, 7 kelt. k.

Savisilla pelt. ja ketoilla (E. — Pe. S. Kp. Kv.) *Us. kyy-näräntä* pituinen isoilla,  $1\frac{1}{2}$  tuuman levyisillä, heleäkelt. kukkaistoilla. — *Cota tinctoria* Gay.

Muist. — Antaa alunaveteen kastetulle villaiselle kauniin keltaisen karvan. Siperiassa otetaan sahviaanin keltaamiseksi leiviskä keltasauramon kukkia ja 3 naulaa alunaa 50:lle nahkalle.

*A. arvensis* L. Peltosauramo. — Marto lop. keilamainen, suikeilla vareilla; kuorusjyvät litteäpäisiä, pitkin uurteisia, sileäharjuisia; lehdet parijakoisia; lehdykät kerran tahi toistain parihalkoisia, pykäliuskaisia. — ☉ 5—7 valk. sät.

Pelt. yl. (E. — Pe. Kv.) 2—4 vaaksan pit. haaraisella pystövarrella; on jotenkin Harakanhatun näköinen, mutta eroitetaan harmahtavilta, lienteiltä lehdiltänsä ja vähän leveämmiltä lehtiliuskoilta, seuraavasta lajista taas sen kautta, ettei haise niin tympeältä; myös on seuraava suoravartisempi ja sileälehtisempi.

*A. cotula* L. Ronnan sauramo. — Tasasoukilla martovareilla; kuorusjyvät pyöreähköllä, paljaalla päällä, epäjuomuisia; muuten k. ed. — ☉ 5—9 valk. sät.

Kyl. harv. (U.) *Parin* vaaksan pit. monihaarisella, pystöisellä varrella, äimämäisillä lehtiliuskoilla; kukkaistot pahanhajuisia. — *Maruta fetida* Cass.

Muist. — Mehiläiset hylkäävät sen, sammakot rakastavat. Kuivatuista kukista laitetun teen sanotaan hyödyttävän emätaudissa, vesipöhdössä, kovettuneissa rauhaisissa ja eläimillä hengenahdistajassa.

### ACHILLEA L. Äärfjämö. Rölleka.

*A. ptarmica* L. Äärfjämö. — Jaottomilla, m. tasa-soukilla, terävä-sahaisilla, kaljuilla lehdillä; huiskilomaisella kukkaistoröhyllä. — 2 7, 8 ihananvalk. sät.

Kost. paik. (A. — K. St. — Kv. Pe.) *Toisinteleä* 4:kin vaaksan pituisena; sädekukkasia 6—12.

Muist. — Tuoreeltaan hyppysissä hierrettynä aivastuttaa

ja us. panee nenän verta vuotamaan; sen kirpeä ja kihoittava juuri suussa pidettynä on väl. ollut avullinen hammaskivussa ja kielen turtuudessa, joko paljaaltaan tahi viinalikona. Pieneksi leikatuna ja juomisen sekaan pantuna pitää sen kauvan happanematta. Kauneutensa ja monivuotisuutensa vuoksi kasvatetaan yrttitarhoisakin, jossa viljeltynä helposti saapi kahdenkertaiset sädekukat.

*A. millefolium* L. Pyörtäne-färfämö. — Lehdet suikeita, pariosaisia parijakoisilla, pykäläitaisilla liuskoilla; tiheällä, m. tasakorkealla kukkaisto-röyhyllä. — 2½ 7–9 valk. t. punert. k.

Pellonpient. ja kuiv. paik. yl. (E. — L. Lv.) *Toisinteele paljon.*

Muist. — Haju ryytisekainen väkevä, maku karvas, kutistava. Oluehen käydessä pantuna lisää se voimaa. Lääkkeeksi käytetään kukkia joko teenä, keitesakona tahi kukkaviinana asetamaan veren ja muita juoksuja, väänteitä ja puhkuja, ähkyjä, reväisimiä, synnytystuskia, leinivikoja, lökätautia ja muita. Lehdet tuoreeltaan muserrettuna ovat hyvät haavoja parantamaan. Kukkaviinasta kehnovatsaisuus ja punatautikin usein on parantunut. Pesovedessä ja hauteinakin ovat kukat hyvin vaikuttavaisia. Rupisia eläimiä pestään tämän kasvin väkevällä keiteliemellä.

#### TANACETUM L. Pietaryrtti. Renfana.

*T. vulgare* L. — Lehdet parijakoisia; lehdykät parihalkoisesti liuskaisia ja sahaampaisia. — 2½ 8, 9 kelt. k.

Kuiv. pient., raunioilla j. n. e. (E. — P. Kv. Lv.) *Us. 4:ki, vaaksan pit., väkevällä hajulla ja karvaalla ryytimaulla; lehdet väl. kiheriä.*

Muist. — Kukkia, lehtiä ja siemeniä käytetään lääkkeeksi matoja, kehoa vatsaa, luuvaloa vasten sisällisesti ja ajetuksia vasten ulkonaisesti.

Lehdet pieneksi hakattuina tuoreeltaan ja keitettyinä painavat villaisen vaatteen vehreäksi. Pitää keittoliemeen sekoittaa tuhkaliipeätä ja sitte uudelleen kiehauttaa, ennenkun aine kastetaan siihen.

#### ARTEMISIA L. Maruna. Malört.

† Karvaisella marrolla: *Absinthium* Gärtn.

*A. absinthium* L. Roimaruna. — Pystöisellä varrella, peräkkäillä, alaskaarevilla, pallopuoliskoisilla, koppiloilla tertuissa; kolmesti parijakoisilla aluslehdillä; varsilehdet eheämpiä suikeilla, harmaanhöyryteillä liuskoilla; suojuslehdet eheitä. — 2½ 7, 8 kelt. k.

Kyläpaik. (E. — Pe. Kp. Kv.) *Us. 4:kin vaaksan pit., hyvin karvasmakuinen, väkevä, ryyti-hajuinen. — Absinthium vulgare Lam.*

**Muist.** — Hyvä vatsanparantava ja matoin surmaava lääke. Viinassa liottamalla saadaan siitä kukkaviinaa, jota kiitetään hyväksi väännteitä asettamaan ja kadonnutta syöntihalua korjaamaan kuin myöski horkan, keltataudin, kerpukin ja pöhön lääkkeeksi, mutta kuumetaudeissa, rintakivuissa, pistoksissa ja liikaverevyydessä se ei ole hyvä. Rihmamadolle on marunaviina niin vastaista, että heittää jäytämisenä vähäksi ajaksi, jonkatähden sitä käytetään koetus-aineeksi, jos vaivat tulevat rihmamadoista tahi jostain muusta. Oluen saattaa maruna väkevämmäksi ja paremmin happenemista vasten kestäväksi. Lampaille annetaan marunaa suolan ja katajamarjain kanssa vesitautia, maksavikoja ja punatautia vastaan. Jos jyväsiemeniä ennen kylvämistä liotetaan joku aika marunaliemessä, niin sanotaan lintuin niihin ei koskevan. Myös luteita vastaan kiitetään väkevää marunalientä hyväksi. Jos koirannahkaisia turkkeja tahi muita pitineitä liotetaan viikon aika marunavedessä, niin koirat niitä eivät enää likaa.

†† Kaljulla marrolla: *Abrotanum* Fr.

*A. vulgaris* L. Pujomaruna. — Pystövarrella, m. perättömillä, vähän nuokahtavilla, pitkulaisilla, höyteä-kehtoisilla koppi-loilla; lehdet toistain parijakoisia suikeilla, pykälaitaisilla, sui-poilla, alta vaaleanhöyteillä liuskoilla; suojuslehdet eheitä, m. tasesoukkia. — 2 7, 8 kelt. t. ruosteenkarv. k. —  $\beta$  coarctata: suppea-, tihu- ja pystötettuinen; lehdet soukemmilla, alta ihan valkeilla, villakarvaisilla liuskoilla.

Pih. ja pient. tav.;  $\beta$  merenrant. (E. — P. Kp.;  $\beta$  T. — Ke.) 1—2 *kyynärän pit. ruskealla t. mustanrusk. varrella, vahvalla, puutavalla juurella.*

**Muist.** — Ei varsin niin karvas k. ed. Hyödyllinen vaimoväen vaikealähtöisiä juoksuja korjaamaan, myös luuvalo-taudeissa sisällisesti annettuna ja ulkonaisestikin jalkaveteen pantuna. Juurta kiitetään varsin hyväksi virma- eli lankeavatautia vasten, jos nautitaan pienennettynä teelusikallinen ta runsaampi illoin ja aamuin. Muutamat liottavat sen sitä varten oluessa.

Sen lehtivilla-vanukkeista tehdään Kiinassa ja Japaniassa pieniä palleraita, joita sitte sytytetään, kuin Lapin maalla taulaa tahi pakkulaa ja muualla väkiviinan kastetuita pumpulipalleraita iholla kytämään, ja sillä tavoin sisällisiä kipuja vaimentamaan tahi parantamaanki. Semmoisia palleraita, olivat mitä ainetta hyvänsä, sanotaan Moksaksi, ja ne vaikuttavat m. siihen laatuun, kun juntukka t. näsiä-niinikin.

Skottlannissa käytetään nuoria pujolehtiä ruuaksi. Hanhien ja muiden lintuin liha sanotaan paremman makuiseksi tulevan jos

paistettava kehä täytetään pujoruoholla. Juuri vanhempana hii-  
lestyy osittain, josta ymmärtämättömillä on ainetta taikauksiin  
tullut.

*A. campestris* L. *Retomaruna*. — Varsi kaareva t. kohe-  
neva, yhdäppäisillä tertuilla ja koppiloilla; jälkimäiset 6—8-kuk-  
kasisia, palleroisia, järin lyhytperäisiä, nuokkuvia; lehdet pari-  
kaisia monijakoisilla, m. rihmamaisilla liuskoilla. — 2½ 7—9.

Kuiv., päivänpaisteisilla, hietaisilla mailla (A. T. U. Ke. Se.)  
*Kyynäränpiti.*; kukkaistot pienukaisia, ruosteenvärisiä.

Muist. — Melk. mauton. Lääkevoima k. ed., mutta paljo  
vähempi.

### LIGULARIA Cass. *Ṣauḥuä*.

*L. sibirica* Cass. — Koppilot latvatertussa; varsi haara-  
ton, kalju, harvalehtinen, pystössä; aluslehdet keihäskantais-herttai-  
sia, hammaslaitaisia, ruodit puoliliereitä; varsilehdet tav. ehytlai-  
taisia, ruodit tyveltä siivikkäitä. — 2½ 7, 8 kelt. k.

Vet. paik. (Kv. Lv.) 1—2 *kyynärän pituinen*, 3—6-tuumai-  
sella latvatertulla; väkevän-hajuisella juurella. — *Cineraria* Waldst.  
& Kit. *Hoppea* Reich.

### ARNICA L. *Ṣrniḥa*. Hästfibler.

*A. alpina* Murr. — Varsi yksikoppiloinen; lehdet vastak-  
kaisia, suikeita, harsuhampaisia. — 2½ 7, 8.

Tunt. harv. (L.) *Kukkaisto vaaleankeltainen*. — *A. montana*  
*β alpina* L. *A. angustifolia* Vahl *Fl. D.*

### CINERARIA L. *Ṣuḥfo*. Askört.

*C. campestris* Retz. — Koppilot latvahuiskilossa; varsi haa-  
raton; aluslehdet ruodikkaita, puikeita, mutkalaitaisia; varsilehdet  
ruodittomia, tasakaitaisia, kaikki samoin kuin varsiki vaalean-  
villaisia. — 2½ 7 kelt. k. — *β aurantiacus*: kehto ruskeanvärinen;  
sädekukkasat rusokellerviä.

Kuiv. paik. (Kv. Lv.) 1—3 *vaaks.piti.*; aluslehdet 1—3-tuu-  
maisina, varsilehdet väl. itse varren levyisiä, ehytlaitaisia. — *C. in-*  
*tegrifolia* E. B. *C. alpina* Pall., H. M. F. *Senecio* DC. — *β Sen-*  
*aurantiacus* Hoppe.

### SENECIO L. *Ṣeltomilla*, *Ṣillaffo*. Boört.

+ Sädekukkasat pitkäveteisiä, suoraan ulospäisiä.

*S. nemorensis* L. *Ṣeltomillaffo*. — Huiskilo monikoppi-  
loinen; kehto liereä, 3—5:llä m. saman pituisella, äimämäisellä li-

säsuomulla; lehdet puikeita — suikeita, sahashampaisia, aliset siipiruotisia; kuorusjyvät kaljuja. — 2 8 kelt. k.

Mets. paik. harv. (Lv.) *Jotenki pitkällä, juomuisella pystövarrella; sädekukkasia* 7—9: *Sen. octoglossus* DC.

S. Jacobæa L. *Saaton villaffo*. — Koppilot tiheässä röyhyssä pystöperäisiä; lehdet pehmeitä, isopäättöisesti parijakaisia, liuskat pääpuolelta levenneitä, pykä- ja hammaslaitaisia; kuorusjyvät kalseita. — 2 7, 8 kelt. k.

Kuiv. paik. harv. (U.) *Väl. 1½ kyynärän pit.; sädekukkas- set väl. puuttuvia*.

Muist. — Kamsiatkassa syödään tätä kasvia, ehkä mais-  
tuu karvaalle. Käytettiin ennen lääkkeeksi punatautia ja kurkku-  
vikoja vasten.

†† Sädekukkas- lyhyitä, taaskierteisiä t. puuttuvia.

S. viscosus L. *Tahmamillaffo*. — Koppilot pystyjä taas-  
kierteisillä sädekukkasilla; lisäkehto tahmean kehdon keskustaan  
ulottuva; lehdet syvästi parihalkoisia, tahmeita. — ☉ 7, 8 kelt. k.

Katuilla, harv. (U.) *Koko kasvi tahmeakarvainen*.

S. sylvaticus L. *Uhomillaffo*. — Pystöisillä koppiloilla,  
taaskierteisillä varsin lyhyillä säteillä; kehto lop. kalju ja paljon  
pidempi sen pohjalla olevaa, 3—5-lehtistä lisäkehtoa; lehdet pari-  
halkoisia, nystylaitaisia. — ☉ 7, 8 kelt. k.

Ahoilla, halmeissa (A. — U. St.) *Tav. parin vaaksan pit.,  
nutturaisilla varrella ja lehdillä*.

S. vulgaris L. *Pihamillaffo*. — Koppilot tiheäröyhyisiä,  
nuokkuvia, tav. säteettömiä; noin 10:llä mustapäisellä, vähän keh-  
topohjaa pidemmällä lisäkehtosuomuilla; lehdet sepokantaisia, pa-  
rihalkoisia, terävähampaisia. — ☉ 6—9 kelt. k.

Asuntopaik. yl. (E. — P. Kv.) *Noin 2-vaaksainen; varsi  
ja lehdet kaljuja; liuskat ristiin kääntyneitä*.

Muist. — Tämän niinkuin muidenki villakkoin siemeniä  
pienet linnut syövät haluisesti ja saavat niistä runsaasti ravintoa.  
Käytetään myös keltapaineeiksi.

## GNAPHALIUM L. Säffärä. Tofsblomster.

Gn. uliginosum L. *Urojäffärä*. — Koppilot palleroisia,  
perättömiä, ryhmin latvassa ja lehtihangoissa; varsi koheneva, tav.  
haarakas, villainen; lehdet suikulaisia, suippoja, lienteitä. — ☉  
7, 8. — β pilulare: kuorusjyvät karheita lyhyistä karvoista.

Kost. paik. yl. (E. — L. Lv.; β St. P. L. Lv.) *Väl. vaan pa-  
rin tuuman pit. ja haaraton, väl. vaaksanki pit. ja haarakas pie-  
nillä, ruosteenkarvaisilla kukkaistoilla m. vehreässä kehossa*.

**Muist.** — Karvaanmainen, ryytisek. maultansa; käytettiin ennen punataudin lääkkeeksi.

*Gn. sylvaticum* L. *Uhojääffärä*. — Koppilot latvassa ja lehtihangoissa, m. tähkämäisesti; varsi juurelta koheneva, haaraton, monilehtinen, tönkeä; lehdet tasasoukkia, alta silkkimäisesti vanukkeisia, aluslehdet suikulaisia; kuorusjyvät karheamaisia. — 2 8 rusk. k.

Kuiv. paik. tav. (E. — P. Kv.) 2 *vaaksan pit., latvapuoella lehdet vanukkeisempiä; aluslehdet päästä levenneitä.*

*Gn. norvegicum* Gunn. *Norjan jääffärä*. — Koppilot latvaan ryhmityneet lehtiseksi tähkäksi; varsi ed., mutta pystympi; lehdet molemmin puolin nutturaisia, keskiväliset isompia; kehtosuomut mustanrusk. pilkuilla; kuorusjyvät ed. — 2 7, 8 rusk. k.

Tunt. (P. L. Lv.) *Tähkä yhtenäisempi ja paksumpi k. ed.; lehdet leveämpiä.* — *Gn. sylvaticum*  $\beta$  *fuscatum* Wg.

*Gn. supinum* L. *Sapinjääffärä*. — Koppilot latvassa, väl. ylimmäisissä lehtihangoissa; varsi hervoton, rihmamainen, lehtivesoilla tyvessä; lehdet tasakaitaisia, suippoja, villaisia; kuorusjyvät karheamaisia. — 2 7, 8 rusk. k.

Kuiv. tunturitien. alankopaikoissa (L. Lv.) *Lyhyellä, noin sormen pituisella varrella, 1—8:lla koppilolla.* — *Gn. alpinum* Fl. D.

#### ANTENNARIA Gärtn. *Räpäälä*. Kattfot.

*A. dioica* Gärtn. *Risjanräpäälä*. — Koppilot m. tasakorkeana huiskilona; kehtosuomut kehkerämäisiä, päästä pyöreähköitä; varsilehdet tasasoukkia, suippoja; rönsyt rentoja, lapiomaisilla, alta vaalean höyteillä, päältä tav. kaljuilla lehdillä. — 2 5, 6 valk. t. pun. k.

Kuiv. kentillä, yl. (E. — L. Lv.) *Noin vaaksan pit., väl. päällenki.* — *Gnaphalium* L.

**Muist.** — Käyt. muinen lääkkeeksi rintatautisille ja väl. taikavaroiksiki, ja oli arvattavasti yhtä voimallinen kumpaisessaki tapauksessa. Paikoin annetaan sitä vieläki vasikoille vetelätoudissa.

*A. alpina* Gärtn. *Tunturiräpäälä*. — Koppilot ed.; kehtosuomut suippoja, (hedekoppiloissa tylpähköitä), litteitä, siiröpäisiä; varsilehdet suikeita; rönsyt ed. — 2 6, 7 vehreän-hallav. k.

Tunt. (L.) *Melkein edellisen näköinen, mutta vähän matalampi.* — *Gnaphalium* L.

*A. carpatica* Bl. et Fing. — Koppilot ryhmityneet kehkeräksi huiskiloksi, litteillä, tylppäpäisillä (ruskean vihervillä) kehtosuomuilla; kaikki lehdet suikulaisia, suippoja, molemmin puolin nutturaisia, 3-suonisia. — 2 6, 7.

Tunt. harv. (L.) *Molempain edellisten lajien näköinen, mutta rönsytönmä, ehkä vesahaaroilla.* — *Gnaphalium* Wg.

### FILAGO L. Tulenlento. Ullblomster.

*F. montana* L. — Varsi haaraton t. vuorohaarainen, pienillä, villaisilla koppiloilla, ryhmistyneinä latvaan ja ylöspäisten haarain sivuille; kehtosuomut tylppäpäisiä; kuorusjyvät pilkullisia; lehdet suikeita — tasakaitaisia, villaisia. — ☉ 6, 7.

Hietaisilla mäk. tav. (A. — K. St. — Kv.) *Tuuman — vaak-san pit., kellervillä m. näöttömillä kukkasilla.* — *Gnaphalium arvense* Willd. *Oglifa* Cass.

### 2 parvi. — *Asteræ*.

#### INULA L. Hirvenjuuri. Ålandsrot.

*I. helenium* L. Iso hirvenjuuri. — Lehdet sepokantaisia, puikeita, epätasaisia, m. saharampaisia, alta höykeitä; kehtosuomut puikeita. — 2 8, 9 kelt. k.

Kost., kyläisillä paik. harv. (A. — U.) 2 *kyyn. pit.*; *parin vaaksan pit., alta tuhkanarvaisilla lehdillä; tuuman pit., noin 40:llä säteellä.*

Muist. — Juurta käytetään vatsan ja rinnan lääkkeeksi; erottaa lökää sulkutaudeissa ja korjaa vaimollisten puutetta. Siitä keitettyä liemellä voidellaan lapsia ryyhdelmissä ja ihottumisissa. Myös kärmeenpistoon kiitetään sitä hyväksi ihrassa keitettyä. Sääsket pakenevat sen savusta. Muutamat sekoittavat lehtiä tupakkaan ja sanovat terveelliseksi polttaa.

*I. salicina* L. Pähä hirvenjuuri. — Lehdet sepokantaisia, suipposuikeita, kaljuja, verkkosuonisia, laidalta hienopiikkisiä, ulospäisiä; varsi pysty, kalju, 1- t. useampi-koppiloinen, laitakoppilot lop. korkeammalla. — 2 7, 8 kelt. k.

Niittutöyräillä (A. — K. H. Kv.) *Kyynärän pit.; monilukuisilla, tonkeilla, m. kiiltävillä, väl. hienosahaisilla lehdillä, monilla 1/2-tuumaisilla säteillä.*

#### ASTER L. Asteri. Aster.

*A. sibiricus* L. Lapin asteri. — Koppilot pallopuoliskoisia, 1—4; kehtosuomut suikulaisia, päästä erivärisiä; lehdet ruodittomia, suikeita, latva-puolelta sahalaitaisia, päältä kaljuja, alta lienteähkkeitä. — 2 7, 8 sinerv. sät.

Järvenrant. (Lv.) *Sormenpituisella, lehtisellä, ylempää ha-tuisella varrella, sinipunervilla sudekukkasilla ja keltaisilla kehä-kukkasilla.* — *A. irtutianus* DC.



*A. tripolium* L. Ranta-asteri. — Koppilot huiskilona, puikeilla kehtosuomuilla; lehdet m. tasakaitais-suikeita, ehytlaitaisia, kaljuja, möyheitä. — 2 7, 8 sin. sät.

Merenrant. (A. — Ke. St. Pe. Kv. Lv.) *Haaraisella, noin 2-vaaksaisella, juurelta punaisella, mehevällä varrella, sinisillä, toistakymmenisillä sädekukkasilla, väl. valkea-säteinen t. peräti säteetön.*

### ERIGERON L. Rallioinen. Binka.

*E. acris* L. Nummi-rallioinen. — Koppilot m. yksikertaisena röyhynä t. terttuna; kehräkukkasat m. säteitten pituiset; lehdet suikeita, ja samoin kuin varsi sekä kehto karvaisia; aluslehdet kieloisia. — ☽ ☉ 7, 8 sinikiuht. t. punert. sät.

Kuiv. niit. ja töyräillä, yl. (E. — L. Lv.) *Sormen — parin vaaksan pit. punertavalla (haaraisella t. haarattomalla) varrella ja ruodeilla.*

Muist. — Käytettiin muinen lasten rikkomista (noitumista) vasten, myös rintataudeissa ja vilustumisissa apteiki-nimellä: *Hb. conyzæ cæruleæ*.

*E. elongatus* Led. Pittä rallioinen. — Koppilot yksikertaisilla, pitkäveteisillä perillä, pidemmillä säteillä, m. kaljulla, nystypilkkuisella keholla; varsi m. kalju; lehdet pitkulais-kaitaisia, 3-suonisia. — 2 7, 8 pun. t. valk. sät.

Tunt. harv. (P. L. Lv.) 2—3 vaaksan pituinen, m. kalju kasvi. — *E. politus* Fr.

*E. uniflorus* L. Rapin rallioinen. — Varsi yksikoppiloinen; säteet pitkäveteisiä, suoraan ulospäisiä; kehto leveän-suikeilla suomuilla, villahöyteinen selvänivelisillä karvoilla; aluslehdet lapiomaisia, tylpäköitä. — 2 7, 8.

Tunt. (L.) 2—5-tuumaisella, 1- harv. 2-koppiloisella, vehreällä varrella, valk. harv. punoittavilla säteillä.

### SOLIDAGO L. Piisfu. Guldris.

*S. virgaurea* L. — Varsi kulmikkainen likeisillä, pystöisillä koppilo-harkoilla latvassa ja ylemmissä lehtihangoissa; lehdet suikeita, aliset sahapampaisia. — 2 7—9 kelt. k.

Niittulaiteilla, ahoilla ja mets. yl. (E. — L. Lv.) *Kynn. ja runsaammanki pit., karheamaisilla, us. 2 tuuman levyisillä aluslehdillä.*

Muist. — Lääkevoima vahvistava ja kutistuttava, vesittävä. Siitä laitettua teetä t. keitettä kiitetään hyväksi sisällisiä haavoituksia ja verestymiä parantamaan. Apteikkinimi: *Hb. consolida saracenica* l. *virga aurea*. Käytetään myös paineeksi (kelt. rusk.)

3 parvi. — **Eupatorieæ.**EUPATORIUM L. *Yunaſatma*. Flockblomster.

*E. cannabinum* L. — Kukkaisto 5—6-kukkasinen; lehdet vastakkaisia, lyhytruotisia, 3—5-osaisia suikeilla, sahalaitaisilla liuskoilla. — 2½ 7 pun. t. punasinert. k.

Pensastoissa rant. harv. (A. K. Kp.) 1—2 *kyyn. pit., pienillä koppiloilla isona, tiheänä, us. syrjäkämmenen levyisenä röyhynä.*

Muist. — Kasvilla ja juurella on karvas, kirpeä maku ja ulostava voima. Sitä käytetään tartunnaisia, ryyhdynnäisiä ja vesipöhöä vastaan. Ulkonaisesti parantaa haavoja ja viinassa liotettuna pöhöttymisiä. Myös paineeksi kelpaava.

PETASITES Tourn. Ruttojuuri. Pestrot.

*P. officinalis* Mönch. Ulfan ruttojuuri. — Koppilo-harkko munanmoinen t. pitkulainen; kukkaistot säteettömiä; lehdet herttamaisia, mutkahtavia, epäsuurilla hampailla, pyöreäkhöillä kullilla, alta harmaanhöyteisii. — 2½ 5 punert. k.

Vet. paik., ojain ja jokien rannoilla, harv. (A. T. St. U.) *Vana* noin korttelin pit.; lehdet kukkimisen jälkeen niinkin isoja, että kanat ja muut pienet elukat kokonaan ovat niiden alla peitteessä. *Haju* tympeä; maku karvaamainen, ryytisekainen. — *P. vulgaris* Desf., *H. M. F. Tussilago petasites* L.

Muist. — Juurakkoa käytett. muinen luuvaloa, virmaa, mätähaavoja ja itseä ruttoaki vastaan. Sillä on vahvistava voima.

*P. frigida* Fr. Ulfon ruttojuuri. — Koppilot yksikertaisena huiskilona, tav. lyhyillä säteillä; lehdet kolmikkomaisesti herttamaisia, mutkin liuskahampaisia, alta vaaleanharmaan-höyteisii. — 2½ 5, 6 rusk. k.

Tunt. tien., vet. pajustoissa (Sp. Kv. P. L. Lv.) 2—3-vaak-saisella vanalla, isoilla suomulehdillä, mustanpunaisilla kun keh-toki; lehdet syväpykeisiä. — *Tussilago* L. *Nardosma* Cass.

TUSSILAGO L. *Seäfenlehti*. Hästhof.

*T. farfara* L. — Vana lehdetön, suomukas, 1-koppiloinen; aluslehdet herttamaisia, pyöröpäisiä, kulmamutkaisia, hammaslataisia. — 2½ 5, 6 kelt. k.

Kost., savisilla, roudan liikuttamilla paikoilla (E. — L. Lv.) 3—6 tuum., ensin pystöisellä, sitte nuokahtavalla vanalla, tuum. le-vyisellä kukkaistolla, monilukuisilla, rihtmakkeisilla säteillä; lehdet kämmenen ja korttelinki levyiset ihnaantuvat vasta kukkimisen jäl-keen juurakosta ja ovat päältä kaljuja, suonikkaita, alta vaalean-höyteisii.

Muist. — Sekä lehtiä että juurakoita on jo muinaisista ajoista kiitetty yskässä ja muissa rintataudeissa, ja pitkittävässä vatsurissa. Lehdistä varsinensa ja juurakoista saadaan erinomaista taulaa, jos niitä kuivattuna, muokataan ja vatkataan vähän ruutin kanssa.

Tätä kasvia pidetään hyvänä kaivopaikan osottajana.

## 2 jako. — *Cynarocephalæ*.

CENTAUREA L. *Raunoffi*. Klint.

*C. scabiosa* L. *Peltosaunoffi*. — Kehdon ulkosuomut puikeita, soukistuvia mustaksi, kampamaiseksi, sukalaitaiseksi lisäkkeeksi; sisäsuomut kaitaisempia samanlaisella, vähän laajenevalla lisäkkeellä; lehdet syvään parijakoisia, karheita, suikeilla, tasasoukilla pykä- ja hammaslaitaisilla liuskoilla. — 2 7, 8.

Pellonpient., tievars., niittutöyr. harv. (A. — K. H. — Kv.) 1—1½ kynnäräisellä varrella, väl. vaaksan pituisilla aluslehdillä, isoilla, palleroisilla kehdoilla ja lähes parin tuuman levyisillä, punasinervillä, väl. valkeilla kukkaistoilla.

Muist. — Lääkkeenä savipuolia ja muita ihottumisia vastaan. Keite painaa villaisen kylmiltään heleänkeltaiseksi vismutti vedessä kastettuna, keitettäissä mustanvehreäksi. Siemenet säilyvät kauvan kehdoissa pienten lintuin mieluisaksi ruuaksi.

*C. phrygia* L. *Nurmisaunoffi*. — Alemmaiset kehtosuomut ulospäisellä, m. äimämäisellä lisäkkeellä, kampamaisesti ripsilaitainen mustilta, lisäkkeen keskimittaa pidemmiltä hapsilta; ylemmäiset kehtosuomut leveällä, ripsilaitaisella sisäsuomulla päässään; lehdet pitkänpuikeita, hammaslaitaisia, karheita. — 2 7, 8 pun. k.

Yläisillä niit. harv. (T. — K. H. — Kv.) 1—3 vaaksan pit. karhealla pystövarrella, useimmiten 1-koppiloisena, leveillä lehdillä, isoilla kukkaistoilla. — *C. phrygia* var. *austriaca* Fr., H. M. *F. C. austriaca* Willd.

*C. jacea* L. *Uhbasaunoffi*. — Kehtosuomuin lisäke kalpea, leveä, pyöreähkö, resalaitainen; lehdet suikeita, ehyt- t. hammaslaitaisia, väl. kaitaisia ja liuskaisia. — 2 7—9 pun. k.

Kuiv. niittulaiteilla, ahorinteillä, tav. (E. — Pe. Kv.) 1—3 vaaksan pit. kohenevalla varrella, tiilinvärisillä t. mustanruskeilla, pähkinän suuruisilla kehdoilla.

Muist. — Lehti-tee kurkun huuhtovetenä apullinen. Myös keltapaineeksi käyt. lehtiä.

*C. cyanus* L. *Ulofaunoffi*, *Ulofuffa*. — Kehtosuomut puikeita, sisämmäiset pitkäveiteisempiä kalvomaisella, sukasahaisella laidalla; lehdet jaottomia, tasasoukkia, aliset us. parijakoisia. — 6, 8 sin. k.

Elopelloissa, yl. (E. — P. Kv. L.) 2—4 vaaksan pit. pystyhaarisella varrella. On harmaanhöyteenen, kun lukinverkon peittämä; kehdot herneenkokoisia; alimmaiset suomet vaalean-sukaisilla laidoilla, muut mustasukaisia; kehräkukkasat harvemmalta ja sinisempiä, säteet paljo isompia, ihanansinisiä. Toisintees väl. punertavilla, väl. valkeilla kukkasilla.

Muist. — Käyt. lääkkeeksi vesiumpea ja vesitautia vastaan keitteenä joko siltään tahi nokkoissiementen seassa, ja silmävihoa vastaan teenä tahi puserretulla nesteellänään. Survotuista kukista saadaan puserdamalla mehua, joka siltään t. alunalla seotettuna käyttää sinisenä lakkinä tahi taitaan kuivata ja semmoisena säilyttää vedellä (ja vähällä alunalla) seotettavaksi, kulloin tarvitaan. Kukkaa (t. mehua) käyt. myös sokurileiville sinitteeksi, sinkki-vitrillillä seotettuna maaliksi, savuttimeksi, tupakkiin j. n. e.

#### SAUSSUREA DC. Väite. Lappskära.

S. alpina DC. — Koppilot tav. tasakorkeassa, tiheässä röyhyssä, pehmythöyteisellä kehdolla; lehdet pitkänpuikeita, kokonaisia, harva- ja hienohampaisia, pehmythöyteisiä. — 2 7, 8 sinipunerv. k.

Kost. tunturitien. (K. Kv. P. L. Lv.) *Epämääräisellä, väl. useamman vaaksan pit. varrella, velitto ja hyvin pehmythöyteenen kun kaikki muutki osat; suomet kehtomyötidisiä, tumman ruskealaitaisia; kukkasat ihanaisia, punasinertäviä.* — *Serratula L. Heterotrichum Link.*

#### CARLINA L. Rurho. Spämanstistel.

C. vulgaris L. — Varsi tav. monikoppiloinen suikeilla, hammas- ja piikkilaitaisilla, alta hienoseittisillä lehdillä; sivukoppilot keskimmäistä korkeammat. — 2 7, 8 vaaleankelt. k.

Hietapohj. ahoilla, mäkirint. (A. — K. H. S. Kv.) 1—2 vaaksan pit., tanealla, väl. vaan 1-koppiloisella varrella. Lakastuneena seisoo vielä kolmantenaki vuotena. Kukkaiston säteet märän ilman edellä ovat pystössä, kuivan ilman edellä ulospäisiä.

Muist. — Juuret hiostuttavia, vesittäviä.

#### CARDUUS L. Rarhiainen. Tomttistel.

C. nutans L. Nuoffo-rarhiainen. — Koppilot sivulle päin nuokkuvia, yksinäisiä pitkäveteisellä, varuttomalla perällä; kehdon ulkosuomet litteitä, ulospäisiä, orakärkisiä; lehdet liuskaisia, piikkisiä, välikkoisesti varsijohteisilla laidoilla. — 2 7, 8 pun. k.

Kuiv. paik., raunioilla, harv. (U.) *Hyvin piikkinen kasvi, us. kynnärän pit., vahvalla varrella, ja parin tuuman levyisillä keh-*

doilla; koppiloperät tyveltä pienilehtisiä; kukkaistot nuorempana myskille hajahtavia.

Muist. — Ennen kukkimista varret kuorittuna taitaan sallitilaitteiksi käyttää.

*C. crispus* L. Peltokarhiainen. — Koppiloperät pystöisiä, 1—3-kukkaistoisia, m. kaljuja, hienopiikkisiä; kehto palleromainen, suikean-äimäisillä, ulospäisillä suomuilla; lehdet johteisia, leveän-sukeita, pykä- ja hammaslaitaisia, hienopiikkisiä, alta tav. valkea-villaisia. — ☉ 7, 8 punasinerv. k.

Pient., varsinkin ohrapelloilla (E. — L. Lv.)  $1\frac{1}{2}$  kyyn. pit.; melk. pistämättömillä, alta väl. kaljuillaki lehdoilla.

### CIRSIUM Tourn. Ohdake. Tistel.

*C. lanceolatum* Scop. Tie-ohdake. — Kehto palleroinen tankeilla, orapäisillä, siirottavilla, villaisilla suomuilla; lehdet johteisia, parihalkoisia siirottavilla, orapäisillä liuskoilla, päältä sukapiikkisiä, alta valkea-villaisia. — 2 7—9 pun. k.

Tievier., raunioilla, tav. (E. — Kp. Pe.) Kyyn. pit. varrella, peukalon pään suuruisilla kehdoilla, hyvin teräväpäisillä suomuilla. — *Carduus* L. *Cnicus* Willd.

Muist. — Kukkaistot juoksuttavat maidon.

*C. palustre* Scop. Suo-ohdake. — Koppilot ryhmässä; kehto munanmoinen, leveän-sukeilla, myötäisillä, lyhyt-otaisilla suomuilla; lehdet johteisia, aliset m. parijakoisia 2-halkoisilla t. isohampaisilla, piikkisillä liuskoilla, päältä karvaisia, alta vehreitä.

2 7, 8 punasinerv. k.

Vet. niit. tav. (E. — P. Kp. L.) 1—3 kyyn. pit. m. koppiloperiin asti haarattomalla pystövarrella, pavunkokoisilla kehdoilla. — *Carduus* L. *Cnicus* Roth.

Muist. — Nuoret taimet keväällä hyvät ruoka-aineiksi.

*C. arvense* Scop. Peltiohdake. — Koppilot epätasaisessa, harseassa röyhyssä; suomut kehtomyötäisiä siirottavalla, ei juuri kankealla odalla; lehdet suikeita, liuska- t. hammas-, piikki- ja mutkalaitaisia. — 2 7—9 sinikiuht. k. —  $\beta$  *maritimum*: lehdet varsijohteisia, m. parijakoisia, soukkalapaisia, 2—3-halkoisilla, harittavilla liuskoilla. —  $\gamma$  *horridum*: varsi lehtijohteista siivikäs, pisteliäs; lehdet parihalkoisia pisteliäillä liuskoilla.

Vilj. yl. (E. — P. Kv.;  $\beta$  St. U.;  $\gamma$  U.) Kyyn. pit. liereällä varrella; ainoastaan ylimäiset ja alimaiset lehdet tav. ovat hammaslaitaisia ja vähän varsijohteisia. — *Serratula* L. *Cnicus* Sm. *Breca* Less. —  $\beta$  *C. arvense*  $\beta$  *ferox* Hn.

Muist. — Varresta saadaan hyvää potaskaa lasitehtaisiin.

*C. heterophyllum* All. Aro-ohdake. — Varsi 1—5:llä kop-

pilolla pitkällä, haarattomalla, suojuksettomalla perällä; kehto munanmoinen suikeilla, myötäisillä, siiro- ja suippopäisillä suomuilla; lehdet sepokantaisia, leveän-sukeita, sahamampaisia t. liuskaisia, alta vaalean-vanukkeisia. — 2 7, 8 pun. t. punasinerv. k.

Vet. metsäniit. (E. — L. Lv.) *Kyyn. pit. haarattomalla, vahvalla varrella, isolla, tuumanlevyisellä kehdoilla, erittäin suikertavalla juurakolla; lehdet johteettomia, aluslehdet peräkkäitä.* — *Carduus L. Cnicus Willd.*

*C. oleraceum* Scop. Luhta-ohdake. — Varsi lehtinen, latvassa monella koppilolla puikeilla, vähän erivärisillä suojuslehdillä; kehto suikeilla, äimäkärkisillä suomuilla; lehdet hertta- ja sepokantaisia, parijakoisia t. -halkoisia kokonaisilla, sahamampaisilla piikkilaitaisilla liuskoilla. — 2 7, 8 kellert. k.

Luhtaniit. harv. (A. Kv.)  $1\frac{1}{2}$  *kyyn. pit. kaljulla varrella, tuuman kokoisilla kehdoilla.* — *Cnicus L.*

Muist. — Lehdet kaaliksina syötävät.

#### LAPPA Tourn. Tafiainen. Kardborre.

*L. tomentosa* Lam. Ufon tafiainen. — Lehdet herttapuikeita, alta hienovillaisia; koppilot sarjahtavassa röyhyssä; pallo-roisen, lukinverkkaisen kehdon sisäsuomut erivärisiä, pitkänsuikeita, tylpeitä, otapäisiä. — 2 7, 8 punasinerv. k.

Kylätien. (A. — K.) *Kyynäräisellä varrella; kehdon ulkosuomut koukeropäisiä.* — *Arctium lappa* β *L. A. bardana Willd.*

Muist. — Juuri (*rad. bardana*) on verenselvittävä, hiosuttava ja vesittävä, hyvä luuvalossa, kerpukissa, jalkataudissa, ruusussa, savipuolissa, syyhyssä, keitteenä. Siemenillä on sama ja ulostavaki voima, hyvät kivitaudissa. Lehdet tuoreeltaan mätähaavoille ja nilkonaisille paikoille avullisia.

Keväällä varret ja juuret kuorittuna ja keitettynä terveelliset syödä. Likapilkut vaatteista us. lähtevät takiaispäillä su'ituna.

*L. minor* DC. Bähä tafiainen. — Lehdet k. ed.; koppilot ryhmätertussa t. lyhytperäisiä; kehto kalju t. vähin lukinverkkoinen m. liereillä, äimämäisillä suomuilla, sisämäiset erivärisiä, laidassa hienosti piikkikarvaisia. — 2 7, 8 vaalean-pun. t. sini-kiuht. k.

Kylätien. tav. (E. — Pe. Kp.) *Matala-vartinen pienillä, nuorempana m. liereillä koppiloilla; kehtosuomut m. tasasuokkia, kaikki koukeropäisiä; koppilot pienempiä ja kaljumpia k. ed.* — *Arctium lappa L.*

Muist. — Lääkevoima ed.

3 jako. — *Cichorieæ*.MULGEDIUM Less. *Heruffa*. Tolta.

*M. alpinum* Less. *Äuortheruffa*. — Koppilot nystykarvaisilla, suomuisilla perillä, m. yksikertaisessa tertussa; lehdet parikaarteisia, nuolikantaisia, sepiviä, hyvin isolla kolmikkomaisella päättö-liuskalla. — 24 8 sin. k.

Tunturilaiteilla, tav. (P. L. Lv.) *Us. 2-kyynäräisellä varrella ja vaaksan levyisillä, soukkakantaisilla lehdillä.* — *Sonchus L. S. cæruleus* Sm.

Muist. — Lappalaiset syövät varsia nuorempana ja kuorittuna.

*M. sibiricum* Less. *Metjäheruffa*. — Koppiloperät suomuisia ja kaljuja kun kehtoki; röyhy tasakorkea; lehdet ruodittomia t. m. sepiviä, suikeita, hammaslaitaisia t. parittain taasliuskaisia. — 24 8 sin. k.

Kost. paik. harv. (H. — Kv. Pe. — L. Lv.) *Lehdet ylempänä m. ehytlaitaisia, alempana us. isohampaisia.* — *Sonchus L.*

SONCHUS L. *Balmatti*. Mjölktistel.

*S. arvensis* L. *Peltomalmatti*. — Koppiloin perät ja kehdot keltaisilla nystykarvoilla; röyhy sarjainen; lehdet taasliuskaisia, herttakantaisia, sepiviä, väl. liuskattomia, otahampaisia. — 24 7, 8 kelt. k. —  $\beta$  littoralis: 1–3-koppiloinen; perät ja kehto kaljumpia.

Vilj. ja merenrant. tav. (E. — P. Kv. Lv.;  $\beta$  A. — Ke. P. Lv.) *Kuorusjyvät karhea-pilkkuisia;  $\beta$  soukilla, kokonaisilla t. lyhytliuskaisilla lehdillä, m. kaljuilla perillä.*

*S. oleraceus* L. *Maitomalmatti*. — Koppiloperät ja kehtopohja nuorempana villakehnäisiä, lop. kaljuja t. joilla kuilla erinäisillä nystykarvoilla; lehdet parikaarteisesti taasliuskaisia ja pehmythampaisia, sinivehreän-hallavia; kanta-liuskat sepiviä, suoraan ulospäisiä, suippoja; kuorusjyvät karhea-pilkkuisia. —  $\odot$  7–9 vaaleankelt. k.

Vilj. tav. (E. — P. S. K.) *Väl. m. kokonaisilla lehdillä.*

Muist. — Ulkomailla käytetään nuoria, talvis-aikana paimittuja taimia kaalilaitoksiksi.

*S. asper* Vill. *Pistiäis-malmatti*. — Perät ja kehto ed. lehdet pitkänpuikeita, kokonaisia t. liuskaisia, tankeilla otahampailta, kiiltäviä; kantaliuskat sepiviä, taaskääntöisiä, pyöreitä; kuorusjyvät sileitä. —  $\odot$  7, 8 vaaleankelt. k.

Vilj. tav. (A. — K. St. H. S.) *Lehdet päältä tummanvähreitä*

*pistävillä laitahampailla; kuorusjyvät sileitä, 3:lla suonella molemmin puolin. — S. oleraceus γ ja δ L. Fl. Sv. S. fallax Wallr.*

### LACTUCA L. Ruohensaali. Vildsalat.

*L. muralis* Don. — Koppilot tav. 5-kukkasisia leveässä, harseassa röyhyssä; lehdet parikaarteisesti taasliuskaisia isolla, 3-t. 5-kulmaisella, pykälaitaisella päätöliuskalla. — 2½ 7, 8 kelt. k.

Louhikoissa mäkien ja kallioin vierissä, harv. (A. U. H. K.) 1½-kyynäräinen, hento kasvi pienillä koppiloilla, mutta us. isossa röyhyssä. — *Prenanthes L. Cicerbita Wallr. Phœnixopus Cass.*

### LAPSANA L. Sennunsaali. Tomtört.

*L. communis* L. — Monikoppiloisella röyhyllä; aliset lehdet parikaarteisia isolla, puikealla, kulmahampaisella päätöliuskalla, yliset puikeita. — ☉ 7—9.

Vilj. tav. (A. — K. St. — Kv.) 3—6 vaaks. pit., pienillä, vaaleankelt. kukkaistoilla.

Muist. — Varsikko kelpaa ruuaksi; käytetään myös rintataajosten hauteiksi.

### TRAGOPOGON L. Pufinparta. Salsofi.

*Tr. pratensis* L. — Laitakukkasit isompia, kehdon pituisia; perät m. tasapaksuja; lehdet tasasoukkia laajemmalla tyvellä, venhomaisia. — 2½ 6, 7 kelt. k.

Niit., puistotarh. harv. (A. — Ke. H. St.) Noin kyynär. pit., sileä, sinehtävä kasvi parin tuuman kokoisilla koppiloilla, noin 8:lla kehtolehdykällä.

### SCORZONERA L. Sifojuuri. Ormrot.

*Sc. humilis* L. — Varsi 1—3-koppiloinen; aluslehdet kaidemman t. leveämmän suikeita; varsilehdet harvalukuisia, pienemät, m. tasakaitaiset; varsi tyveltä ynnä aluslehti-ruotien kanssa villainen; kehdon ulkosuomut puikeita — suikeita. — 2½ 6, 7 kelt. k.

Kost. niit. harv. (U. Ke.) Liereällä, kurtteisella juurakolla, vaaksan pit. varrella; aluslehdet tuuman levyisiä, varsilehdet hyvin kaitaisia; kukkaisto 2 tuuman levyinen.

Muist. — Juurakko on katkera mutta ryytimaihin muutettuna parantaa makunsa ja sopii kaalilaitoksiksi.

### PICRIS L. Rikkerö. Bittermjölk.

*P. hieracioides* L. — Varsi pysty, karheakarvainen; lehdet sepokantaisia, suikeita, hammaslaitaisia; röyhyn keskimäiset koppilot lyhempiä; kehtosuomut veltohkoita. — 2½ 7, 8 kelt. k.



Pient., tievars. harv. (Ke. S. K. Kp. Kv.) *Parin* kyynär. pit. varrella, tuuman levyisillä, liuskaisilla lehdillä ja samanlevyisillä kukkaistoilla; ison Keltanon näköinen.

### CREPIS L. Keltto. Krepe.

#### † Varsi lehtinen.

Cr. paludosa Mönch. Suofeltto. — Lehdet kaljuja, hertakantaisesti sepiviä, soikeita t. leveän-pitkulaisia, vähän taashampaisia, aliset tav. pyöreä-liuskaisia, peräkkäitä; röyhy harsea mustankarvaisilla t. m. kaljuilla kehdoilla. — 2 7 kelt. k.

Kost. niit. (E. — P. Kv. Lv.) *Hyvin* kalju, iso- ja ohutlehtinen, us. 1 1/2 kyyn. pituinen ruohoke. — *Hieracium* L. *Geracium* Reich. *Soyeria* Godr.

Cr. biennis L. Suhtafeltto. — Lehdet taaspäin pariliuskaisia, karheakarvaisia, yliset ruodittomia, suikeita, hammaslaitaisia; kehto karheahöyteinen; kuorusjyvät m. sileäharjuisia. — 6—8 kelt. k.

Niit. törmillä, huhta-ahoilla, harv. (K.) 1 1/2 kyyn. pit. pitkällä varrella, härkäpavun kokoisella, mustanvehreällä kehdoilla, m. tuuman levyisillä kukkaistoilla, syväliuskaisemilla lehdillä k. seur. ja liuskat us. monihalkoisia; keltaisilla luoteilla. Kukkaistot ummistuvat kello 3—4 vaiheilla iltapuol.

Cr. tectorum L. Raunio-feltto. — Lehdet suikeita, jaotomia, hammaslaitaisia t. parihalkois-liuskaisia, m. kaljuja, yliset tasasoukkia, tav. nuolikantaisesti sepiviä; kehto lienteä; kuorusjyvät karhea-harjuisia. — ☉ 6—9 kelt. k.

Tievars., raunioilla, katoilla j. n. e. tav. (E. — L. Lv.) *Tav.* kyynär. pituinen; lehdet väl. m. tasasoukkia ja ehytlaitaisia, väl. syvään parihalkoisia suoraan lojottavilla t. edespäisillä liuskoilla; röyhy lehtinen pienillä, virnan kokoisilla kehdoilla ja vaalean-keltaisilla, 1/2 tuum. levyisillä, kello 4:llä iltapuol. ummistuvilla kukkaistoilla.

#### †† Vartena lehdetön vana: *Intybus* Fr.

Cr. præmorsa Tausch. Lypäffä feltto. — Koppilot tertumaisessa harkossa; kehtosuomut kaljuja t. jokuisella valkealla karvalla, ilman nystykarvoita; lehdet pitkulaisia, päätä kohden leveämpiä, ehytlaitaisia t. hienohampaisia, lienteitä. — 2 6, 7 kelt. k.

Niit., ahoil. harv. (H.) *Juuri* typäkkä; vana 1—1 1/2 jalan pit.; lehdet m. ruusukkeisia. — *Hieracium* L. *Geracium* Reich.

**HIERACIUM L.** Keltanunnu, Keltano. Hökblomster.

† **Piloselloidea:** enentyvät rönsyistä; kuorusjyvät hyvin pikkuraisia; haiven-hapset tasapitkiä, hentoja.

• Vartena lehdetön t. yksilehtinen vana näkyvillä t. maanpäällisillä rönsyillä.

**H. pilosella L.** Karafan keltano. — Vana paljas, tav. 1-koppiloinen, rönsyävä; lehdet soukasti vastopuikeita — suikeita, päältä vehreitä pitkällä, harseilla karvoilla, alta vaalean- t. harmaan-vanukkeisia. —  $\alpha$  6—8. —  $\beta$  virescens: lehdet alta tuskin vaaleampia, hyvin harseilla, ohuella tähti-höydyllä.

Kentillä, töyr. tav. (E. — P. Kv.) *Tav.  $\frac{1}{2}$  vaaksan pit. vanalla, ruusukkeisilla, tuuman pit. aluslehdillä; kukkasien laide alta puolen tav. punaviiruinen; väl. kukkivat rönsyt.*

**H. auricula L.** Siiren keltano. — Vana tav. 1-lehtinen, rönsyävä ja 1—8:lla lyhytperäisellä koppilolla sarjassa; lehdet suikeita — kieloisia, tylppäpäisiä, harsu-ripsisiä, molemmin puolin kaljuja, sinivihervä; kukkasien laide us. molemmin puolin keltainen. —  $\alpha$  6—8. —  $\beta$  majus: 2—3 vaaksan pit., moni (4—8) koppiloinen.

Niittutöyr. tav. (E. — P. Kv.) *Tav. vaaksan pit. vanalla, 3:lla pienellä koppilolla; toisinteleä kuiv. paik. sormenpituuisena, m. kaljuna ja 1-koppiloisena: var. minus Fr.;  $\beta$ :n kukkasien laide alta puolen väl. punaviiruinen: H. suecicum Fr.*

**H. fuscum Vill.** Rušfo-keltano. — Vana paljas t. 1-lehtinen, tav. rönsyävä, harvakoppiloisella sarjalla; lehdet leveän-suikeita, tylppiä, harsuhampaisia, molemmin puolin kalseita, vehreitä t. sinettäviä; kukkasien laide ruskean-kellervä; vartalo ruskeamainen. —  $\alpha$  7. —  $\beta$  decolorans Fr.: lehdet vastopuikeita — leveän-pitkulaisia, selvän-vehreitä; kukkasien laide vanhempana kellahtuva.

Niittutöyr., tunt. harv. (U. H. S. K. St. Pe. P.;  $\beta$  P.) *Vana noin vaaksan pit., pitkällä lojottavilla karvoilla, tyvellä tav. yksinäinen, tasasoukka lehti; koppilot 4—5, pieniä;  $\beta$  noin jalan pituisella vanalla, tiheämmällä, vaalean-karvaisella, huiskilomaisella sarjalla. — H. Blyttianum Fr. Epicrisis Hier.*

**H. floribundum Wimm.** Niittu-keltano. — Vana 1-lehtinen, takkuinen, ylempää nystykarvainen, rönsyävä, tav. harvakoppiloisella, m. yksikertaisella sarjalla; lehdet leveän suikeita — kieloisia, tylppäpäisiä t. vastalaskuisella päällä, sinivihervä, kaljuja t. ripsilaitaisia ja alta puolen harsukarvaisella suonella; kehto-suomut tylppiä, mustan-karvaisia; kukkasien laide ja vartalo keltaisia. —  $\alpha$  7.

Kost. niit. harv. (U. St. H. S. K.) *Noin jalan pit.; vana tav. tumman-punerva, ylempää ynnä perien kanssa pitkällä, ulospäisillä, mustilla sukarvoilla ja lyhemmillä nystykarvoilla; koppilot isohkoita mustan-vehreällä kehdoilla.*

H. pratense Tausch. Nurmifeltano. — Vana 1-lehtinen, takkuinen, lyhytrönsyinen, toiskertaisella, monikoppiloisella sarjalla; lehdet selvän-vehreitä, pitkulais-suikeita, tylppiä, molemmin puolin, erinom. suonelta ja laidalta kalseita; kukkasien laide ja vartalo ed. — 2 6, 7.

Niit. harv. (U. Ke. St. — Kp. Pe.) *Vana 1½—3 vaaksan pit.; rönsyt väl. puuttuvia; vana ylempää ja koppilon perät vanukkeisia, tiheillä, mustilla nysty- ja suka-karvoilla; lehdet lyhyillä, pehmeillä, käyrillä karvoilla.* — *H. collinum* Gochn. pr. p.

•• Varsi yksi — harvalehtinen, puuttuvilla (t. maan-alaisilla) rönsyillä.

H. præaltum Vill. Pitkä feltano. — Sinivihertävä; varsi 1—3-lehtinen, kalju t. harsu-takkuinen; lehdet suikeita, suippoja, m. ehytlaitaisia, kaljuja ilman tähtikarvoita t. -höydyttä, ulkomaiset tylppäpäisiä; koppilot tiheässä, runsaassa röyhyssä sinivehreillä, tähtihöydyttömillä, harsukarvaisilla kehdoilla; suomut tav. tylppiä, vaalea-laitaisia, karvaselkäisiä. — 2 6, 7.

Kuiv. paik. harv. (U. St. H. S. K. Pe.) *2—4 vaaksan pit. kaljulla, sinehtävällä, varrella ja lehdillä, pienukaisilla kehdoilla ja kukkaistoilla.*

H. cymosum L. Viuhko feltano. — Vehreä; varsi 1—6-lehtinen, takkuinen, tähti-höyteinen; lehdet pitkulaisia — suikeita, karvaisia, molemmin puolin kuta kuinki tähti-höyteisiä; ulkomaiset aluslehdet tav. lyhempiä, m. vastopuikeita, tylppäpäisiä; koppilot viuhkossa t. sarjamaisessa röyhyssä; kehto takkuinen, nystykarvainen ja tähtihöyteinen. — 2 6, 7. —  $\beta$  pubescens: koppilot tav. ryhmin tiheässä viuhkossa; perät lyhyitä ja samoin kun kehdotki tiheällä tähtihöydellä, nysty-karvaisia; varsi ja lehdet m. karvattomia, lienteitä. —  $\gamma$  hirtum: koppilot viuhko-röyhyisiä; perät ja kehto k. ed.; hienohampaiset lehdet ja varsi takkuisia t. tiheän-kalseita.

Niit., mäk., tav. (E. — P. Kv. Lv.) *3—4 vaaksan pit., väl. matampiki, vehreä t. vähän harmahtava.* — *H. Nestleri* Vill. —  $\beta$  *H. glomeratum* Fr. —  $\gamma$  *H. collinum* Fr. *H. fallax* Willd., Hn.

†† **Pulmonarea:** enentyvät juurellisista lehtipöryläisistä; aluslehdet kukkimisen aikana pysyviä ja vehreitä; kuorusjyvät isompia; haivenen hapsset eripitkiä, tönkeitä.

## \* Kukkaset karva- t. ripsilaitteisia.

*H. alpinum* L. Tunturi-feltano. — Varsi tähti-höyteenen, karvainen, yksi- t. harva-koppiloinen; aluslehdet lapiomaisia, kanaltaan vähittäin soukistuneet siivikkään routiin, molemmin puolin karvaisia; kehto harmaan-höyteä pitkistä, tiheistä karvoista; kukkasien laide karvainen. —  $\alpha$  7, 8. —  $\beta$  fuliginosum: varsi lehtinen, tiheään vaalean-höyteä, tav. nystykarvaton; lehdet sui-kean lapiomaisia; kehto ruskean-höyteä.

Tunt. tav. (P. L. Lv.) Varsi tav. vaaksan pit., m. lehdetön t. 1—2:lla pienellä, tasasoukalla lehdellä, ja yksi-koppiloinen; toisinteleen jalan pit., harvalehtisenä, 2—4:llä, pystyperäisellä koppilolla; aluslehdet ehytlaitaisia t. harvaltaan loiva-, väl. mutka-hampaisia; kukkaistot tav. isoja, yli tuuman levyisiä; vartalo tav. kel-tainen.

*H. nigrescens* Willd. Mustais-feltano. — Varsi ed. 1- t. harva-koppiloinen ylöspäisillä perillä; aluslehdet pitkän-soikeita, karvaisia pitkäveteisillä, kapeilla ruodeilla; kehto musta, lyhyt-höyteenen, nystykarvainen; kukkasien laide lienteä; vartalo ruskea. —  $\alpha$  7, 8.

Tunt. (L. Lv.) Varsi 1—2-lehtinen, väl. lehdetön; lehdet ehytlaitaisia t. mutkahampaisia, lyhyt- ja käyrä-karvaisia; koppilot 2—4, väl. yksinäisiä ihan mustilla kehdoilla; vartalo aina ruskea. — *H. atratum* Fr.

## \*\* Kukkaset kaljulaiteisia.

*H. murorum* L. Salofeltano. — Varsi tav. yksilehtinen ja harvakoppiloinen m. haarattomalla huiskilolla, kohenevilla perillä; aluslehdet ohuita, puikeita — pitkän-suikeita, ruodikkaita, tav. tylpäkällä t. herttamaisella kannalla, isohampaisia, pehmytkarvaisia, tav. ilman tähtikarvoita; kehto lienteä, kuta kuinki nysty- ja tähti-karvainen soukilla, suipoilla suomilla; vartalo lop. sinettävä t. ruskea. —  $\alpha$  6, 7. —  $\beta$  incisum Hop.: lehdet herttamaisia, sinivihreitä, syvään liuskahampaisia; kehto nystykarvaton, tiheällä tähtihöydyllä. — \* *cæsium* Fr.: varsi 1—2-lehtinen; lehdet sinisen-hallavia vähän soukkenevalla kannalla, alta puolen tähtikarvoilla; kehto k. ed. toisint.

Mets. ja m. p. tav.;  $\beta$  ja \* mäk. päivänpaist. (E. — L. Lv.;  $\beta$  U. St. K.) Varsi m. kalju, kyynärän pit.; ylöskaarevilla, tähtivanukkeisilla koppiloperillä; lehdet pehmeitä, ohuita pitkillä, höyteisillä ruodeilla, varsilehti pienempi lyhytruotinen väl. ruoditon. —  $\beta$  *H. muror. var. subcæsium* Fr. — \* *H. cæsium* Fr., Hn.

*H. vulgatum* Fr. Ahofeltano. — Varsi 2—monilehtinen haaraisella röyhyllä ja sirottavilla koppiloperillä; alus- ja varsi-

lehdet m. tasamukaisia, soikeita t. puikeita — suikeita, kannaltaan ruodiksi soukkenevia, enimm. keskikohdalta hammaslaitaisia, pehmeitä, harsukarvaisia, tav. ilman tähtikarvoita; kehto ja vartalo k. ed. — 24 6, 7.

Metsätöyr., niit. tav. (E. — L. Lv.) *Toisintele* paljon erittäinki lehtien leveydellä ja karvaisuudella, väl. edellisestä lajista tuskin eroava; varsi toisint. 1- ja 5-lehtisenä; lehdet milloin vehreitä ja ohuita, milloin (päivän-paist. paik.) sinertäviä ja taneampia, alta puolen väl. veri-punaisia. — *H. sylvaticum* Lam. *H. maculatum* E. B.

*H. saxifragum* Fr. Kalliofeltano. — Varsi tav. monilehtinen, tyveltä hatuinen, useammalla, 1—2-koppiloisella, pystöisellä, m. tasakorkealla perällä; aluslehdet ruodikkaita, suikeita, suippoja, tankeita, sinihallavia, ehytlaitaisia t. harsuhampaisia, molemmin puolin kalseita t. ripsilaitaisia, alta harvaltaan tähtikarvaisia; varsilehdet pienempiä, ruodittomia; perät ja kehto epäselvällä tähtihöydyllä, harsukarvaisia; suomut suippoja, vähän leveämpiä; vartalo keltainen. — 24 6, 7. —  $\beta$  hispidissimum: lehdet ja varsi tyveltä tiheä-takkuisia.

Kallioilla (T. U. — L. Lv.;  $\beta$  T. U.) *Toisintele* lehtiensä paljoudella ja karvainsa sekä paljoudella ja tiheydellä; eroaa edellisistä lajeista sinihallavilla, tankeilla t. nahkeilla lehdillään, isomilla kehdoillaan, joiden suomut ovat vähän leveämpiä ja tylpempiä; aluslehdet tav. kuihtuvia ennen varsilehtiä. — *H. saxifragum* & *norvegicum* Fr.

+++ **Accipitrina:** enentyvät suletuista silmikoista varren tyvellä; aluslehdet kukkimisen aikana puuttuvia t. kuihtuvia; kuorusjyvät ja haiven kun ed.

\* Varsilehdet sepimättömiä.

*H. rigidum* Hn. Tankea feltano. — Varsi monilehtinen, tav. tankea ja haaroittuva toiskertaiseksi röyhyksi; lehdet leveän-suikeita, suippoja, jurahampaisia, harvaan kalseita, aliset kannaltaan soukkenevia lyhyeksi ruodiksi, yliset ruodittomia; kehto tumman-vehreä harvoilla nysty- ja suka-karvoilla; suomut monirivisiä, tylppäpäisehköitä, ulkomaiset hölteitä, siirpäisehköitä; vartalo sini-ruskea. — 24 7, 8. — \* *tridentatum* Fr.: varsi hennompi ja vähemmän haarova, tav. pillikäs; lehdet ohuempia; kehto vaaleampi-vehreä.

Kuiv. paik., mäk.; \* leht. (T. U. — P. L.; \* A. Ke. Pe.) Tav. 1½ kyynärän pituisella, tankeammalla, haarailemmalla varrella ja röyhyillä kun Ahokeltano ja kukkiva myöhemmin, jolloin varsinaiset aluslehdet jo ovat kuihtuneet.

*H. gothicum* Fr. Ryötin feltano. — Varsi k. ed.; lehdet ruodittomia t. hyvin lyhytruotisia, puikeita — suikeita, harsuhampaisia; suomet leveitä, kehtomyötäisiä, lop. mustanvehreitä t. m. mustia, keskeltä pitkiten nystykarvaisia, tylppäpäisiä, ainoastaan sisimmäiset nirkkoja. — 2/4 7, 8.

Vuor. ja kuiv. paik. (Pe. L. Lv.) *Epäilemättä vaan edellisen lajin toisintelo.*

*H. umbellatum* L. Sarjafeltano. — Varsi monilehtinen, kalju t. epäkarhea; lehdet suikeita — tasasoukkia, perättömiä, harsuhampaisia; koppilot tav. sarjamaisessa röyhyssä tähtivanukkeisilla perillä; kehtosuomet kaljuja t. epäselvästi lienteitä, päästä harittavia. — 2/4 7—9.

Kuiv. niit. yl. (E. — L. Lv.) *Tav. runsaslehtinen; vehreillä, kaljuilla, haritetuilla kehdoilla.*

•• Lehdet kuta kuinki sepokantaisia.

*H. crocatum* Fr. Saurafeltano. — Varsi monilehtinen, tankea, haarautunut harvoiksi, tav. 1-koppiloisiksi, tankeiksi, suoriaksi periksi; lehdet suikeita t. pitkänsoikeita, yliset m. puikeita, kaikki etenki yliset kuta kuinki sepokantaisia, hammaslaitaisia; koppilo-perät tähtivanukkeisia, m. suomuttomia; kehto typäkkäpohjainen, tyveltä nystykarvahko musevilla, yksivärisillä, m. kaljuilla suomuilla; vartalo ruskea. — 2/4 7.

Vuoriseut. harv. (S. K. P. L. Lv.) *Toisintees kaljuna t. karvaisena, soukemmilla t. leveämmillä lehdillä; koppilot tasakorkeana huiskilona, perät enimm. haarattomia ylisistä lehtihangoista. — H. sylvaticum* Wg.

*H. prenanthoides* Vill. Synäfeltano. — Varsi monilehtinen, karvainen, toiskertaisella röyhyllä; lehdet tav. ohuita, harsuotahampaisia, alta ja laidoilta karvaisia, suikeita, aliset leveämmällä, herttamaisella sepokannalla, yliset muuten kannalta leveneitä; kehto ja perät tähtivanukkeisia, nystykarvaisia; kuorusjyvät kalveita. — 2/4 7, 8.

Vuoriseut. harv. (K.) 1—1 1/2 kynn. pit.; peinemmillä, haaraisilla röyhyillä latvassa ja 3—4:ssä ylisessä lehtihangassa; kehto m. limitön, joilla kuilla pikkuraisilla pohjasuomuilla; kuorusjyvät vaaleankeltaisia.

TARAXACUM L. Maitiäinen. Smörblomster.

*T. officinale* Web. — Koppilo yksinäinen pillikkäällä vartalla; lehdet alaspäin pariliuskaisia t. kokonaisia. — 2/4 5—10 kelt. k. —  $\beta$  palustre Sm.: koppeloperä ylöskaareva, pulleahko;

lehdet kokonaisia t. syvään ja soukasti pari- ja taasliuskaisia, möyheähköitä; lisäkehto puikeilla, myötäisillä somuilla.

Asuntopaik. j. m. yl. (E. — L. Lv.;  $\beta$  A.) *Varsi noin vaaksan pit.*; kukkaistot isoja; juurakko tappimainen, mustapintainen. — *Leontodon taraxacum* L. —  $\beta$  *L. lividus* Kt. *L. salinus* Hoppe.

Muist. — Juurakkoa varhain keväällä otettuna käytetään vesittäjänä, veren puhdistavana ja vatsan pehmittävänä lääkkeenä vesi-, kelta- ja perätaudeissa, vatsan turvoksessa, sairasmielisyydessä j. m. Sitä varten niistä joko tuoreeltaan puserretaan mehua, taikka keitetään väkeväälientä kuivatuiista. Mehua on myös avulliseksi silmäjään voiteeksi kiitetty. Muutamat ovat juuria kahvenki sijaan käyttäneet. — Nuorista lehdistä varhain keväällä otettuna saadaan terveellisiä salatti- ja kaalilaitoksia.

#### LEONTODON L. Boifuffa. Mjölklblomster.

*L. hispidus* L. Refä-moifuffa. — Vana paljas, 1-koppiloinen; lehdet suikeita, pari- ja taasliuskaisia; kehtopohja munanmoinen; tav. takkuinen. — 2½ 6–8 kelt. k. —  $\beta$  *glabratus*: koko kasvi m. kalju.

Niit., ahoilla, leht. (U. — P. Kv.;  $\beta$  U. K. Kp.) *Noin vaaksan pit.*; isolla kukkaistolla. — *Apargia Hoffm.* —  $\beta$  *L. hastilis* L.

*L. autumnalis* L. Syys-moifuffa. — Vana paljas, kokeneva, 1 — useampi-koppiloinen; perät latvapuoelta somuisia, kehtoa vasten nuijamaisesti levenneitä; lehdet kokonaisia t. liuskahampaisia, tav. kaljuja. — 2½ 7–9 kelt. k.

Ahoilla, yl. (E. — L. Lv.) *Vana tuskin vaaksan pit.*; kehto muin kalju, muinlientä, pohjalta kapeneva. — *Apargia Hoffm.*

Muist. — Kukkaisto aukenee kello 7 aamup. ja ummistuu k. 3 iltapuoella.

#### HYPOCHÆRIS L. Päränfilmä. Fibler.

*H. maculata* L. — Varsi m. paljas, 1–4-koppiloinen, karhea; lehdet alas painuneita, vastopuikeita, liuskattomia, hammaslaitaisia; kehto hatuinen; haivenet varrellisia. — 7–9 kelt. k.

Niittutöyräillä (A. — K. St. — S. Kv.) *Varsi us. kyynärän pit.*, vaaksan pituisilla aluslehdillä, isoilla kukkaistoilla.

Muist. — Lehtiä paikoin syödään kaalina.

#### 16 heimo. — DIPSACACEÆ.

TRICHERA Schrad. Ruufuruoho. Äkervädd.

*Tr. arvensis* Schrad. — Laitakukkaset isommilla laide-

liuskoilla, kun kehräkukkasen; varsilehdet syvään parihalkoisia t. pykäläitaisia, harv. kokonaisia; varsi hatuinen. — 24 7, 8.

Pellon pient., kuiv. niit. tav. (E. — P. Kv.) *Parin vaaksan pit. us. 3-koppiloisella varrella, sinipunervilla, väl. punaisilla t. vaalahtavilla, yli tuuman levyisillä, kauniilla kukkaistoilla.* — *Scabiosa L. Knautia Coult.*

Muist. — Käytettiin ennen keuhko- ja muiden sisäelinten vikain paranteeksi, myös ulkonaisesti ihoruohumisia vasten. Karvaansekainen maultansa. Kukkaistot tupakan savusta muuttuvat vehreiksi. — Kaaliksi keväällä sopiva.

#### SUCCISA Koch. Purtojuuri. Ängsvädd.

*S. pratensis* Mönch. — Kaikki kukkasen yhdenmoisia paleroisessa mykerössä; lavan vareet terätorven pituisia; lehdet suikeita. — 24 8, 9.

Kost. niit., ahoilla, tav. (E. — Pe. H. S. K. Kv.) *Kukkais-tot sinisiä, harv. punaisia t. valkeita.* — *Scabiosa succisa L.*

Muist. — Kelta- ja vehreäpaineeksi sopiva.

### 17 heimo. — VALERIANACEÆ. Virmajuurisia.

#### VIBURNUM L. Heifi. Olvon.

*V. opulus L.* — Lehdet 3-halkoisia, suippohampaisia, ruodilla ylempänä nyylämäisiä nysteröitä; viuhkon laitakukat isompia, neuvottomia. — 24 6, 7 valk. k.

Kost. laksoisilla metsäniit. (E. — P. Kv.) *Sylenkorkea pensas sileäkuorisilla, paksuydillisillä, helposti lävistyvillä oksilla, isoilla valkeilla litteillä kukkaviuhkoilla, punaisilla marjoilla.*

Muist. — Vesat piipunvarsiksi, puu kaiteenpiiksi. Kuoresta saadaan linnun liimaa keittämällä. Marjoja syöpi pyy ja muut linnut; myös valmistetaan niistä sekä etikkaa että palovii-naa. Kylmettyneenä kadottavat pahan makunsa ja kelpaavat ihmisten syödä sekoitettuna jauhoilla ja leiväksi laitettuna.

Kasvia käytetään myös paineeksi.

#### VALERIANA L. Virmajuri. Vendelrot.

*V. officinalis L.* Tamallinen virmajuri. — Sekä varsietä aluslehdet parijakoisia 3—9:llä suikealla liuskaparilla; kukkaviuhko kolmis-haarukainen, m. tasalattainen. — 24 6, 7. —  $\beta$  *sambucifolia*: lehdet 3—5:lla liuska-parilla, juurahampaisilla liuskoilla; varsi tav. rönnyvä.

Kost. vet. niit. tav. (E. — L. Lv.;  $\beta$  T. U. H. P.) *Kyynärän pit., vaalean-punervilla kukilla; lehtiliuskat väl. sahaampaisia;*



*juurakko 1* — *useampi-vartinen*, milloin *rönsyvä*, milloin *rönsytön*; *haju omansa*, *väkevän-sekainen*. —  $\beta$  *V. sambucifolia* Mik., *Hn.*

Muist. — Juurta käytetään lääkkeeksi virmaa, matoja, päänkivistystä, lavantautia, vaimollisten tukkeusta vasten keitteenä, keitesakona t. jauhoina.

*V. capitata* Link. *Epin* *wirmajuuri*. — Aluslehdet kokonaisia, lyhytruotisia, pitkänpyöreitä; yliset varsilehdet ruodittomia, 3—5-jakoisia pitkulaisilla, ehyt- t. hammaslaitaisilla liuskoilla; suojuslehdet suikulaisia; kukat mykeröittäin huiskilossa. — 4 8.

Tunt. laiteilla, harv. (Lv.) 1—2 *vaaksan pit.*, *m. kaljulla liereällä varrella*.

VALERIANELLA Mönch. *Peltosaali*. *Åkersalat*.

*V. olitoria* Mönch. — Varsi toishaarukkinen; kukat mykerömäisesti haarukkain päässä; hedelmät litteähkön palleroisia, *m. sileällä hampaattomalla päällä*, *tyhjällä 2-jakoisella pesällä sisässä*. —  $\odot$  5—8.

Somerikoilla, pelt. (A.) *Harv. vaaksaa pidempi, pienillä vaalean-sinisillä kukilla*. — *Valeriana locusta* L. *Fedia olitoria* Vahl.

18 heimo. — RUBIACEÆ. Matarakasveja.

GALIMUM L. *Matara*. *Måra*.

† Lehdet odattomia.

*G. boreale* L. *Ahomatara*. — Hedelmä kalsea, sikiäimenä *m. terän kokoinen*; lehdet *leveämmältä kannalta suikeita*, *alta kaljuja*, 4 säteittäin \*); varsi pysty, karhea. — 4 7, 8 valk. k.

Kuiv. niit. ja ahoilla, yl. (E. — L. Lv.) 2—3 *vaaksan pit. varrella, vähän hajahtavilla kukilla*.

Muist. — Juurta käytetään punapaineeksi villaiselle, jota ensin keitetään koivunlehtien ja sitte ahomatara-juurijauhoin kanssa. — Myös maidon juoksutusaineeksi.

*G. palustre* L. *Suomatara*. — Hedelmä kalju; sikiäin nelihalkoista terää pienempi; kukat viuhkoissa; lehdet 4, harv. 5 t. 6, säteittäin, suikulaisia — vastopuikeita, tylppiä, erisuuria; varsi hervoton, *m. kalju*. — 4 6, 7 valk. k.

Vet. liejupaik. tav. (E. — L. Lv.)  $\frac{1}{2}$ —3 *vaaksan pit.*, *toisintelevä pystöisellä varrella; mustenee kuivaessa*.

*G. trifidum* L. *Rantamatara*. — Hedelmä kalju; sikiäin

\*) Sädelehtien luku niin tässä kuin seur. suvussa taitaa toisinaan poiketa tavallisesta määrästänsä, ja usein on alisissa ja ylisissä säteikoissa vähempi lehtiluku.

3-halkoisen terän kokoinen; kukkaperät ylisissä lehtihangoissa, 1—3-kukkaisia; lehdet 4 säteettäin, pitkänsuikeita, erisuuria, tylppiä; varsi rento, karhea. — 2½ 6, 7 valk. k.

Vet. lampirant. harv. (E. — L. Lv.) *Tuskin vaaks. pituisella, sammalten seassa suikertavalla varrella; pienempi ja karheampi k. ed. paljo pienemmillä, harv. 4-halkoisilla kukilla; hedelmä 2-kyhmyinen, puolikkaat palleroisia m. irti toisistaan.*

†† Lehdet otapäisiä.

G. uliginosum L. *Suhtamatar.* — Hedelmä nysteröpilkkui-nen; kukat toistain kolmis-haarukkaisessa viuhkossa; lehdet 6, suikulaisia, karhealaitaisia; varsi tav. velto ja karhea. — 2½ 7, 8 valk. k.

Vesiperäisillä paik. tav. (E. — L. Lv.) ½—2 *vaaksan pit. varrella; m. Suomataran näkkinen, mutta paljo pienempi; kiuvaessa ei mustene.*

G. mollugo L. *Painematar.* — Hedelmä kalju; viuhkot harsuja, monin kerroin kolmis-haarukkaisia; lehdet 8, tasakaitais-suikeita t. niskalta leveämpiä, tylppiä, lyhyt-otaisia; varsi velto, selvästi 4-tahkoinen, kalju. — 2½ 6, 7 valk. t. kellert. k.

Kuiv. mailla, ahoilla j. m. harv. (T. U. St. — Kv. Lv.) *Us. kyyn. pit. mutkaisella, hauraisella varrella; paljo toisinteleva. — G. erectum Huds.*

Muist. — Juurta käytetään punapaineksi.

G. verum L. *Keltamatar.* — Hedelmä kalju; viuhkot k. ed.; lehdet tasakaitaisia, taaskääntöisillä laidoilla, 8 säteettäin; varsi pystöinen, nulokulmainen, lieminkäinen. — 2½ 7 kelt., harv. valk. k.

Niit., tievars., pient. (E. — Pe. Kp.) 2 *vaaks. pit. liereähköllä varrella, tav. hyvin kaitaisilla, päältä kiiltävillä lehdillä, hyvällä, hunajamaisella hajulla.*

Muist. — Juurta käytetään puna-, ja kukkia keltapaineksi villaiselle. Maidon juoksutteenksi juustoliemeen pannuista kukista tulee juusto keltaiseksi ja hyvänhajuiseksi. Juuri virmataudin, emätaudin, sydänriiden paranteeksi. — Keltamataroita koottiin ennen vanhaan ruumisten alle arkkuun, josta niillä nimensä Ruumiinheinä.

G. triflorum Mich. *Suorimatar.* — Hedelmä kalsea; kukkaperät lehtihangoissa, tav. 3-kukkaisia; lehdet 6 säteettäin, pitkänsuikeita, taaspäisillä piikeillä selkäsuonessa, myötäpäisillä laidassa; varsi hervoton, karhea. — 2½ 7, 8.

Kallioin siimeksessä, harv. (U. H. S. K. P. Kv.) 1½ *vaaksan pit. heleän-vehreä, kaljuilla kukkaperillä, valk. t. vihervillä kukilla, kui-*

*vaneena hyvälle hajahtava, melk. Maratin näköinen ja hajuihin.*  
— *G. suaveolens* Wg.

Muist. — Käyt. yksin tarpeisiin, kun Marattiaki.

*G. aparine* L. *Sierumatara*. — Hedelmä koukkusukainen t. kalju, ja nysteröinen; perät 3—6-kukkaisia; lehdet 6—9 säteettäin, suikulaisia ja samoin kuin kärheä varsikin vastapäisillä piikeillä. — ☉ 6—8 vaaleankelt. k. —  $\beta$  infestum Kit.: hedelmä pienempi, epänysteröinen, mutta karvainen; kukat pieniä, keltäviä.

Kylätien. (A. T. U.;  $\beta$  E. — L. Lv.) *Mehevempi ja hauraampi muita mataroita; varsi us. pienen kynän paksuinen; hedelmä melk. hampun siemenen kokoinen.*

Muist. — Voiteeksi iهران t. voin kanssa kasvannaisia vasten. Myös kerpukia ja ryyhtymistä vasten sisälle otettuna. — Siemeniä on käytetty kahveksi, juurta punapaineeksi.

#### ASPERULA L. *Maratti. Madra.*

*A. odorata* L. — Kukat peräkkäissä viuhkoissa; hedelmä kalsea; lehdet suikeita, 8 säteettäin. — 2½ 5—7 valk. k.

Varjoisissa leht. harv. (A. U. H. K.) *Parin vaaks. pit., yli tuuman pituisilla, karhealaitaisilla lehdillä; kuivaneena hyvälle hajahtava.*

Muist. — Viinissä ja juomassa liotettuna antaa niille hyvän ma'un. Voidetta iهران kanssa sormipykimille ja lehmän nisähaavoille. Tupakin sekaan hajun vuoksi. — Ennen lääkkeenä käytetty maksatauti, ihottumisia ja vesikauhua vasten.

### 19 heimo. — CAPRIFOLIACEÆ. Kuusamakasveja.

#### LONICERA L. *Suuſama. Try.*

*L. xylosteum* L. *Punaſuuſama*. — Perät 2-kukkaisia, kukkain pituisia; molempain kukkain sikiäimet erillään, ainoastaan pohjallaan yhdessä; lehdet soikeita, höykeitä. — ½ 6 vaaleankeltäviä. k.

Metsäniit., laksorinteillä (E. — Pe. Kv.) *Parin kyynär. korpensas punaisilla kaksois-marjoilla; 1½ tuum. pitk. lehdillä ja tuskin ½ tuum. kokoisilla terillä.*

Muist. — Puu kovaa, sopiva kaiteenpiikiksi, haravanpiikiksi, piipunvarsiksi, käsisauvoiksi j. n. e. Sopii myös pensasaidaksi. Marjat ulostavia ja runsaammin nautittuna oksettavia.

*L. cœrulea* L. *Siniſuuſama*. — Perät 2-kukkaisia, joksensakin kukkia lyhemmät; molempain kukkain sikiäimet kokonansa toisiinsa kasvettuneet ja lop. yhtenä marjana; suojuslehdyy-

köitä 2 äimämäisiä; lehdet pitkänpyöreitä, ruodit karvaisia. — l 6 valk. k.

Vuorisent. harv. (Kv. Lv.) *Isompi edellistä, puolen tuum. pituisilla, sinervillä marjoilla*.

Muist. — Kelpaava mihin edellinenki laji.

#### LINNÆA Gron. Banano.

*L. borealis* L. — Varsi suikertava, vastakkaisilla, pyöreähköillä lehdillä, pystöisillä, 2- tahi 4-kukkaisilla haarukoilla. — 2 l 7 vaal., sisältä punert. k.

Havumets. (E. — L. Lv.) *Kyynäräsillä ja pidemmilläki, rihmamaisilla varsisuikeroilla, joista tuo tuostaki nousee sormenkorkuisia, rihmamaisia, punertavia haarukoita, pavunkokoisilla lehdillä ja tuumanpituisilla, punertav. kukkaperillä, nuokkuvilla, varsinkin öillä hyvänhajuisilla kukilla*.

Muist. — Kiitetään hyväksi luiden kolotustauksissa, jäsentauksissa, juoksiaisessa teevetenä nautittuna taikka ulkopuolisesti hauteina maidon kanssa yhteen survottuna. Myös pöhötyksissä samoin käytettynä.

#### 20 heimo. — CAMPANULACEÆ. Kellokasveja.

##### CAMPANULA L. Kello. Blåklocka.

† Lehdet selvästi karvaisia tahi karheita.

*C. glomerata* L. Peuranfello. — Kukkamykeröt latvassa ja väl. sivulla; verholiuskat pystöisiä, litteitä, suippoja; lehdet puikean-suikeita, alempana pitkäruotisia, ylempänä puoliseppoisia. — 2 l 7, 8 sinipunert., väl. valk. k.

Maa-niit. tievars. (E. — Pe. Kv.) *Us. 1/2 kyynärän pit.; kukat hienokarvaisia; aluslehdet puikeita*.

Muist. — Ansaitisi kauneutensa vuoksi kukkatarhoissa viljeltä.

*C. cervicaria* L. Hirvenfello. — Kukkamykeröt ed.; verholiuskat ulospäisiä, sisään-kääntyneellä päällä, venhomaisia, tylppiä; kaikki lehdet suikeita; varsilehdet puoliseppoisia, aliset ruodikkaita. — 2 l 7, 8 sin. k.

Metsäisillä niittutöyräillä, harv. (T. — K. St. — Kv.) *Varsi paksu 1—1½ kyynärän pit., mehevä ja karvainen; karvat hauraita, m. läpikuultavia; teräpoimut kalseita*.

Muist. — Juuret ihmisten syötäviä, kukat kelpaavat mehiläisille.

*C. trachelium* L. Barjanfello. — Kukat lehtisessä tertussa t. lehtihankaisilla perillä; verholiuskat puikean-suikeita, suip-

poja, pystöisiä, laidalta tankeakarvaisia; lehdet hertakkeisia, ylempänä puikeita, pitkäsuippoisia, kaikki syvään toissahaisia, alempana ruodikkaita, ylempänä ruodittomia; varsi särmikäs, kalsea. — 2 7, 8 sin., väl. valk. k.

Metsäniit. harv. (A. K.)  $1\frac{1}{2}$  kyynärän pit.; kukat tuuman pituisia, harv. kuutta enemmän; lehdet kuin Nokkosilla.

Muist. — Kaunis kukkatarhoihinki; juuret syötäviä.

C. latifolia L. Ukonfello. — Kukat ylisissä lehtihangoissa, yksinäisiä, pystöisiä; verholiuskat suikeita, suippoja, suoria, kaljuja; lehdet puikeita, suippoja, toissahaisia, alempana hertahtavia, ruodikkaita; varsi epäkulmainen, pehmytkarvainen. — 2 7, 8.

Kallioin juurilla siimeksisissä leht. harv. (K.) *Us.*  $1\frac{1}{2}$  kyynärän pit., erittäin leveillä lehtiruodeilla ja lehdillä; kukat isoja, vuorimailla valk., muuten tav. sinisiä.

Muist. — Sekä juuret että lehdet hyviä salattilaitoksiksi ja kaalikeitoiksi keväällä.

C. rapunculoides L. Ruohenfello. — Yksipuolisesti nuokkuvilla kukilla tertussa; verholiuskat suikeita, taaskääntöisiä; lehdet alempana ruodikkaita, herttapuikeita suippoja, yliset ruodittomia, m. suikeita. — 2 7, 8 punasinert. k.

Viij. harv. (A. — K. Kv.) *Us.* kyynärän pit., väl. yli 30-kukaisella tertulla, tuuman pit. kukilla, herttamaisilla aluslehdillä, hapsisella suikertavalla juurakolla.

Muist. — Käyt. samoin k. ed.

†† Lehdet tavallisesti kaljuja.

C. rotundifolia L. Riisänfello. — Terä kellomainen, paljon isompi vastopuikeata, alaskaarevaa hedelmää; luotin haarukat vartaloa lyhemmät; aluslehdet munuamaisia t. hertakkeisia, nyhlaitaisia, varsilehdet tasasoukkia. — 2 7, 8 sin., väl. valk. k.

Niit. ja ahoilla, tav. (E. — L. Lv.) *Tav.*  $\frac{1}{2}$  kyyn. pituinen monivartisella juurella, pienemmillä kodilla, kun muut lajit.

C. persicifolia L. Rurenfello. — Terä isokelloinen 5:llä loivalla liuskalla; luotin haarukat vartaloa pidemmät; aluslehdet vastopuikeita — pitkulaisia, ruodikkaita; varsilehdet tasasoukkia, harvaan nyhytlaitaisia. — 2 7, 8 sin., väl. valk. k.

Niittutöyräillä, harv. (E. — Pe. Kv.) *Hapsisella juurella; us.* yli tuuman pit. kukilla;  $\frac{1}{2}$  tuuman pit. kodilla; tankealla, tyvipuolelta särmikkäällä, us. päälle  $1\frac{1}{2}$  kyyn. pituisella varrella. Toisinaan erittäinkin verho karvainen.

Muist. — Tämän ja edellisenki lajin puserretusta kukkamehestä saadaan sinistä ja alunalla seotettuna vehreätä läkkiä eli maalia, joka ei kuitenkaan ole oikein pysyväistä.

*C. patula* L. *Harafanfello*. — Kukut lojottavassa, sarjamaisessa, latvahaaraisessa röyhyssä; terä laajeneva, kellomainen, yli keskikohdan halkoinen; aluslehdet vastopuikeita — pitkulaisia, ruodikkaita, varsilehdet suikeita, nyhälaitaisia. — 2) 6—8 sinipunert. k.

Niit. tav. (E. — P. Kv.)  $1\frac{1}{2}$  *kyyn. pit.*, suoralla *kulmikkaalla varrella*; *terä pohjasta suppeampi, laidoilta leveä ja kahta pidempi äimämäisiä verholiuskoja; juuri hapsinen.*

*C. uniflora* L. *Epinfello*. — Varsi 1-kukkainen; terä pikarimainen, lyhempi kalvolaitaista, suikeata, lop. pystöistä hedelmää; lehdet alempana pitkulaisia, varsilehdet m. tasasoukkia, nyhälaitaisia. — 2) 7, 8 sin. k.

Tunturiseut. harv. (L.) *Us. puoltaan lyhemmillä, sirottavilla verholiuskoilla kun terä, kukostaissa sormenpituksella, myöhemmin pidemälläki varrella,  $\frac{1}{2}$  tuuman pituisella, kynän paksuisella kodalla.*

#### JASIONE L. *Munffi. Monke.*

*J. montana* L. — Lehdet tasasoukkia; perät pitkiä, 1:llä kukkaistolla. — ☉ 7, 8 sin., harv. valk. k.

Kuiv. paik. harv. (T. — Ke. H.) 2 *vaaksan pit. tuuman pituisilla, varren levyisillä, tav. aaltolaitaisilla, epäkalseilla lehdillä, lehtihaikaisilla rönsyillä.*

### 21 heimo. — LOBELIACEÆ. Nuottaruohoisia.

#### LOBELIA L. *Nuottaruoho.*

*L. Dortmanna* L. — Varsi lehdetön rippuvilla kukilla; lehdet tasasoukkia, ehytlaitaisia, 2-pillisiä sisältä. — 2) 7, 8 vaaleansin. k.

Vedessä hietarant. (E. — P. Kv.) *Vedenalaisilla, tuuman pituisilla lehdillä, liereällä varrella; kukat tertussa.*

### 22 heimo. — CONVULVULACEÆ. Kiertokasveja.

#### CONVOLVULUS L. *Kierto. Vinda.*

*C. arvensis* L. — Perät liereitä, 1-kukkaisia; varsi köynneliäs; lehdet nuolikantaisia, suippoliuskaisia; verholiuskat pyöreähköitä; perän keskikohdalla 2 suojuslehdyykkää. — 2) 7, 8.

Pelt. harv. (A. — U. St. S. Kv.) *Tuuman levyisillä, valkeilla, ulkopuolelta punakoilla, hyvälle hajahtavilla kukilla, vähän lehtiä pidemmillä perillä.*

CUSCUTA L. *Humala-wierasä*. Snarrefva.

*C. europæa* L. *Humala-wierasä*. — Kukat perättömiä, ryhmistyneitä; verho 4—5-halkoinen pitkänpuikeilla, tylpillä liuskoilla; terä-torvi ensittäin liereä, eikä erittäin laidetta pidempi, sisäpuolella tav. kalvomaisia, torven laitaan likistyneitä suomuja; vartalot suippo-luottisia, ei erittäin pidemmät kotaa; varsi haarallinen, rihmamainen. — ☉ 7, 8 punert. t. valk. k.

Loisiona humalassa, nokkosissa, hampussa (E. — Pe. H. S. K. Kv.) Kukat alussa kuminan, myöhemmin pippuran jyvän suuruisia; terä-torven suomuja tois. ei tavata ollenkaan.

Muist. — Painaa alunassa liotetun vaatteen punaiseksi.

*C. epilinum* Weih. *Pellawa-wierasä*. — Terä alusta laajeneva, kellomainen; torvi laidetta pidempi; verho 5-jakoinen, leveän-puikeilla liuskoilla; torvi-suomut k. ed.; varsi m. yksikertainen. — ☉ 7, 8.

Loisiona pellavassa, harv. (St.) *Hienompi k. ed., m. haaraton; kukat kellervä.*

## 23 heimo. — BORAGINACEÆ. Karhealehtisiä.

SYMPHYTUM L. *Raunionnyrtti*. Vallört.

*S. officinale* L. *Punerma raunionnyrtti*. — Vähän karheakarvainen; lehdet puikean-suikeita, suippoja; yliset johteisia, vuorottaisia, aliset ruodikkaita, pitkän-puikeita; ponnet kahdesti pidemmät palhoa. — 2 6, 7 punasinert. t. valk. k.

Kylätien. harv. (U.) *Us. kyynäränki pituinen.*

Muist. — Juuri erittäin näljäinen. Kiitetään hyväksi vatsatautia, verisylyä ja rakkovikoja parantamaan, sekä ihmisten että eläinten kohtauksissa. Voiteena nahkoille pitää ne kauvan pehmeänä. Apteiki-nimensä sillä on *Consolida major*.

*S. orientale* L. *Karhea raunionnyrtti*. — Tankeakarvainen; lehdet puikean-suikeita; yliset ruodittomia, epäjohteisia, aliset ruodikkaita, hertakkeisia; ponsi palhon pituinen. — 2 6, 7 pun. k.

Kylätien. harv. (T.) *Tunnettava karheasta karvaisuudestaan ja lehtiensä johteettomuudesta.* — *S. uplandicum* Nym.

ANCHUSA L. *Säränfieli*. Oxtunga.

*A. officinalis* L. — Karheakarvainen; kukkatertut lop. parittaisia; verho suippomaisilla liuskoilla ja ulospäisillä karvoilla; varsilehdet suikeita — m. tasasoukkia. — 2 6, 7.

Pient., kuiv. niit. harv. (A. T. U.) *Kyynärän pit.; kukat sinisiä, sinipunerv. t. punaisia, vähän isommat kun muiden heimolaistensa; verholiuskat väl. tylpeitä.*

Muist. — Lehdet keväällä salattilaitoksiksi. Lehtimehestä alunan kanssa keitetynä tulee vehreätä maaliväriä.

### LYCOPSIS L. Raäti. Rast.

L. arvensis L. — Tankeakarvainen; terätorvi keskeltä polviva; varsi pystössä; lehdet suikeita, mutkaisesti hienohampaisia. — 6, 7.

Pelt. (A. — K. St. — S.) *Us. parin vaaksan pit.; kukat ensittäin punertavia, myöhemmin sinisiä.* — *Anchusa Lehm.*

Muist. — Kelpaa salatiksi keväällä.

### MYOSOTIS L. Lemmikki. Förgätmigej.

M. palustris With. Arolemmikki. — Teräliuskat tav. lanttopäisiä; hedelmällinen verho syvään 5-hampainen suorilla, tav. myötäisillä karvoilla; varsi ylempätä haarova. — 2½ 6—8 sin. k.

Vet. paik. yl. (E. — L. Lv.) *Us. 2 vaaksan pit. ihanilla sinisillä, ensimmältä punerva-laiteisilla, 2—3 linjan levyisillä kukilla, kauniin keltaisilla nielusumuilla. Varresta lähtee toisinaan pitkiä sivuhaaroja, ja pienempään toisinteloin teräliuskat väl. ovat pyöröpäisiä.* — *M. scorpioides L. \*)*

Muist. — Saksalaiset, Ruotsalaiset ja moni muu kanssa käyttävät tätä kukkaa lemmen ja ystävyiden muistimeksi, josta sillä on nimensä saksaksi: *Vergisemeinnicht* ja ruotsiksi: *Förgätmigej* s. o. *muista minua*. Suomalaisetki toisinaan sanovat sitä *Muiston-kukaksi*.

Lääkkeenä käytetään kukkaa tuoreelta muserrettuna hauteeksi punaisille, vuotaville silmille.

M. cæspitosa Schultz. Rantalemmikki. — Teräliuskat pyöröpäisiä; hedelmä-verho m. perän pituinen, yli puolivälin halkoinen, suikealiuskainen, suorilla, myötäisillä karvoilla; varsi lyhyt, pitkiksi haaroiksi jakauva. — 2½ 6—9 sin. k.

Rant. (E. — L. Lv.) *Kukat pienempiä, mutta verho isompi kuin Arolemmikillä; varsi myötäkarvainen, jo alemmata haarautuva ja haarat pitkällä, hervakoilla, harsuilla kukkatertuilla; alemmaiset kukat tav. suojuslehtisiä.* — *M. lingulata Lehm., H. M. F.*

M. sylvatica Hoffm. Ehtolemmikki. — Hedelmä-verho perää lyhempi, höyteä, harittavilla, koukkupäisillä karvoilla, yli puolivälin epämukaisesti liuskottu; terän laide litteä, paljon verhoa avarampi; varsilehdet kantapuolelta leveämpiä, vähän sepiviä. — 2½ 5—8 sin. k.

Tunt. ja varj. paik. harv. (Kv. L. Lv.) *1—2 vaaks. pit. m.*

\*) Linné osotti kaikkia Lemmikin eri lajeja yhteis-nimellä *M. scorpioides*.



yhtä isoilla kukilla, kun *Arolemmikki* ja suikertavalla juurakolla; koko kasvi harmaan höyteä. — *M. arvensis* β *Wg.* *M. alpestris* *Schmidt.*

*M. arvensis* *Hoffm.* Peltolemmikki. — Hedelmä-verho munanmoinen, sulettu, muuten k. ed.; terän laide onteva, ei paljon verhoa avarampi, pyöröpäisillä liuskoilla; vartalo paljon terän torvea lyhempi; lehdet pitkän-soikeita. — ☉ 6—9 sin. k.

Vilj. tav. (E. — P. Kv. Lv.) *Noin vaaksan pit. t. pidempi; isompi seuraavaisia, joilla kuin tälläkin on paljon pienempi ja ontevampi terälaide k. edellisillä; juurakko lyhyt pian hapsistuva.* — *M. intermedia* *Link.*

*M. hispida* *Schlecht.* Mäfilemmikki. — Hedelmä-verho munanmoinen, avosuinen, koukkusukainen, samanpituksilla, kaarevilla perillä; terälaide ja vartalo ed.; tertut siirottavia, harsukukkaisia. — ☉ 5, 6 sin. k.

Kuiv. mäk. harv. (A. T. U.) 3—6 tuuman pit., hyvin hoikka; kuivana hauraalla varrella ja erittäin perillä; hyvin pienukaisilla, alusta punertavilla, ei koskaan kellertävillä kukilla. — *M. colina* *Reich.* *M. arvensis* γ *Wg.*

*M. stricta* *Link.* Mholemmikki. — Hedelmä-verho pitkänmunainen, pystöpäinen, sulettu, koukkusukainen, m. perätön; kukat lopulta pitkissä, pystöisissä tertuissa; terä ja vartalo ed. — ☉ 5, 6 sin. k.

Kuiv. mäk. (E. — P. S. K. Kv.) 2—4 tuuman pit.; haarat tyveen asti kukallisia ja alimmaisat kukat us. lehtihankaisia.

*M. sparsiflora* *Mik.* Pohjan lemmikki. — Teräliuskat pyöröpäisiä; verho 5-liuskainen, tyveltä koukkusukainen; varsi vastakarvainen, monihaarainen, hervoton, 5-särmäinen; lehdet pitkänpuikeita, alempana ruodikkaita, ylempänä ruodittomia. — ☉ 5—7.

Varj. vuor. harv. (Lv.) *Us. vaaksan pit.; kukat hyvin pieniä; perät lop. nuokkuvia.*

### LITHOSPERMUM L. Ruusjuuri. Sminkrot.

*L. arvense* *L.* — Terä ei paljon verhoa pidempi; lehdet suikulaisia, jotenki siirottavilla karvoilla ja haarattomalla selkäsuonella; varsi pysty; lohkohedelmukset epätasaisia. — ☉ 5, 6 valk. k.

Pient. tav. (E. — P. Kv.) *Parin vaaksan pit.; hedelmukset mustanharmaita; kukat tav. valkeita; juuri pinnalta punainen, tahraava.*

Muist. — Tytöt paikoin käyttävät juurta poskipäilleen ruoksi.

STENHAMMARIA Reich. *Ḥaliffa*.

*St. maritima* Reich. — Lehdet pitkulaisia, möyheitä. — 4 6, 7 vaaleansin. k.

Merenrant. harv. (Kv. L. Lv.)  $\frac{1}{2}$ —1 *kyynärän pit., lamova, haarikas, sinihallava kasvi.* — *Pulmonaria* L. *Lithospermum* Lehm. *Mertensia* Don.

PULMONARIA L. *Smiffä. Lungört.*

*P. officinalis* L. — Aluslehdet herttapuikeita, varsijoh-teisia; varsilehdet puikean-suikeita, karheakarvaisia, aliset levyt-laitaisella ruodilla, yliset puolisepoisia. — 4 5, 6.

Varj. leht. (T. — K. St. H. S.) 2 *vaaks. pit.; aluslehdet ilmaan-tuvat myöhemmin ja kasvavat isoiksi, kuta kuinki hertakkeisiksi; ku-kat ensin punaisia, myöhemmin sinisiä.*

Muist. — Salatti- ja kaalilaitoksiksi sopiva.

ECHIUM L. *Reibonfieli. Blåkunt.*

*E. vulgare* L. — Tankeakarvainen, karvat nyyllämäisellä tyvellä; lehdet suikulaisia; tähkä toiskertainen lyhyillä, likeisillä sivutähkillä; heteet terää pidemmät. — 7, 8.

Kuiv. paik., pelt. harv. (T. U.) *Kyynär. pit. suoralla, tan-kealla, haarattomalla varrella, pitkätähkäinen; kukat vaaleansin., harv. valkeita.*

Muist. — Juuri punapaineksi.

CYNOGLOSSUM L. *Röiranfieli. Hundtunga.*

*C. officinale* L. — Heteet terätorvessa; verholiuskat pit-kulaisia; lehdet leveänsuikeita, vähän mutkailevia, myötäkarvaisia, harmaanhöyteitä. — 6—8.

Tievars. ja kylätien. harv. (A. — U. St. H.) *Us. kyynärän pit. tylkeällä, hiirenpesäisellä hajulla, piukalla varrella, ensin punai-silla, myöhemmin likasinertävillä, ei paljon verhoa isommilla kukilla.*

Muist. — Käytettiin muinen yskän, verijuoksuin, punatau-din, riiden, silmäkipuin ja monen muun vian lääkkeeksi sekä juuri että varsi lehtinensä. Muutamat arvelevat sitä vähin vaarallisek-siki runsaammin nautittuna. Hiirten sanotaan kamovan paikkoja, joissa tämän kasvin lehtiä ja siemeniä pidetään. Syöpäläisiä sen myös pitäisi päästä hävittämän.

ECHINOSPERMUM Sw. *Sirkunjuvä. Piggfrö.*

*E. lappula* Lehm. *Rotifirkunjuvä.* — Hedelmän perät hy-vin lyhyitä, pystöisiä; pähkylät kahdella piikkirivillä laidoissa; lehdet suikeita, ripsisiä. — 7, 8 vaaleansin. k.

Kylätien. kuiv. paik. harv. (A. — K. Pe. Lv.) *Vaaksan pit.* yksivartisella juurella, vaaleanharmaalla höyteellä; terät verhoa ei paljoa isommat. — *Myosotis L. Rochelia Röm.*

E. deflexum Lehm. Mettäfirunjymä. — Hedelmäperät alaskaarevia, aliset suojuksella; pähkylät yhdellä piikkirivillä. — 7, 8 vaaleansin. k.

Vuor., tunt. harv. (K. P. L. Lv.) *Pelttolemmikin näköinen, mutta isompi, us. kyynärän pit.; juuri monivartinen. — Myosotis Wg.*

#### ASPERUGO L. Serhi. Paddfot.

A. procumbens L. — Varsi hervoton, okainen, perättömillä kukilla lehtihangoissa. — ☉ 5, 6 sinipunerv. k.

Kylätien., pihoilla (E. — L. Kp.) *Us. kyynärän pit. karhealla, takistavalla, haaraisella varrella, soikeilla lehdillä.*

### 24 heimo. — LABIATÆ. Huulikukkaisia.

#### 1 parvi. — Mentheæ.

#### MENTHA L. Minttu. Mynta.

M. gentilis L. Salominttu. — Kukat lehtihangoissa kiehkurana, nuorempana harmaanlienteitä; perät ja terä m. kaljuja; verho karvainen ja pihkapilkkuinen äimämäisillä hampailla; lehdet lyhytruotisia, puikeita, karvaisia suippoisilla, ulospäisillä saahampailla. — 4 7, 8 sinert. k.

Viljelöpaik. metsist. harv. (U. H. Kp.) 1—2 *vaaksan pit.; lehdet ylempänä m. ruodittomia, alempana tuskin 1/2 tuuman pit.; kukat lop. lyhytperäisiä.*

Muist. — Tätä kuin seuraaviaki lajeja käytetään teenä oksetus-vioissa, vatsataudeissa, vilustuksissa ja muissa kohtauksissa. Myös haudekääreenä lämpimältä vaimoväen rinnoille maito-umnessa, suonivedoissa j. m.

M. aquatica L. Rantaminttu. — Kukat mykerössä t. kiehkuroittain latvaan asti; verho äimäpäisillä hampailla, tyveltä karvainen; lehdet puikeita, ruodikkaita, saahampaisia. — 4 7, 8 sin. k.

Rant. harv. (A.) *Us. kyynärän pit.; isonlaisilla lehdillä ja kukkamykeröillä. — M. hirsuta E. B. Origanum vulgare Fl. D.*

M. arvensis L. Arominttu. — Kukat hiehkuroittain; verho kellomainen lyhyillä, puikeilla hampailla ja tav. karvainen kuin peräki; lehdet puikeita — suikeita, ruodikkaita, tasaaisia. — 4 7, 8 punasin. k. —  $\beta$  lapponica: kasvi vehreä; perät ja suikeat lehdet m. kaljuja.

Rant. ja kost. paik. tav. (E. — L. Lv.;  $\beta$  P.) 1—2 *vaaksan pit.*, tav. *pehmeä ja karvainen*. —  $\beta$  *M. lapponica* Wg.

Muist. — Lääkkeeksi sopiva kuin edellisetki.

### LYCOPUS L. Rantayrtti. Kloört.

*L. europæus* L. — Lehdet syvään saharahampaisia t. parihalkoisia, karvaisehkoita, tav. elytluskaisia. — 2½ 7, 8 valk. t. punert. k.

Rant., kost. paik. (E. — Pe. Kv.) 2—4 *vaaks. pit. pystövarrella, tuuman levyisillä lehdillä, pienillä kukilla kiehkuroittain*.

Muist. — Kuivattuna ja vihrillin kanssa keitettyinä painaa mustaksi. Kasvin mehellä kulkulais-roistot välistä mustaavat kasvonsa mustilaisten näköiseksi.

### 2 parvi. — *Saturejineæ*.

#### ORIGANUM L. Meirami. Dosta.

*O. vulgare* L. — Kukkaröyhy kerroitellen 3-haarukainen, mykerömäisillä tähkäryhmillä; suojuslehdet soikeita, vähän verhoa pidemmät; varsilehdet puikeita. — 2½ 7, 8 pun. k.

Leht., niittutöyr. (A. T. K.) 2—3 *vaaksan pit., isolla, suojuslehdistä vähän sinertävällä röyhyllä, ryytihajuinen*.

Muist. — Lääkevoima lieventävä ja vahvistava. Yskässä, vaimoväen kuukautis-vioissa sisällisesti ja hauteina ulkonaisesti lievitävä. Lehdistä saadaan hyvää teetä, kun niille keväällä riivittynä lyödään kiehuvaa vettä, ne sitte siitä otettuna sykerretään ja kuivataan kuumilla rautalevyillä ja sullotaan tousiin vasta vuoden päästä viljeltäväksi. Tuoreeltaan juomisen sekaan käydessä pantuna ne lisäävät sen voimaa, ja kuivaneena tynnyriin ripustettuna pitävät juomisen kauvemmin happanematta. Käytetään myös makkaran ryydeiksi, punapaineksi j. m.

#### THYMUS L. Ujuruoho. Timjan.

*Th. serpyllum* L. — Kukat mykerössä; lehdet pieniä, soikeita — tasasoukkia, m. ruodittomia, ripsilaitaisia; varsi rento, yleensä lieminkäinen. — 2½ 6—8 pun., harv. valk. k.

Hietanummilla ja töyr. (E. — L. Lv.) 1—2 *vaaksan pit.; kukat hajahtavat hyvälle*.

Muist. — Löysääväksi ja vahvistavaksi lääkkeeksi teenä, myös hauteeksi ulkovieille suonivedoissa, niukahuksissa j. m.

#### CALAMINTHA Mönch. Räänminttu. Hartimjan.

*C. acinos* Clairv. — Kukat eri kiehkuroina; verho kupuva;

lehdet puikeita t. soikeita, harseasti sahapampaisia. — ☉ 6—8 punasinerv. k.

Kuiv. hietamailla (A. — K. St. — S. Kv.) *Vaaks. pit. tav. pystöisellä, monihaaraisella varrella; hyvänhajuinen.* — *Thymus L. Acinos vulgaris Pers. Melissa acinos Benth.*

Muist. — Yksiin tarpeisiin sopiva k. ed.

### CLINOPODIUM L. Näfiminttu. Bergmynta.

Cl. vulgare L. — Suojuslehdet kalseita; varsilehdet puikeita, lyhytruotisia, harseasti nyhytlaitaisia, karvaisia; varsi tav. haaraton. — 2½ 8 pun. k.

Niittutöyr. harv. (A. — K. H. — Kv.) 2—3 vaaksan pit., hyvin monikertaisilla ja monikukkaisilla kiehkuroilla; verhot puolta lyhemmät terää; haju ryytisekainen. — *Melissa clinopodium Benth.*

Muist. — Hyvä teeksi samalla tavalla, kun meirami laitettuna.

## 3 parvi. — *Scutellariæ.*

### SCUTELLARIA L. Wuohennokka. Getnos.

Sc. galericulata L. Sompi wuohennokka. — Kukat parittain lehtihangoissa; lehdet suikeita, leveän- m. herttakantaisia, harsuhampaisia. — 2½ 7, 8 sin. k.

Rantatienoilla, yl. (E. — L. Lv.) 2 vaaks. pituinen, 4-tahkoisella varrella,  $\frac{3}{4}$  tuuman pituisilla kukilla.

Sc. hastifolia L. Wähempi wuohennokka. — Kukat tähkämäisesti latvassa, pidemmät suojuslehtiä; varsilehdet parilla lyhyellä, ulospäisellä sivuliuskalla kannassa, m. keihäskantaisia, ehytlaitaisia. — 2½ 7 sinipunert. k.

Kivisillä, eritt. meren rant. harv. (A. — Ke.) Vähän pienempi edellistä, mutta kukat isompia; lehdet soikeita — herttamaisia poikkipäisellä kannalla.

### PRUNELLA L. Urohumala. Brunell.

Pr. vulgaris L. — Verhon ylihuuli poikkipäinen 3:lla, kannaltaan erillisellä hampaalla; lehdet pitkänpuikeita, kannalta tav. hammastettuja. — 2½ 7, 8 sin., harv. valk. k.

Ahoilla, tav. (E. — L. Lv.) Us. vaaksan pit., m. käpymäisellä tähkällä; kukat tav. 3 linjan pituisia; lehdet väl. mutkalaitaisia, väl. hammastettuja; varsi milloin pysty, milloin rento.

Muist. — Muserrettuna haavoille hyvä ja teenä suun huuh-  
timeksi kurkkuvioissa.

4 parvi. — **Nepeteæ.**NEPETA L. *Risjanminttu. Kattmynta.*

*N. cataria* L. — Lyhytperäiset kukkaviuhkot kiehkuroittain tähkässä; lehdet ruodikkaita, herttamaisia, jurasahaisia, lie-minikäisiä. — 2 7.

Kylätien. harv. (A. U.) 2—6 vaaksan pit., valkeilla, sisäpuolelta punapilkkuisilla, väkevähajuisilla kukilla.

Muist. — Hyvä löysääväksi ja hiostuttavaksi teeksi. Vaimoväen kalvetustaudissa avullinen. Kissoille on tämän kasvin haju erittäin mieluinen.

GLECHOMA L. *Maahumala. Jordrefva.*

*Gl. hederaceum* L. — Lehdet pyöreän hertakkeisia, m. kaljuja; verhoampaat puikeita, otapäisiä. — 2 5, 6 sin. k.

Aitovier. j. m. (A. — K. St. H. Kv. Lv.) 2—3 vaaks. pit.; kukat 6-kukkaisissa kiehkuroissa, tav. 3 yhdessä; aliset lehdet muuamaisia; miedolla, rytyimisellä hajulla. — *Nepeta glechoma Benth.*

Muist. — Lääkevoima ulostava, vesityttävä, ja ulkovoiteena haavan parantava. Hyvä rintateeksi. Englannissa pannaan juomisen sekaan käydessä, jonka siitä luullaan terveelliseksi tulevan, varsinki kivitautia vasten.

DRACOCEPHALUM L. *Ampiaisyrtti. Draknos.*

*Dr. Ruyschiana* L. *Nurmen ampiaisyrtti.* — Kukat lyhyenä tähkänä; lehdet tasasoukkia t. suikulaisia, tylpäköitä, ehytlaitaisia samoin kuin suippo-puikat suojuslehdetki. — 2 7 punasi-nert. k.

Niit. harv. (K. Kv.) *Us. 2 vaaksan pituinen, m. kalju, soukilla 1½ tuuman pituisilla lehdillä, tuuman pituisilla kukilla, vähän väkevänlaisella hajulla.*

*Dr. thymiflorum* L. *Raunion ampiaisyrtti.* — Kukat kiehkuroittain, ylempänä lähetysten tähkänä, pitkulaisilla, ehytlaitaisilla suojuslehdillä; verho m. terän pituinen; lehdet puikeita — pitkulaisia, sahalaitaisia. — ☉ 5, 6 sinert. k.

Peltoilla, tievars. harv. (U. S. K. Kv.) *Us. 2 vaaks. pit.; lehdet lyhemmät lehtiväliä; verho liereä, ylihuuli 3-liuskainen, puikea, otapäinen.*

5 parvi. — **Stachydeæ.**BETONICA L. *Petonia.*

*B. officinalis* L. — Varsi pystössä, ylempänä tähkämäisesti lähettäisillä kukkakiehkuroilla ja soikeilla, m. verhonpitu-

silla suojuslehdillä; verhoampaat otapäisiä, puikea-kantaisia; alahuulen keskiliuska nyhälaitainen, lanttopäinen. — 24 7, 8 pun. k.

Leht., niit. harv. (U.) 2 vaaksan pit.; lehdet pitkähertakkeisia, nyhälaitaisia; kukat perättömiä, alin kiehkura tav. erillään ylimmissessä lehtihangassa; terät ulkopuolelta valkea-höyteisiä; lehdet tuoreeltaan vähän pahalle hajaitavia. — *B. stricta* Ait.

Muist. — Lehdet kuivattuna aivastimeksi, myös teeksi lökäyskässä, luuvalossa, hermotauksissa; juuret keuhkotaudissa, ja runsaammin nautittuna oksettimeksi, hienottuna aivastimeksi.

### STACHYS L. Pähkämö. Stinknässla.

*St. sylvatica* L. Metjähkämö. — Kiehkurat 6-kukkaisia; lehdet ruodikkaita, herttamaisia, suippopäisiä. — 24 7, 8 tumman-pun. k.

Leht. j. m. (A. — K. St. — Kp. Kv.) *Us. kyynär. pit., musevanvehreä, pahanhajuinen; lehdet hyvin tuumanlevyisiä; varsi haaraton; tähkä soukkamainen.*

Muist. — Keltapaineeksi käytetty.

*St. palustris* L. Suopähkämö. — Kiehkurat 6-kukkaisia, puikean-suikeilla suojuslehdillä; lehdet suikeita, herttakantaisia lyhyillä t. puuttuvilla ruodeilla. — 24 8 pun. t. valk. k. —  $\beta$  *agrestis*: pienempi; lehdet, eritt. alta, höyteitä.

Kost. paik.  $\beta$  pelt. tav. (E. — Pe. Kv.)  $\frac{1}{2}$ —1 *kyynär. pit.; juurakot lop. pahkuraisia; varsi karvainen; lehdet sormenlevyisiä, 3:n tuuman pituisia; teränielu paikallinen;  $\beta$  enemmän harmaan-höyted.*

Muist. — Haavan lääkkeeksi (ennen). Juuripahkurat hyvä ruuan aine köyhinä vuosina.

### LEONURUS L. Rufula. Bonässla.

*L. cardiaca* L. — Yliset lehdet nalkkimaisia, 3-halkoisia, jurahko-sahaisia. — 24 7, 8.

Kylätien., tievars. harv. (A. — Ke. St. — S. Pe.) 1—1½ *kyynär. pit., monihaarainen; aliset lehdet us. kymmenen levyisiä, herttamaisia, liuskaisia; kukkakiehkurat pitkinä tähkinä punaisilla, sisätiä valkeanpilkkuisilla kukilla; karvaan makuinen äkeällä, tympeällä hajulla.*

Muist. — Lääkkeeksi päänsäälöittäjä ja reväisintä, sydänkipua vastaan.

### GALEOPSIS L. Piffife. Blindnässla.

*G. ladanum* L. Puna-piffife. — Kiehkurat erillään; terän ylihuuli hampainen; lehdet puikeita t. soukempia, sahalaitai-

sia, kalseita; varsi lienteä yhtäpaksuilla nivelillä. — ☉ 7, 8 pun. k.

Vilj. (A. — K. Kv. H. S.) 1—2 vaaks. pit.; verhohampaat suoria; terän ylihuuli us. 2-liuskainen; varsi tav. punertava, epäselvästi 4-tahkoinen.

Muist. — Vahvistavaksi ja löysääväksi teeksi rint-, vatsa- ja lökävioissa.

G. tetrahit L. Mätipillife. — Kiehkurat ylempänä m. yhdessä; varsi tankeakarvainen paksummilla nivelillä, puikeilla lehdistä; terä kahdesti verhoa pidempi t. lyhempi. — ☉ 7, 8.

Vilj. ja mäk. tav. (E. — L. Lv.)  $\frac{1}{2}$ —1 kyynär. pit.; kukat tav. punaisia, tois. vaaleankeltaisia.

G. versicolor Curt. Seltapillife. — Terä kolmesti verhoa pidempi leveällä, kuvertuneella ylihuulella, muuten k. ed. — ☉ 7, 8.

Vilj. tav. (E. — L. Lv.) Kukat isoja, keltaisia, rusopunaisella alahuulella. — G. tetrahit y L.

Muist. — Käytäntö sama k. punapillikkeen.

#### LAMIUM L. Peippi. Plister.

L. album L. Baltea peippi. — Kiehkurat 12—20-kukkaisia; verho sukahampainen; lehdet ruodikkaita, herttamaisia, suipvoja, jurasahaisia; varsi takkuinen. — 24 5—9 valk. k.

Kylätien harv. (A. — U. St. H.)  $\frac{1}{2}$ —1 kyynär. pit., Nokkosien muotoisilla lehdistä, isoilla tuuman pituisilla kukilla.

Muist. — Muinaisaikaan lääkkeenä valkeanjuoksua, yskää ja rauhaisvikoja vastaan. Myös hyvä kaaliksi keväällä.

L. purpureum L. Punapeippi. — Lehdet ruodikkaita, herttamaisia, tylppäpäisiä, tylsäshaisia t. pykälaitaisia, ylempänä lähinäisiä; verhohampaat verhoa pidemmät. — ☉ 4—9 pun. k. — \* incisum Willd.: suojuslehdet liuskaisia; yliset varsilehdet nalkimaisella kannalla.

Viljelöpaik. tav. (E. — P. Kv.; \* P.)  $\frac{1}{2}$ —2 vaaks. pit., väkevällä, tylkeällä hajulla. — \* L. confertum Fr., H. M. F.

Muist. — Kaalikeitoiksi keväällä, kuin muutki peipit. Sannotaan karkottavan koita ja luteita.

L. amplexicaule L. Peltopeippi. — Aliset lehdet ruodikkaita, yliset ruodittomia, munuamaisia, pykälaitaisia t. syvähampaisia, tylpeitä; verhohampaat verhoa lyhemmät. — ☉ 6—8 pun. k.

Kylätien. kuiv. paik. harv. (A. — K. Kv. H.) Tav. kahta pienempi Punapeippiä, harmaan höyteisillä, nahkeilla verhoilla.



6 parvi. — **Buguleæ.**AJUGA L. *Älfanfaafi*. Kåringkruka.

A. pyramidalis L. — Karvainen, rönsytön; kiehkurat 6-kukkaisia; varsilehdet pienempiä kuin isot aluslehdet, paljon kukkia pidemmät, mutkahampaisia. — 4 5, 6 sin. k.

Varj. aituuksissa (A. T. U. S.) *Vaaksan pit., harv. lyhyillä rönsyillä, tav. 1-vartinen, 4-puolisesti asettuneilla, latvaanpäin pienenevillä lehdillään leveän-keilamainen; kukat m. lehtien peitteessä.*

Muist. — Arveltiin ennen vatsataudeissa avulliseksi.

25 heimo. — **MENYANTHACEÆ.** Raatekasveja.

MENYANTHES L. Raate. Vattenklöfver.

M. trifoliata L. — Lehdet 3-lehdykkäisiä. — 4 6.

Soissa, yl. (E. — L. Lv.) *Juurakko suikertava; kukat harkossa, sisäpuolelta valkeita, ulkoa punaliuskaisia.*

Muist. — Lehdet ovat oivallista, *Trifolium aquaticum*-nimellistä, vatsan-vahvistavaa lääkettä kerpukissa, vesitaudissa, luuvalossa, vilutaudissa, matovaivoissa ja muissa teenä, keitteenä t. mehenä. Ne ovat sitä varten keväällä ennen kukille joutumista kerättävät. Savipuolia ja mätähaavoja pestään keitteellä ja samoin pää syöpälaisten vaivatessa. Matoja vasten sopii ottaa lehtijauhoja ynnä väkevän raate-teen kanssa pari kolme teelusikallista kaksi viikkoa myötänsä. Kovemmissa rintataudeissa, uuttavassa kuumetaudissa ja raskaille vaimoille on raate sopimatonta.

Lehtiä käytetään myös humalan asemesta oluehen ja muuhun juomiseen, josta tulevat terveellisiksi, jos karvaan-makuisiksi. Juuria on paikoin ruuaksi nälkävuosina kerätty.

26 heimo. — **POLEMONIACEÆ.** Sinilatvaisia.

POLEMONIUM L. Sinilatwa. Blågull.

P. cœruleum L. *Turmen sinilatwa.* — Lehdet parilehtisiä; röyhy pystössä; kukat nuokkuvia; verho pidempi terätorvea. — 4 6, 7 sin., harv. valk. k.

Niit. varsinki vuoriseut. harv. (U. St. — Kv. P. L.) *Kyyvärän pit., pystüvartinen. Tavallinen kukkatarhoissa, ja siitä monasti metsistynyt.*

P. pulchellum Bunge. *Säpin sinilatwa.* — Höyteä, ylempänä tahmea; lehdet parilehtisiä lyhyillä, tylpähkoilla lehdyköillä; muuten k. ed. — 4 7, 8 sinerv. k.

Laks. harv. (Kv. Lv.) *Pienempi k. ed., vaaksan t. runsaam-*

man pituisella, paljaalla t. harva- (1—2-)lehtisellä varrella. Tuskin edellisestä eroava. — *P. arcticum* Fr., *H. M. F.*

### DIAPENSIA L. luvana. Polört.

*D. lapponica* L. — Tupastava, yksinäisillä kukilla pystöisen vanan päässä; lehdet kieloisia, tylppäpäisiä. — 7, 8 valk. k.

Tunt. (L. Lv.) *Matala, aina vehreä kasvi, 1—2 tuuman pituisilla vanoilla.*

## 27 heimo. — OLEACEÆ.

### FRAXINUS L. Saarni. Ask.

*Fr. excelsior* L. — Kehätön; lehdet parilehtisiä suikeilla, sahalaitaisilla lehdyköillä; siipihedelmä viistoin lovipäinen. — 5, 6 punasinert. k.

Mets. ja laks. harv. (A. — Ke. St. H.) *Korkea puu vehmaisissa metsissä, kylätienoilla, nurmilla; vastakkaisilla haaroilla, isoilla mustilla silmikoilla ja tuumanpituisilla siipihedelmillä; kukat lehden-edellisid; ponnet mustia.*

Muist. — Kuori lääkkeenä vatsan asetuttava, matoja vasten, vilutaudeissa ulostusaineen jälkeen. Lehdet ovat vähän ulostavia. Lehtien mehua saksanviinan kanssa kiitetään hyväksi käärmeenpistossa. Puun lastuista keitetään saarnentervaa, josta on apua ollut hengenahdistajassa, ähkyssä, vilutaudissa.

Puunaine on valkeaa, kovaa ja sitkeää, kaikenlaisiksi veistinkaluiksi kaunis ja sopiva.

Saarni kasvaa hyvin hyötyisästi sekä vesoista että siemenistä, jotka lokakuussa ovat valmiita.

## 28 heimo. — ASCLEPIADACEÆ. Perhokukkaisia.

### CYNANCHUM RBr. Perhokukka. Tulkört.

*C. vincetoxicum* RBr. — Terä kalju, puikealiskainen; lehdet puikeita t. hertahtavia, snippoja, laidat alta puolen samoin kuin ruoditki lienteitä; varsi pystössä. — 6, 7 valk. k.

Kallion-raoissa, mäkirinteillä (A. T.) *3 vaaksan pituinen; kukat sarjamaisesti latvassa ja ylisissä lehtihangoissa; tuppihedelmukset us. 2 tuuman pituisia.* — *Asclepias* L. *Vincetoxicum officinale* Mönch.

Muist. — Juuri vesityttävä ja hiestyttävä, keitteenä tahi jauhattuna vesitaudissa ja myrkytyksissä kiitetty, siitä sillä onki toinen nimensä: *Kärmeenpiston yrtti.*

## 29 heimo. — GENTIANACEÆ. Katkerokasveja.

## GENTIANA L. Kattero. Höstklocka.

† Terä paljaalla, karvattomalla nielulla.

*G. rotata* Fröl. Lapin kattero. — Terä ratasmainen, litteä, 5-jakoinen, tyveltä ripsuinen; verholiuskat soukkia, m. teränpituisia; heteet nielun sisässä; aluslehdet ruusukkeisia, varsilehdet pitkulaisia — tasasoukkia. — ☉ 7, 8 sin. k.

Tunt. harv. (Lv.) *Vaaksan pit. vuorottaisilla haaroilla, 1-kukkaisilla perillä.* — *Pleurogyne* Griseb. *Swertia* L., Pall. *G. sulcata* Willd. *Sw. sulc.* Rottb.

*G. pneumonanthe* L. Niittukattero. — Terä laajenevasti pikarimainen, 5-halkoinen ehytlaitaisilla, lyhytsuippoisilla liuskoilla ja lyhyillä välihampailla; ponnet alusta yhdessä; lehdet tasasoukkia, tylpäköitä. — ☉ 7, 8 sin. k.

Niit. ja ahoilla, harv. (Ke.) 1—2 *vaaksan pit.*; kukat 1—1½ *tuuman pituisia, sormen levyisiä, perät paljon lyhemmät.*

Muist. — Kukkia käytettiin ennen lääkkeeksi keuhko-, maksa- ja pernatautia vasten.

*G. serrata* Gunn. Turjan kattero. — Terä soukan-pikarimainen, 4- väl. 5-halkoinen, hienosahaisilla liuskoilla; varsilehdet tasasoukkia — suikulaisia; perät 1-kukkaisia, monin kerroin kukkaa pidemmät. — ☉ 7, 8 sin. k. — β detonsa: terä 4:llä nyhlaitaisella liuskalla.

Merenrant. tunturilaitteilla, harv. (L.; β L. Lv.) *Varsi sormen pit. ja kukkaperät väl. pidemmät; kukat us. runsaan tuuman pituiset; kaksi verholiuskaa pidemmät ja soukemat toisia.* — *G. ciliata* Bl. Fl. N. — β *G. detonsa* Rottb.

*G. involucreta* Rottb. Pohjan kattero. — Terä pikarimainen, suippoliuskainen; latvakukat tav. ryhmistyneet mykerömäisiksi sarjoiksi, lehtimäisillä suojuksilla; lehdet puikeita; varsi 4-kulmainen. — ☉ 7, 8 valk. t. sinerv. k.

Merenrant. harv. (L. Lv.) *Us. vaaksan pit., tav. 5-halkoisilla terillä.* — *G. aurea* L. *G. quinquefolia* Fl. D.

*G. nivalis* L. Sumikattero. — Terä suppilomainen, 5-halkoinen, tylppäliuskainen; verho tuskin puoliväliin 5-liuskainen, teräväkulmainen; kukat lop. perällisiä; lehdet puikeita. — ☉ 7 sin. k.

Tunturilait. harv. (L. Lv.) 2—4 *sormen pituinen; ½ tuuman ja pidemmilläki kukilla.*

†† Terä karvaripsuisilla nielusomuilla: *Eurythalia* Ren.

*G. tenella* Rottb. Pienokattero. — Terä 4-halkoinen; verho

4-jakoinen puikeilla, m. tasamukaisilla liuskoilla; perät pitkiä, m. lehdettämiä; varsilehdet puikeita. — ☉ 7, 8 sin. k.

Tunturilait. harv. (L. Lv.) 1—3 tuuman pit., tyveltä haaroa, us. 1-kukkainen. — *G. Koenigii* Gunn. *G. glacialis* Vill.

*G. campestris* L. Hofattero. — Terä 4-halkoinen; verho 4-jakoinen, 2:lla paljon isommalla, soikealla liuskalla; lehdet pitkän-puikeita. — ☉ 7, 8 sin., harv. valk. k.

Yläisillä niit. ja ahoilla (A. — U. St. H. S. Pe. P.) Vaaksan pituisella, haaraisella, monikukkaisella varrella; pienemmät verholiuskat tav. isompain sisäpuolella.

Muist. — Lääkkeenä pistoksia vastaan oluessa tahi viinissä liotettuna. Juurta ja varttaki lehtinensä käytetään humalan puutteessa juomisen sekaan.

*G. amarella* L. Hofattero. — Terä 5- t. 4-halkoinen; verho m. tasamukaisesti 4- t. 5-halkoinen suikulaisilla, tylpillä, terätorven pituisilla liuskoilla; varsilehdet puikeita — soikeita t. kieloisia; aluslehdet lapiomaisia. — ☉ 6—10 sin. k. —  $\beta$  lingulata: varsilehdet pitkulaisia — soukan kieloisia, tylppäpäisiä.

Tuoreilla niit. ja ahoilla (A. — K.;  $\beta$  E. — P. Kv. Lv.) Vaaksan pit., pienemmillä kukilla k. ed., vähän erisuurilla verholiuskoilla; päälaajin lehdet leveämmät kannalta,  $\beta$ :n keskeltä tahi päästä; haarat myöhdään syksyyn toinen toisensa perästä kukostavia. —  $\beta$  *G. lingulata* Agardh.

Muist. — Lääkevoima sama k. ed.

## ERYTHRÆA Pers. Rantafappi. Tusengyllen.

*E. littoralis* Fr. Sjömpi rantafappi. — Kukat toishaarukkaisessa viuhkossa; verho m. torven pituinen; lehdet suikulaisesti tassoukkia; varsi nulukulmainen. — ☉ 7, 8 pun. k. —  $\beta$  minor: sormenkorkuinen, monilukuisilla ryhmäkukilla.

Merenrant. (A. — Ke. St.;  $\beta$  A. U.) Vaaksan pit.; kukat m. erityisittä perittä; linjan levyisillä, väl. kieloisilla lehdillä. — *E. angustifolia* Wg. —  $\beta$  *Chironia littoralis* E. B.

Muist. — Vatsanvahvistava horkan, pernataudin, luiden kollottajan lääkkeenä.

*E. pulchella* Fr. Bähä rantafappi. — Varsi haaraton, 1-kukkainen t. tyvestä alkain haarainen perällisillä kukilla; verho torvea lyhempi; lehdet puikeita. — ☉ 7, 8 pun. k.

Merenrant. harv. (A. U.) Us. tuskin tuuman pit. — *E. angustifolia*  $\beta$  *tenuiflora* Wg. *Gentiana* Sw.

## 30 heimo. — SOLANACEÆ. Koisokasveja.

SOLANUM L. *Röifo. Trollbär.*

*S. nigrum* L. *Muëtafoifo.* — Varsi ruohomainen sileillä kulmilla; lehdet puikeita, epähampaisia t. mutkalaitaisia; kukat sarjamaisia yhteisellä perällä lehtien alapuolla. — ☉ 7, 8 valk. t. sinervähk. k.

Kylätien. harv. (A. T. U.) *Parin vaaksan pit., tuuman pituisilla kukkaperillä, ison herneen kokoisilla, mustilla t. vihertävillä marjoilla.*

Muist. — Lehdet ryyhtynäisissä, koissa ja mätähaavoissa ulkonaisesti.

*S. dulcamara* L. *Punafoifo.* — Varsi pensastava, notkea t. m. köynneliäs; lehdet puikean-herttamaisia, yliset tav. keihäskantaisia; kukkaröyhyt toishaarukkaisia, toisella puolella vartta, lehdet toisella. — h 7, 8 sinipunert. k.

Rant. ja tuoreilla louhikoilla (E. — Pe. Kv.) *Pensaan tappainen, tav. kalju pitkulaisilla, punaisilla marjoilla.*

Muist. — Varsista pieniksi leikattuna ja teeksi laitettuna on hyvä apu moneen vikaan, syyhelmiin, savipuoliin ja muihin iho-rohtumiin, kolottajiin, keltatautiin, kerpukkiin, mätähaavoihin, ruusupöhöön. Marjat ovat myrkyllisiä, oksetuttavat ja ulostuttavat. Koirat ovat 30:stä marjasta kuolleet. Varret sopivat van-teiksi kipoille ja kannuille, myös vasuksiksi.

DATURA L. *Öulluruoho. Spikklubba.*

*D. stramonium* L. — Lehdet puikeita, mutkahampaisia, kaljuja; kota pystössä, munanmoinen, vahva-orainen. — ☉ 7, 8 valk. k.

Katuvarsilla, harv. (U.) *Parin vaaksan pit., tympeähajuisen; lehdet 7—8:lla, liuskaisella hampaalla; kukat ja kodat isoja.*

Muist. — Avullinen sisällisesti hermotaudeissa, luuvalossa, kolotusvioissa, päänvioissa, rampauksissa, kasvonkolottajassa, virmassa, vesikauhussa, hinkuyskässä ja muissa sakokeittona t. viina-rohtona; ulkonaisesti hauteena perätaudissa, rauhaiskovettumissa, maitopakoissa; lehdet tupakkana poltettuna hengenahdistajassa ja muissa rintavioissa. On hyvin myrkyllinen kasvi ja vaarallinen tuntemattoman käyttöä. Oksesuola viinin ja potaskan kanssa paras apu myrkytyksissä.

HYOSCYAMUS L. *Willifaafi. Bolmört.*

*H. niger* L. — Kukat perättömiä; lehdet pitkän-puikeita, sepokantaisia, kulmikkaasti mutka- t. liuskalaitaisia. — ☉ 7, 8.

Kylätien. (E. — Pe. S. K.)  $1\frac{1}{2}$  *kyynärän pituinen, tahmea, pahanhajuinen kasvi; juuri tappimainen, hyvin myrkyllinen kuin muutkin osat; kukat likakeltaisia mustansinisellä pohjalla ja suoniverkotuksella, harv. puhdas-keltaisia t. vaaleamaisia.*

Muist. — Lehdistä keitetään sakennusta, joka monessa viassa on hyvin tehoisa lääke, mutta liiaksi nautittuna huumaaava, myrkyllinen ja kuolettavaki. Sitä käytetään vetotaudin, jäsenkolotusten, virman, emätaudin, hammastaudin, kuivan yskän, reväisimen ja monen muun vian paranteeksi hyvin pienissä annoissa. Ulkonaisesti hauteina lehdet lievittävät ja vaimentavat kolotuksia. Siksi laitetaan myös *Villikaalin öljyä* (*Oleum Hyoscyami*) lehdistä, jos niitä lämpimässä paikassa liotetaan jossain rasvaisessa öljyssä, että voima niistä lähtee öljyyn.

### 31 heimo. — PERSONATÆ. Naamakukkaisia.

#### 1 parvi. — *Verbasceæ*.

VERBASCUM L. *Tulifuffa*. Kungsljus.

V. thapsus L. *Ufon tulifuffa*. — Lehdet pitkäjohteisia, nyhälaitaisia, ohuesti vanukkeisia, yliset suippoja; kukinto tiheä, tähkämäinen; teräliuskat soikeita; palhot valkean-höyteitä, 2 m. paljaat; kaikki ponnet yhtä suuria. —  $\gg$  7, 8 kelt. k.

Kuiv. paik. (E. — Pe. Kv.) *1—2 kyynärän pit. vahva, lehti-johteista kulmikas varsi; lehdet 2—3 tuuman levyisiä; kukat m. perättömiä, hyvälle hajaitavia.* — V. *Schraderi* Koch.

Muist. — Kukat yskä- ja rinta-teeiksi. Kukat ja lehdet keitteenä vatsa- ja ulkotaudin paranteeksi. Myös ulkopaisesti lievittäviksi hauteiksi ajoksille ja keitteenä kurkun huuhteeksi, lavemangeiksi. Hiirten ja rottain sanotaan karttavan niitä paikkoja, joissa tätä kasvia kuivaltaan säilytetään. Siemenet jauhettuna, maidon kanssa kokkareiksi tehtynä ja veteen viskattuna sanotaan huumaaavan kalat, jotta taidetaan käsin ottaa.

V. nigrum L. *Siisjan tulifuffa*. — Lehdet herttasokeita, alta harmaanlienteitä, johteettomia, yliset m. puikeita, ruodittomia, aliset ruodikkaita; kukkaryhmät harsuja; palhot punasinertävän-höyteitä; ponnet k. ed. —  $\gg$  7, 8 kelt. k.

Kuiv. paik. harv. (A. — K. St. — S. Kv.) *1—2 kyyn. pituisella, kynänpaksuisella, liereällä varrella, kuivaessa mustuvalla höyteellä.*

Muist. — Käytettiin ennen lääkkeenä m. samoissa tiloissa kuin edellinenki.

## SCROPHULARIA L. Eppiläjuuri. Flenört.

*Scr. nodosa* L. Niiel-*syyläjuuri*. — Terä avonainen; verholiuskat puikeita; lehdet herttapuikeita, suippoja, epämukaisesti jurasahaisia, kaljuja; varsi 4-tahkoinen, kalju. — 2 7, 8 ruuk. k.

Tuor. paik., vesivierillä, tav. (E. — Pe. Kv.) 2—3 vaaksan pituinen, isolla kukkaröhyillä, 3-jakoisilla haarukoilla; lehdet levellillä, m. poikkipäisellä kannalla; tympeämaisella hajulla, pahalla kurvaalla maulla.

Muist. — Juurikeitettä muinen käytettiin rauhaisvikain, riiden, kaulakupuin, peräputkamain ja monen muun vian parantoon. Kiitettiin myös hyväksi vanhoissa mätähaavoissa. Norjassa nauttivat sitä teenä kurkkukipeissä, ja väkevällä keittoliemellä pestään rupisia sikoja.

*Scr. vernalis* L. Kevät-*syyläjuuri*. — Terä sulettu; verholiuskat pitkulaisia; lehdet herttamaisia, toistain jurasahaisia; varsi 4:llä nulukulmalla, ynnä lehtiruotien kanssa höyteä. — 2 6, 7 kelt. k.

Raunioilla, harv. (T.) Tahmeakarvainen; nuorempana kukkaröhyillä lehtihangoissa, lop. myöskin latvassa.

2 parvi. — *Antirrhineæ*.

## LINARIA Mill. Kannueroobo. Flugblomster.

*l. vulgaris* Mill. Njo kannueroobo. — Kukat tähkämäisessä tertussa, perät nystykarvaisia; verho kalju, kannusta lyhempi; varsi pysty erinäisillä, m. tasasoukilla, kaljuilla lehdillä. — 2 7 kelt. k.

Kuiv. paik. (E. — Pe. Kv. Lv.) 2 vaaksan pituisella, tav. hirttämällä, kaljulla, sinetävällä varrella ja lehdillä, tuuman pituisilla kuitilla; kannukset pitkin perä pidemmät; maku tympeä, hirttämätön. — *Antirrhinum linaria* L.

Muist. — Pohja- ja keltatadissa vesittävän ja ulostuttavan ruuhtansa vuoksi teenä; alkuaikaisesti lauteena peräputkamissa. Ihmureltaan maahan seassa samasta kuolettavan karpäsiä; liiaksi nautittuna myrkyllinen ihonähtä.

*l. maritima* Desf. Niiel kannueroobo. — Koko kasvi tahmeakarvainen; kukat keltahangoissa ja hirsuissa lehtisissä tertuissa; verho kannusta pidempy perä lyhempi; lehdet suikulaisia, vuorisaassa alhaat rousakkeita. — 2 6 7 vaalean-sinipunerv. k.

Pohj. raunioilla harv. A. I. U. *Silene* röl. vaaksan pituisen var. kannueroobo. *Antirrhinum maritima* L.

VERONICA L. *Ḥättyruoḥo, Ḥädbyfe. Ärenpris.*

† Kukkaterttu t. -tähkä varren latvassa.

V. longifolia L. *Pittälehti-tädbyfe.* — Yhdellä t. useammalla pitkäveteisellä tähkällä latvassa; lehdet 3, 4 (harv. vaan 2) säteettäin, puikean-sukeita, suippoja, päähän asti sahalaitaisia, erisuurilla t. toissahaisilla hampailla; verholiuskat selvästi eripitkiä, suippoja. — 24 7, 8 sin. k. — β *maritima*: lehdet pyöreällä t. poikkipäisellä kannalla, pitkillä, suipoilla, hyvin erisuurilla hampailla.

Tuoreilla vuorilaiteilla, jokivarsilla; β merenrant. (E. — L. Lv.)  
*Us. kyynärän pituinen*  $\frac{1}{2}$ —1 *vaaksan pit.* tähkällä,  $\frac{3}{4}$  *tuuman le-*  
*vyisillä lehdillä.*

V. spicata L. *Ḥähkä-tädbyfe.* — Tähkä ed.; lehdet 2 (hyvin harv. 3) vastattain, suikeita — m. puikeita tav. lyhyillä, m. yhtäsuurilla sahashampailla, päätä kohden ehytlaitaisia; verholiuskat m. tasapitkiä, tylppiä. — 24 6, 7 sin. k. — β *hybrida*: paljon järeämpi, lehdet pitkänpuikeita pyöreähköllä kannalla, tylpällä, ehytlaitaisella päällä, järeillä, tylpillä, sahamaisilla nyhähampailla.

Kuivilla, päivänalaisilla, mäkisillä paik. harv. (A. Ke.; β A.)  
*Vähän vaalahtava näslään.*

V. alpina L. *Ḥapin tädbyfe.* — Kukat tähkämäisenä terttuna; perät suojuksia lyhemmät; verholiuskat ripsilaitaisia; terä kellomainen; lehdet vastakkaisia, pitkänpyöreitä t. soikeita; kota vastopuikea, poikkipäinen. — 24 7, 8 sinipunert. k.

Tunt. laiteilla, harv. (L. Lv.) *Tav. sormen korkuinen, siemen-*  
*ten valmistuessa pidempiki; kota leveyttänsä pidempi. Kasvi mus-*  
*tenee kuivaessa.*

V. serpyllifolia L. *Ḥrmon tädbyfe.* — Kukat tähkämäisenä terttuna; verho m. kalju; lehdet puikeita t. soikeita, tylppiä, nyhälaitaisia, kaljuja; kota leveä, 2-kyhmyinen, lovipäinen, verhon pituinen. — 24 5—7 siniviir. k. — β *borealis* Læst.: lehdet pyöreämpiä; kukat melk. selväsiniisiä.

Ahoilla, niit., pient. yl. (E. — L. Lv.; β L.) *Tav. sormen-*  
*korkuinen karvaisilla, pituuttaan levedämmillä kodilla, tyveltä ren-*  
*nolla varrella; kukat vaaleansinisiä mustansinisiä viiruilla.*

V. saxatilis L. fil. *Ḥunturitädbyfe.* — Terttu harvakukkainen; perät suojuksia pidemmät; verholiuskat kaljuja; terä litteä; lehdet pitkulaisia; kota pitkänpuikea, verhoa paljon pidempi. — 24 7 sin. k.

Tunt. harv. (L.) *Tuskin sormen pit., pensastava kasvi isoilla,*  
*koreilla kukilla.* — V. *fruticulosa* Fl. D.

(V. *arvensis, verna*).



SCROPHULARIA L. *Snyfläjuuri*. Flenört.

*Scr. nodosa* L. *Nivel-snyfläjuuri*. — Terä avonainen; verholiuskat puikeita; lehdet herttapuikeita, suippoja, epämukaisesti jurasahaisia, kaljuja; varsi 4-tahkoinen, kalju. — 2 7, 8 rusk. k.

Tuor. paik., vesivierillä, tav. (E. — Pe. Kv.) 2—3 *vaaksan pituinen, isolla kukkaröhyllä, 3-jakoisilla haarukoilla; lehdet leveällä, m. poikkipäisellä kannalla; tympeämäisellä hajulla, pahalla karvaalla maulla.*

Muist. — Juurikeitettä muinen käytettiin rauhaisvikain, riiden, kaulakupuin, peräputkamain ja monen muun vian paranteeksi. Kiitettiin myös hyväksi vanhoissa mätähaavoissa. Norjassa nauttivat sitä teenä kurkkukipeissä, ja väkevällä keittoliemellä pestään rupisia sikoja.

*Scr. vernalis* L. *Sewät-snyfläjuuri*. — Terä sulettu; verholiuskat pitkulaisia; lehdet herttamaisia, toistain jurasahaisia; varsi 4:llä nulokulmalla, ynnä lehtiruotien kanssa höyteä. — 2 6, 7 kelt. k.

Raunioilla, harv. (T.) *Tahmeakarvainen; nuorempana kukkaröhyillä lehtihangoissa, lop. myöskin latvassa.*

2 parvi. — **Antirrhineæ.**LINARIA Mill. *Kannuöruoho*. Flugblomster.

*L. vulgaris* Mill. *Sfo kannuöruoho*. — Kukat tähkämäisessä tertussa, perät nystykarvaisia; verho kalju, kannusta lyhempi; varsi pysty erinäisillä, m. tasasonkilla, kaljuilla lehdillä. — 2 7 kelt. k.

Kuiv. paik. (E. — Pe. Kv. Lv.) 2 *vaaksan pituisella, tav. haarattomalla, kaljulla, sinehtävällä varrella ja lehdillä, tuuman pituisilla kukilla; kannukset paljon periä pidemmät; maku tympeä, karvaanlainen. — Antirrhinum linaria* L.

Muist. — Pöhö- ja keltataudissa vesittävän ja ulostuttavan voimansa vuoksi teenä; ulkonaisesti hauteena peräputkamissa. Tuoreeltaan maidon seassa sanotaan kuolettavan karpäsiä; liaksi nautittuna myrkyllinen ihmisillenki.

*L. minor* Desf. *Bähä kannuöruoho*. — Koko kasvi tahmeakarvainen; kukat lehtihangoissa t. harsuissa, lehtisissä tertuissa: verho kannusta pidempi, perää lyhempi; lehdet suikulaisia, vuorottaisia, aliset vastakkaisia. — (C) 6, 7 vaalean-sinipunerv. k.

Pelt., raunioilla, harv. (A. T. U.) *Sormen, väl. vaaksan pituinen, tav. haarainen. — Antirrhinum minus* L.

VERONICA L. *Ḍättyruoḥo, Ḍädbyfe. Ärenpris.*

† Kukkaterttu t. -tähkä varren latvassa.

*V. longifolia* L. *Pittäleḥti-tädbyfe.* — Yhdellä t. useamalla pitkäveteisellä tähkällä latvassa; lehdet 3, 4 (harv. vaan 2) säteettäin, puikean-suikeita, suippoja, päähän asti sahalaitaisia, erisuurilla t. toissahaisilla hampailla; verholiuskat selvästi eripitkiä, suippoja. — 2 7, 8 sin. k. —  $\beta$  *maritima*: lehdet pyöreällä t. poikkipäisellä kannalla, pitkillä, suipoilla, hyvin erisuurilla hampailla.

Tuoreilla vuorilaiteilla, jokivarsilla;  $\beta$  merenrant. (E. — L. Lv.)  
*Us. kyynärän pituinen*  $\frac{1}{2}$ —1 vaaksan pit. tähkällä,  $\frac{3}{4}$  tuuman leveyisillä lehdillä.

*V. spicata* L. *Ḍäḥfä-tädbyfe.* — Tähkä ed.; lehdet 2 (hyvin harv. 3) vastattain, suikeita — m. puikeita tav. lyhyillä, m. yhtäsuurilla saha-hampailla, päätä kohden ehytlaitaisia; verholiuskat m. tasapitkiä, tylppiä. — 2 6, 7 sin. k. —  $\beta$  *hybrida*: paljon järeämpi, lehdet pitkänpuikeita pyöreähköllä kannalla, tylpällä, ehytlaitaisella päällä, järeillä, tylpillä, sahamaisilla nyhähampailla.

Kuivilla, päivänalaisilla, mäkisillä paik. harv. (A. Ke.;  $\beta$  A.)  
*Vähän vaalahtava näöltään.*

*V. alpina* L. *Ḍapin tädbyfe.* — Kukat tähkämäisenä terttuna; perät suojuksia lyhemmät; verholiuskat ripsilaitaisia; terä kellomainen; lehdet vastakkaisia, pitkänpyöreitä t. soikeita; kota vastopuikea, poikkipäinen. — 2 7, 8 sinipunert. k.

Tunt. laiteilla, harv. (L. Lv.) *Tav. sormen korkuinen, siemen-ten valmistuessa pidempiki; kota leveyttänsä pidempi. Kasvi mustenee kuivaessa.*

*V. serpyllifolia* L. *Ḍrmon tädbyfe.* — Kukat tähkämäisenä terttuna; verho m. kalju; lehdet puikeita t. soikeita, tylppiä, nyhälaitaisia, kaljuja; kota leveä, 2-kyhmyinen, lovipäinen, verhon pituinen. — 2 5—7 siniviir. k. —  $\beta$  *borealis* Læst.: lehdet pyöreämpiä; kukat melk. selväsiniisiä.

Ahoilla, niit., pient. yl. (E. — L. Lv.;  $\beta$  L.) *Tav. sormen-korkuinen karvaisilla, pituuttaan leveämmillä kodilla, tyveltä rennolla varrella; kukat vaaleansinisiä mustansinisillä viiruilla.*

*V. saxatilis* L. fil. *Ḍunturitädbyfe.* — Terttu harvakukkainen; perät suojuksia pidemmät; verholiuskat kaljuja; terä litteä; lehdet pitkulaisia; kota pitkänpuikea, verhoa paljon pidempi. — 2 7 sin. k.

Tunt. harv. (L.) *Tuskin sormen pit., pensastava kasvi isoilla, koreilla kukilla.* — *V. fruticulosa* Fl. D.

(*V. arvensis, verna*).

SCROPHULARIA L. *Snyläjuuri*. Flenört.

*Scr. nodosa* L. *Nimel-snyläjuuri*. — Terä avonainen; verholiuskat puikeita; lehdet herttapuikeita, suippoja, epämukaisesti jurasahaisia, kaljuja; varsi 4-tahkoinen, kalju. — 2½ 7, 8 rusk. k.

Tuor. paik., vesivierillä, tav. (E. — Pe. Kv.) 2—3 vaaksan pituinen, isolla kukkaröhyllä, 3-jakoisilla haarukoilla; lehdet leveällä, m. poikkipäisellä kannalla; tympeämaisella hajulla, pahalla karvaalla maulla.

Muist. — Juurikeitettä muinen käytettiin rauhaisvikain, riiden, kaulakupuin, peräputkamain ja monen muun vian paranteeksi. Kiitettiin myös hyväksi vanhoissa mätähaavoissa. Norjassa nauttivat sitä teenä kurkkukipeissä, ja väkevällä keittoliemellä pestään rupisia sikoja.

*Scr. vernalis* L. *Kewät-snyläjuuri*. — Terä sulettu; verholiuskat pitkulaisia; lehdet herttamaisia, toistain jurasahaisia; varsi 4:llä nulukulmalla, ynnä lehtiruotien kanssa höyteä. — 2½ 6, 7 kelt. k.

Raunioilla, harv. (T.) *Tahmeakarvainen*; nuorempana kukkaröhyillä lehtihangoissa, lop. myöskin latvassa.

2 parvi. — *Antirrhineæ*.LINARIA Mill. *Rannuëruoho*. Flugblomster.

*L. vulgaris* Mill. *Sfo rannuëruoho*. — Kukat tähkämäisessä tertussa, perät nystykarvaisia; verho kalju, kannusta lyhempi; varsi pysty erinäisillä, m. tasasoukilla, kaljuilla lehdillä. — 2½ 7 kelt. k.

Kuiv. paik. (E. — Pe. Kv. Lv.) 2 vaaksan pituisella, tav. haarattomalla, kaljulla, sinehtävällä varrella ja lehdillä, tuuman pituisilla kukilla; kannukset paljon perää pidemmät; maku tympeä, karvaanlainen. — *Antirrhinum linaria* L.

Muist. — Pöhö- ja keltataudissa vesittävän ja ulostuttavan voimansa vuoksi teenä; ulkonaisesti hauteena peräputkamissa. Tuoreeltaan maidon seassa sanotaan kuolettavan karpäsiä; liiaksi nautittuna myrkyllinen ihmisillenki.

*L. minor* Desf. *Bähä rannuëruoho*. — Koko kasvi tahmeakarvainen; kukat lehtihangoissa t. harsuissa, lehtisissä tertuissa; verho kannusta pidempi, perää lyhempi; lehdet suikulaisia, vuorrottaisia, aliset vastakkaisia. — 2½ 6, 7 vaalean-sinipunerv. k.

Pelt., raunioilla, harv. (A. T. U.) *Sormen, väl. vaaksan pituinen, tav. haarainen*. — *Antirrhinum minus* L.

VERONICA L. *Ḍättyruoḥo, Ḍäḍyfe. Ärenpris.*

† Kukaterttu t. -tähkä varren latvassa.

*V. longifolia* L. *Pittäfehti-täḍyfe.* — Yhdellä t. useamalla pitkäveteisellä tähkällä latvassa; lehdet 3, 4 (harv. vaan 2) säteettäin, puikean-sukeita, suippoja, päähän asti sahalaitaisia, erisuurilla t. toissahaisilla hampailla; verholiuskat selvästi eripitkiä, suippoja. — 2½ 7, 8 sin. k. — β *maritima*: lehdet pyöreällä t. poikkipäisellä kannalla, pitkillä, suipoilla, hyvin erisuurilla hampailla.

Tuoreilla vuorilaiteilla, jokivarsilla; β merenrant. (E. — L. Lv.)

*Us. kyynärän pituinen 1½—1 vaaksan pit. tähkällä, ¾ tuuman leveyisillä lehdillä.*

*V. spicata* L. *Ḍäḥfä-täḍyfe.* — Tähkä ed.; lehdet 2 (hyvin harv. 3) vastattain, suikeita — m. puikeita tav. lyhyillä, m. yhtäsuurilla sahalampailla, päätä kohden ehytlaitaisia; verholiuskat m. tasapitkiä, tylppiä. — 2½ 6, 7 sin. k. — β *hybrida*: paljon järeämpi, lehdet pitkänpuikeita pyöreähköllä kannalla, tylpällä, ehytlaitaisella päällä, järeillä, tylpillä, sahamaisilla nyhähampailla.

Kuivilla, päivänalaisilla, mäkisillä paik. harv. (A. Ke.; β A.)

*Vähän vaalahtava näöltään.*

*V. alpina* L. *Ḍapin täḍyfe.* — Kukat tähkämäisenä terttuna; perät suojuksia lyhemmät; verholiuskat ripsilaitaisia; terä kellomainen; lehdet vastakkaisia, pitkänpyöreitä t. soikeita; kota vastopuikea, poikkipäinen. — 2½ 7, 8 sinipunert. k.

Tunt. laiteilla, harv. (L. Lv.) *Tav. sormen korkuinen, siemen-ten valmistuessa pidempiki; kota leveyttänsä pidempi. Kasvi mustenee kuivaessa.*

*V. serpyllifolia* L. *Ḍurvon täḍyfe.* — Kukat tähkämäisenä terttuna; verho m. kalju; lehdet puikeita t. soikeita, tylppiä, nyhälaitaisia, kaljuja; kota leveä, 2-kyhmyinen, lovipäinen, verhon pituinen. — 2½ 5—7 siniviir. k. — β *borealis* Læst.: lehdet pyöreämpiä; kukat melk. selväsiniisiä.

Ahoilla, niit., pient. yl. (E. — L. Lv.; β L.) *Tav. sormen-korkuinen karvaisilla, pituuttaan leveämmillä kodilla, tyveltä rennolla varrella; kukat vaaleansinisiä mustansinisillä viiruilla.*

*V. saxatilis* L. fil. *Ḍunturitäḍyfe.* — Terttu harvakukkainen; perät suojuksia pidemmät; verholiuskat kaljuja; terä litteä; lehdet pitkulaisia; kota pitkänpuikea, verhoa paljon pidempi. — 2½ 7 sin. k.

Tunt. harv. (L.) *Tuskin sormen pit., pensastava kasvi isoilla, koreilla kukilla.* — *V. fruticulosa* Fl. D.

(*V. arvensis, verna*).

†† Kukatertut lehtihankaisia.

*V. officinalis* L. Rõhtotäbyfe. — Varsi rento, lienteä; kukat m. perättömiä tiheissä, tähkämäisissä, pystöisissä tertuissa; lehdet soikeita t. puikeita, sahalaitaisia. — 2½ 5, 6 sin. t. vaalean-sin. k.

Kuiv. mäkisillä ahoilla, tav. (E. — P. Kv.) *Lähes vaaksan korkuisilla pystöhaaroilla, pikkusormen pit. tertuilla.*

Muist. — Yskäteeksi ja myös kivitaudissa avullinen. Ennen vanhaan, kun vielä noitua löytyi, luultiin sen ne poistavan.

*V. chamædrys* L. Rurmitäbyfe. — Varsi koheneva, kahden puolen villakarvainen; kukat pitkäveteisillä perillä harseassa tertussa; verholiuskat suikeita; lehdet m. ruodittomia, puikeita t. hertahtavia, syväsahtaisia, epätasaisia. — 2½ 5, 6 sin. k.

Niit., mets. tav. (E. — Pe. Kv. Lv.) *Väl. parin vaaksan korkuinen, isoilla taivaansinisillä kukilla, valk. heteillä; lehdet alempana väl. lyhytruotisia.*

Muist. — Samalla lääke-avulla kun ed.

*V. beccabunga* L. Djätäbyfe. — Kalju; varsi koheneva; kukat ed. leveän-sukeilla verholiuskoilla; lehdet paksuja, puikeita t. pitkulaisia, tylppiä, loivaan nyhäsahtaisia, ruodikkaita. — 2½ 5—9 sin. k.

Hetepuroissa, ojissa, harv. (A. U. S. Pe.) *Väl. parin vaaksan pit., m. pyöreillä, suipohkoilla lehdillä.*

Muist. — Hyvä keväillä salatiksi; lääkkeenä veren selvittävä, kerpukkaa vasten.

*V. anagallis* L. Ronnan täbyfe. — Varsi pysty; tertut monikukkaisia, siirrottavilla kukkaperillä; lehdet leveän-sukeita, vähän sepokantaisia, harseasti hienosahtaisia; kodat kehrämäisiä, päästä epälovisia. — ☉ 6, 7 sin. t. punerv. k.

Rant., ojissa, harv. (Se.) ½—1 tuuman levyisillä, 2—4:n pituisilla lehdillä; kukkatertut tav. kaksitellen vastattain; kukat vaaleampia k. ed., punertava-viiruisia.

*V. scutellata* L. Rõhtatäbyfe. — Varsi velto; tertut harvakukkaisia, ulospäisillä kukkaperillä; lehdet ruodittomia, m. tassoukkia, ehytlaitaisia t. taaskääntöisillä nyhähampailla; kota pituuttaan leveämpi, syvälovinen päästä. — 2½ 5—7 siniviiruis. k. — β villosa: karvainen.

Vet. paik. tav. (E. — L. Kv.) *Sormenkork. 1—2 linjan levyisillä, 1—2 tuuman pituisilla, väl. m. suikeilla lehdillä; tertut tav. yksitellen, vuorottain lehtihangoissa.*

††† Kukat yksitellen lehtihangoissa.

*V. arvensis* L. Rään täbyfe. — Varsi pysty; perät hyvin

lyhyet suikealla suojuksella; lehdet puikeita poikkipäisellä kannalla, harsusahaisia, ainoastaan alimmaiset lyhytruotisia. — ☉ 5, 6 vaaleansin. k.

Kuiv. paik., pelloilla (A. — K. St. — Kv.) *Tuskin vaaksan korkuinen pienoisilla, verhoa lyhemmillä kukkaterillä; kodat lop. tähkämäisiä.*

V. verna L. *Rewätädye*. — Varsi ja haarat pystöisiä; kukat m. perättömiä suikulaisella suojuksella; lehdet 5- t. 3-liuskaisia, alimmaiset puikeita, liuskattomia. — ☉ 5 sin. k.

Kuiv. paik. tav. (E. — Pe. Kv.) *Lop. 3—6 tuuman pit. ja haarainen; lehdet m. paljaita; varsi ja suojuksset hienokarvaisia; kukat hyvin pieniä, paljon verhoa lyhemmät; kodat ed.*

V. agrestis L. *Peltotädye*. — Vehreä ja karvainen; perät lehtien pituisia t. lyhemmät; verholiuskat tylppäsoikeita, epäsuonisia, päältäpuolen karvaisia; lehdet herttamaisia t. puikeita, sahalaitaisia; kota pyöreähkö syvälovisella päällä. — ☉ 5—9.

Viljelömailla, erittäinki ylävämmillä, harv. (A. — U. St. H. Pe.) *Us. parin vaaksan pit., rento varsi; heteet torven alalaidasta lähteviä; kota harvoilla nystykarvoilla; kukat milloin sinisiä, milloin vaalean-punertavia t. valkeita.*

V. hederifolia L. *Mantädye*. — Rento; perät lehden pituisia; verholiuskat suippoherttaisia; lehdet pyöreäherttaisia 3—5:llä loivalla liuskalla, päätö-liuska iso, ehytlaitainen. — ☉ 5, 6 vaaleansin. k.

Kuiv. pelt. harv. (A. T.) *Vaaksan pit.; tav. 4:llä isolla, maljamaisella siemenellä kodassa.*

### LIMOSELLA L. *Mutaprtti*. Dyört.

L. aquatica L. — 2 7, 8 valk. t. punert. k.

Rant., lätköissä (E. — P. Kv. Lv.) *Lehdet tav. soikeita pitkäveteisillä ruodeilla; kukat tav. yksikertaisella, juuresta lähtevällä perällä.*

### 3 parvi. — *Rhinanthæ*.

#### CASTILLEJA L. fil. *Rastilja*.

C. pallida Kunth. — Kukinto tiheä, lehtinen, tähkämäinen; ylihuuli 2—3:n alahuulen pituinen; verholiuskat torven, väl. koko teränsä pituiset; lehdet vuorottaisia, suikulaisia; suojuksset pitkän-suikeita, vähän pykäläitaisia, lähes kukan pituiset. — 2 7, 8 pun. k.

Tunt. harv. (Lv.) *Us. 2 vaaksan pit.; vaalean-keltaisilla, väl. punervilla suojustehdillä. — Bartsia L.*

### †† Kukatertut lehtihankaisia.

V. officinalis L. Rohtotäbyfe. — Varsi rento, lienteä; kukat m. perättömiä tiheissä, tähkämäisissä, pystöisissä tertuissa; lehdet soikeita t. puikeita, sahalaitaisia. — 2½ 5, 6 sin. t. vaalean-sin. k.

Kuiv. mäkisillä ahoilla, tav. (E. — P. Kv.) *Lähes vaaksan korkuisilla pystöhaaroilla, pikkusormen pit. tertuilla.*

Muist. — Yskäteeaksi ja myös kivitaudissa avullinen. Ennen vanhaan, kun vielä noitua löytyi, luultiin sen ne poistavan.

V. chamædrys L. Nurmitäbyfe. — Varsi koheneva, kahden puolen villakarvainen; kukat pitkävetisillä perillä harseassa tertussa; verholiuskat suikeita; lehdet m. ruodittomia, puikeita t. hertahtavia, syväsahtaisia, epätasaisia. — 2½ 5, 6 sin. k.

Niit., mets. tav. (E. — Pe. Kv. Lv.) *Väl. parin vaaksan korkuinen, isoilla taivaansinisillä kukilla, valk. heteillä; lehdet alempana väl. lyhytruotisia.*

Muist. — Samalla lääke-avulla kun ed.

V. beccabunga L. Djatäbyfe. — Kalju; varsi koheneva; kukat ed. leveän-sukeilla verholiuskoilla; lehdet paksuja, puikeita t. pitkulaisia, tylppiä, loivaan nyhäsahtaisia, ruodikkaita. — 2½ 5—9 sin. k.

Hetepuroissa, ojissa, harv. (A. U. S. Pe.) *Väl. parin vaaksan pit., m. pyöreillä, suipohkoilla lehdillä.*

Muist. — Hyvä keväillä salatiksi; lääkkeenä veren selvittävä, kerpukkia vasten.

V. anagallis L. Ronnan täbyfe. — Varsi pysty; tertut monikukkaisia, siirrottavilla kukkaperillä; lehdet leveän-sukeita, vähän sepokantaisia, harseasti hienosahtaisia; kodat kehrämäisiä, päästää epälovisia. — ☉ 6, 7 sin. t. punerv. k.

Rant., ojissa, harv. (Se.)  $\frac{1}{2}$ —1 tuuman levyisillä, 2—4:n pituisilla lehdillä; kukkatertut tav. kaksitellen vastattain; kukat vaaleampia k. ed., punertava-viiruisia.

V. scutellata L. Suhtatäbyfe. — Varsi velto; tertut harvakukkaisia, ulospäisillä kukkaperillä; lehdet ruodittomia, m. tasanoukkia, ehytlaitaisia t. taaskääntöisillä nyhähampailla; kota pituuttaan leveämpi, syvälovinen päästä. — 2½ 5—7 siniviiruis. k. — β villosa: karvainen.

Vet. paik. tav. (E. — L. Kv.) *Sormenkork. 1—2 linjan levyisillä, 1—2 tuuman pituisilla, väl. m. suikeilla lehdillä; tertut tav. yksitellen, vuorottain lehtihangoissa.*

### ††† Kukat yksitellen lehtihangoissa.

V. arvensis L. Räen täbyfe. — Varsi pysty; perät hyvin

lyhyet suikealla suojuksella; lehdet puikeita poikkipäisellä kannalla, harsusahaisia, ainoastaan alimmaisiet lyhytruotisia. — ☉ 5, 6 vaaleansin. k.

Kuiv. paik., pelloilla (A. — K. St. — Kv.) *Tuskin vaaksan korkuinen pienoisilla, verhoa lyhemmillä kukkaterillä; kodat lop. tähkämäisiä.*

V. verna L. *Remätädye*. — Varsi ja haarat pystöisiä; kukat m. perättömiä suikulaisella suojuksella; lehdet 5- t. 3-liuskaisia, alimmaisiet puikeita, liuskattomia. — ☉ 5 sin. k.

Kuiv. paik. tav. (E. — Pe. Kv.) *Lop. 3—6 tuuman pit. ja haarainen; lehdet m. paljaita; varsi ja suojuksiet hienokarvaisia; kukat hyvin pieniä, paljon verhoa lyhemmät; kodat ed.*

V. agrestis L. *Peltotädye*. — Vehreä ja karvainen; perät lehtien pituisia t. lyhemmät; verholiuskat tylppäsoikeita, epäsuonisia, päältäpuolen karvaisia; lehdet herttamaisia t. puikeita, sahalaitaisia; kota pyöreäkö syvälovisella päällä. — ☉ 5—9.

Viljelömailla, erittäinki ylävämmillä, harv. (A. — U. St. H. Pe.) *Us. parin vaaksan pit., rento varsi; heteet torven alalaidasta lähteviä; kota harvoilla nystykarvoilla; kukat milloin sinisiä, milloin vaalean-punertavia t. valkeita.*

V. hederifolia L. *Mantädye*. — Rento; perät lehden pituisia; verholiuskat suippoherttaisia; lehdet pyöreäherttaisia 3—5:llä loivalla liuskalla, päätö-liuska iso, ehytlaitainen. — ☉ 5, 6 vaaleansin. k.

Kuiv. pelt. harv. (A. T.) *Vaaksan pit.; tav. 4:llä isolla, maljamaisella siemenellä kodassa.*

### LIMOSELLA L. *Mutaprtti*. Dyört.

L. aquatica L. — 2 7, 8 valk. t. punert. k.

Rant., lätköissä (E. — P. Kv. Lv.) *Lehdet tav. soikeita pitkäveteisillä ruodeilla; kukat tav. yksikertaisella, juuresta lähtevällä perällä.*

### 3 parvi. — *Rhinantheæ*.

#### CASTILLEJA L. fil. *Rastilja*.

C. pallida Kunth. — Kukinto tiheä, lehtinen, tähkämäinen; ylihuuli 2—3:n alahuulen pituinen; verholiuskat torven, väl. koko teränsi pituiset; lehdet vuorottaisia, suikulaisia; suojuksiet pitkän-sukeita, vähän pykälaitaisia, lähes kukan pituiset. — 2 7, 8 pun. k.

Tunt. harv. (Lv.) *Us. 2 vaaksan pit.; vaalean-keltaisilla, väl. punervilla suojuslehdillä. — Bartsia L.*



## BARTSIA L. Punaiffo.

*B. alpina* L. — Lehdet puikeita, tylppäsahaisia; kukat ylimmäisissä lehtihangoissa. — 2 6, 7 punasinerv. k.

Soissa, etenki tunt. (P. L. Lv.) *Parin vaaksan pit. haaratomalla, kuivaessa mustuvalla varrella, puolen tuuman levyisillä lehdillä.*

## ODONTITES Hall. Sänfiö. Rödkulla.

*O. rubra* Pers. — Lehdet suikulaisia t. tasasoukkia, yliset vuorottaisia suojuksina; kukat yhdäppäisessä tertussa, suojusten pituisia t. lyhempiä. — ☉ 7, 8 pun. k. —  $\beta$  simplex: varsi haaraton; lehdet möyheähköitä; yliset kukat suojuksia pidemmät.

Pelt.;  $\beta$  merenrant. (A. — K. St. — Kp.;  $\beta$  E. — P.) *Vaaksan pit.* — *Euphrasia odontites* L. *Bartsia odont.* Sm. —  $\beta$  *O. littoralis* Fr., *H. M. F. O. verna* Drej.

## EUPHRASIA L. Silmäruoho. Ögontröst.

*E. officinalis* L. — Varsi haaraton t. siirottavilla haaroilla; lehdet puikeita, sahalaitaisia; kota lanttopäinen. — ☉ 6—8. —  $\beta$  parviflora: tav. haarova, pienemmillä kukilla, otasahaisilla lehdillä.

Ahoilla, niittutöyr. tav. (E. — L. Lv.) *Tav. syrjäkämmenen pituinen; kukat sinertäviä t. vaalahtavia keltaisella niehulla. Kasvaa lihavissa paikoissa isoksi ja lehdet levedämmiksi.*

Muist. — Puserrettua mehua käytettiin ennen moninaisten silmävikain paranteeksi. Myös nautittiin sitä sisällisestiki viinissä liotettuna lääkeviinana, t. vedessä teenä ei ainoasti silmäkipeisiin, vaan keltatautiinki. Maku sillä on vähän kitkerä, jumova.

## RHINANTHUS L. Rauffu. Penninggräs.

*Rh. major* Ehrh. Retolauffu. — Suojukset vaaleankeltaisia (ei vehreitä), ylimmäiset syväсахaisia äimämäisillä hampailla: terän ylihuulen etuhampaat erivärisiä, puikeita; torvi kaarehtavasti ylöspäin käyrä. — ☉ 6, 7 kelt. k.

Niit. ja kedoilla, yl. (E. — L. Lv.) *Parin vaaksan pit.; lehdet pitkänsuikeita t. tasasoukkia, sahalaitaisia, ruodittomia.* — *Rh. crista-galli*  $\beta$  L. *Alectorolophus* Hall.

*Rh. minor* Ehrh. Rrolauffu. — Suojukset vehreitä, terävä-sahaisia; terähuulen hampaat puikeita; torvi suora. — ☉ 6, 7 kelt. k.

Aroniit. tav. (E. — L. Lv.) *Pienempi edellistä ja tummempi väriltään.* — *Rh. crista-galli*  $\alpha$  L. *Alectorolophus* Hall.

SCEPTRUM Rudb. *•Baltiffa. Kungsspira.*

*Sc. carolinum* Rudb. — Kukat 3—4 kiehkuroittain yhteisenä, välikköisenä tähkänä; lehdet parihalkoisia, tylppiä, pykäja nyhälaitaisilla liuskoilla; varsi haaraton, m. lehdetön. — 2 7, 8.

Soissa, vet. niit. (U. H. S. K. Pe. — L. Lv.)  $\frac{1}{2}$ —1 *kyynärän pituinen*; *kukat päälle tuuman pituisia, vaaleankeltaisia, punapäisillä huulilla; pikkusormen paksuisella varrella, syrjäkämmenen pituisilla aluslehdillä, kolmittaisilla ehytlaitaisilla kiehkura-suojuksilla.* — *Pedicularis sceptrum-carolinum* L.

Muist. — Paikoin käyttävät survotuita siemeniä hammas-taudin hauteeksi.

PEDICULARIS L. *Ruujiio. Kallgräs.*

† Terän ylihuuli poikkipäinen t. 2-liuskainen.

*P. palustris* L. *Suofuufio.* — Ylihuuli alahuulen pituinen, poikkipäinen, kahdella suipolla liuskalla; lehdet parijakoisia; varsi haaraton t. latvaan asti haarova. — 2 6, 7 pun., harvoin valk. k.

Vet. niit. tav. (E. — L. Lv.) *1-2 vaaksan pit., pystyllä varrella ja haaroilla; ylihuuli vähän tummempi muuta kukkaa.*

Muist. — Tukehuttaa muut kasvit ympärillään ja syytetään heinän seassa saattavan tautia elukoille, verivirtsan sarviraa-ville, vesipöhön lampaille.

*P. lapponica* L. *Säpin fuufio.* — Ylihuuli alahuulen pituinen ja eteenpäin soukistunut pitkäksi, kaksiliuskaiseksi nokaksi; lehdet parihalkoisia, liuskat lehtilavan pituisia; varsi haaraton lyhyellä tähkällä m. ulospäisillä kukilla. — 2 7, 8 kelt. k.

Tunturilait. (L. Lv.) *Vaaksan pit., väl. 2-3:lla varrella samasta juuresta.*

*P. sudetica* L. *Tunturifuufio.* — Ylihuuli tylppä, lovipäinen, 2-hampainen; lehdet syvään parihalkoisia soukilla, epä-mukaisesti hampaisilla liuskoilla; varsi haaraton. — 2 7, 8 pun. k.

Tunturiseut. harv. (Lv.) *Syrjäkämmenen pit., 1-1½ tuum. pituisella, tiheällä tähkällä; 3-liuskaisella, ylihuulta lyhemmällä alahuulella, sivuliuskat hampaallisia.*

†† Terän ylihuuli kokonainen.

*P. verticillata* L. *Ristifuufio.* — Terän ylihuuli tylppäpäinen; lehdet parihalkoisia, 4-säteisiä pitkulaisilla, tylppähampaisilla liuskoilla; varsi haaraton. — 2 7, 8 pun. k.

Tunturiseut. (Lv.) *Vaaksan pit., väl. useammalla varrella juuresta, viisihampaisella höyteisellä verholla, tiheällä tähkämyk-  
röllä latvassa.*

*P. flammea* L. *Stufufuufio*. — Kukat pystöisiä tiheässä tähkässä; verho 5-liuskainen, kalju; ylihuuli suora, tylppäpäinen, koko emin sulkeva; lehdet perijakoisia vähän taaspäisillä liuskoilla. — 2 7.

Kork. tunt. harv. (L.) *Sormenkorkuinen*; kukat ruskeankellervia mustanpunaisella ylihuulella.

*P. hirsuta* L. *Sumifuufio*. — Kukat k. ed.; verho 5-hampainen ohuella, valkealla villalla; ylihuuli pitkäveteinen, edeskäyräkö, tylppä; lehdet parihalkoisia leveämmällä lavalla, lyhyillä, vähän edeskääntöisillä liuskoilla. — 2 6, 7 pun. k.

Kork. tunt. harv. (L. Lv.)  $\frac{1}{2}$ —1 vaaksan pit., tav. useammalla varrella, litteillä ruodeilla; koko kasvi ylempänä valkeahöyteen; lehtiliuskat ei taaskääntöisiä.

### MELAMPYRUM L. *Maitiffa*. Kohvete.

*M. cristatum* L. *Retomaitiffa*. — Kukat nelikulmaisessa, tiheässä, leveän-keilamaisessa tähkässä, herttamaisilla, vastalaskuisilla, liuskahampaisilla suojuksilla. — ☉ 7.

Niittutöyr. harv. (A. T.) *Tuskin parin vaaksan pit.*; *tasa-soukilla, ehytlaitaisilla lehdillä; suojukset ruosteenpunaisia; kukat punaisia, keltasuisia.*

*M. arvense* L. *Peltomaitiffa*. — Kukat pitkulaisessa, ei erittäin tiheässä tähkässä; suojukset suikeita, pariliuskaisia; verhot karheamaisia. — ☉ 7.

Pelt. ja peltoniit. harv. (T.) *Parin vaaksan pit., haaraisella varrella, suikeilla eheillä lehdillä, nisunjyvän muotoisilla siemenillä; kukat ja suojukset punaisia valkealla keskirenkaalla ja keltaisella pilkulla alahuulen kannassa.*

*M. nemorosum* L. *Lehtomaitiffa*. — Kukat harseana tähkänä; suojukset herttamaisia, suippoja, suippohampaisia; verhot valkeavillaisia. — ☉ 6, 7.

Leht. niittumets. (A. — K. Kp. Kv.) *Väl. jalan korkuinen lehtihankaisilla, yhdäppäisillä kukilla, punasinertävillä, harv. valkeilla suojuksilla, ruskeankellervillä kukilla.*

Muist. — Lehmät tästä ruohosta lypsävät runsaasti väkevää maitoa.

*M. pratense* L. *Niittumaitiffa*. — Kukat ylemmissä lehtihangoissa yksitellen ja yhdäppäisiä; terä suoraan ulottavalla alahuulella sulettu, kolmea pidempi kun kalju verho. — ☉ 7, 8 vaaleankelt. k.

Metsäniit. tav. (E. — L. Lv.) *Parin vaaksan kork., yleensä vehreä paitsi kukat; suojuslehdet kannalta 2—3:lla hampaalla; terän valkea torvi kuin kukatki  $\frac{1}{2}$  tuuman pituisia.*

Muist. — Yhtä hyvä maidon lisäävä ruoho k. ed.

*M. sylvaticum* L. Salomattiffa. — Kukkat ed.; terä ei erittäin pidempi kaljua verhoa, avosuinen, alaspäisellä alahuulella. — ☉ 7, 8 ruskeankellerv. k.

Metsäniit. tav. (E. — L. Lv.) *Parin vaaksainen*; 2—3 linjan levyisillä lehdillä; kukat puolta pienemmät k. ed., noin 3 linj. pit.

#### 4 parvi. — **Orobanchæ.**

LATHRÆA L. Suomuffa. Fjällrot.

*L. squamaria* L. — Varsi haaraton; kukat yhdäppäisessä, nuokahtavassa tertussa; alahuuli 3-liuskainen. — 24 4, 5 tummanpun. k.

Varj. kalliojuur. harv. (A.) *Väl. vaaksan pit.*; koko maanpäällinen kasvi vaaleanpunainen, lehdetön, suomukas; maan-alainen osa valkea, haarakas, paksuilla tahkulaisilla suomuilla peitetty.

Muist. — Käytettiin muinen hauteeksi loukkauksille ja sisällisesti verijuoksuin asettamiseksi.

### 32 heimo. — UTRICULARIACEÆ. Vesiherneisiä.

UTRICULARIA L. Vesiherne. Blåsört.

*U. vulgaris* L. Njo vesitherne. — Lehdet parijakoisia hapsimaisilla, rakollisilla liuskoilla; terän ylihuuli tuskin pidempi kun alahuulen lakkimaisesti pullea kanta; kannus keilamainen, siirrotava. — 24 7, 8 ruskeankellerv. k.

Vesi-ojissa j. n. e. (E. — P. Kv.) *Us. parin vaaksan pit.*; varsi maksan värinen, tav. 6:lla lähes tuumanlevyisillä kukilla, hampunsiemenen kokoisilla, vedenalaisilla rakoilla lehdissä, herneen kokoisilla kodilla; ponnet yhtyneitä.

*U. intermedia* Hayn. Reffi vesitherne. — Lehdet 3-jakoisia toishaarukkaisilla, 1-suonisilla, tasasoukilla, sukalaitaisilla liuskoilla; rakot erityisissä, lehdettömissä haaroissa; terän ylihuuli m. kahta pidempi kun alahuulen kanta; kannus äimämäinen, myötäinen. — 24 7, 8 vaaleankelt. k.

Ves. soilla, tav. (E. — L. Lv.) *Puoltaan pienempi edellistä*, tav. 4-kukkainen, nauriin siemenen kokoisilla rakoilla, pienen herneen kokoisella kodalla.

*U. minor* L. Wähä vesitherne. — Lehdet k. ed. hapsimaisilla, suonettomilla, kaljuilla liuskoilla; kannus sangen lyhyt, tylppä; alahuuli pitkänpyöreä, taaskääntöisellä laidalla. — 24 7 vaaleankelt. k.

Vesi-øjissa (E. — P. L. Kv.) *Sormenkorkuinen* pienoisilla lehtirakoilla ja kodilla, parin linjan levyisillä kukilla.

PINGUICULA L. Jöfönlehti. Tätört.

*P. vulgaris* L. Samallinen jöfönlehti. — Kannus m. tasa-paksu, äimämäinen, suora, m. terän pituinen; teräliuskat erisuuria, eheitä, pyöreähköitä; lehdet soikeita. — 4 5—7 sin. k.

Tuor. paik. (A. Kp. Kv. P. L. Lv.) *Sormenkorkuinen*; varsi hyvin hienokarvainen.

Muist. — Lehdet lypsyhaalean maidon sekaan pantuna muuttavat sen muutamain päivän perästä venyökkäpiimäksi, josta sitte yksi lusikallinen on kyliksi sitkistämään muunki maidon samanlaiseksi. Sillä tavoin taidetaan venyökkäpiimää halki vuoden pitää. Keitetty ja kuorittu maito sanotaan yökönlehdellä saatavan kauvemmin pilaumattomaksi.

Lehtimehua käytetään voiteeksi lehmäin nisähaavoille, taikka liotetaan lehtiä sitä varten liinöljyssä. Lasten päistä sanotaan saman voiteen tahi lehtikeitteen täit karkottavan, ja hiukset keltaavan.

Tämä kasvi osottaa kylmää kohtaa maasta.

*P. alpina* L. Balfea jöfönlehti. — Kannus keilamainen, edespäin käyrä, terää lyhempi; vana kalju. — 4 6, 7 valk. k.

Kost. tunturipaik. (Kv. P. L. Lv.) *Sormenkorkuinen* 1—2:lla keltaisella paikulla kukan alahuulessa. — *P. flavescens* Flörke.

Muist. — Yksi voima k. ed.

*P. villosa* L. Höyteä jöfönlehti. — Kannus suora, äimämäinen, vanan koukistuksen vuoksi lähellä kukkaa taaspäinen; vana höyteä; lehdet pyöreähköitä. — 4 7, sin. k.

Tunturisent. harv. (L. Lv.) Paljon pienempi edellisiä, ei kun 1 1/2 tuuman korkuinen, 3 linjan kokoisilla ontevilla lehdillä, viiruisella litteäköllä terällä.

33 heimo. — PRIMULACEÆ. Esikköisiä.

1 parvi. — Roteæ.

LYSIMACHIA L. Alpi. Lysing.

*L. vulgaris* L. Stanta-alpi. — Varsi pystöinen latvaisella kukkaröhyhällä tahi tertulla; lehdet suikeita, 2—4 säteettäin. — 4 7, 8 kelt. k.

Rant. tav. (E. — L. Lv.) *Kyynärän pit.*, tav. useampi-kukaisilla perillä latvassa ja ylemmissä lehtihangoissa.

Muist. — Keltapaineeksi avullinen.

*L. nummularia* L. Ruhta-aspi. — Varsi suikertava, kalju, yksinäisillä kukilla lehtihangoissa; verholiuskat m. herttamaisia; lehdet vastakkaisia, pyöreäkköitä. — 2½ 7 kelt. k.

Luhtaisilla rantaniit. harv. (T. K.) *Parin vaaksan pit., 4-kulmaisella varrella, vähän suippopäisillä lehdillä, litteäkköillä, iso- maisilla kukilla, lehdenpituisilla perillä.*

#### NAUMBURGIA Mönch. Sejia-aspi.

*N. thyrsoflora* Reich. — Varsi pysty; kukat peräkkäitä tiheässä, liereässä tertussa suikeitten lehtien hangoissa. — 2½ 7 kelt. k.

Vedessä (E. — L. Lv.) *2-vaaksainen, vastakkaisilla kukkatertuilla keskikohdalla vartta; lehdet kannalta leveimpiä; verho- ja teräliuskat emä ja heteitä pidemmät. — Lysimachia* L.

#### TRIENTALIS L. Metjätähti. Dufkulla.

*Tr. europæa* L. — Lehdet pitkän-suikeita. — 2½ 5, 6 valk. k.

Mets. katajikoissa, yl. (E. — L. Lv.) *Sormenkorkuinen; varsi 1—2-kukkainen; lehdet alempana puuttuvia tahi pieniä, vuorottaisia, ylimmät säteettäin.*

#### GLAUX L. Ranniffi. Strandling.

*Gl. maritima* L. — Varsi pysty; lehdet puikeita tahi pitkulaisia, vastakkaisia; kukat perättömiä lehtien hangoissa. — 2½ 7, 8 pun. k.

Merenrant. tav. (A. — Ke. — P. Kv. Lv.) *Sormenkorkuinen, kellomaisilla kukilla keskikohdasta latvaan asti.*

#### SAMOLUS L. Punfa.

*S. Valerandi* L. — Varsi pysty kukkatertuilla latvassa; perät suojuksella keskikohdassaan; lehdet lapiomaisia. — 7, 8 valk. k.

Merenrant. harv. (A. U.) *1—2 vaaksan pit., ylensä kalju, mehevähkö, ½ tuuman levyisillä lehdillä; kukat pienoisia, alempana lehtihangoissa.*

#### 2 parvi. — *Preciæ.*

#### PRIMULA L. Giffö. Vifva.

*Pr. veris* L. Rämä-efiffö. — Kukkasarja pitkäveteisellä vanalla; terä laajenevalla nielulla, laide syvään onteva; verholiuskat suippopuikeita; lehdet puikeita, soukkajohteisia, epämuikaisesti nyhälaitaisia, kurttuaisia, lieminkäisiä, alta vaaleampia. — 2½ 5, 6 kauniin kelt. k.

Niit., laks. harv. (A. — K. St. Pe. P.) *Vaaksan pit.*, *hyvähajuisilla kukilla ja anikselle hajahtavalla juurakolla; lehdet tuuman levyisiä; verho päälle 1/2 tuuman pituinen.* — *Pr. officinalis Jacq., H. M. F.*

Muist. — Kukat viinan rohdoksi hyviä. Myös kiitetään niistä sokurin ja sitruunan kanssa vedessä käyttämällä maukasta viiniä saatavan, juuri parantaa juomisen mauelleen; lehdet keväällä kelpaavat salatiksi.

*Pr. farinosa L.* Pönerwa esiffö. — Sarja monikukkainen; terä suppeanieluinen; verho pitkulainen tasasoukilla, tylpillä, m. torvenpituuisilla hampailla; teräliuskat leveitä, vastoherttaisia; lehdet vastopuikeita — kieloisia, kaljuja, alta samoin kuin verholiuskatki tav. valkea-jauhoisia. — 2 5, 6 punasinert. k.

Alankoniit. harv. (A. T. P.) *Vaaksan pit., pienemmillä lehdillä ja verhoilla k. ed.*

*Pr. stricta Horn.* Einervä esiffö. — Sarja monikukkainen; verho m. munanmoinen, kupuva, soikeilla liuskoilla, lyhemmät terän suppeanieluista torvea; lehdet pitkulaisia, hienohampaisia, lyhytruotisia, m. jauhottomia kuin verholiuskatki; teräliuskat nalkkimaisesti vastoherttaisia, kolmesti torvea lyhemmät. — 2 6, 7 sinikiuht. k. — *β glabrescens F. Nyl.*: lehdet pidempiruotisia; verhon hampaat leveämpiä.

Tuor. tuuturitien. niit. (P. L. Lv.; *β* Lv.) *Varsi tav. pidempi ja kiiltävästi tumman vehred, mutta harvemmillä ja pienemmillä kukilla, soukemmilla teräliuskoilla ja lyhemmällä verholla k. ed.* — *Pr. farinosa β Wg.*

*Pr. sibirica Jacq.* Pohjan esiffö. — Sarja 1—3-kukkainen; verho m. samanpituinen kuin terän suppeanieluinen torvi; lehdet puikeita — soikeita, ehytlaitaisia, kaljuja pitkäveteisellä, soukalla ruodilla. — 2 7, 8 sinikiuht. k.

Rantaniit. harv. (Kv. Pe. P. L. Lv.) *Sormenkorkuinen; kukat isompia, kun 2:lla edellisellä lajilla (1/2 tuuman levyisiä), harv. 3:a useammat.* — *Pr. finmarkica H. M. F. Pr. integrifol. Gunn. Pr. norvegica Retz.*


## ANDROSACE L. Ruffi. Hillsko.

*A. septentrionalis L.* — Verho kalju, kulmikas, ei varsin terän pituinen; sarjavarukset periä lyhemmät; lehdet suikeita, hienohampaisia, m. kaljuja; varsi lieminkäinen. — 2 5, 6 valk. k.

Yläisillä hietamailla, harv. (Ke. P. Lv.) *1/2—1-vaaksainen; aluslehtiruusuksu tuuman levyinen tahi runsaammin, 1- tahi useampi-vartinen; sarjan eriperät lähes tuuman pituisia.*

## 34 heimo. — PLANTAGINACEÆ. Ratamokasveja.

## PLANTAGO L. Ratamo. Grodblad.

Pl. major L. Tie-ratamo. — Tähkä tihukukkainen, liereä; kodat monisiemenisiä; lehdet puikeamaisia, hammaslaitaisia, kaljuja t. epälieminkäisiä, ruodikkaita, tav. 7-suonisia; vana liereä, epäjuomuinen. — 2  7, 8.

Teillä, pelt., rant. tav. (E. — L. Lv.) 1 tuuman mutta väl. 2 ja 3:n vaaksanki korkuinen, pitkällä tasapaksulla tähkällä, ruskeilla ponsilla, lehdettömällä vanalla.

Muist. — Lehdet avullisia haavain paranteeksi ulkonaisesti, sisällisesti keitteenä verijuoksuin, ulko- ja punataudin asettamiseksi, kurkun huuhteeksi, siemenet vatsanvähvisteeksi, juuri hammastaudin lääkkeeksi.

Pl. media L. Turmiratamo. — Tähkä pitkulainen, lop. liereä, hyvin tihukukkainen; kodat 2—4-siemenisiä; lehdet puikeita, höykeitä, tav. 5-suonisia, ruodittomia; vana ed. — 2 6, 7.

Maaniit. harv. (A. — K. St. — Kv.) Vana monin kerroin lehtiä pidempi; tähkä runsaan tuuman pituinen, pikkusormen paksuinen, vaaleanpunainen, hyönnhajuinen; ponnet m. valkeita vaalean-punaisilla palhoilla.

Muist. — Käyt. k. ed. Juurikeitteellä sanotaan kevät-horkkia (vilutauteja) ja muitaki kuumetauteja parannetuksi.

Pl. lanceolata L. Suifea ratamo. — Tähkä pallo- tahi munanmoinen; kodat 2-siemenisiä; lehdet suikeita, harseasti nyhähampaisia, suippoja, ruodikkaita; vana kulmikas, juovainen. — 2 5—7.

Kuiv. paik. (A. — K. St. H. S. Kv.) Lyhyillä, harmaan-punertavilla tähkillä, m. valkeilla ponsilla.

Muist. — Edellisten laatuinen voimaltaan. Siemenistä saadaan hyvää jälää, jota sekoitetaan silmärohtoihin ja muihin sisäänotto-lääkkeisiin vatsureissa, kusetinvioissa, kuin myös kurkkuhuhteisiin.

Pl. maritima L. Meriratamo. — Tähkä pitkä, liereä kaljuilla, verhonpituisilla suojuksilla; kodat tav. 2-siemenisiä; lehdet möykeitä, tasasoukkia, kaljuja, kourumaisia; vana liereä. — 2 7.

Merenrant. tav. (A. — U. — P. L. Kv. Lv.) Kellertävällä tähkällä; lehdet rihmasoukkia — kynänpaksuisia, 1—5-suonisia, kannalta tav. villaisia; ponnet keltaisia.

Muist. — Kaaliruuksi keväillä sopiva.

## LITTORELLA L. Raani. Strandpryl.

L. lacustris L. — Kukat erineuvoisia; lehdet pystyjä, lie-



reitä, äimämäisiä, ynnä 1-kukkaisten peräin kanssa juuresta lähteviä. — 24 6—8.

Järvien ja jokien hietarannoilla osiksi vedessä, harv. (T. H.) *Pikkusormen pituisilla lehdillä; hedekukka 1—2 tuuman pituisella perällä ja sen ympärillä tav. 3 perätöntä emikukkaa samassa lehti-hangassa; ponnet keltaisia; lehdet Lahnaruohon näköisiä, vaan eivät ole 4-pillisiä sisältä.*

### 35 heimo. — PLUMBAGINACEÆ.

#### ARMERIA Willd. Ruohoneiliffä. Trift.

*A. elongata* Koch. Murmineiliffä. — Vana kalju; lehdet tasakaitaisia, heinämäisiä, tav. ripsilaitaisia, tylpäköitä; kehdon ulkomaiset suomut leveän-puikeita, vehreäselkäisiä, otapäisiä. — 24 6, 7 valkeanpun. k.

Rantamaisilla, kuiv. niit. harv. (T. U.) *Väl. parin-vaaksainen; lehdet rihmamaisia, 1-suonisia; kehdestä juoksee vanan ympäri alaspäin lyhyt, erivärinen tuppikääre. — A. vulgaris* Willd. *Statice armeria* L.

*A. arctica* Wallr. Rapin neiliffä. — Lehdet kaljuja, rihmamaisia, suippoja; kehtsuomut pyöreän-soikeita t. puikeita, tylp-päpäisiä, vaaleanruskeita; muuten k. ed. — 24 7.

Merenrantamailla, harv. (Lv.) Tuskin edellisestä eroava. — *A. vulgaris-arctica* Cham. *Statice armeria* β *arctica* Ledeb.

### 36 heimo. — CORNACEÆ. Kanukkaisia.

#### CORNUS L. Ranuffa. Kornell.

*C. sanguinea* L. Pensaskanuffa. — Suora- ja kaljuhaarainen pensaskasvi; kukat varuksettomia litteissä, huiskilomaisissa viuhkoissa; lehdet puikeita, molemmin puolin vehreitä. — 24 6, 7 valk. k.

Leht. harv. (A.) *Parin kyynärän kork., punertavalla kuorella haaroissa, mustansinisillä luu-marjoilla.*

Muist. — Puu-aine kovaa ja kaunista, pieniin nikkaruksiin hyvin otollinen. Kasvia sopii viljellä pensas-aidoiksi.

*C. suecica* L. Ruohokanuffa. — Ruohokasvi; kukkasarjake paljon lyhempi kun sen 4, puikeata, suippoa, valkeata varuslehteä; lehdet ruodittomia, puikeita, suonikkaita. — 24 6, 7.

Kost. paik., rant. (E. — L. Lv.) *Vaaksan pit., yksinäisellä varrella, ylemmyyttään isommilla lehdillä, pienillä, yhdyskukkasiensa tapaisilla, mustanpunaisilla sarjakukilla, 1/2 tuuman pituisilla, val-*

keilla terämaisilla varuslehdillä, punaisilla puolamaisilla marjoilla ryhmäkkeessä.

Muist. — Marjat äiteliä. Muutamat sekoittavat lehtiä tupakkiin.

### 37 heimo. — UMBELLIFERÆ. Sarjakasveja.

#### 1 parvi. — Campylosperma.

##### CONIUM L. Ratto. Odört.

*C. maculatum* L. — Lehdet kolmesti pariosaisia; sarjukain varuslehdykät puikean-sukeita, sarjukkaa lyhemmät. — 7 valk. k.

Kuiv. paik., pelt. (A. — Ke. St.)  $1\frac{1}{2}$ –2-kyynäräinen, huu-  
maavalla hajulla, ruosteenpilkkuisella varrella.

Muist. — Kiitetään avulliseksi rauhauskovettumissa, pa-  
hoissa haavoissa, vetotaudeissa keittosakona, jauhoina, laastarina  
j. n. e. On myrkyllinen ja sentähden taitamattoman kartettava.

##### MYRRHIS Scop. Safranfirveli. Kyrfvel.

*M. odorata* Scop. — Yleensä pehmytkarvainen; lehdet kol-  
mesti pariosaisia, päätöliuskat sahalaitaisia. — 4 6–8 valk. k.

Vilj. harv. (A. T. U. H.) 1–2-kyynäräinen, väkevänhajui-  
silla lehdillä, liereällä, aniksen makuisella varrella, tuuman pitui-  
silla, lop. mustilla kaksoisjyvillä. — *Scandix* L.

Muist. — Juurella ja ruoholla maustetaan ruokia. Myös  
ovat ne lievittäviä, rintataudeissa ja tupakan seassa ahdashenki-  
sille hyödyllisiä. Lehmille lisää tämä ruoho maitoa. Paikoin sitä  
käytetään keltapaineksi.

##### CHÆROPHYLLUM L. Metjäfirveli. Vildkyrfvel.

*Ch. Prescottii* DC. — Varsi alempata vastakarvainen,  
ylempätä m. kalju, juomuinen, nivelten alla tursea; lehdet kol-  
mesti pariosaisia tasasoukilla, suikeilla, pykälaitaisilla liuskoilla;  
vartalot m. pystöisiä; hedelmät liereitä. — 4 6, 7 valk. k.

Niit., vilj. harv. (Kv. P. L. Lv.) Sarjukkavarukset puikean-  
sukeita, otapäisiä, kaljuja; varsikko pienellä juurimukulalla. — *Ch.*  
*bulbosum* Nyl.

##### ANTHRISCUS Pers. Roiranputti. Hundfloka.

*A. sylvestris* Hoffm. — Varsi juovikas, alempata lienteä,  
ylempätä kalju, peräkkäillä sarjoilla latvassa; lehdet kahdesti—  
kolmesti pariosaisia; lehdykät ulospäisillä ruodeilla ja parihal-  
koisilla, pykälaitaisilla liuskoilla. — 4 6, 7 valk. k.

Vilj., leht. tav. (E. — L. Lv.) 1—1½-*kyynäräinen*; *jyvä-puolikkaat kiiltäviä*. — *Cerefolium Bess., Hn. Chærophyllum L.*

Muist. — Keitesakoa on hyvällä onnella käytetty vanhain pahatautisten ja riisivikain paranteeksi, erittäinkin nälkäpiteen kanssa. Kukat ennen puhkeamista otettuna painavat alunoidun vaateen keltaiseksi.

## 2 parvi. — *Orthospermæ.*

### LASERPITIUM L. Rarnašruoho.

*L. latifolium L.* — Yleensä kaljuhko, isolla sarjalla ja m. hapsimaisilla varuksilla; lehdykät vinoherttaisia, tylppiä, suip-posahaisia, harv. pykälaitaisia; jyväpuolikasten harjut siivikkäitä, kiheriä. — 2½ 7, 8 valk. k.

Metsäniit., laks. harv. (A.) *Parin kyynäräinen, sinehtävä; lehdykät tuuman, sarjat lähes vaaksan levyisiä.*

Muist. — Vatsanvähvistava juuri avullinen horkissa ja muissa vioissa, varsinkin eläinten taudeissa.

### HERACLEUM L. Ukonputki. Björnfloka.

*H. sibiricum L.* — Kalsea; sarjan laitakukat ei erittäin muita isommat; lehdet 2—3-parisia; lehdykät parijakoisia t. syvään-pykeisiä soikeilla t. tasasoukilla, jurasahaisilla, hampaisilla, tahi m. kokonaisilla liuskoilla. — ½ 7, 8 vehreän- t. vaalean-kel- lerv. k.

Niit., tievars. (E. — Pe. Kv. Lv.) *Isompia sarjakasveja; terälehdet tav. vastoherttaisia; lehtiliuskat us. tuumaa leveämmät; varsi juovikas tahi särmikäs, sormea paksumpi; sarjat kämmenen levyisiä.* — *H. sphondylium L. Fl. Sv.*

Muist. — Käytetään paikoin punatautia vasten. Puolassa laidetaan siemenistä ja lehdistä jästin kanssa juomista. Kamsiat-kassa syödään varsi kuorittuna, paloitettuna ja kuivattuna. Venäjällä paikoin varresta poltetaan viinaa. Varren päälimmäinen kuorihitu on väkevä, että nostaa rakkojaki, jos pidetään iholla.

### PASTINACA L. Pasternaŭa. Palsternakka.

*P. sativa L.* — Lehdet pariosaisia, tav. 4-parisia; lehdykät puikeita, pykä-sahaisia, väl. liuskaisia. — ½ 7, 8 kelt. k.

Ryrtimaiden vaiheilla, harv. (A. — Ke. H.) *Viljeltyä met-sistynyt.*

Muist. — Hedelmäin sanotaan parantaneen helpompia horkkia tiimaa ennen tuloaikaa viinan seassa nautittuna. Juuri on ruokava, jota sentähden pannaanki keittoihin. Myös taitaan siitä keit-

tämällä, käyttämällä ja humaloittamalla juomista saada. Ulko-  
mailla viljellään pasternakkaa syvään kynnetyillä, lihavilla mul-  
taisilla kesantopelloilla hyvin tehoisaksi karjanruuaksi.

### ANGELICA L. Putti. Angelika.

† Jyväpuolikasten kuori lop. irtautuva siemenestä: *Archangelica* Hoffm.

A. *archangelica* L. Väinönputti. — Sarjaperät tav. kaljuja; laitasarjukat keskimäistä korkeammat; lehdet kahdesti pariosaisia; lehdykät toissahaisia; päätölehti 3-halkoinen; lehtiruodit päältä litteitä; jyväpuolikkaat kehkeriä kohoisilla harjuilla. — 2 7, 8 vehreänkelt. k.

Tunturilait. (P. L. Lv.) 1—1½ kyynäräinen tuuman paksulla, liereällä varrella; aluslehdet yleensä 1—1½ kyynärän levyisiä, 2—3 tuuman pitkällä, alta hallavilla liuskoilla; sarjat 1½—2 vaaksan levyisiä. — *Archangelica officinalis* Hoffm., Fr.

Muist. — Hedelmät ja juuri vieläki tehoisampia kuin Karhunputken vatsanhuonoudessa, ähky-, emä-, kolotus-, yskä- ja kuumetaudeissa. Kuorituista varsia syövät Lappalaiset haluisesti.

A. *littoralis* Fr. Rantaputti. — Sarjaperät m. kaljuja; lehdet kahdesti pariosaisia, uurtoruotisia; lehdykät epämukaisesti sahalaitaisia, päätölehti 3-halkoinen; jyväpuolikkaat k. ed. — 2 6, 7 vehreänkelt. k.

Merenrant. (A. T. U. St.) M. liereillä, matala-uurtuisilla ruodeilla; sekä muotoansa että hyötyänsä hyvinki Väinönputken kaltainen. — A. *archangelica* β Wg.

†† Jyväpuolikasten kuori siemenen kanssa yhdessä.

A. *sylvestris* L. Karhunputti. — Sarjaperät lieminkäisiä; aliset lehdet toistain—kolmesti pariosaisia, 3—4-parisia; lehdykät puikeita, sahalaitaisia (johteettomia), päätölehti tav. kokonainen, väl. 3-jakoinen; lehti- ja lehdykkäruodit venhomaisia; jyväpuolikkaat litteitä, kalvolaitaisia. — 2 7, 8 valk. k.

Aroniit., rant. tav. (E. — L. Lv.) Us. 1½-kyynäräinen; lehdykät tav. kokonaisia, paksumaisia, hieno- ja tihe-sahaisia.

Muist. — Juuri ja hedelmät vatsanvähvistavia ja selvittäviä ähkytaudissa, emätaudissa j. m.

### PEUCEDANUM L. Suujuuri. Mjölkröt.

P. *palustre* Mönch. — Varsi kulmikas ja juomuinen; sarsasäteet lieminkäisiä; varukset suikulaisia; varsilehdet kolmesti pariosaisia, moniparisia, tasasoukan-suikeilla, lyhytsuippoisilla liuskoilla. — 2 7, 8 valk. k.

Suoniit., rant. (E. — P. Kv.) 1—1½-kyynäräinen; juuri kitkerän ja kirpeän makuinen, ryyti-hajuinen; varsi m. liereä; ruodit tupellisia, sepokantaisia; lehtien ympärys kolmikkomainen. — *Selinum L. Thysselinum Hoffm.*

Muist. — Lappalaiset pitävät juurta suussaansa tupakan puuteessa. Kuivattuna sitä paikoin käytetään ruokaryydiksi.

### SELINUM L. Metjäfumina.

*S. carvifolia L.* Suomen metjäfumina. — Varsi juovikas, kalvokulmainen; varukset tasasoukkia; varsilehdet toistain—kolmesti pariosaisia, moniparisia, m. tupettomilla ruodeilla, soukilla, pitkulaisilla, otapäisillä liuskoilla. — 2 7, 8 valk. k.

Metsäniit. (T. U.) 2—3-vaaksainen, pian varisevilla sarjavaruksilla; terälehdet m. yhdistyviä; varsilehtien ympärys puiketaahi soikea; lehdykät vaalealla odalla päässä.

*S. Gmelini Bray.* Papin metjäfumina. — Varsi juomuinen; varukset m. hapsimaisia, helposti varisevia; varsilehdet m. kolmesti pariosaisia leveillä, pitkillä tupilla; lehdykät lyhytsoikeanliuskaisia; lehtien ympärys puiketa. — 2 7, 8 valk. k.

Ruohoisilla tunturiseut. harv. (Kv. Lv.) 2—3-vaaksainen väljillä, tuumanpituksilla, varresta pian eridvillä tupilla. — *Conioselinum Fischeri Wimm. & Gr. C. tataricum Fisch., H. M. F.*

### CENOLOPHIUM Koch. Tuholatwa.

*C. Fischeri Koch.* — Lehdet kolmesti pariosaisia, moniparisia ulospäisillä lehdyköillä, päätölehti 3-liuskainen; varsi liereä, kalju, juomuinen; sarjavarus 1-lehtinen, harv. puuttuva; sarjukat monella sukamaisella varuslehdellä. — 2 7, 8 valk., harv. punert. k.

Merenrant. harv. (Lv.) *Sarjaperät karheahkoita.* — *C. Fischeri var. lapponicum Nyl.*

### HALOSCIAS Fr. Rantaputti. Strandfloka.

*H. scoticum Fr.* — Lehdet toistain 3-sormisesti jakoisia; lehdykät vinopuiketa, latvapuolelta jurasahaisia, nalkkimaisella, ehytlaitaisella kannalla. — 2 7 valk. k.

Merenrant. kallioin välissä, harv. (Kv. L. Lv.) *Parin vaakan pit.; tuuman levyisillä lehdyköillä; pahanhajuinen.* — *Ligusticum L.*

### LIBANOTIS Crantz. Peuranjuuri. Säfserot.

*L. montana All.* — Lehdet pariosaisia, parijakoisilla t. pariosaisilla, pykäliuskaisilla lehdyköillä; varsi uurtokulmainen; kaksoisjyvät höyteitä. — 2 7, 8 valk. k.

Niittutöyr. harv. (A. T.) *Us. kyynärän pit.; juuri ryytimäinen, ylempätähapsikas; kukkasarjat tav. hyvin tiheitä, kehkeriä; hedelmäsarjat litteitä t. m. ontevia; jyväpuolikkaat ryytimäisiä.* — *Athamanta libanotis* L.

**ÆTHUSA L.** *Ėufanputti.* Vildpersilja.

*Æ. cynapium* L. — Lehdet kahdesti pariosaisia pariakoisilla, pykäläitaisilla, suikealiuskaisilla lehdyköillä. — ☉ 6—8 valk. k.

Ryytimaissa, vilj. (A. — Ke. H.)  $1\frac{1}{2}$ -kyynäräinen; lehdet ohuita, alta külloisia; varukset suikulaisia, sarjukoita pidemät, alaspäisiä.

Muist. — Myrkyllinen ihmisille, hanhille ja kanoille, monelle muulle elukalle vahingoton.

**ÆNANTHE L.** *PaĖaputti.* Stäkra.

*Æ. phellandrium* Lam. — Sarja monisäteinen; varsilehdet kolmesti pariosaisia taaskääntöisillä ruotihaaroilla, soikeilla, tylpillä liuskoilla. — ☽ 7, 8 valk. k.

Vesipaik. harv. (A. St. K. Kv.)  $\frac{1}{2}$ —2-kyynäräinen pienillä, veden sisässä m. rihmamaisilla lehtiliuskoilla, pillikkäällä, tois. tuumanpaksuisella, pullealla varrella. — *Phellandrium aquaticum* L.

Muist. — Myrkyllinen. Hedelmät avullisia horkassa, keuhkotaudeissa, kerpukissa, mätähaavoissa j. m. sisällisesti sekä ihmisille että luontokappaleille. Ludetten sanotaan pelkäävän tuoreita lehtiä.

**CICUTA L.** *ReiĖo.* Sprängört.

*C. virosa* L. — Lehdet kahdesti pariosaisia erillisillä taihytyvillä, suikeilla, teräväsahaisilla liuskoilla. — ☽ 7, 8 valk. k. —  $\beta$  tenuifolia: lehtiliuskat hyvin soukkia, loiva- ja harsusahaisia.

Vesipaik. (E. — L. Lv.;  $\beta$  Lv.)  $1\frac{1}{2}$ -kyynäräinen mukulamaisella, pillikkäällä juurella; lehtiliuskat noin 2 tuuman pituisia,  $\frac{1}{2}$  tuuman levyisiä,  $\beta$ :lla ei jos tuuman pituisia, linjanlevyisiä.

Muist. — Juuri on kovin myrkyllinen, vaikuttava hourauksia, päänkivistyksiä, sydämen tykytyksen, suonivedon, kouristuksen, kovan mahapolton, oksennuksen ja lop. hengenlähdön. Paras apu niitä vasten on aikaisin otettu oksennuspulveri. Pahoille savipuolille ja jäsenkolotuksille käytetään juurta ulkonaisesti paranteeksi paljaltaan riivittynä tahi rasvan kanssa voiteeksi keitetynä.

Muutamat sanovat pienempien vesienki juuresta myrkylliseksi ja karjalle vaaralliseksi tulevan.

**ÆGOPodium L.** Buohenputti. Kirskaal.

*Æ. podagraria* L. — Lehdet toistain 3-sormisesti ja koisia; lehdykät puikeita vinoherttaisella kannalla. — 2 7, 8 valk. k.

Ryytimaissa, leht. tav. (A. — K. St. — Kv.)  $1\frac{1}{2}$ —2 *kyynärän pituinen*.

Muist. — Lehdet keväällä hyvät kaaliksi ja pinatiksi kelloillisia.

**CARUM L.** Rumina. Kummin.

*C. carvi* L. — Lehdet kahdesti pariosaisia, hienojakoisilla lehdyköillä. — 2 6—8 valk. t. punerv. k.

Pient., nurm. tav. (E. — P. Kv. L.) *Parivaaksainen kaljulla, liereällä, haaraisella varrella*. — *Bunium* Godr. & Gren.

Muist. — Hedelmiä käytetään ruoka- ja leipäryydiksi, myös lievitäväksi lääkkeeksi ähkyssä ja vatsanpuhdistuksissa sisällisesti ja ulkopuolisesti (mahahauteena). Juuri on hyvä liemiruokiin ja lehdet keväällä kaalilaitteisiin.

**PIMPINELLA L.** Uniäruoho. Bockrot.

*P. saxifraga* L. — Varsi juomuinen; lehdet pariosaisia; lehdykät pyöreähköitä t. leveänpuikeita, tylppiä, sahalaitaisia; ylisten lehtien liuskat soukkia, ehytlaitaisia. — 2 6, 7 valk. k. —  $\beta$  *dissecta*: lehdykät parijakoisia, liuskaisia.

Kuiv. niit. tav. (E. — P. Kv. Lv.;  $\beta$  A. U. P.) *3-vaaksainen; juuri pitkä, tappimainen; varsi m. kalju, mutkainen; sarjat parin tuuman levyisiä*.

Muist. — Juuri on vatsanvahvistava, vesityttävä, hiestyttävä ja löänselittävä, hyödyllinen nivossa, vesi-, yskä- ja lökättaudeissa. Siemenillä on miedompia lääkitysvoimia.

**SIUM L.** Sorjanputti. Strätta.

*S. latifolium* L. — Varsi pysty pitkäperäisillä sarjoilla; varsilehdet pariosaisia; lehdykät suikulaisia t. tasasoukkia, sahalaitaisia otapäisillä hampailla. — 2 7, 8 valk. k.

Ves. harv. (A. K.)  $1\frac{1}{2}$ —2 *kyynärän pit., useampi-tuumaisilla sarjaperillä, eheillä varuksilla; aluslehdet kahdesti pariosaisia*.

Muist. — Tuoreena vahingollinen eläimille. Juuri myrkyllinen, kuitenkin karjan lääkkeenä paikoin tavallinen.

SANICULA L. *Sanfula*. *Läkeört*.

*S. europæa* L. — Sarja jaottomilla ja 3-jakoisilla säteillä; lehdet 3—5-sormisesti jakoisia; lehdykät nalkkimaisia, 3-halkoisia, loivaliuskaisia ja sahalaitaisia; varsi haaraton, paljas t. 1-lehtinen. — 2½ 7 vaaleanpunerv. k.

Leht. harv. (A.) *Parin vaaksan pituinen*.

Muist. — On pidetty haavan-parantavana ruohona ja käytetty sekä keittoliemenä sisällisesti että hauteena ulkonaisesti.

## 38 heimo. — ADOXACEÆ.

ADOXA L. *Tešmanhyrtti*. *Myskört*.

*A. moschatellina* L. — Lehdet toistain 3-sormisia. — 2½ 5, 6 vehr. k.

Varj. mäk. (A. — K. St. H. Kv. Lv.) *Herneenkokoisilla kukkamykeröillä; hajahtaa myskille*.

39 heimo. — ACERACEÆ. *Vahterikasveja*.ACER L. *Vahteri*. *Lönn*.

*A. platanoides* L. — Kukkaperät kaljuja pystöisenä, tasakorkeana huiskilona; lehdet kouramaisesti 5-liuskaisia, kaljuja; liuskat ja hampaat suippoja. — ½ 6 kelt. k.

Metsäniit. kyl. (A. — K. St. — S.) *Iso- ja ohutlehtinen pitkä, runsasvarjainen puu*.

Muist. — Vahterista keväällä vuotaa mahalaa, josta koon keittämällä saadaan hyvää siirappia ja sokeria. Keskipohmainen puu antaa toista kannua mahalaa vuorokauteensa, ja 3:sta mahalakannusta on saatu 2 korttelia siirappia ja luoti sokeria. Myös juomaa, simaa ja etikkaa taitaan siitä käyttämällä saada. Aineensa puolesta vahteri on valkoista, kevyttä ja monenlaisiksi kapineiksi sopivaa puuta. Kasvaa siemenestä multaiseen tahi savisekaiseen maahan syksyllä kylvettynä ja on helppo sekä hoitaa että paikasta toiseen muuttaa. Kun vahteri sievään kasvaa isoksi kauniiksi puuksi, niin sillä ihmiset kyllä vähällä työllä ja vaivalla taitaisivat pihansa ja muut lähisemtunsa kaunistaa. Missä vanhoja vahtereita löytyy, siellä keväällä helposti saadaan vesoja niiden vaiheilta, ettei ole muuta vaivaa kun istuttaa ja sitte vähimmiten kastella niitä. Mahalan ottamisen jälestä pitää reikä tapilla kiinni tukittamaan, muuten puu kuivettuu.



40 heimo. — **NYMPHÆACEÆ**. Lummenkasveja.**NYMPHÆA** L. Summe. Neckros.

*N. alba* L. — Terälehdet pitkulais-pyöreitä t. soikeita; luotilla 10—20 sisään käyrää sädettä; lehdet herttamaisia syvällä kantalovella, pyöreämäisiä, litteitä, ehytlaitaisia, liereä-ruotisia. — 2 7, 8 valk. k. —  $\beta$  minor: kahta pienemmillä kukilla ja lehdistä. —  $\gamma$  biradiata: luotissa iso tähtimäinen, rusappa pilkku.

Järv. ja lammikoissa (E. — P. Kv. Lv.;  $\gamma$  H.) *Kukat* us. 4 tuuman levyisiä; luotti kelt., ruskeankellervä t. punainen.

Muist. — Juurakkoa ja siemeniä käyt. punatautia ja valkoisen vuotua vasten.

**NUPHAR** Sm. Upuffa. Neckblad.

*N. luteum* Sm. Barjan-upuffa. — Luotti 12—20-säteinen, kokonainen; ponnet tasasoukkia, pitkulaisia; lehdet syvään herttamaisia, ruodit ylempänä 3-kulmaisina (1 kulma pyöreähkö). — 2 7 kelt. k. —  $\beta$  minus: kukat pienempiä, noin tuuman-levyisiä; luotti 10—12-säteinen. —  $\gamma$  intermedium: luotti 9—15-säteinen; ruodit litteähköitä.

Järv. tav. (E. — L. Lv.;  $\beta$  S.;  $\gamma$  P. L. Lv.) *Ponnet* 2—3:n leveytensä pituiset. — *Nymphæa* L. —  $\gamma$  *N. intermedium* Ledeb.

Muist. — Sikain sanotaan siemennöityvän upukan juuria runsaammin syötyänsä ja hedelmistä kokonaan kuolevan. Keittämällä juuret kuitenkin paranevat ja taitaan katovuosina leiväksiki käyttää. Sirkat pakenevat juurien savua ja torakat häviävät niistä pienennettynä ja maitoon sekoitettuna. Kalat mielellään asuskelevat upukan leveitten lehtien suojassa.

*N. pumilum* DC. Ronnan-upuffa. — Luotti noin 10-säteinen, liuskainen; ponnet m. nelikolkkaisia, ei kun puolentoista leveytensä pituisia; ruodit tylppämaisesti 3-kulmaisina. — 2 7 kelt. k.

Ojissa ja lammissa, harv. (A. H. K. Pe. P.) *Kukat* *Rentukan* (*Caltha palustris*) kukkain kokoiset; lehdet noin 2 tuuman levyisiä; terälehdet pieniä, vastopuikeita. — *N. minimum* Sm.

41 heimo. — **RANUNCULACEÆ**. Leinikköisiä.1 parvi. — **Ranunculeæ**.**RANUNCULUS** L. Seiniffö. Solögon.

+ Terälehdet 5 t. useampia; valkeita.

*R. glacialis* L. Jää-leiniffö. — Varsi pystöinen, 1—2-kukkainen; aluslehdet ruodikkaita, 3-jakoisia, syvähalkoisilla ja

liuskaisilla lehdyköillä; hedelmykset kuutavaisesti kalvoselkäisiä.  
— 2 7, 8.

Kork. tunt. (L.) 1—2-, harv. 3-kukkainen; kukat isoja, 5:llä ulkopuolin sinipunervalla terälehdellä.

R. Pallasii Schlecht. Turjan leiniffö. — Varsi suikertava, pillikäs; kaikki lehdet ruodikkaita, soikeita t. vastopuikeita, 3-jakoisia nalkkimaisilla liuskoilla t. ehytlaitaisia; hedelmykset pitkän-puikeita, kehkeriä, kaljuja. — 2 7, 8.

Vet. soissa (Lv.) Verho 3-lehtinen; terä useammalla vastopuikealla t. nalkkimaisella, pian varisevalla lehdellä.

†† Terälehdet 5 (*Lapin leiniköllä* us. 6—8), keltaisia.

\* Varsilehdet liuskaisia t. jakoisia; hedelmykset sileitä.

♂ — Varsi enimm. monikukkainen; perät uurteisia.

R. bulbosus L. Mufula-leiniffö. — Varsi harvakukkainen, siirottava- ja pehmeä-karvainen, juurelta paisunut mukulaksi; aluslehdet 3-jakoisia leveän-nalkkimaisilla, liuskaisilla ja hampaisilla lehdyköillä, päätölehti ruodikas; verhot alaspäisiä; hedelmäpohjus tönkeäkarvainen. — 2 6.

Niittumäissä, harv. (A. T.) Varsi vaaksan pituinen, us. yksikertainen; hedelmykset litistyneitä, pallistettuja, lyhyellä koukeroisella odalla. Varjossa varsi väl. kasvaa pitkäksi, haarovaksi, jolloin varsimukula m. katoaa ja lehtiliuskat suikistuvat.

R. polyanthemus L. Mholeiniffö. — Varsi monikukkainen, harittavasti hatuinen, mukulaton; aluslehdet 3—5-jakoisia ja liuskaisia, päätölehti m. ruoditon; varsilehdet 5-jakoisia ja liuskaisia; pohjus ed. — 2 6, 7.

Niittumäissä (E. — Pe. Kv. Lv.) 2—3 vaaksan pituinen, isokukkainen; hedelmykset lyhyt- ja koukero-otaisia.

R. repens L. Suifferoleiniffö. — Varsi koheneva, suikertavilla lonkeroilla; lehdet 3-sormisesti jakoisia ruodikkailla, 3-jakoisilla ja liuskaisilla lehdyköillä; verho myötäinen. — 2 5—8. — β hirsutus: ruodit ja lehdet höyteitä.

Viljelömaissa, tav. (E. — L. Lv.) Kukat tav. isohkoita, tumman-keltaisia.

R. sceleratus L. Suhtaleiniffö. — Lehdet syvästi 3-halkeisia, tylppäpykeisillä liuskoilla, yliset jakauneina m. kantaan saakka suikeiksi — tasasoukiksi liuskoiksi; terälehdet verhon pituisia, lop. pitkulaista pohjusta lyhemmät. — ☉ 6—8. — β minimus: 1—3 tuuman pituinen, 1-kukkainen.

Matal. vesissä ja lähiseut. tav. (E. — Pe. Kv. Lv.) Toisintelelee suuruutensa suhteen m. kyyndrän pituisesta parin tuumai-

*seen, muin pystövärtinen kuivalla alalla, muin laiehtiva vedessä; kukat pienoisia.*

Muist. — Hyvin kirpeä; nostaa vaikeasti paranevia rakkoja iholle sidottuna.

**b** — Varsi tav. monikukkainen; kukkaperät uurrettomia.

*R. acris* L. Niittuleiniffö. — Varsi tav. hyvin lyhyillä, myötäisillä karvoilla; lehdet karvaisia, 3—5-jakoisia, pykäliuskaisia; ylisten varsilehtien liuskat m. tasasoukkia; hedelmykset ja pohjus kaljuja. — 24 7—9.

Niit. yl. (E. — L. Lv.) *Usein kyynärän pituinen; aluslehdet toisint. 3- ja 5-liuskaisina t. -osaisina.*

Muist. — Kasvi lehtineen muserrettuna ja iholle pantuna nostaa rakkoja, jonka kautta se hyödyttää luuvalossa ja reisisäryssä, myös vilutaudissa kalvoisimille sidottuna. Päälle 5 t. 6 tunnin sitä ei kuitenkaan pidä iholla pitää, eikä välistä niinkään kauvan.

*R. cassubicus* L. Luppileiniffö. — Varsi kalju, monikukkainen; aluslehdet pyöreän-munuamaisia, jaottomia, jyreästi nyhähampaisia, alta harsukarvaisia, ruoti tyveltä avaran, kalvomaisen, tav. lehdettömän tupen sisässä; varsilehdet kourajakaisia tav. sui-keilla, sahausilla liuskoilla. — 24 5, 6.

Varjopaik. suoniit. harv. (A. T. St. H.) *Isompi seuraavaista; aluslehdet vanhempina us. 4-tuumaiset läpimitalta; hedelmysten ota pidempi ja suurempi, ainoasti päästü koukero.*

*R. auricomus* L. Aroleiniffö. — Varsi kalju, monikukkainen; aluslehdet munuamaisia — herttamaisia, tav. syvästi 3-halkoisia t. jakoisia, väl. kokonaisia, jyreästi nyhähampaisia, tupettomia, alta kaljuja; varsilehdet ed., tasasoukilla, tav. ehytlaitaisilla liuskoilla. — 24 5, 6.

Niit. tav. (E. — L. Lv.) *Lehdetöntä tuppea, joka sulkee aluslehtien ruotityven edellisessä lajissa, ei ole tällä lajilla, jonka aluslehtien ruoti sen sijaan tyveltä levenee tupeksi.*

**c** — Varsi yksikukkainen, t. haarattomilla kukkaperillä lehtihangoissa.

*R. nivalis* L. Sumifeiniffö. — Varsi pysty, yksikukkainen; aluslehdet munuamaisia t. herttamaisia, alle keskustan 5—7-halkoisia; varsilehdet syvästi 3—5-halkoisia, ehytlaitaisilla liuskoilla; verho ruskeanhöyteä, terälehtiä lyhempi; hedelmyksillä pitkäveteinen, käyrä ota. — 24 7, 8.

Kork. tunt. (L.) *Tuskin vaaksan pituinen; lehdet kiiltäviä.*

3:lla emäliuskalla, keskinen ehyt, sivuliuskat pykölläitaisia; kukat kullankeltaisia.

*R. pygmaeus* Wg. *Piffuleiniffö*. — Varsi koheneva, yksikukkainen; aluslehdet m. munuamaisia, 3—6-halkoisia, ehytlaitaisilla liuskoilla; verho ei paljon karvainen, m. pidempi terälehtiä; hedelmykset lyhytotaisia. — 2 7, 8.

Tunt. (L. Lv.) *Sangen vähäinen*. — *R. nivalis*  $\beta$  L.

*R. hyperboreus* Rottb. *Pohjan leiniffö*. — Varsi suikertava, juurrehtiva, lehtinen; lehdet 3-halkoisia ehytlaitaisilla, tylppäpäisillä liuskoilla; kukkaperät kaljuja; hedelmykset m. odattomia. — 2 7. —  $\beta$  *Samojedorum*: ihan kalju, 1—3-tuumainen; lehdet nalkkimaisia, 3-osaisia.

Kost. paik. tunt. harv. (Kv. L. Lv.;  $\beta$  Lv.) 2—3-tuumainen kasvi; kukat *sangen vähäisiä, useimmin 3—4:llä terälehdellä; hedelmyksillä ennen valmistumista lyhyt koukeroinen vartalo, joka lop. m. kokonaan menehtyy*. —  $\beta$  *R. Samojedorum* Rupr.

*R. lapponicus* L. *Epän leiniffö*. — Varsi alla maanpinnan suikertava, pystöisillä, 1-kukkaisilla, paljailla t. 1-lehtisillä kukkaperillä (vanoilla); lehdet kaljuja, 3-jakoisia leveän-lapiomaisilla, nyhä- t. pykölläitaisilla liuskoilla; hedelmykset koukero-otaisia. — 2 8.

Kost. paik. tunt. harv. (P. L. Lv.) *Oikea varsi suikertaa juurakkona maakamaran alla t. sammalissa, kohottava nivelistä lehtiä ja kukkaperiä; verholla tav. 3, terällä 7 vähäistä lehteä, mikä kuit. toisintee; hedelmykset ei paljon otiaan pidemmät*.

\*\* Varsilehdet kokonaisia.

*R. lingua* L. *Sofileiniffö*. — Varsi pysty; lehdet pitkäveteis-suikeita, harseasti nyhähampaisia; hedelmyksillä pitkävetinen koukku-ota. — 2 7, 8.

Joki- ja järvirant. vedessä (E. — Pe. Kv.) *Us. kyynärän pituinen ja pidempiki; lehdet vaaksan pituisia; kukat tuuman levyisiä. Toisintee kaljuna ja kalseana*.

Muist. — Iholla peidettynä nostattaa rakkoja. On kirpeä ja vahingollinen eläinten syödä. Melkein koko Leinikkö-suvulla on sama omaisuus.

*R. flammula* L. *Sulileiniffö*. — Varsi koheneva t. suikertava, harv. pysty; lehdet puikean-suikeita — tasasoukkia, kaljuja; terälehdet isommat verhoa; hedelmykset hyvin lyhyt- ja suoraotaisia, vastopuikeita. — 2 7. —  $\beta$  *reptans*: varsi rihmamainen, longertava, kaarevasti kohoavilla solmuväleillä, solmuista juurrehtiva; lehdet m. rihmasoukkia.

Soissa, rant. tav. (E. — P. Kv.;  $\beta$  E. — L. Lv.) *Lehdet*

väl. sormenlevyisiä; ensimmäiset aluslehdet kevdällä puikeita, ja vedessä pitkäruohtisia, laiehtivia. —  $\beta$  *R. reptans* L.

Muist. — Tästä tehdään voidetta ja sidotaan valtasuonelle vilutaudissa. Vahingollinen hevoisille ja lampaille.

### BATRACHIUM Wimm. Sätfin. Grodhår.

*B. heterophyllum* Fr. Sofijätfin. — Varsi nulokulmainen; laiehtivat lehdet munuamaisia (väl. puuttuvia), keskustaan asti t. syvempään 3 — 5-halkoisia ja hampaisia; vedenalaiset, m. ruodittomat lehdet hienojakoisia hapsimaisilla, sirottavilla liuskoilla; kukat tav. isoja monilukuisilla heteillä; hedelmykset lyhytvartalaisia. —  $2\frac{1}{2}$  6—8. —  $\beta$  *truncatum*: laiehtivat lehdet typpäty-kantaisia. —  $\gamma$  *fluitans*: vedenalaiset lehdet m. ruodikkaita, rinnakkaisilla liuskoilla. —  $\delta$  *succulentum*: sangen pieni; kaikki lehdet hienojakoisia, tasasoukilla, hapsimaisilla, möyheähköillä liuskoilla.

Ves. tav. (E. — L. Lv.;  $\gamma$  K. Kp. Kv. P.;  $\delta$  Kv. P.) — *Ranunculus aquatilis* Auctt. —  $\gamma$  *B. peltatum* Fr. —  $\delta$  *B. admixtum* W. Nyl. H. M. F.

*B. trichophyllum* Chaix. Rarmajätfin. — Varsi ed.; kaikki lehdet lyhyt-ruodikkaita, jakauneita sirottaviksi hapsiliuskoiksi, epäsuuntaisella piirillä; heteitä 12 — monta; hedelmykset lyhytvartalaisia, useimmasti karvaisia. —  $2\frac{1}{2}$  6—8.

Ves. harv. (A.) — *Ranunculus paucistamineus* Tausch.

*B. confervoides* Fr. Ronnanjätfin. — Varsi ja lehdet ed.; heteitä 6—10; hedelmykset pyöreämäisesti tylppäpäisiä, vartalottomia. — ☉ 7.

Ves. harv. (U. Kv. P. L.) Tav. 2—3-tuumainen, mutta kasvaa väl. jalan pituiseksi ja sen ylitse; kukat aina pienet parin linjan pituisilla, soukilla terälehdillä. Sekä tämä että edellinenki laji ovat mahdollisesti Jokisätkimen toisintoita.

*B. divaricatum* (Schrank.) Särwijätfin. — Varsi ed.; kaikki lehdet ruodittomia, hapsijakoisia, puoli- t. kokopyöreällä ympäryksellä; heteet tav. monilukuisia; pohjus palleroinen, karvainen. —  $2\frac{1}{2}$  6—8. —  $\beta$  *oligandrum* Sæl.: pienempi; lehdet selvemmin ruodikkaita, epäsuuntaisemmalla piirillä; kukat pienempiä; heteitä 8—10.

Järv. harv. (A. U.;  $\beta$  U.) Tuttava lehdistään, joiden liuskat ovat jotenki pyöreämäisessä tasapinnassa, tankeita eivätkä niin pehmeitä ja veltoja kun muilla lajeilla. — *B. circinatum* Fr., H. M. F.

*B. marinum* Fr. Merijätfin. — Varsi liereä; kaikki lehdet ruodittomia, jakauneita hapsimaisiksi, myötäsuuntaisiksi, ei pal-

jon siirottaviksi liuskoiksi; hedelmäpohjus keilamainen, karvainen; hedelmyksillä selvä, ehkä lyhyt vartalo. — 24 7.

Merives. (A. — U. St. Pe.) *Varsi pitkä, luuvalkea, epäselvästi litteämäinen; hedelmyksiä 40—60.*

### FICARIA Hall. Maapähkinä. Korskal.

F. ranunculoides Mönch. — Varsi tav. 1-kukkainen; lehdet herttamaisia, aliset loivaan, yliset syvemmästi mutkalaitaisia. — 24 5 kelt. k.

Leht. (A. — U. St. H. Kv.) *Juurena kimppu nuijamaisia mukuloita. — Ranunc. ficaria L.*

Muist. — Tuoreena muserrettu ja ihran kanssa seotettu hyvä voide peräpukamiin ja kaulakupuihin, kun ynnä sen mehua maidonherassa nautitaan, joka myös on hyvää kerpukkiin. Juuret ennen kukkimista tuikeita, jotta jos muserrettuina iholle pannaan, vetävät kuin sinappi t. rakkolaastari. Varsikko käyt. kaalein seassa keväällä.

### MYOSURUS L. Siirenhäntä. Musrumpa.

M. minimus L. — Lehdet m. rihmamaisia, kukkaperän kera juurehisia. — ☉ 5, 6 kelt. k.

Kuiv. paik. (E. — P. Kv.) *Kukka pieni 1/2—2-tuumaisella perällä; pohjus lop. 1—2-tuuman pituinen.*

### 2 parvi. — *Anemoneæ.*

### THALICTRUM L. Ängelmä. Ängsruta.

† Hedelmykset moni-uurteisasia; kukat röyhyssä t. toiskertaisissa tertuissa.

Th. kemense Fr. Lapin ängelmä. — Varsi juova-kulmikas, nuorempana tiheä-, vanhempana harsuröyhyinen; lehdet toistain — kolmesti pariosaisia, aliset sivuhaarat m. keskisen pituisia; lehdykät pyöreämaisiiä t. vastopuikahkoja, tylppäliuskaisia, alta vaaleita. — 24 7, 8 kellerv. k.

Kost. metsäleht. harv. (P. L. Lv.) *Niittu-ängelmän muotoinen, mutta lehdet monittais-jakoisempia, lehdykät ohuempia ja pyöreämaisempia.*

Th. rariflorum Fr. Pohjan ängelmä. — Varsi ed.; röyhyhaarat pystöisiä, m. tertuttaisilla kukilla; lehdet tav. toistain pariosaisia, lyhemmillä sivuhaaroilla, vastopuikeilla, tylppäliuskaisilla lehdyköillä. — 24 7, 8. — β boreale: haarattomalla varrella, harvemmillä kukilla.

Niit. ja jokirant. harv. (P. Lv.; β Lv.) *Näöltään kun La-*

*pin ängelmä*, mutta lehdet ovat vähemmän kolmikkomaisia piiriltään, niinkuin seur. — *β Th. strictum* \* boreale F. Nyl.

*Th. flavum* L. Niittu-ängelmä. — Varsi ed.; röyhyhaarat pystöisillä, latvaa päin sarjattaisilla kukilla; lehdet toistain pariosaisia, lyhyillä sivuhaaroilla, vastupuikeilla, tav. 3-liuskaisilla lehdyköillä. — 2½ 6, 7 kelt. k.

Kost. niit. tav. (E. — P. Kv.) 1—1½-kynnäräinen, vähintään tuuman pituisilla, muin leveä-, muin nalkkimais-kantaisilla lehdyköillä; röyhy runsaskukkainen, vaaleankeltaisilla hedepalhoilla. Tav. on suomumaisia, pian menehtyviä korvakkeita lehtihaarain hangoissa.

Muist. — Käyt. tuoreeltaan muserrettuna hauteeksi vasten hammas- ja muita särkyjä. Juuri on vatsan pehmentävä, kuin raparperi. Juurilla painetaan myös villainen punakellerväksi ja lehdillä tumman keltaiseksi.

*Th. simplex* L. *Soiffa ängelmä*. — Varsi kulmikas, litteillä sivuilla; röyhyhaarat terttuisilla, nuokahtavilla kukilla, erikiehkuroissa; lehdet k. ed., soukemmilla, nalkkimaisilla liuskoilla. — 2½ 7 harmaankelt. k.

Niit. harv. (H. S.) Tav. hoikempi k. ed.; perähaarukoita 2—5, erityisissä puolikiehkuroissa; palhot musevia.

*Th. angustifolium* Jacq. *Soiffa ängelmä*. — Varsi juova-kulmikas; kukat sarjoissa, pystyjä; lehdet kolmesti pariosaisia; lehdykät tasasoukkia t. suikeita; päätölehdykkä us. kapean-nalkkimainen, 2—3-liuskainen. — 2½ 7.

Kost. metsäniit. harv. (Kv.) Aliset lehdet leveämmillä (1—2 linj.), noin tuuman pit. lehdyköillä, ylisten rihmamaisia; palhot keltaisia.

†† Hedelmukset moni-uurteisia; kukat ihan yhdessä yksikertaisessa tertussa.

*Th. alpinum* L. Tunturi-ängelmä. — Terttu kukkiessa alaskaareva; varsi m. lehdetön; lehdet toistain pariosaisia pyöreämäisillä lehdyköillä. — 2½ 6, 7.

Tunt. tav. (L. Lv.) Vaaksan pituinen, haaraton; lehdykät vähäisiä, kiiltäviä; kukat sinipunervia t. kelt.

††† Hedelmukset 3—4:llä, leveällä kalvokulmalla.

*Th. aquilegiifolium* L. *Alifeia-ängelmä*. — Lehdet kolmis-pariosaisia; ruodit apulehtisiä; lehdykät pyöreämäisiä t. vastopuikeita, tylppäliuskaisia; kukat m. huiskilomaisessa röyhyssä. — 2½ 6 punert. k.

Lehdoissa, harv. (K.) *Lehdet m. kuin Akileian, mutta pienempiä.*

### ANEMONE L. Wuoffo. Sippa.

† Varus erillään kukasta, monijakoisilla lehdillä.

*A. nemorosa* L. Waffen-wuoffo. — Vana 1-kukkainen, yksinäisellä aluslehdellä; varuslehdet ruodikkaita, pykälaitaisia; kupulehtiä 6 t. useampia, pitkulaisia; hedelmukset ja varuslehtien ruodit harsukarvaisia. — 2½ 5, 6 valk. t. punerv. k.

Mets. kost. paik. tav. (A. — K. St. H. Kv.) *Tämän ja seuraavan lajin juurakko tasapaksu, lojottava. Tavataan väl erityisillä emikukilla, täysineuvoisia vähemmillä.*

Muist. — Kasvista valmistettua voidetta pidetään valtasuonella lasten vilutaudissa. Sovitetaan vetämään vähä ennen väristyksen tultua. Tislattua vettä kukista käyt. ruskottumista, savipuolia ja huunpuremia vasten, ei kuitenkaan ylenmääräisesti. Tottumattomat eläimet saavat tätä kasvia syötyänsä verivirtsan ja väl. punataudinki.

*A. ranunculoides* L. Reltawuoffo. — Vana 1—2-kukkainen; varuslehdet m. ruodittomia, sahamaisesti pykälaitaisia; kupulehtiä tav. 5, pitkänpyöreitä; muuten k. ed. — 2½ 5, 6 kelt. k.

Leht. niit. harv. (A. — U. St. H.) *Edellistä vähempi, aina heleän-keltaisilla kukilla.*

†† Varus kukan-alainen, verhonmoinen, kokonaisilla lehdillä: *Hepatica* DC.

*A. hepatica* L. Sinivuoffo. — Lehdet keskustaan asti 3-halkoisia kokonaisilla, tasamukaisilla liuskoilla. — 2½ 5.

Metsämaissä (A. — K. St. — S.) *Kukat tav. sinisiä, väl. punaisia t. valkeita, joskus kahdenkertaisia. — Hepatica triloba* DC.

Muist. — Käyt. ennen maksa- ja munuaisvikoja vasten, myös verivuotuja parantamaan, keitteenä t. teenä nautittuna.

### PULSATILLA Mill. Räenfilmä, Räeffö. Gökskällä.

*P. patens* Mill. Sormi-fäeffö. — Lehdet pitkäruoetisia, 3-sormijakoisia; lehdykät m. nelisivuisia, 2—3-jakoisia nalkkimaisilla, päästä syvästi 2—3-hampaisilla t. monijakoisilla liuskoilla; kukka m. pystöinen. — 2½ 5 punasinerv. k.

Mäissä, harv. (H.) *Kukkiessa Mälikäekön näköinen, mutta kukkimisen jälkeen pitkäruoetisilla, 3-sormijakoisilla lehdillensä eroava. — Anemone* L.

*P. vernalis* Mill. Rangaš-fäeffö. — Lehdet pariosaisia; leh-



dykät m. vastopuikeita syväpykeisillä, leveän suikeilla t. puikeilla liuskoilla ja hampailla. — 24 5.

Kankailla, hietam. (H. S. Ke. K.) *Kukka ensimmältä lyhytvainainen, m. pystöinen; vanhempana tulee vana vaaksan pituiseksi, nuokkuvalla, ainoasti päivänpaisteessa leveän-aukealla kukalla; väri valkea punaisenvoipa, ulkopuoli punaruskea. Varus kaikilla lajeilla hienojakoinen, hyvin höyted.* — *Anemone L.*

*P. vulgaris* Mill. Mäfitäeffö. — Lehdet toistain — kolmispariosaisia, tasasoukilla liuskoilla; kukka nuokahtava m. suorilla, kahdesti heteitä pidemmillä lehdillä. — 24 5, 6.

Hietamäissä, harv. (A. Ke.) *Kukka iso, punasinervä.* — *Anemone L.*

Muist. — Kukka iholle sidottuna nostattaa rakkoja. Niistä tislattulla vedellä parannettiin muinen horkkaa eli vilutautia.

*P. pratensis* Mill. Hofäeffö. — Lehdet ed.; kukka hyvin nuokkuva, päästään taaskääntöisillä, tuskin puoltaan heteitä pidemmillä lehdillä. — 24 5.

Kuiv. niit. harv. (Ke.) *Kukka vähempi k. ed., sisältä tumman-punainen, ulkoa jäänkarvainen.* — *Anemone L.*

Muist. — Kasvia sekä siltään kuivattuna ja pienennettyinä, että keitesakona on nautittu sisään ottaen kaihia ja muita silmävikkoja vasten. Ulkonaisesti käyttäen on sen keittovedestä ollut hyvä apu mätähaavoihin.

### 3 parvi. — **Helleboreæ.**

**CALTHA L.** Rentufla. Kalfleka.

*C. palustris* L. — Varsi kokeneva t. rento; lehdet herttatt. munuamaisia, juranyhäisiä, pyöreämäisillä kantaliuskoilla. — 24 5, 6 kelt. k.

Vetis. paik. tav. (E. — L. Lv.) *Varsi pillikäs, samoin k. koko kasvi kalju; kukat isoja noin tuuman levyisiä.*

Muist. — Vahingollinen eläinten syödä. Kukkasilmikot (puh'enneina) etikalla ja suolalla sekoitetut taidetaan syödä. Kukamehusta keitettyä alunan kanssa saadaan keltaista läkkiä.

**TROLLIUS L.** Rullero. Bullerblomster.

*Tr. europæus* L. — Verho-lehdet yli 10, palleroisesti yhtyneitä; terälehdet puhkeamatonten heteitten pituisia. — 24 6, 7.

Niit. j. n. e. (E. — L. Lv.) *3—4 vaaksan pituinen isoilla palleroisilla, vaaleankeltaisilla kukilla, 5—7-jakoisilla lehdillä. Heteet siitepölyn luotuaansa ovat pidemmmät terälehtiä.*

Muist. — Kaunis kukka; arvellaan vahingolliseksi lampaille. Norjassa hautovat jalka-ajoksia siitä keitettyllä lämpimällä vedellä.

### AQUILEGIA L. *Ufileia*. Akleja.

*A. vulgaris* L. — Teräkannukset käyräpäisiä, verholehtiä lyhemmät; lehdet toistain 3-sormisesti jakoisia; lehdykät loivapykeisiä, pyöreän-tylppämäisillä liuskoilla. — 24 7, 8.

Leht., vuoritien. harv. (A. — K. St. S. Kv.) *Tav. kalju kasvi isoilla sinisillä, väl. vaaleanpunaisilla t. valkeilla kukilla. Toisinteele karvaisella varrella.*

Muist. — Siemeniä nautittiin ennen iho- ja päärupeja vasten. Kukista saadaan sinitettä paperille, joka sitte punaiseksi muuttumalla osottaa, jos jossain märkytydessä on vähänkään happoa.

### ACONITUM L. *Ufonhattu*. Stormhatt.

*A. septentrionale* Köll. — Terttu tahmea tiheistä nystykarvoista; kypäri epäkynsinen, sen pitkäveteinen liereä osa ja siitä m. suorakulmaisesti ulottava laide m. yhdenpituisia; mesipiteet taaskierteisellä kannuksella, suikealla huulella; lehdet kouramaisesti 3—7-halkoisia ja liuskaisia. — 24 7, 8.

Vuor. (K. Kv. Lv.) 2—3-kynnäräinen, sinisillä, väl. m. valkeilla, sangen harv. (meidän maalla) keltaisilla kukilla. — *A. lycoctonum* L. *Fl. Sv., H. M. F.*

Muist. — On kylmissä maissa vähemmän myrkyllinen, kun lämpimissä.

### DELPHINIUM L. *Ufonhattu*. Riddarsporre.

*D. consolida* L. — Varsi harittavasti haarova-röyhyinen; mesikannus yksikertainen; hedelmys yksinäinen, kalju; lehdet hienojakoisia. — ☉ 6, 7 punasin. k.

Vilj. harv. (A. T. U. H.) *Varsi parin vaaksan pit. harvakukkaisilla tertuilla.*

Muist. — Kukkamehusta saadaan alunoin sinistä lakkiä.

### 4 parvi. — *Pæoniæ*.

#### ACTÆA L. *Ronnanmarja*. Paddbär.

*A. spicata* L. — Terttu munanmoinen; lehdet toistain — kolmesti 3-sormisesti jakoisia. — 24 5, 6 valk. k.

Leht. (E. — L. Lv.) *Terttu yksinäinen; marjat mustia.*

Muist. — Juurakko puuroksi valmistettu ja pantu rauhauskovettumille saapi ne peräymään. Pidetään vahingollisena eläimille. Yksi ainoa marja on kanoja sekä muita lintuja surmannut. Väkevä juuriliemi karkoittaa luteet. Marjamehusta saadaan alunoin mustaa läkkiä.

### PÆONIA L. Peijona. Pion.

*P. anomala* L. — Lehdet 3-sormisesti jakoisia; lehdykät soikeita, parijakoisia suikeilla, suipoilla, pykälätaisilla liuskoilla; hedelmäksiä 5, ohut-vanukkeisia t. kaljuja, ulospäisiä. — 2/7.

Hietarant. harv. (Lv.) *Pensastava*, noin 2 kyynärän pituinen kasvi isoilla, 2—4 tuuman levyisillä, tumman-punaisilla kukilla. — *P. intermedia* Fr. (eikä Meyer).

## 42 heimo. — PAPAVERACEÆ. Unikkokasveja.

### PAPAVER L. Unikko. Vallmo.

*P. nudicaule* L. — Kota tönkeäkarvainen, nuijamainen; vana paljas, 1-kukkainen; lehdet parijakoisia leveän-sukeilla, väl. syväpykeisillä liuskoilla. — 2/6, 7 kelt. k.

Tunt. harv. (Lv.) *Tupastava kasvi*. — *P. radicum* Rottb. *P. alpinum* Fr., H. M. F.

### CHELIDONIUM L. Keltamo. Svalört.

Ch. majus L. — Kukat sarjassa; lehdet pariosaisia, liuskaisilla lehdyköillä. — 2/5—8 kelt. k.

Kiviseinäin ja huoneitten vier. (A. — K. St. H. Kv.) *Koko kasvissa on ruskeankeltaista mehua*.

Muist. — On vesityttävä ja löysäävä. Sen keltaista mehua käytettiin savipuolen voiteeksi ja myös silmäverhon eli kaihen parantamiseksi. Keitesako on väl. ollut avullinen rinta-, vesi- ja vilutaudeissa.

## 43 heimo. — FUMARIACEÆ. Emäkkeisiä.

### CORYDALIS Pers. Siurunfannu. Nunneört.

*C. solida* Sm. Täyteinen siurunfannu. — Lehdet toistain 3-sormisesti jakoisia monihalkoisilla lehdyköillä; suojukset monihalkoisia; vartalo tyveltä polvimutkainen, sitte suora; sisälehtien selkä soukka- ja lyhytsiipinen. — 2/5 pun. k.

Leht. harv. (A. — K. St. H.) *Terttu tav. harsumpi ja runsaskukkaisempi sekä pidemmillä kukkaperillä k. seur. lajiin*.

*C. laxa* Fr. *Wetito fiurunfannus*. — Lehdet, suojukset ja terälehdet ed.; vartalo polviton; hedelmän perä m. soukkasuikean kodan pituinen. — 2½ 5 pun. k.

Leht. harv. (A. T. St.) — *Fumaria bulbosa* α. *L. Fl. Sv.*

*C. fabacea* Pers. *Wähä fiurunfannus*. — Lehdet ed.; suojukset kokonaisia; vartalo polviton; terän sisälehtien selkää leveällä, paljon yli terälehden päätä ulottuvalla siivellä. — 2½ 5 pun. k.

Leht. harv. (A. St.) 3—5 tuuman pituinen, harvakukkainen; suojukset hyvin harv. loiva-pykeisiä. — *Fumaria bulbosa* β *L.*

#### FUMARIA L. *Emäffi. Jordrök.*

*F. officinalis* L. — Lehdet toistain pariosaisia, suikealiuskaisia; verholehdet  $\frac{1}{3}$  terän pituisia, puikeita; hedelmät palloeroisia, hienokoleita, lanttopäisiä. — ☉ 6, 7 pun., harv. valk. k.

Viljelömaissa, tav. (E. — P. Kv.) *Muin pystöinen, muin köynneltä; hedelmät munuamaisehkoita.*

Muist. — Sangen katkera. Kiit. avulliseksi perna- ja pöhötaudissa, kerpukissa, ja vatsan huonoudessa. Käyt. osittain sokurin kanssa keitetynä, osittain teenä. Tuore puserrettu mehu, annettu 1—2 lusikallista eräänsä maidonherassa, hyvä keltataudissa, maksataudissa ja moninaisissa ihovioissa.

#### 44 heimo. — CRUCIFERÆ. Ristikukkaisia.

##### 1 parvi. — *Lomentææ*.

#### BUNIAS L. *Ufonpalko. Långrofva.*

*B. orientalis* L. — Litukat vinopuikeita, kyhmyisiä, siivettämiä; aliset lehdet m. parikaarteisia isolla suipukalla päätöliuskalla, yliset kokonaisia suikeita. — 2½ 6, 7 kelt. k.

Viljelömaissa, harv. (A. — K. S. Kv.) *Iso, ransaskukkainen kasvi; lehdet epähampaisia. — Lælia Reich.*

#### RAPHANUS L. *Retiffa. Rättika.*

*R. raphanistrum* L. — Lehdet parikaarteisia tasamukaisilla liuskoilla; liskot lop. nivelikkäitä, juomuisia t. uurteisia. — ☉ 7, 8.

Pelt. ja viljelöm. (E. — P. Kv.) *Liskot väl. syvä-uurteisia: kukat tav. vaaleankeltaisia, vähän sinipunervilla suonilla, joskus ihan keltaisia kuin Peltonarskulla, mutta helposti erotettavia kiinteistä verhostansa. — Raphanistrum segetum Reich. R. innocuum Mönch.*

## CAKILE Scop. Rantafinappi. Strandsenap.

*C. maritima* Scop. — Lehdet parihalkois-liuskaisia, parijakoisia t. mutkalaitaisia, möyheitä; lidun ylinen pesä nuolikantainen, litteämäinen. — ☉ 7, 8 sinipun. k.

Merirant. harv. (St. U. Ke.) *Tav. rento.* — *Bunias cakile* L.

2 parvi. --- **Brassiceæ.**

## BRASSICA L. Raafi. Kål.

*Br. campestris* L. Peltosaafi. — Juuri soukka; varsilehdet herttapuikeita t. pitkulaisia, syvästi sepokantaisia, kaljuja, sinertäviä; aluslehdet lyhyrhampaisia, ruodikkaita, kalseahkoita. — ☉ 7 kelt. k. — β *rapa*: juuri paksu, möyheä (nauris), 2-vuotinen.

Pelt. tav. (E. — L. Lv.) — β *Br. rapa* L. on yleisesti viljelty kasvi: *Nauris*.

*Br. napus* L. Turnipfi. — Juuri tappimainen; varsilehdet suikeita, soukemmalla, m. nuolimaisella sepokannalla, ynnä lyhyrmäisten, ruodikasten aluslehtien kanssa kaljuja. — ☉ 6, 7 kelt. k. — β *rapifera*: juuri paksumpi, tappimainen.

Pelt., merirant. harv. (A.) *Verho avonainen m. k. Narskusuvulla.* — β viljellään siellä ja täällä: *Turnipsi*.

## EUTREMA RBr. Sapinpalko.

*E. Edwardsii* RBr. — Aluslehdet 4—5 kertaa pidemmillä ruodeilla, tasaisia, kaljuja, 1-suonisia, tav. ehytlaitaisia; aliset varsilehdet lyhytruotisia, yliset m. ruodittomia; kukkia 7—10 tiheässä huiskilossa. — 4 7 valk. k.

Tunt. harv. (Lv.) 2—3-tuumaisella, kaljulla, haarattomalla varrella. — *Draba lævigata* Schlecht.

## SINAPIS L. Raräfu. Senap.

*S. arvensis* L. Peltonaräfu. — Liskot liekeitä, kyhmyisiä siirottavia; vartalo nelikolkkais-keilamainen, liskoa lyhempi, kalju; lehdet puikeita, jurahampaisia t. parikaarteis-liuskaisia; varsi kalsea. — ☉ 6—8 kelt. k. — β *ambigua*: liskot kalseita.

Pelt. (A. — U. St.; β U.) β:lla on varsi siirottavampi-haarainen; lehdet kaikki lyhytruotisia, liuskaisia, nuolikantasehkoita: *S. arvensis-Schkuriana* Reich.

*S. alba* L. Walfesijemen-naräfu. — Liskot tönkeä-karvaisia, leveästi harittavia, m. lyhemmät kalpamaista vartaloa; lehdet kannalta parihalkoisia ja liuskaisia. — ☉ 7—9 kelt. k.

Pelt. harv. (U. St. Pe.)

Muist. — Siemenistä sama hyöty, kun seuraavanki kasvin.

### MELANOSINAPIS DC. Sinappi. Svartsenap.

*M. communis* Spenn. — Liskot varsimyötäisiä; lehdet parikaarteisia, ylisimmät kokonaisia, kaljuja kuin varsiki. — ☉ 6, 7 kelt. k.

Viljelömaissa, harv. (U.) — *Sinapis nigra* L., *H. M. F. Brassica nigra* Koch.

Muist. — Siemenistä jauhettuna ja sekoitettuna etikalla ja happamalla leivällä saadaan Sinappi-taikinaa, jota sidotaan iholle pistoksia, kolotuksia ja muita sisänäisiä kipuja vaimentamaan. Sinappi-jauhoja kiitetään hyväksi savipuolia ja päänrupia parantamaan. Vesi- ja vilutaudissa, kuivataudissa, rampausvioissa, kerpukissa ja muissa on sinappi sisälle ottaen välistä avullinen ollut.

### 3 parvi. — *Sisymbrieæ*.

#### ERYSIMUM L. Ufonnauriä. Rym.

*E. hieraciifolium* L. Rantaheinä ufonnauriä. — Varsipystöinen, kulmikas; lehdet suikeita, harseasti nyhäsahaisia, haara-karvaisia; kukat kahta, liskot monta kertaa periä pidemmät, m. pystöisiä. — ☽ 5, 6 kelt. k.

Kuiv. paik., etenki meren luot. ja tunt. (A. — K. St. Pe. P. Lv.) *Liskot toisintelevat varsimyötäisinä ja sirottavina.* — *Cheiranthus alpinus* Wg. *Fl. L.*

*E. cheiranthoides* L. Pelloheinä ufonnauriä. — Lehdet suikeita, ehytlaitaisia t. harsuhampaisia; liskot kahta pidemmät ulospäisiä periä. — ☽ 6—8 kelt. k.

Viljelömaissa, tav. (E. — P. Kv. Lv.) *Liskot kaarevasti kokenovia m. harvittavilla perillä; kukat pienemmät k. ed.*

#### SISYMBRIUM L. Pernaruoho. Stillfrö.

*S. officinale* Scop. Äimäliäfoinen pernaruoho. — Haarat leveästi harittavia; liskot lyhyitä, äimämäisiä, varsimyötäisiä; lehdet taasliuskaisia. — ☉ 7—9 kelt. k.

Kylätien., teillä (A. — K. St. H. S.) — *Erysimum* L. *Chamaepitium* Wallr.

Muist. — Käyt. kerpukin ja rintatautien lääkkeeksi.

*S. sophia* L. Neulaliäfoinen pernaruoho. — Terälehdet verhoa lyhemmät; varsilehdet toistain hienosti parijakoisia; liskot rihmahoikkia, sirottavia. — ☉ 7 kelt. k.

Kuiv. paik. tav. (E. — P. Kv.) *Terälehdet ulottavia heteitä puolta lyhemmät.*

Muist. — Kiit. hyväksi kohtutaudissa; siemenet vasten matoja sekä punatautia.

### ALLIARIA Adans. Palkolauffa. Lökrum.

*A. officinalis* Andrz. — Lehdet herttamaisia, ruodikkaita, mutkahampaisia. — 5 valk. k.

Leht. harv. (A. T.) *Erysimum alliaria* L. *Sisymb. alliaria* Scop.

Muist. — Kynsilaukan hajuinen ja makuinen. Vesityttävä ja löysäävä, käyt. sisällisestä sulkua, ulkonaisesti mätähaavoja vasten. Kun lehmät sitä syövät, saa maito sipulin maun.

### HESPERIS L. Sillaffo. Nattviol.

*H. matronalis* L. — Terälehdet vastopuikeita; varsilehdet puikean-sukeita, suipukoita, mutkahampaisia; liskot kulmikas-liereitä, kaljuja. — 6, 7 valk. t. punasinerv. k.

Metsämaissa, rann. harv. (A. T. Kv.) *Kyynärän pituinen. hyvän-hajuisilla kukilla, jonkatähden viljellään. Itsestään kasvava on tav. valkeakukkainen ja m. hajuton: H. inodora* L. *Sp. pl.*

### 4 parvi. — Arabideæ.

#### DENTARIA L. Hammasjuuri. Tandört.

*D. bulbifera* L. — Lehdet vuorottaisia, 2—3-parisia, päätlehtisiä; yliset kokonaisia sipuliumpuilla lehtihangoissa. — 5 vaaleanpun. k.

Leht. harv. (A. T. U.) *Lehdykät suikeita.*

#### CARDAMINE L. Rraši. Ängskrasse.

† Lehdet parijakoisia.

*C. amara* L. Puroraši. — Varsi lop. kasvattava lehtivesoja haarahangoista; lehdet 2—5-parisia; lehdykät kaikki pyöreämaisiiä — pitkulaisia, kulmahampaisia; terälehdet vastopuikeita; liskot äimämaisellä vartalolla, kahta pidemmällä kun liskon leveys. — 5, 6 valk. k.

Hetepuroissa j. n. e. (A. — K. St. — Kv.) *Tuttu pitkävetisestä vartalosta, sekä ruskean-sinervistä ponsista.*

*C. pratensis* L. Sjöraši. — Aluslehtien lehdykät pyöreämaisiiä, kulmahampaisia, varsilehtien suikeita, tav. ehytlaitaisia; terälehdet vastopuikeita; liskot sangen lyhytvartaloisia. — 5, 6 valk. t. sinikiuht. k.

Vetis. niit., ojissa, tav. (E. — L. Lv.) *Isompikukkainen kun muut, keltaisilla ponsilla; lehdet 5—moniparisia.*

Muist. — Sen mehu on hyödyllinen nautittaa kerpukissa. Kukut ja siemenet hyvät suonenvedossa ja vävähtelemisissä. Kukoistaa keväällä lahnankudun aikana.

*C. parviflora* L. *Œuftraefi.* — Kaikki lehdykät pitkulaisia t. tasasoukkia, ehytlaitaisia, ei korvakkeisia; terälehdet pitkulais-lapiomaisia; liskot noin kahta vertaa pidemmät sirottavia periä. — ☉ 6—9 valk. k.

Tulvapaik. harv. (T. U.) *Varsi muin rento, muin pysty, 3—10-tuumainen, haarova, pienikukkainen; terälehdet verhoa kahta pidemmät; aluslehtien lehdykät pyöreämuotoisia, väl. hammaslaitaisia niinkuin varsilehdetki. Kukoistaa vedenkorkeuden mukaan kevästä syksyyn myöhäiseen. Maku kuin Indian krassilla.*

*C. hirsuta* L. *Œhoftraefi.* — Varsi tav. suora, harvalehtinen; varsilehdet 2—4-parisia, hammaslaitaisilla lehdyköillä; terälehdet pitkulais-kieloisia; heteitä 4; liskot 3 kertaa periään pidemmät, lyhemmällä vartalolla kun liskon leveys. — ☉ 5, 6 valk. k.

Metsämaissa j. n. e. harv. (T.) *Alkukukkiessa sormenpituinen, vanhempana 6—8-tuumainen; terälehdet 1—1½ linjan pituisia.*

†† Lehdet kokonaisia.

*C. bellidifolia* L. *Œapin traefi.* — Lehdet kaikki kokonaisia, puikeita, ehytlaitaisia, pitkärutotia. — ☉ 7, 8 valk. k.

Kork. tunt. (L.) *1—2-tuumainen varsi, aluslehtiä muin pidempi, muin lyhempi.*

#### ARABIS L. *Pittäpaffo.* Glis.

*A. hirsuta* Scop. *Œhoineen pittäpaffo.* — Kukut periään pidemmät; terälehdet pystöisiä, pitkulaisia; varsilehdet pitkulaisia, sahalaitaisia, vähän sepokantaisia; liskot pystöisiä, varsimyötäisiä. — ☉ 5, 6 valk. k. —  $\beta$  sagittata: järeämpi; lehdet sormen levyisiä, sepivällä nuolikannalla; siemenet kalvopalteisia.

Niittumäissä, harv. (A. T. Kv.;  $\beta$  A.) — *Turritis* L. —  $\beta$  *A. sagittata* DC.

*A. alpina* L. *Œapin pittäpaffo.* — Kukut periä lyhemmät, vastopuikeilla, ulospäisillä terälehdillä; varsilehdet puikean-pitkulaisia, sepokantaisia, ynnä vastopuikeitten aluslehtien sahapampaisia ja lienteitä; liskot sirottavia. — ☉ 7 valk. k.

Tunt. (L. Lv.) *Varsi tyveltä rento ja kasvattava haaroja, peräkkään valmistuvia ja kukkivia; kukat isompia kun muilla lajeilla.*



*A. petræa* Lam. Sora-pittäpaffo. — Kukat periään pidemmät; terälehdet vastopuikeita; aluslehdet hammaslaitaisia t. liuskaisia; varsilehdet m. tasasoukkia, ehytlaitaisia; liskot siirrotavia, latvalta kyhmyinäisesti laajenneilla perillä. — 2 6, 7 valk. t. punasinert. k.

Sorarant, harv. (Kv. L.) *Isommilla kukilla k. seur., tav. kaljulla varrella.* — *Cardamine* L.

*A. suecica* Fr. Ruotfin pitäpaffo. — Harsukarvainen; aluslehdet vastopuikeasti pitkulaisia, parikaarteisia; varsilehdet monilukuisia, suikeita; perät siirrotavia, kukkain pituisia; liskot ed. vähän laajenneella pohjuksella. — 2 5, 6 valk. k.

Kuiv. paik. tav. (E. — P. Kv.) *Terälehdet lapiomaisia, kahta isommat, kun seur.; verholehdet kellahtavia.* — *A. arenosa*  $\beta$  *macilenta* Hn. *Sisymbrium arenosum* L. *Fl. Sv.*

*A. Thaliana* L. Mähehin pitäpaffo. — Kukat tav. lyhemmät periä; terälehdet kieloisia; aluslehdet pitkulaisia t. soikeita, m. ehytlaitaisia; varsilehdet suikean-tasasoukkia, ehytlaitaisia; liskot ed. — 2 5, 6 valk. k.

Kuiv. paik. (A. — K. St. — Kv. Lv.) *Vaaksan pituinen, hoikka, vähäisillä väl. loivahampaisilla aluslehdillä.* — *Conringia* Reich. *Sisymbrium* Koch.

#### TURRITIS L. Pöiffyheinä. Räckentraf.

*T. glabra* L. — Aluslehdet mutkahampaisia, lienteitä; varsilehdet sepokantaisia, ehytlaitaisia, kaljuja; liskot periään monin kerroin pidemmät. — 2 6, 7 vaaleankelt. k.

Kuiv. paik. (A. — K. St. — Kv. Lv.) *1—2 kyynärän pituinen, sinivihreä kasvi.* — *Arabis perfoliata* Lam.

Muist. — Siemeniä murskattuina nautitaan paikoin pistotautia vasten.

#### BARBAREA RBr. Rananfaafi. Vinterkrasse.

*B. stricta* Fr. Beteinen rananfaafi. — Aluslehtien päätoliuska pitkulais-puikea; varsilehdet hyvin isolla, soikealla päätoliuskalla, sivuliuskat vähäisiä t. ei ollenkaan; terälehdet kapean-nalkkimaisia, typpäköitä; liskot varsimyötäisiä, lyhyellä m. tasapaksulla vartalolla. — 2 6, 7 kelt. k.

Kost. niit., rant. tav. (E. — L. Lv.) *1—3 jalan pituinen, vanhempana pitkillä pystöisillä tertuilla, tuuman pituisilla liskoilla; kukat kahta vähempiä kun seur., us. vanhempain liskoin peittämiä; aluslehtien päätoliuska väl. vähän herttakantainen.* — *B. vulgaris*  $\alpha$  Wg. *Erysimum barbarea*  $\beta$  L.

*B. vulgaris* RBr. Pientareinen rananfaafi. — Aluslehtien

päättöliuska herttamais-pyöreä; varsilehdet jyreästi mutkahampaisia t. parijakoisia; terälehdet leveän nalkkimaisia, lanttopäisiä; liskot tav. siirottavia, soukempi-vartaloisia. — 2½ 7 kelt. k.

Pellonpient., ojissa, harv. (A. T. K. Kv.) 1—2 jalan pituinen, runsailla heleän-keltaisilla tertuilla, 6—10 linjan pituisilla liskoilla. — *Erysimum barbarea* α L.

Muist. — Hyvä ja terveellinen salatiksi talvis-aikana.

NASTURTIIUM RBr. Nenätti. Vattenkrasse.

† Kukat valkeita.

N. armoracia Fr. Piparuutti. — Terälehdet verhoa pidemmät; aluslehdet puikean-pitkulaisia, kokonaisia, tylppäsahaisia; varsilehdet suikeita, kokonaisia ja sahalaitaisia t. parihalkoisia; lidut soikeita. — 2½ 6, 7.

Veden vaih. harv. (T. U. S.) Pitkä kasvi, hyvin isoilla aluslehdillä. — *Cochlearia* L. *Armoracia rusticana* Koch.

Muist. — Juuri kaavittuna tuttu ruokaryyti tuoreen lihan ja kalan kanssa. Käytetään myös juomassa, viinissä tai maidossa liotettuna lääkkeeksi jäsenkolotusta, ruusua, vesitautia, kerpukkia, rinnan-ahdistusta ja kivitautia vasten, joko yksinään taikka sekaisin katajamarja-siirapin tai männynkerkkäkeitteen kanssa. Ulkonaisesti ienlihalla pidettynä lievittää se hammastautia. Saattaa myös monessa muussaki sisänaïisessä kivussa, vatsan väänteissä j. n. e. lievitystä, jos sitä iholle asetetaan.

†† Kukat keltaisia.

N. amphibium RBr. Beñinenätti. — Terälehdet verhoa pidemmät; yliset varsilehdet suikeita, aliset parijakoisia; lidut m. palleroisia, vartalon pituisia. — 2½ 7, 8.

Ves. harv. (St. H. Ke. Kv.) Alimmaiset lehdet väl. Retikan lehden muotoisia, vedenalaiset us. hienosti parijakoisia.

Muist. — Vesityttävä; avullinen kerpukissa, matovaivoissa; siemenet taitaan käyttää sinapin asemesta vaikka pöytäanki.

N. sylvestre RBr. Rantanenätti. — Terälehdet pidemmät verhoa; varsilehdet parijakoisia; liskot tasasoukkia, litteämäisiä, kaksisärmäisiä, monin kerroin vartaloa pidemmät. — 2½ 7, 8.

Rant. harv. (A. T. U.) Liskot ensimmältä rihmamaisia, lop. m. kalpamaisia, perien pituiset. — *Sisymbrium* L.

N. palustre DC. Suomenätti. — Terälehdet verhon pituisia; varsilehdet parijakoisia; lidut pitkulaisia, pullakat, kummas-taki päästä ja sivuilta tylppämaisiet; vartalo sangen lyhyt. — ☉ 6—9.

Vetis. paik. tav. (E. — L. Lv.) — *Sisymbrium amphibium* β  
L. *Sisymbrium islandicum* Fl. D. *Roripa* Bess.

### 5 parvi. — Nucamentes.

ISATIS L. Morjinfo. Vejde.

I. tinctoria L. — Litukat pitkulaisia, soukkakantaisia, päästä pyöreämaisiiä, kaljuja; aluslehdet hienohampaisia; varsilehdet nuolimaisesti sepokantaisia. — ☉ 7 kelt. k.

Kuiv. paik., etenki merirant. harv. (A. T. U. St.) *Kukat pieniä, ei paljon yli linjan pituisia; lehdet suikeita.*

Muist. — Sisältää ehta siniväriä (indigoa) ja kasvatetaan sen vuoksi lihavassa santamaassa. Siemenet kylvetään ohuelta tyynessä ilmassa. Itävät 4:ssä viikossa ja ovat sitte nousneena taidolla ruokottavat.

NESLIA Desv. Öhräheinä. Korndädra.

N. paniculata Desv. — Lehdet suikeita, sepokantaisia, karheita; litukat kurttuaisia. — ☉ 7, 8 kelt. k.

Viljelömaissa, harv. (T. U.) — *Myagrum* L. *Rapistrum* Gärtn.

### 6 parvi. — Lepidineæ.

LEPIDIUM L. Roufuruoho. Krasse.

L. ruderale L. — Litukat pyöreämaisiiä, m. vartalottomia, terälehdet puuttuvia; heteitä 2; aliset varsilehdet yksi- t. toistainparijakoisia, yliset kokonaisia, tasasoukkia. — ☉ 5—9.

Seinävier. j. n. e. tav. (E. — Pe. Kv.) *Kukat sangon pieniä; pahahajuinen.*

Muist. — Puserrettua mehua on sanottu hyödylliseksi kivitaudissa. Sen väkevä haju hoetaan karkoittavan luteet.

CAPSELLA Mönch. Rutuŕffa. Lomme.

C. bursa-pastoris Mönch. — Aluslehdet kokonaisia t. parihalkoisia; varsilehdet nuolikantaisia. — ☉ 4—9 valk. k.

Pelt. j. n. e. tav. (E. — L. Lv.) *Lehdet toisintelevat kokonaisina, mutkahampaisina ja parihalkoisina.* — *Thlaspi* L.

Muist. — Käyt. ennen lääkkeeksi vilutautia j. m. vasten.

THLASPI L. Tasŕfuheinä. Skärffrö.

Thl. arvense L. — Kalju; litukat pyöreämaisiiä, siipilaitaisia, syvällä, kapealla lovella päässä; lehdet suikeita, nuolimaisesti sepokantaisia, hammaslaitaisia. — ☉ 6, 7 valk. k.

Pelt. tav. (E. — L. Lv.) *Litukat kynnen kokoisia, m. tasa-soukalla lovella pädsään, monisiemenisiä; aluslehdet pian kuituvia.*

Muist. — Tästä ruohosta, jos lypsylehmät sitä runsaammin syövät, saavat maito, voi ja juusto pahan maun. Vuoteisiin pantuna sanotaan karkoittavan luteet. Siemenistä saadaan runsaasti öljyä.

### 7 parvi. — Alyssineæ.

CAMELINA Crantz. Ritupellawa. Lindådra.

C. sylvestris Wallr., Fr. Tanfa Ritupellawa. — Litukat perunanmoisia, tankealaitaisia, hienosti karhea-pilkkuisia, litteämäisesti 2-syrjäisiä, pyöröpäisiä, pitkäveteisellä vartalolla otana; lehdet suikeita, ruodittomia, nuolikantaisia, m. ehytlaitaisia, ynnä varren kanssa tankeamaisia. — 5, 6 vaaleankelt. k.

Pelt. harv. (A. U. H. S. K. Pe.) Tav. 2—3 *vaaksan pit., kal-seankarhea, etenki tyvipuolelta, väl. kalju.* — *Myagrum sativum* L.

C. foetida Fr. Hentoinen Ritupellawa. — Litukat vastomunaisia, m. palleroisia, pullakoita, hienosti verkkosuonisilla, ohuilla laidoilla, epäselvällä syrjällä, poikki- t. m. lanttopäisiä, lyhytvartaloisia, aliset lop. nuokahtavia; lehdet soikeita, ohuita, soukkenevalla nuolikannalla; varsi hoikka, haarikas. — 7, 8 vaaleankelt. k.

Pellavasmaissa (E. — Pe. Kv.) *Hentoisempi edellistä, kalju, heleänvehreä; litukkain laidat nuorempina hyvin velttoja; toisinteleä kokonaisilla ja pariliuskaisilla lehdillä: C. dentata Pers., H. M. F.*

### ALYSSUM L. Harmio. Grådådra.

A. incanum L. — Lehdet suikeita; terälehdet 2-halkoisia; litukat hienosti harmaanhöyteitä. — 7 valk. k.

Kuiv. paik. harv. (U. — K. H. — Kv.) — *Farsetia* RBr. *Berteroa* DC.

### COCHLEARIA L. Ruiriruoho, Ruirimo. Skörbjuggsört.

C. anglica L. Pohjan Ruirimo. — Aluslehdet puikeita, väl. loivaan herttakantaisia; varsilehdet suikeita t. pitkulaisia, vähän sepokantaisia; litukat soikeita — suikeita. — 6, 7 valk. k. —  $\beta$  fenestrata:  $\frac{1}{2}$  perän pituisella litukalla, rakoisella välikelmulla. —  $\gamma$  arctica Schlecht.: pienempi kooltansa; litukat lyhempiä, vartaloa 5 kertaa pidemmät, noin 4-siemenisiä.

Merirant. harv. (Kv. Lv.;  $\beta$  Lv.;  $\gamma$  Lv.)  $\frac{1}{2}$  *kyyndärän pituinen; päälaji 6—12-siemenisillä, vartaloa 8—10 kertaa pidemmällä litukoilla.*

*C. danica* L. *Utelä-fuirimo*. — Lehdet m. kaikki epäneli-siä t. munuamaisia, kannalta keihäskulmaisia; litukat pyöreän-puikeita. — ☉ 5, 6 valk. k.

Kiv. merirant. harv. (A. T. U. St.) *Tuttava m. kolmikkomai-sista ja ruodikkaista varsilehdistänsä*.

DRABA L. *Rynjimö*. Vår-älskling.

† Terälehdet 2-halkoisia: *Erophila* DC.

*Dr. verna* L. *Rewätfynjimö*. — Vana paljas; litukat pit-kulaisia — soikeita, periään lyhemmät. — ☉ 5 valk. k.

Kuiv. paik. tav. (A. — K. St. — S.) *Kukkivana tuuman pi-tuinen soikeilla t. pitkulaisilla aluslehdillä, sitte 3—4-tuumainen*.

Muist. — Päätt kallistuvat alas yöksi ja muutonki märän ilman edellä.

†† Terälehdet kokonaisia t. lovipäisiä.

*Dr. nemorosa* L. *Reltäfynjimö*. — Litukat pitkulais-pyö-reitä, puolen peränsä pituisia; lehdet puikeita, sahalaitaisia; terä-lehdet lovipäisiä; heteitä 6. — ☉ 5 kelt. k.

Hietaharj. raun. harv. (U. S. K. Kv.) *On ensin keväällä m. varretton, sitten us. iso ja haarova pitkiksi tertuiksi; litukat tav. lienteitä, harv. kaljuja*. — *Dr. lutea* Gilib.

*Dr. incana* L. *Farmaa-fynjimö*. — Varsi 3 — monilehti-nen, tiheästi ja hienosti tähtikarvainen niinkuin lehdetki; lidut pitkulais-veteisiä t. suikeita, kierteisiä, paljon periään pidemmät; lehdet puikeita — suikeita, saharhampaisia. — ☉ 5, 6 valk. k.

Kuiv. paik. harv. (E. — Pe. L. Lv.) *Lidut tav. lienteitä, väl. kaljuja; tyveltä tav. rönsyävä, joskus rönsytön*. — *Dr. confusa* Ehrh.

*Dr. hirta* L. *Uapin fynjimö*. — Varsi tav. 1—4-lehtinen. tähti- t. hienokarvainen; lidut munais-pitkulaisia — suikeita, nä-kymättömällä t. sangen lyhyellä vartalolla; varsilehdet puikeita — suikeita, 1—3 saharhammasta laidoissa. — ☉ 6, 7 valk., harv. kellaht. k. — *β rupestris* RBr.: 1—2 vaaksan pituinen, veltto, harvemmin tähtihöyteä ja karvainen; lidut leveämpiä, pitkulaisia, epävartaloisia; kukat aina valkeita.

Tunt. (P. L. Lv.; *β* Lv.) *Toisintele paljon*. — *β Dr. hirta α inferalpina* Wg.

*Dr. nivalis* Liljebl. *Uumifynjimö*. — Varsi ja kukkaperät tähtihöyteitä; lidut suikeita, kaljuja; lehdet kieloisia, ehytlaitai-sia, harmaita tiheästä tähtihöyteestä. — ☉ 6, 7 kellakan valk. k.

Tunt. harv. (L.) *Kukkivana tav. 1—1½ tuuman pituinen. lop. m. 3-tuumainen; tuttava höyteen vuoksi vaaleanharmaista leh-*

*distä, joilla ei ole pidempiä karvoja. — Dr. muricella* Wg. *Dr. Liljebladii* Wallm.

*Dr. alpina* L. Tunturifynsimö. — Varsi ja kukkaperät hienokarvaisia; lehdet suikeita, ehytlaitaisia, karvaisia; litukat munaisen soikeita, m. kaljuja, lyhytvartaloisia. — 2 6, 7 kelt. k.

Tunt. (L. Lv.) Tuttava jotenkin isoista, heleän-keltaisista kukistaan; varsi m. aina lehdetön, hedelmän valmistuessa us. vaaksan pituinen.

## SUBULARIA L. Äimäruoho. Sylört.

*S. aquatica* L. — Varsi vananmoinen äimämäisillä lehdillä tyvässä. — ☉ 7, 8 valk. k.

Rant. (E. — L. Lv.) 1—1½ tuuman pituinen, ynnä lehdetömän, lehtihankaisen kukkavanansa kanssa; kukat pienät, tertutaisia.

## 45 heimo. — POLYGALACEÆ. Linnunruohoisia.

*POLYGALA* L. Linnunruoho. Jungfrulin, Fogelört.

*P. vulgaris* L. Uhoinen linnunruoho. — Isompain verholehtien suonet lehden laidalla verkkomaisesti yhdessä; varsilehdet tasasoukkia — suikulaisia, alimmat lyhempiä, soikeita; suojuslehdet soikeita, kukkapoimeja aina lyhemmät; kota paljon lyhempi verholehtiä. — 2 6, 7.

Niittumäissä, harv. (A. T. K. Kv.) Kukat isompia k. seuraavalla, tav. selväsinisiä, harv. valkeita t. kalkkisekaisella maalla punaisia.

Muist. — Vasten käärmeenpistoa käytetty. Uskotaan lisäävän maitoa lehmissä.

*P. amara* L. Uroinen linnunruoho. — Verholehtien suonet päistä erillään; varsilehdet ed., alimmaiset isompia, lapiomaisia; kota m. verholehtien pituinen. — 2 6, 7 sin. t. vaalahtavilla k.

Kost. niit. j. m. harv. (A. U. S. — Kv. Lv.) Tav. haarova tyveltä useiksi, 2—3 tuuman pituisiksi varsiksi, vähemmällä kukilla k. ed.; lehdet varren tyvellä pidempiä ja leveämpiä, k. aliset varsilehdet. — *P. uliginosa* Reich., *H. M. F.*

## 46 heimo. — BALSAMINACEÆ.

*IMPATIENS* L. Häpyfannus. Springkorn.

*I. noli-tangere* L. — Perät yksinäisiä, useilla rippuvilla kukilla; lehdet puikeita; varren nivelet turpeita. — ☉ 7, 8 kelt. k.

Varj. ja kost. paik. (E. — Pe. H. — Kv.) Kukat isoja, hienoista

*peristä rippuvia. Väl. jäädvät kukkapoimet pieniksi ja valmistumattomiksi, mutta kasvattavat kuitenkin kypsiä hedelmiä.*

Muist. — Lehdet ja kukat sisältävät kaunista keltaväriä ainetta, jota sanotaan käytettävän Pohjois-amerikassa ja myös Kasanissa puumulin värjäyksiin.

#### 47<sup>i</sup> heimo. — TILIACEÆ. Lehmuskasveja.

TILIA L. Lehmus. Lind.

*T. parvifolia* Ehrh. Niint-lehmus. — Kukat monikukkaisessa huiskilossa, huiskiloa pidemmällä suojuksella; lehdet vinoherttaisia, terävä-sahaisia, kaljuja, alta sinivehreitä, suonihangoissa villaisia; kota m. perunanmoinen, kehnäishöyteä, pehmeäkuorinen. — h 7 vaaleankelt. k.

Niittumäissä, leht. (E. — Pe. Kv.) Pitkä puu hyvänhajuisilla kukilla, m. huiskilomaisessa röyhyssä, jonka perässä on pitkä, kellakka suojuislehti. — *T. europæa* L. *T. sylvestris* Desf. *T. ulmifolia* Scop.

Muist. — Kukista saadaan tislaten hyvää vettä, joka sisällisesti on lievittävää. Niitä käyt. siteeksi särkyihin, polttohaavoihin, jalanpolttoon ja kuori vedessä liotettuna köysiksi ja matoiksi. Puu on löyhää. Kasvatetaan siemenistä, jotka kypsyvät lokakuussa, tahi juurivesoista keväällä.

#### 48 heimo. — MALVACEÆ. Malvakasveja.

MALVA L. Malma. Kattost.

*M. borealis* Wallm. — Varsi rento; lehdet munuais-pyöreitä, 5—7:llä loivalla, pyöreämäisellä liuskalla; terälehdet ei paljon pidemmät verhoa; hedelmä alaspäinen, noin 10-hedelmäksinen. kohonneilla syrjillä, päältä epätasainen, lienteä. — ☉ 6—9 valk. k.

Kaduilla, teillä (E. — Pe. H. K.) Terälehdet harv. yli  $\frac{1}{2}$ :lla vertaa verhoa pidemmät. — *M. rotundifolia* L.

Muist. — Juuri imelä. Lehti-teetä tahi keitettä käyt. korlaus-vesiksi kurkun vihoissa, myös lavemangeiksi. Sisällisesti on keitevettä nautittu kivi- ja punataudeissa. Kelpaa myös kaali-ruuiksi ihmisten syödä, ja onki terveellinen.

#### 49 heimo. — GERANIACEÆ. Kurenpolvisia.

1 parvi. — GERANIÆ.

GERANIUM L. Kurenpolvi. Näfva.

† Perät yksikukkaisia.

*G. sanguineum* L. Punainen kurenpolvi. — Lehdet 5—7-

jakoisia 3—5-halkoisilla, tylppäpäisillä liuskoilla. — 24 6, 7 tummanpun. k.

Niittumäissä ja kallioilla, harv. (A. T. U. St. Pe.) *Kukat isoja, kauniita.*

†† Perät 2-kukkaisia; juuri vahva, monivuotinen.

*G. palustre* L. Uroinen kurenpolvi. — Terälehdet pyöreä-mäisiä, pidemmät m. kaljua verhoa; palhot äimämäisiä; lehdet jakauneet alle keskustan 3—5:ksi pykähampaiseksi liuskaksi; korvakkeet suikeita; hedelmykset epälienteitä, ylöspäisiä alaskaarevilla perillä; varsi koheneva. — 24 7 pun. k.

Kost. niit. harv. (T. U. Ke. S. K.) *Palhot ei kannalta paljon leveämpiä; kukat jotain vähempiä k. seur.*

*G. sylvaticum* L. Mätäinen kurenpolvi. — Terälehdet ed. karvaista verhoa pidemmät; palhot äimämäisiä; lehdet jakauneet alle keskustan 5—7:ksi pykä- ja sahalaitaiseksi liuskaksi; hedelmykset karvaisia; perät suoria, ei alaskaarevia; varsi pysty. — 24 7 punasin. t. vaalak. k.

Niit. ja metsämaissä, tav. (E. — L. Lv.) *Ylisimmät lehdet ruodittomia; karvainen kasvi.*

*G. pratense* L. Hurmeinen kurenpolvi. — Terälehdet ed. karvaista verhoa pidemmät; palhot leveämmällä, puikealla kannalla; varsilehdet jakauneet m. kantaan asti noin 7:ksi, pykä- ja hammaslaitaiseksi liuskaksi; hedelmykset karvaisia, alaspäisiä. — 24 7 vaaleansin. k.

Niit. j. n. e. harv. (T. S. Ke. K. Kv. P. Lv.) — *G. sylvaticum* Fl. D.

†† Perät 2-kukkaisia; juuri heikko, vuosinainen.

*G. bohemicum* L. Huhtainen kurenpolvi. — Terälehdet karvaisen, sukapäisen verhon pituisia, nalkkimaisia ja lovipäisiä; hedelmykset tahmea-karvaisia, sileitä pystöisillä perillä; lehdet alle keskustan 3—5-halkoisia, hammaslaitaisia; varsi tahmea-karvainen. — ☉ 7, 8.

Huhtahalm. harv. (T. — K. St. — S.) *Aliset lehdet vuorottaisia, kaikki ruodikkaita; terälehdet punervan sinisiä, ripsiläisiä ja vähempiä kun Metsäisellä kurenpolvella; hedelmykset mustia, isojen verhojen sisäisiä.*

*G. pusillum* L. Retoinen kurenpolvi. — Terälehdet lovipäisiä, ei paljon m. suattomia verholehtiä pidemmät; varsilehdet pyöreitä, 5—7-halkoisia, nalkkimaisilla, eheillä t. 2—3-hampaisilla liuskoilla; varsi ja ruodit sangen lyhytlienteisiä; hedelmykset myötäkarvaisia, alaskaarevilla perillä; siemenet sileitä. — ☉ 6—9.



Kuiv. paik., kylätien. harv. (A. T. U.) *Tav. vähäinen ja rento, väl. isompi ja pystöinen; kukat vaaleasti sinervän-punaisia.* — *G. rotundifolium* L. *Fl. Sv., H. M. F.*

*G. Robertianum* L. *Haifewa furenpołwi.* — Terälehdet vastopuikeita, 10-kulmaista, sukapäistä verhoa pidemmät; varsilehdet kantaan asti 3—5-jakoisia parihalkoisilla liuskoilla; hedelmykset kurttuaisia. — ☉ 7, 8 pun. k.

Kallioilla louhikoissa (E. — Pe. K. H. S.) *Varsi ja lehdet us. punaisia. Koko kasvi hierten haisee pahalta, kisuiselta.*

Muist. — Keitevedellä pestään haavoja, jotka siitä pikemmin paranevat; teestä pysähtyy maito imettäjissä. Karkoittaa luoteet, kun seiniä sillä hierotaan.

*G. lucidum* L. *Łoistawa furenpołwi.* — Verho kalju, 5:llä kalvomaisella kulmalla, poikkikurttuinen sukapäisillä lehdillä; varsilehdet pyöreämäisiä, alle keskustan halkaistut 3—5:ksi tylppämaisiksi, pykäläitaiseksi liuskaksi; hedelmykset kurttuaisia. — ☉ 6, 7 pun. k.

Varj. kallioilla, harv. (A.) *Varsi ja aluslehdet punaisia; koko kasvi kiiltävä, m. kalju.*

*G. molle* L. *Łelitto furenpołwi.* — Terälehdet lovipäisiä, 2-liuskaisia, verhoa pidemmät; verholehdet suippoja, suattomia, pitkäkarvaisia; varsilehdet munuais-pyöreitä, alle keskustan 7—9-halkoisia nalkkimaisilla, eheillä t. 2—3-hampaisilla liuskoilla; hedelmykset ed. — ☉ 6, 7 pun. k.

Kuiv. paik. harv. (A.) *Hentoinen ja veltto kasvi; varsi ja ruodit pehmeillä, pitkillä karvoilla; kukat pieniä; hedelmykset kaljuja.*

## ERODIUM l'Hér. ĘurennoĤa. Kamnăfva.

*E. cicutarium* l'Hér. — Siiteponsiset palhot leveă-kantaisia, hampaattomia; hedelmän ota kalsea; lehdet pariosaisia m. parijakoisilla ja hampaisilla liuskoilla. — ☉ 6, 7 pun. k.

Kyl., teillä (E. — Pe. Kv.) *Tav. rento ja tahmeakarvainen.* — *Geranium* L.

## 2 parvi. — Oxalideæ.

### OXALIS L. Ęăenfaali. Harsyra.

*O. acetosella* L. — Perăt yksikukkaisia juurakosta; lehdet 3:lla vastoherttaisella, karvaisella lehdykällä. — 2Ĥ 5 valk. k.

Kost. varjopaik. tav. (E. — P. Kv.) *Kasvi on puhtaan hap-pamen makuinen; juurakko nivelikă, suomuinen.*

Muist. — Tuoreesta keittäen saadaan Sal acetosellă, joka

on hyödyllistä poltto- ja kuumetaudeissa. Kasvin neste kadottaa mustepilkut vaatteista. Kasvi taidetaan myös salatti-ruuaksi käyttää.

3 parvi. — **Lineæ.**

**LINUM L.** Pellawa. Lin.

*L. catharticum* L. — Varsi latvempaa toishaarukkinen, vastakkaisilla lehdillä, aliset vastopuikeita, yliset m. suikeita. — ☉ 6, 7 valk. k.

Niit., laitum. (A. — K. St. Pe. Kv.) *Vaaksan pituinen.*

50 heimo. — **HYPERICACEÆ.** Kuismokasveja.

**HYPERICUM L.** Kuismo. Johannisört.

*H. quadrangulum* L. Ruhtafuismo. — Varsi pystöinen, 4:llä ei paljon kohoavalla kulmalla, kalju; verholehdet pitkänpyöreitä, tylppäpäisiä, nystyrättömiä; varsilehdet puikeita, kaljuja. — 24 7, 8 rusokellerv. k.

Metsäniit. tav. (E. — P. Kv. Lv.) — *H. dubium* Willd.

Muist. — Sopii käyttää samalla lailla, kuin seur.

*H. perforatum* L. Turmifuismo. — Varsi liereä, 2:lla kohokulmalla, pystöinen, kalju; kukat röyhysä; verholehdet suikeita, suippoja, nystyrättömiä; varsilehdet pitkulaisia, kaljuja, läpikuultavasti pilkullisia, puolisepoisia. — 24 7, 8 kelt. k.

Töyr. (E. — Pe. H. S. K.) *Kyynäräinen, runsaskukkainen. Toisintees hyvin soukkalehtisenä.*

Muist. — Kukkaröhyistä keitettyä vettä on ennen nautittu sisällisiä haavoja parantamaan keuhkotaudissa, verisylyssä, myös matovaivoissa j. m. — Maidon pilautuessa pestään astiat kuismon keitteellä. Myös painauksiin (värjäyksiin) käytetään kukkaröhyä. Kukan-alut antavat kauniin punavärin paloviinalle.

*H. hirsutum* L. Hofuismo. — Varsi pystöinen, liereä, lienteä; verholehdet pitkulaisia, lyhytvartisilla nystyröillä laidas- sa; lehdet soikeita, ruodittomia, alta lienteitä. — 24 7, 8 kelt. k.

Laitum., vuor. harv. (T.) *Yliset lehdet hienopilkkuisia, aliset väl. epäruotisia.*

51 heimo. — **CISTACEÆ.**

**HELIANTHEMUM Mill.** Päivännouto. Solvända.

*H. vulgare* Gärt. — Varsi alemmaa puisehko, kohenevilla haaroilla ja tertuilla, alaskaarevilla kukkaperillä; lehdet vastak-

kaisia, pitkulaisia, alta tav. harmaanhöykeitä, suikeilla korvakkeilla. — 2½ 7 kelt. k.

Niittumäissä, harv. (A. H. K. Lv.) *Kukat isoja, m. tuuman kokeisia, nuokkuvia.* — *Cistus helianthemum* L.

Muist. — Kauneutensa vuoksi kyllä soveljas kukkatarhoihin muuttaa.

## 52 heimo. — VIOLACEÆ. Orvonkukkaisia.

VIOLA L. Ormontukka, Ormoffi. Viol.

† Varsi lehtinen ja kukkahinen.

*V. tricolor* L. Rento-ormoffi. — Aliset lehdet hertta-puikeita, yliset suikean-pitkulaisia, harsunyhäisiä, m. kaljuja; korvakkeet isoja, parikaarteis-liuskaisia; kannus verholisäkkein pituinen. — ○ 5—9. — β *arvensis*: verho terän pituinen t. pidempi.

Vuor. pelt. ja viljelöm. tav. (E. — P. Kv. Lv.) *Toisinteele paljon kukkien värin suhteen, tav. sinipunervia ja keltaisia, väl. ihan kelt. t. valkeita.* — β:n kukat tav. vaalean keltaisia: *V. arvensis* Murr.

Muist. — On ulostuttava ja veren raitistuttava. Vasten pahaa rohtumaa (*crusta lactea*), kun vähäiset lapset saavat kasvoihinsa, liotetaan sitä maidossa, ja nautitaan teelusikoittain, tahi keitetään (teenä), otettuna kourallinen kuivia kasveja puoleen tuoppiin vettä ja vähän kiehautettuna, jota sitte nautitaan joka päivä. Pienille lapsille annetaan ikänsä jälkeen vähemmin. Makua parannetaan fenkolilla. Taikka annetaan kuivana hienonnettua ja rieskassa keitettyä illoin aamuin eli useimmin siksikun rohtuma katoaa. Sanotaan avulliseksi myös muissa pääruveissa ja useissa taudeissa, niink. ruusussa, luuvalossa, savipuolissa, kavissa, pahoissa haavoissa j. n. e. — Terälehtien mehusta saadaan siniväriä. — Villalanka alunoittuna painuu tästä kasvista jäännäksiksi.

*V. stagnina* Kit. Ranta-ormoffi. — Kalju; lehdet puikeita t. hertta-sukeita, harsu-nyhäisiä, lapa ihan vähän ruotiin johtainen; korvakkeet kaitais-pitkulaisia, hampaisia; kannus keilamainen. — 2½ 6, 8.

Kost. paik., rant. harv. (K.) *Tav. pystöinen, monivartinen; terälehdet leveän-pitkulaisia, vaalean-sinisiä t. m. valkeita; kota pitkulainen.*

*V. biflora* L. Sapiin ormoffi. — Varsi tav. 2-kukkainen; lehdet munuamaisia, nyhälaitaisia, ehytlaitaisilla korvakkeilla. — 2½ 6, 7 kelt. k.

Tunt. purolaks. (L. Lv.) *Kukat vähäisiä, selväkeltaisia.*

*V. canina* L. Aho-orvoffi. — Lehdet pitkulais-herttaisia, nyhä-sahaisia, kaljuja; korvakkeet puikeita t. pitkulais-suikeita. sahalaitaisia, aliset aina lehtiruotia lyhemmät; verholiuskat suikeita, suippoja typäkällä, teräkannusta lyhemmällä lisäkkeellä; kota pitkulainen. — 2½ 5—7 vaaleansin., väl. valk. k.

Metsämaissä, tav. (E. — L. Lv.) *Varsi tav. koheneva; toisintee 1-tuumaisena — jalan pituisena; lehdet pitkäveteisempiä leveämmillä ja eheämmillä korvakkeilla k. seur.*

Muist. — Kukista taidetaan valmistaa viola-siirappia, kun terälehdet liotetaan vedessä, keitetään ja sokuria pannaan sekaan. On hyödyllistä lapsillen yskässä. — Sienen aikana jäljättyvä maito sanotaan paranevan aho-orvokin läpi siilattuna.

*V. sylvatica* Fr. Metjä-orvoffi. — Lehdet leveän-herttaisia, nyhä-sahaisia, kaljuja t. epä-lieminkäisiä, ohuita; korvakkeet kaitais-suikeita, ripsuisia, ruotia lyhemmät; verho ja kota ed. — 2½ 5—7.

Metsäniit., leht. (A. — K. St. — Kp. Pe.) *Us. iso, aina leveälehtinen; kukat selväsinisiä t. joskus vaalakoita. — V. sylvestris Reich., Lam.*

Muist. — Sopii käyttää yksiin tarpeisiin Aho-orvokin kanssa.

*V. arenaria* DC. Rummi-orvoffi. — Tav. hienon- ja tiheänlienteä; lehdet tankeita, pyöreä-herttaisia, nyhälaitaisia, sinertäviä, leveän-suikeilla, suipposahaisilla korvakkeilla; verholiuskat ed.; kota munanmoinen. — 2½ 5, 6.

Kank., hietamäissä (E. — P. Kv. Lv.) *2—4 tuuman pituisen, tupastavasti monivarsinen; lehdet vähäisiä, ja samoin sinikiuhavat kukatki; kannus us. valkea. Toisint. väl. ihan kaljuna.*

†† Ensimmäiset (terälliset) kukat juuresta lähtevillä perillä; myöhemmin ilmaantuu lehtinen varsi terättömillä kukilla.

*V. mirabilis* L. Sehto-orvoffi. — Lehdet munuais-herttaisia, vähän suippoja, harsunyhäisiä; korvakkeet kokonaisia; varsi ja ruodit pitkin toista sivua karvaisia; verholiuskat suipukoita; vanalliset kukat hedelmättömiä, terälehtisiä; varsikukat hedelmällisiä, terälehdettämiä. — 2½ 5 vaaleansin. k.

Leht. (A. — K. St. — Kv.) *Ensimmäiset kukat perillään suoraan juuresta lähteviä, hyvänhajuisia, jälkinäiset lehtisessä varressa, sangen harv. terälehtisiä.*

††† Aina varrettomia, juurakosta nousevalla kukkaperällä t. vanalla.

*V. collina* Bess. Mäti-orvoffi. — Melk. varreton, rönsy-

tön; lehdet puikeita — hertakkeisia, päältä lieminkäisiä, alta ynnä ruotien kanssa hatuisia; verholehdet tylppiä; alin terälehti lovipäinen, toiset tylppiä; hedelmäperät kohenevia suikeilla, pitkäripsisillä, tyveltä ruotivarailla korvakkeilla. — 2 5, 6 vaaleansin. k.

Leht., mäkimaissa, harv. (K.) *Hyvänhajuisilla kukilla; terän sivulehdet m. lovipäisiä.*

*V. umbrosa* Fr. Riihe-orwoffi. — Rönstön; lehdet leveän herttaisia, harseasti nyhäsahaisia, harsukarvaisia; verholiuskat suipukoita; teräkannus pitkä, pussimaisesti levennyt alaspäin. — 2 5, 6 sin., joskus valk. k.

Kost. paik., purorant. j. m. harv. (U. St. H. S. Kp. Kv.) *Juurakko hoikka ja hapsinen; lehdet ohukaisia, syvällä ja soukalla lovellä kannassa, äkisti supistuneella päällä.* — *V. hirta* β Wg.

*V. uliginosa* Schrad. Luhta-orwoffi. — Rönstön; lehdet pitkän-herttamaisia, harseasti nyhäsahaisia, m. kaljuja; verholiuskat tylppäpäisiä; terälehdet kaljuja, pitkulaisia, lanttopäisiä. — 2 6 punasinerv. k.

Luhtarant. harv. (U.) *Täysikasvaneet lehdet 1—1½ tuuman levyisiä, 2—2½ tuuman pituisia, syvä lovi kannassa; hedelmäperä pystöinen; kaikki terälehdet lanttopäisiä.*

*V. epipsila* Led. Viete-orwoffi. — Lehdet leveän-herttamaisia, lyhytsuippoja, alisin munuamainen, harsunyhäisiä, tav. alta harseasti hienokarvaisia; suojuslehdykät perän latvapuolella; verholiuskat tylppäpäisiä; terälehdet kaljuja, 4 ylisempää soikeita, tylpiä, ehytpäisiä. — 2 5, 6 valk. k.

Liejurant., harv. (E. — L. Lv.) *Isompi seuraavata, vähän kurtteisilla lehdillä.* — *V. fennica* F. Nyl. *V. svecica* Fr., H. M. F.

*V. palustris* L. Suo-orwoffi. — Lehdet pyöreän munuamaisia, harsunyhäisiä, kaljuja; suojuslehdykät kukkaperän keskustassa t. tyvipuolella; verholiuskat soikeita, tylppäpäisiä; muuten k. ed. — 2 5, 6.

Vet. niit. tav. (E. — L. Lv.) *Vähäinen, pienemmillä, vaaleankiuhlavilla, väl. m. valkeilla, suonisilla kukilla; vanhempina ovat lehdet paljon isompia, mutta aina sileitä ja kiiltäviä.*

### 53 heimo. — DROSERACEÆ. Kihokkikasveja.

PARNASSIA L. Bifuffo. Slotterblomma.

*P. palustris* L. — Lehdet herttamaisia; mesivareet monisäteisiä. — 2 7, 8 valk. k.

Kost. paik. (E. — L. Lv.) *Varsi 1-kukkainen; varsilehti sepokantainen; aluslehdet ruodikkaita.*

**Muist.** — Vähän karvas ja jumova maullaan.

**DROSERÄ L. Riihotti. Daggört.**

*Dr. rotundifolia L.* Pyörölehtinen riihotti. — Vana monikukkainen; lehdet pyöreitä, leveämmät pituuttansa. — 2 7 valk. k.

Soissa, tav. (E. — L. Lv.) *Siemenet löyhän, verkkomaisen kalvon sisäisiä. Lehtien laidissa niin tällä kuin seuraavillaki lajeilla on pitkiä, punaisia nystykarvoja, joista kohoilee tahmeata nestettä.*

**Muist.** — Kun maitoa siivilöitään läpi lehtien, taikka maitytöydyttiin laidat tahritaan niillä, saadaan sitä sakomaitoa, joka kauan pysyy happanematta ja muuttaa sitte muunki maidon samantaiseksi. Lehmäin kesällä myrkyllisiä sieniä syödessä ja maidon siitä pahentuessa, saadaan se läpi kihokin siivilöiden parannetuksi. Kasvi on vahingollinen lampaille.

*Dr. longifolia L.* Pitkälehtinen riihotti. — Vana monikukkainen, jokseenki pidempi lapiomaisia t. kieloisia, tylppäpäisiä lehtiä; siemenet verkkomaisen, löyhän, sileän kalvon sisällä. — 2 7 valk. k.

Soissa (E. — L. Lv.) *Vana 3—6 tuuman pituinen; lehdet, ruotia lukematta, m. tuumanpituisia.* — *Dr. anglica Sm.*

*Dr. intermedia Hayn.* Keskimäinen riihotti. — Vana monikukkainen, tuskin vastopuikeita t. lapiomaisia lehtiä pidempi; siementen kuori tiheä ja nystermäpilkkuinen. — 2 7 valk. k.

Soissa, harv. (A. — K. Pe.) *Vana us. lehtiä lyhempi, väl. vähän pidempi, harv. 2-tuumainen; siemenet mustanruskeita, hyvin nystermäisiä, ilman sellaista löyhää kalvoa, kun edellisillä on.*

**54 heimo. — SILENACEÆ. Kohoruohoisia.**

**1 parvi. — Lychnideæ.**

**SILENE L. Kohoruoho, Riihotti. Silén.**

† Verho pullakka, munanmoinen: *Behen L.*

*S. inflata Sm.* Turmiriihotti. — Varsi kuta kuinki pystöinen, toishaarukkaisella viuhkolla; verho kalju, verkkosuoninen ja suippohampainen; terälehtien lapa alle keskustan 2-halkoinen. — 2 7, 8 valk. k.

Niit. tav. (E. — L. Lv.) *Us. kyynärän pituinen, sinivihreä; terälehdet ilman näkyväsittä lisälehdettä, ainoasti parilla epäselvällä kyhmyllä lavan kannassa.* — *Cucubalus behen L.*

*S. maritima With.* Meririihotti. — Juuri tav. työntävä monilukuisia, rentoja, kukkiessa kohenevia, 1—3-kukkaisia var-

sia; verho ed.; terälehtien lapa keskustaan t. vähän alemma 2-halkoinen. — 2/7, 8 valk. k.

Somer. merenrant. (A. — U. St. — P. Lv.) *Juuri tav. paksu, syvällä makaava kivien välissä, ylöspäin hoikka, haarova moniksi veltoiksi, us. rennoiksi haaroiksi; lehdet soukempia ja paksumpia, kukat harvempia ja isompia k. ed.; terä muin pienillä suomumaisilla lisäterillä, muin ainoasti kyhmyillä k. ed., vaikka vähän isommilla. Luultavasti vaan edellisen toisintelo.*

†† Verho liereä t. pitkulainen: *Viscago* Fr.

*S. nutans* L. *Retofohoffi*. — Röyhy pitkäveteisillä, vastakkaisilla, 3—7-kukkaisilla haaroilla, nuokkuvilla kukilla; terälehtien lapa 2-jakoinen, 2:lla äimämäisellä lisälehdellä kannassa; varsilehdet suikulaisia. — 2/6, 7 valk. k.

Mäkimaissa (A. — K. St. H.) *Latvempaa tahmeakarvainen, väl. kalju.*

*S. tatarica* Pers. *Satarian fohoffi*. — Terttu yhdäppäinen, pysty vastakkaisilla, pitkillä, 1—3-kukkaisilla haaroilla; kukat nuokhtavia pystöisillä perillä; terälehdet ed., lisälehdettömiä; varsilehdet kaitais-suikeita. — 2/7, 8 valk. k.

Santarant. harv. (L. Lv.) *Koko kasvi paitsi kukkaperät kalju. ruskean-punahtava; kodat kukkimisen jälkeen pystyjä. — Cucubalus* L.

*S. viscosa* Pers. *Tahmafohoffi*. — Kasvi tahmeakarvainen; röyhy m. tähkämäinen, vastakkaisilla, lyhyillä, 1 — monikukkaisilla haaroilla, tylppähampaisella verholla; terälapa syvään 2-halkoinen, lisälehditön; varsilehdet aaltolaitaisia. — 2/6, 7 valk. k.

Merirant. harv. (A. T. U.) — *Cucubalus* L.

*S. noctiflora* L. *Yö-fohoffi*. — Kasvi tahmeakarvainen, 1—2-kukkainen, t. toishaarukkaisella latvaröyhyllä; verho 10-suoninen, pitkillä äimämäisillä hampailla; terälapa 2-halkoinen. — 2/7, 8.

Pelt. ja viljelöm. harv. (T. U. H. K.) *Toisinteleo yksikertaisena ja isoröyhyisenä valkeilla, t. etenki ulkopuolin punertavilla kukilla, lyhyellä lisäterällä. — Melandrium* Fr., *H. M. F.*

††† Verho ylipuolelta laajempi t. pikarimainen: *Atocion* Fr.

*S. armeria* L. *Kalju fohoffi*. — Kalju; kukat tasalatvaisissa, tiheissä viuhkoissa, kokonaisilla terälehdillä; yliset varsilehdet m. herttamaisia. — 2/7, 8 pun., harv. valk. k.

Vilj. metsist. harv. (H.) *Sinertävä, tav. runsaskukkainen. Epädilemättä ryytitarhoista metsistynyt.*

*S. rupestris* L. *Kallio-fohoffi*. — Kasvi kalju; varsi tav.

toishaarukkaisella viuhkolla; terälehdet vastoherttaisia; varsilehdet suikeita. — ☉ 2 7 valk. k.

Kallioilla (T. — Ke. H. S. P.) *Us. monivarsinen ja runsaskukkainen. Tulee rönsymällä väl. monivuotiseksi.*

*S. acaulis* L. Eapin kofoffi. — Varsi tupastava, sangen lyhyt yksikukkaisilla haaroilla alisista lehtihangoista; terälehdet lovipäisiä; varsilehdet soukkia, ripsilaitaisia; kota pitkulainen. — 2 7 pun., harv. valk. k.

Tunt. (L. Lv.) *Kasvaa us. laveissa, 1—2 tuuman korkuissa, selvän-vehreissä tuppaisa; kukat tav. 2-kotisia, emikukat vähempiä; lehdet toisintelevät äimämäisistä pitkulaisiin.*

### MELANDRIUM Röhl. Ailaffi. Blåsläst.

† Kukat enimm. 2-kotisia; siemenet munuamaisia, kalvopalteettomia.

*M. sylvestre* Röhl. Eehto-ailaffi. — Höyteä pitkistä, pehmeistä karvoista; emikukkain verhohampaat pitkän-pukeita, suipukoita, kodan pituisia; lehdet m. soikeita, yliset puikeita, suipukoita. — 2 5—8 pun. k.

Leht. (E. — L. Lv.) *Lehdet toisintelevät muodossaan, mutta ovat pituutensa suhteen m. aina leveämmät k. seur. lajilla; kukat hajuttomia, väl. vaaleanpunaisia: var. carneum. — M. diurnum Fr. Lychnis dioica L. L. sylvestris Schk.*

*M. pratense* Röhl. Nurmi-ailaffi. — Lyhemmin harmaanhöyteä; emikukkain verhohampaat leveämmästä kannasta pitkäveiteisesti tasasoukkia, yli kodan ulottuvia; lehdet suikeita. — 2 7, 8 valk. k.

Pelt., viljelöm. (E. — P. Kv.) *Kukat isoja, tav. lumivalkeita ja hyvänhajuisia etenkin iltasilla. — Lychnis dioica β L. Lychn. vespertina Sibth. L. pratensis Schk. Melandr. vespert. Fr.*

†† Kukat täysineuvoisia; siemenet leveällä laitakalvolla: *Wahlbergella* Fr.

*M. apetalum* Fenzl. Eapin ailaffi. — Varsi 1-kukkainen; terälehdet ei paljon pidempiä, lop. lyhempiä kun munanmoinen, pullakko verho; lehdet suikean-tasasoukkia; siemenet leveillä, pullakoilla syrjillä. — 2 7, 8 valk. k.

Tunt. harv. (L. Lv.) *Kukkiessaan parintuumainen, lop. vaakanpituinen t. pidempi, 1:llä, harv. 2:lla nuokkuvalla kukalla, pysyisellä hedelmällä. — Lychnis L.*

*M. affine* Hn. Tunturi-ailaffi. — Varsi 1—3-kukkainen; terälehdet jokseen pidempiä kun pitkulainen, ei pullakka verho; lehdet ed.; siemenet leveällä kalvopalteella. — 2 7, 8.



Tunt. harv. (L. Lv.) *Edellisen muotoinen, mutta hennempi. pystöisillä kukilla ja verholta kiinteästi suletulla hedelmällä; terälehdet valkeita t. punervia.* — *Lychnis affinis* Vahl. *L. triflora* Fl. D.

### VISCARIA Röhl. Tervaffo. Tjärblomma.

*V. vulgaris* Röhl. Mäkitervaffo. — Terälehdet eheitä t. lovipäisiä; varsilehdet m. tasasoukkia, yliset laidoilta villaisia; varren yliset solmuvälit tervamaisesti tahmeita. — 2½ 6, 7 pun., harv. valk. k.

Niittumäissä, tav. (E. — P. Kv.) *Kukat ryhmäisiä.* — *Lychnis viscaria* L. *V. purpurea* Fr., *H. M. F.*

*V. alpina* Röhl. Tunturi-tervaffo. — Terälehdet 2-halkoisia; varsi ja m. tasasoukat lehdet kaljuja. — 2½ 7 pun. k.

Mäk., rant. etenk. tunt. (T. U. H. S. P. L. Lv.) 6—10-tuumainen, pienempikukkainen k. ed. — *Lychnis alpina* L.

### LYCHNIS L. Räenfuffa. Göklyst.

*L. flos-cuculi* L. — Kukat toishaarukkaisessa viuhkossa; terälehtien lapa 4-jakoinen; lehdet suikean-tasasoukkia, kaljuja. — 2½ 7 pun., harv. valk. k.

Kost. niit. tav. (E. — P. Kv. Lv.) *Tav. kyynäränpituinen, harsuviuhkoinen.*

### AGROSTEMMA L. Muranfuffa. Klätt.

*A. githago* L. — Kasvi hatuinen; verholiuskat suikulaisia, tav. pidemmät vastoherttaisia terälehtiä. — ☉ 7 sinipun. k.

Pelt. (E. — P. L. Kv.) *Tav. kyynäränpituinen, isoilla kaulaneilla kukilla.* — *Lychnis Koch. Githago segetum* Led.

## 2 parvi. — *Diantheæ*.

### DIANTHUS L. Neiliffä. Nejluka.

*D. superbus* L. Murmineiliffä. — Varsi pystöinen, ylempää tav. haarova röyhyksi; lisäverhon lehdet puikeita, suippoja, paljon lyhempiä kun verho; terälehdet monihalkoisia, sisäpuolelta karvaisia; varsilehdet tasasoukkia. — 2½ 7, 8 vaaleanpun. k.

Niittumaissa (Kv. P. L. Lv.) *Jalanpituinen; aluslehdet suikeamaisia; haju lauhkea.*

Muist. — Kaunis kukka ryytimaihlin kylvää.

*D. arenarius* L. Pietaneiliffä. — Juurelta haarova enimm. 1-kukkaisiksi varsiksi; lisäverhon lehdet puikeita, lyhyen suippoja, paljon lyhemmät verhoa; terälehdet ed.; varsilehdet tasakaitaisia, käyräköitä. — 2½ 7 valk. k.

Hietalakeilla, harv. (U. Ke. St.) *Vaaksanpituinen*, *tupastava*; *terälehdet väl. m. kaljut sisäpuolelta*; *hyvénhajuinen*.

*D. deltoides* L. *Retoneiffiä*. — Kukat erinäisiä; lisäverhon lehdet puikeita, suippoja, paljon lyhemmät verhoa; terälehdet kokonaisia, syvänyhäisiä; varsilehdet tasasoukasti suikeita, tylppäpäisiä, hienosti karhealaitaisia. — 2 7, 8 tav. pun. k. —  $\beta$  *glauca*: lisäverhon lehdet tav. 4, aliset lop. erinäisiä; kukat vaaleankalveja; kasvi sinertävä.

Ahoilla, ket. tav. (E. — P. Kv.;  $\beta$  U. S. Pe.) *6–8-tuumainen*. —  $\beta$  *D. glaucus* L.

### GYPHOPHILA L. Rauniffi. Fänting.

*G. muralis* L. — Varsi haarikas erinäisillä, pitkäveteisillä kukkaperillä; terälehdet nyhälaitaisia t. lovipäisiä; varsilehdet äimäisestisesti tasasoukkia. —  $\odot$  7, 8 punerv. k.

Kuiv. paik. harv. (T. — K. St. S.) *Harv. päälle 2–4 tuuman pituinen*, *siirottava-haarainen*, *pienillä kukilla m. hapsimaisissa perissä*.

*G. fastigiata* L. — Varsi ylempänä haarova peräkkäiksi, m. tasalatavaisiksi, tiheiksi viuhkoiksi, nystykarvaisilla, tahmeilla haarukoilla; lehdet m. tasasoukkia, tylppäpäisiä. — 2 7, 8 valk. k.

Kuiv. paik. harv. (P. Lv.) *6–10 tuuman pit., tyveltä tupastava*.

## 55 heimo. — ALSINACEÆ. Tähtimökasveja.

### 1 parvi. — *Stellariæ*.

#### MALACHIUM Fr. Mata. Sprödört.

*M. aquaticum* Fr. — Yliset varsilehdet puikean-herttaisia, sepokantaisia; röyhy toishaarukainen, kukilla latvassa ja haa-rahangoissa; kota m. palleromainen. — 2 7 valk. k.

Rant., kost. paik. harv. (H. S. K. Kv.) *Lehdet tuuman lovyisiä, aliset us. ruodikkaita*. — *Cerastium* L. *Larbrea* DC.

#### STELLARIA L. Tähtimö. Stjernört.

† Lehdet puikeita t. herttamaisia, aliset ruodikkaita; kukat valkeita.

*St. nemorum* L. *Säffötähtimö*. — Röyhy toishaarukainen; terälehdet alle keskustan halkoisia, verhoa pidemmät; aliset lehdet ruodikkaita, herttamaisia, yliset ruodittomia, puikeita, suipukoita; varsi yltä-ylitse karvainen. — 2 6.

Purolaks. j. n. e. (E. — L. Lv.) *Iso*; *lehdet päälle tuuman levyisiä, 2 tuuman pituisia*.

*St. media* With. Maiffatähtimö. — Kukat toishaarukkaisessa röyhyssä t. lehtihangoissa; terälehdet 2-jakoisia, verhoa lyhemmät; lehdet kaikki puikeita; varsi nivelten välillä vuorottain pitkin pituuttaan karvainen. — ☉ 4—10.

Viljelöm. j. n. e. yl. (E. — L. Lv.) *Toisintele 3—10:llä heiteellä.* — *Alsin media* L.

Muist. — Käyt. ulkonaisesti jäähdyttäväksi hauteeksi haavakuumeessa. Sopii myös ruuaksi kananpojille ja laululinnuille.

†† Lehdet soukempia, kaikki ruodittomia; kukat valkeita.

\* Terälehdet keskustaan asti halkoisia.

*St. holostea* L. Sehtotähtimö. — Röyhy toishaarukkainen; terälehdet pidemmät suonittomia ja suippoja verholehtiä; varsilehdet suikulaisia, pitkänsuippoja, laidoilta karheita; siemenet hyvin isoja, piikkilisiä. — 2 6, 7.

Leht. harv. (A. — K.) *Kukat isoja; lehdet karheita lyhyistä, tönkeistä laitakarvoista; siemenet kun pieniä hampunsiemeniä, tiheäpiikkisiä pitkistä tylpistä nyylistä.*

\*\* Terälehdet kantaan asti jakoisia; kukat pitkäperäisissä, latva- tahi latvanlähisissä röyhyissä.

*St. palustris* Retz. Suo-tähtimö. — Varsi tav. pystöinen, kalvomaisilla suojuksilla; verholehdet suipukoita, 3:lla kohosuonella, kolmatta osaa t. enemmän terälehtiä lyhemmät; varsilehdet tasasoukkia, kaljuja. — 2 6, 7. —  $\beta$  *glauca*: sinivehreä.

Kost. niit. rant. (E. — L. Lv.) *Kukat paljon isompia k. seuraavalla. Päälaji paljon harvemmin tavattava kun toisinto.* — *St. Dilleniana* Mönch. *St. glauca* With.

*St. graminea* L. Seinä-tähtimö. — Varsi hervoton; terälehdet harv. verhoa pidemmät; muuten k. ed. — 2 6—8. —  $\beta$  *junccea*: lehdet ohuita, keskustalta leveämpiä, suikeita; röyhy harvakukkainen.

Niit. j. n. e. tav. (E. — L. Lv.;  $\beta$  A. P. Lv.) *Lehdet eivät paljon leveämpiä kannalta, joka us. on karvahkolaitainen, niinkuin pienet suojuuksetki; terälehdet muin verhon pituisia, muin jotain pidempiä; koko kukka kuitenkin vähempi kun edellisellä.*

*St. longifolia* Fr. Metfätähtimö. — Varsi hervoton, kalvomaisilla suojuksilla; verholehdet terälehtien pituisia, ilman selvittä suonitta; varsilehdet litteitä, tasasoukkia, kannalta soukempia, ripsilaitaisia. — 2 6—8. —  $\beta$  *alpestris*: varsi kalju; lehdet kannalta leveähkömpiä.

Kost. mets. (E. — L. Lv.;  $\beta$  L.) *Kaikin puolin hennompi k. ed., vähemmällä kukilla, joiden verhossa tuskin näkyy suonien jäl-*

kiä ennen hedelmän valmistumista, jolloin tav. tulevat näkyvämmiksi.  
— *St. Frisiana* Ser. —  $\beta$  *St. alpestris* Fr.

\*\*\* Terälehdet 2-jakoisia; kukat ylisissä lehtihangoissa, joskus myös vähäisissä latvaröyhyissä.

*St. crassifolia* Ehrh. Rantatähtimö. — Kukkaperät lehtihangoissa t. vähissä harsuissa röyhyissä, suojuksettomia; verholehdet suippoja, epäselvästi 3-suonisia, terälehtiä lyhemmät; varsilehdet suikeita — puikeita, kaljuja, paksuhkoita ja hauraita. —  $\gamma$  7. —  $\beta$  subalpina: m. pysty; kukat pienessä röyhyssä; lehdet suikean-puikeita. —  $\gamma$  brevifolia: lyhemmillä lehdillä.

Merirant.  $\beta$  tunt. harv. (Ke. Kv. Pe. P. Lv.;  $\beta$  P. L. Lv.)  
*Toisintee 1-tuumaisesta 6-tuumaiseen; parhaiten tuttava ulottavista terälehdistä ja möyheähkivistä, tönkeistä varsilehdistä.*

*St. uliginosa* Murr. Hetetähtimö. — Kukkaperät ed., kalvomaisilla suojuksilla; verholehdet epäsuonisia, terää pidemmät; varsilehdet pitkulaisia — suikeita, paksuhkoita, sinivihreitä, ripsikantaisia. —  $\odot$  5—8.

Hetepaik. harv. (A. — K. St. — S. Kv.) *Tav. matala, hauras, valkeilla suojuksilla kukkaperäin tyvellä.*

*St. borealis* Big. Pohjan tähtimö. — Kukkaperät ed., suojuksettomia; verholehdet suippoja, epäsuonisia, pidemmät lyhytaikuisia terälehtiä; varsilehdet suikulaisia, ohuita, ripsikantaisia. —  $\odot$  7. —  $\beta$  calycantha: pienempi, m. terätön.

Kost. paik. tunt. (P. L. Lv.) *Vehreä, hentoinen pienillä, uspuuttuvilla terälehdistä. Kun röyhitty, tulee suojuksiaki, mutta vehreitä ja näältään kun kurtistuneita varsilehtiä.*

*St. humifusa* Rottb. Lapin tähtimö. — Varsi lamova; kukat lehtihankaisia, suojuksettomia; verholehdet pitkulaisia, tylppäpäisiä, ei paljon terää lyhemmät; varsilehdet pitkän-soikeita, kaljuja. —  $\gamma$  7, 8.

Merenrant. (Kv. L. Lv.) *Ei paljon eroava Rantatähtimön vähemmistä, leveä-lehtisemmistä muodoista.*

## CERASTIUM L. Härffi. Cerast.

† Terälehdet jokseenki pidempiä kun verho; kukat valkeita.

*C. trigynum* Vill. Lapin härffi. — Varret rentoja 1—4-kukkaisia, m. kaljuja hienokarvaisilla kukkaperillä; vartaloita tav. 3; lehdet pitkulaisia, vähän suipukoita ja yhdäppäisiä, kaljuja. —  $\gamma$  7, 8.

Tunt. (L. Lv.) *Vartaloita väl. 4 t. 5; hentoisempi ja kiiltävämmän mustanvehreä k. seur. — Stellaria cerastioides L.*

*C. alpinum* L. Tunturi-härffi. — Varret 1—3-kukkaisia,

tav. höykeitä; suojukset leveällä, tav. valkealla kalvolaidalla; lehdet pitkulaisia; kota pitkulainen, käyräkhö. —  $\alpha$  7, 8. —  $\beta$  latatum: tiheästi villainen. —  $\gamma$  glabratum: kalju, erinomattain verho. —  $\delta$  latifolium: nystykarvainen; suojukset m. kokonaan vehreitä; lehdet vähän leveämpiä; kukat vähän isompia, pidemmillä terälehdillä.

Tunt. tav. (K. Kv. P. L. Lv.;  $\delta$  P. L.) *Haaraton t. juurelta haarova useiksi, tav. 2-kukkaisiksi varsiksi.* —  $\delta$  *C. latifolium L., Hn.*

*C. arvense L. Rinne-härffi.* — Varsi lienteä, toishaarukkaisella, monikukkaisella röyhyllä; lehdet suikeasti tasasoukkia, suipukoita. —  $\alpha$  7, 8.

Kuiv. paik. harv. (T. H.) *Tav. 1/2-kyynäräinen, monivarsinen; terälehdet püälle kahta pidemmät verhoa; lehdet kuta kuinki lienteitä, vtl. m. kaljuja.*

†† Terälehdet hiukan t. ei ollenkaan pidemmät verhoa; kukat valkeita.

*C. vulgatum L. Turmi-härffi.* — Varsi rento t. koheneva, lienteä; lehdet puikean-sukeita t. pitkulaisia; terälehdet 2-halkoisia; kota käyrä, kahta pidempi verhoa. —  $\odot$  6–8. —  $\beta$  alpestre: terälehdet ulottavia; varsilehdet m. soikeita.

Ahoilla, niit., pelt., ryytim. yl. (E. — L. Lv.;  $\beta$  L. Lv.) *1–2 vaaksan pituinen, lyhytkarvainen; röyhy kukkiessa harsumpi k. seur.; siemenet yleensä tasamukaisesti nystermäpilkkuisia.* — *C. viscosum Sm., Wg. Fl. L. C. triviale Link.*

*C. viscosum L. Miti-härffi.* — Varsi tav. pystöinen, tahmean-höyteä, m. varren läpimitan pituisilla karvoilla; lehdet pyöreämäisiä t. soikeita; terälehdet 2-liuskaisia; kota ed. —  $\odot$  7, 8.

Kost. ruohostoissa, harv. (U.) *Toisintee isompana ja vähempänä; kukat ensinnältä tiheästi ryhmäisiä, hedelmän valmistuessa erinäisiä; siemenet kulmilla nystermäpilkkuisia, sivuilta m. siloitä t. epäpilkkuisia.* — *C. vulgatum Sm. E. B. C. ovale Pers. C. glomeratum Thuill.*

*C. semidecandrum L. Mäti-härffi.* — Höyteä; lehdet soikeita; heteitä 5; terälehdet verhoa lyhemmät, lovipäisiä t. nyhälaitaisia; suojukset leveällä, valkealla kalvolaidalla; hedelmäperät ensinnältä alaspäisiä, lop. kaikki t. osittain pystöisiä. —  $\odot$  5, 6.

Kuiv. paik. harv. (A. T. U.) *1–4 tuuman pituinen, tav. tahmean-höyteä ja kellertävä, vtl. ohuesti harmaanhöyteä t. m. kalju.*

ARENARIA L. *Arho*. Sandling.

† Siemenet valkealla napalapulla; lehdet  $\frac{1}{2}$ —1-tuumaisia:  
*Mähringia* Koch.

*A. lateriflora* L. *Arho*-*arho*. — Juurelta jakauva useiksi, m. haarattomiksi varsiksi yksinäisellä, 1—3-kukkaisella, lehtihankaisella, puikeita — pitkulaisia lehtiä pidemmällä perällä; verholehdet puikeita, tylppäpäisiä, terää paljon lyhemmät. — 2 7, 8 valk. k.

Kost. ruohostoissa, harv. (Kv. P. L. Lv.) *Melk.*  $\frac{1}{2}$  tuuman levyisellä terällä.

*A. trinervis* L. *Arho*-*arho*. — Varsi toishaarukkinen; verholehdet suikeita, pidemmät sekä terää että kotaa; lehdet lyhytruotisia, puikeita, suippoja, 3—5-suonisia. — ☉ 6 valk. k.

Mets. (E. — Pe. Kv. Lv.) 3—7 tuuman pituinen; haaraisempi edellistä, muuten vähän samanmuotoinen.

†† Siemenet napalaputtomia; lehdet 1—2-linjaisia.

*A. ciliata* L. *Tunturi-arho*. — Verho terää lyhempi; lehdet ruodittomia, vastopuikeita — kieloisia, suippoja, tav. ripsikantaisia, epäselvällä suonella. — 2 6—8 valk. k.

Tunt. ja vuor. harv. (Lv.) 1—4-tuumainen; tyvellä haarova t. tupastava; kota jos hiukan verhoa pidempi.

*A. serpyllifolia* L. *Rangas-arho*. — Verholehdet suikeita, terää pidemmät; varsilehdet ruodittomia, leveän puikeita, suippoja, selvästi monisuonisia. — ☉ 6, 7 valk. k.

Kuiv. paik. (A. — K. St. — Kv.) Koko kasvi harmaankarheahko, väl. vähän tahmeakarvainen.

2 parvi. — *Alsineæ*.HALIANTHUS Fr. *Rantafaaeli*. Strandportlake.

*H. peploides* Fr. — Kukat yksinäisiä ylisissä lehti- ja haarahangoissa, peräkkäitä; lehdet puikeita — suikeita, möyheitä. — 2 6, 7 valk. k.

Hietais. merirant. harv. (U. Ke. Pe. P. Kv. L. Lv.) Lehdet nahkeita, paksuja, tav. hyvin tiheässä, etenki ylempänä. — *Arenaria* L. *Alsine* Wg. *Honkenya* Ehrh., *Led.* *Ammadenia* Gmel.

ALSINE Wg. *Nätä*. Hvitarfve.

*A. stricta* Wg. *Tunturi-nätä*. — Kukkahaarat sangen pitkiä, pystöisiä, harvalehtisiä, 1—2-kukkaisia; verholehdet suippoja, suonittomia, m. terälehtien ja kodan pituisia; lehdet äimämäi-

siä, tylppäpäisiä, kaljuja, ilman näkyvittä suonitta. — 2½ 7, 8 valk. k.

Tunt. harv. (L. Lv.) *Tyveltä haarova ja lehtinen*; kukka-haarat 2—4 tuuman pituisia, tav. yhdellä t. muutamalla lehtiparilla keskustassa ja sen alla.

A. biflora Wg. Eäpin nätä. — Varsi tyveltä haarova useiksi, tav. 2-liuskaisiksi, ylempää karvaisiksi haaroiksi; verholehdet tylppäpäisiä, vähän lyhemmät pitkulaisia terälehtiä; varsilehdet äimämäisesti tasasoukkia, tylppäpäisiä, tasaisia. — 2½ 7, 8 valk. k.

Tunt. (L.) 1—3-tuumainen, tylpillä, us. lovipäisillä, joskus punervilla terälehdillä. — *Stellaria L. Alsinea Sw.*

A. rubella Wg. Punerwa nätä. — Varsi tyveltä haarova, 1—2-kukkaisilla, ylempää nystykarvaisilla, m. pystöisillä haaroilla; verholehdet suippoja, 3-suonisia, pidemmät soikeita terälehtiä; aliset lehdet tasasoukkia, yliset suikeita, kaikki 3:lla kohosuonella. — 2½ 7 punerv. k. — β hirta: haarat sormen pituisia, hervottomia, tav. 2-kukkaisia, 3—6:lla lehtiparilla; kukat valkoisia.

Tunt. harv. (L.) 1—2-tuumainen, tupastava, m. pystöisillä, 1-kukkaisilla, 1—2-lehtiparisilla haaroilla. — *Arenaria Gieseckii & hirta Fl. D. Alsine verna var. Led. A. hirta Hn.*

#### SAGINA L. Haariffo. Smånarf.

† Kukan-osat 5-lukuisia: *Spergella* Reich.

S. nodosa Fenzl. Rantahaariffo. — Varsi pysty, monikukkainen; kukkahaarat solmikkaita pienistä lehtiryhmistä; terälehdet pidemmät tylppäpäisiä verholiuskoja; lehdet äimämäisiä, tylppäpäisiä. — 2½ 7, 8 valk. k.

Rant. (A. — Ke. St. Pe. P. Kv. Lv.) *Toisintatee kaljuna ja hienosti nystykarvaisena*; kukat hunajan hajuisia. — *Spergula L.*

S. saxatilis Wimm. Eäpin haariffo. — Haarat lyhyen, heidelmättömän varren sivuista lojottavia pitkäveteisillä, kohenevilla kukkaperillä, nuokkuvilla kukilla; verholiuskat tylppäpäiset, terälehtiä pidemmät; varsilehdet soukan-äimämäisiä, lyhyt-otapäisiä, kaljuja. — ☉ 2½ 6—8 valk. k.

Tunt. tav. (L. Lv.) *Vähän isompi ja pidemmällä kukkaperillä k. seuraava laji, josta tämä ei paljon eroa, etenki kun tällä väl. on 4-lukuiset kukan-osat ja us. pieniä t. puuttuvia terälehtiä.* — *Spergula saginoides Sw. Sp. Linnæi Led.*

†† Kukan-osat 4-lukuisia: *Sagina L.*

S. procumbens L. Pihahaariffo. — Terälehtiä ei ollenkaan t. paljon lyhemmät kun tylppäpäinen verho; muuten k. ed. ☉ 5—8.

Kost. paik. yl. (E. — L. Lv.) *Haarat* 1—2-tuuman pituisia; heteitä tav. 4—7; emiä 4—5. — *Spergula sagina* Sw.

### 3 parvi. — *Lepigoneæ*.

SPERGULA L. *Spatiffa*. Spergel.

Sp. arvensis L. *Peltospatiffa*. — Kukat röyhyssä; siemenillä soukka, sileä, rengasmainen kalvopalle. — ☉ 7, 8 valk. k.

Pelt. rant. j. n. e. yl. (E. — L. Lv.) *Varsi tahmeakarvainen, harv. kalju. Väl. hyvin vähäinen, ja silloin tav. vaan 5-heteinen.*

Muist. — Siemenistä sopii katovuosina leipää valmistaa. On usein rikkaruohona kevät-touvoissa ja pellava-maissa. Kasvaa hyvin tiheänä, mutta matalana; heinäksi työläs kuivattaa.

Sp. pentandra L. *Wuorispatiffa*. — Kukat röyhyssä; siemenet pallistettuja leveällä, sädejuomuisella kalvolla. — ☉ 6, 7 valk. k.

Kuiv. metsävuor. (A. — Ke. St. — S. Pe.) Kukat harv. auki; tav. kalju ja tankeampi edellistä. — Sp. arvensis  $\beta$  Wg. Sp. *Morisonii* Boreau, Hn.

LEPIGONUM Fr. *Solmuheinä*. Fjällarfve.

L. rubrum Fr. *Punainen solmuheinä*. — Lehdet rihmamaisia, litteitä, otapäisiä; röyhy lehtinen; verho m. kodan pituinen; siemenet vastomunaisia, turpea-laitaisia, kaikki palteettomia. — ☉ 4 6, 7 pun. k. —  $\beta$  pinguis: lehdet odattomia, puoliliereitä.

Kuiv. paik., rant. tav. (E. — P. Kv.) *Lehdet litteitä ja tav. varren solmuväliä lyhemmät. — Arenaria L. Alsine* Wg. *Spergularia* Pers. —  $\beta$  *L. neglectum* Kindblad, Hn.

L. medium Fr. *Keski solmuheinä*. — Varsi liereä; lehdet rihmamaisia, puoliliereitä, suippoja, odattomia; röyhy ja verho ed.; siemenet vastomunaisia, koholaitaisia, muutama kalvopalteella. — 4 7, 8 valk. t. vaaleanpun. k.

Kost. paik. harv. (A. T. St. U.) *Lehdet tav. pidempiä ja möyheämpää k. ed.*

L. salinum Fr. *Merisoluheinä*. — Varsi litteämäinen; lehdet ed., möyheitä, tylppäpäisiä; röyhy lehtinen, tav. pitkävetisillä tertuilla; verho  $\frac{1}{3}$  kotaa lyhempi; siemenet pyöreämaisiiä, m. litteitä, turpea-laitaisia, eräät (väl. enin osa) kalvopalteella. — ☉ 7, 8 valk. t. vaaleanpun. k.

Merenrant. (A. — U. St. — P.) *Kukkaperät niin tällä kun ed. hiukan, harv. kahta pidemmät kotaa; terälehdet molemmilla pitkulaisia.*



## 56 heimo. — ELATINACEÆ. Vesirikkoisia.

## ELATINE L. Vesirikko. Helting.

*E. alsinastrium* L. Vätäffö-vesirikko. — Lehdet puikean-suikeita — suikulaisia, ruodittomia, säteettäisiä; kukat ylisissä lehtihangoissa yksitellen, lyhytperäisiä t. m. perättömiä, 4-lukuisilla kehä-osilla. — ☉ 7, 8 valk. k.

Vesikuljuissa ja kuopissa, harv. (T. St. U. H.) *Pystöisellä, tav. haarattomalla, kaljulla, nivelikkäällä varrella.*

*E. hydropiper* L. Pippura-vesirikko. — Lehdet vastakkaisia, pitkulais-vastopukeita, pitkä-ruodikkaita; kukat yksinäisiä, perättömiä, lehtihankaisia, kehä-osat 4-lukuisia; heteitä 8; kota 4-pesäinen. — ☉ 6—9 punerv. k. —  $\beta$  orthosperma: siemenet m. suoria.

Rant. vedessä ja veden vaih. (E. — P. Kv.) *Vähäinen, suikertava ja juurrehtiva kasvi, kuivalla alalla tav. punakka; pienten pippura-jyvän kokoisilla kodilla; siemenet tav. käyriä.*

*E. triandra* Schk. Kosmiheteis-vesirikko. — Terälehtiä ja heteitä 3; kota 3-pesäinen; lehdet ed., lyhytruotisia. — ☉ 6—9 punerv. k. —  $\beta$  callitrichoides W. Nyl.: isompi, pystövärtinen, tasasoukilla lehdillä.

Rant. harv. (T. — K. St. H. S.;  $\beta$  U.) *Kaikin osin isohkompi edellistä, leveämmillä ja lyhempi-ruotisilla lehdillä; siemenet vähin käyriä.*

## 57 heimo. — CUCURBITACEÆ. Kurkkakasveja.

## BRYONIA L. Rörirannauriä. Hundrofva.

*Br. alba* L. — Kukat yksikotisia, terttuisia; lehdet hertta-  
maisina, 5-liuskaisia, hammaslaitaisia, karheapilkkuisia. — 2/7, 8  
kelt. k.

Aitovier. j. n. e. harv. (A. T.) *Väänneliäs kasvi, vahterin-  
moisilla lehdillä, rihammaisilla, varresta lähtevillä kärhillä; hede-  
kukat isompia kun emikukat; marjat mustia. Puutarhoista metsis-  
tyvä.*

Muist. — Juuri ulostava ja vesityttävä. Sen tuoretta me-  
hua on sanottu hyväksi vesitaudissa, hengen-ahdissa ja matovai-  
voissa. Taikka liotetaan juurta sitä varten viinissä tahi oluessa.  
Pöhöttymisiä ja reisikolotusta vasten käytettiin sitä ulkopuolin  
päälle pantuna.

58 heimo. — *RIBESIACEÆ*. Viinapensaisia.

*RIBES* L. Viinapensas. Vinbär, Ribs.

*R. grossularia* L. Karvais-pensas. — Haarat 1—3-ker-  
taisilla piikeillä; lehdet 3-liuskaisia; perät yksinäisiä, 1—3-kuk-  
kaisia. — h 5, 6 ruskeanvehr. k.

Kuiv. paik. kyl. (A. T. U. H.) *Hedelmä mehuinen, hyväma-  
kuinen: Karvamarja. — Puutarhoista metsistynyt.*

Muist. — Marjat kypsyneinä, hyviä siltäänki syödä, ovat  
sangen sopivia viiniksi ja sylttäämiseksi. Kasvaa helposti juuri-  
vesoista t. oksista (myöski marjoista) tavallisessa ryytimaan mul-  
lassa. Pitää udestaa istutettaman 6 t. 7 vuoden perästä ja liial-  
lisista juurivesoista ruokottaman.

*R. nigrum* L. Siestar-pensas. — Piikitön; kukat nuokku-  
vissa tertuissa, kellomaisia, suipukoilla suojuksilla, lyhemmät pery-  
köitä; lehdet 5-liuskaisia, alta pihkapilkkuisia. — h 5 ruskeanvehr. k.

Varjopaik. tav. vesitienoilla, harv. (E. — L. Lv.) *Lehdet  
väkevähajuisia; hedelmät mustia viinamarjoja.*

Muist. — Oksat ja nuoret lehdet käyt. teeksi huuvaloon  
ja pitkittävään yskään myös muuksiki tavalliseksi teeksi. Marja-  
hillaa käyt. kurkkutaudissa j. m. Pantuina paloviinaan muutta-  
vat tuoreet lehdet ja oksat sen maun ja hajun paremmaksi. Mar-  
joista saadaan viiniä. Ist. juurivesoista varjopaikkoihin.

*R. rubrum* L. Punamarjainen viinapensas. — Piikitön; ku-  
kat nuokkuvissa t. rippuvissa tertuissa, maljamaisia, pyöreämai-  
sillä, kukkaperiä lyhemmillä suojuksilla; lehdet 5-liuskaisia. —  
h 5 kelt. k.

Leht. (E. — L. Lv.) *Hedelmät punaisia viinamarjoja.*

Muist. — Marjat ovat vilvoittavia kuumetaudeissa. Niistä  
taidetaan myös käyttäen hyvää viiniä valmistaa.

*R. alpinum* L. Taifinamarjainen viinapensas. — Piikitön;  
kukat pystöisissä tertuissa, kukkaperiä pidemmillä suojuksilla; leh-  
det 3-halkoisia. — h 5, 6 kelt. k.

Metsämaissa, tav. (E. — Pe. S. L.) *On us. 2-kotinen, toisen-  
puolisen siittimen keski-eräisyyttä; marjat punaisia, äitälän makeisia.*

Muist. — Puulaji kovaa, sopiva haravan piikeiksi j. n. e.

59 heimo. — *RHAMNACEÆ*. Paatsamaisia.

*RHAMNUS* L. Paatsama. Toste, Brakved.

*Rh. frangula* L. Ropaatama. — Oraton; kukat täysi-  
neuvoisia, 5-halkoisia; luotti jaoton; lehdet soikeita, suippoja, ehyt-  
laitaisia. — h 6, 7 valk. k.

**Metsäniit. tav. (E. — P. Kv. Lv.)** 3—4 *kyynärän pituinen pensaspuu; luumarjat ensin punaisia, lop. mustia, tav. 2-siemenisiä. — Frangula vulgaris Reich.*

**Muist.** — Kuori on kiitetty ulostus-aine kovassa vatsassa, vesitaudissa j. m. Käyt. myös keitevetenä, ja on hyödyllinen eläimille umpitaudissa sisälle annettuna. Maidossa keitettyinä saadaan siitä kapivoidetta.

Kuori värjää villaisen keltaiseksi, ja marjat vehreäksi, kun aine ensin on koivunlehdillä keltaiseksi painettu. Marjoja käyt. monin tavoin värjäyksiin: keitetään sekä marjat että lehdet miedossa lipeässä ja värjätään sillä. Jota tummemmaksi väri tahdotaan, sitä selkeämpää lipeää otetaan. Puussa ei ole silmikoita talvella.

**Rh. cathartica L. Mätipaatfama.** — Haarat orapäisiä; kukat 2-kotisia, 4-halkoisia, monijakoisella luotilla; lehdet soikeita, sahalaitaisia. — h 7 vehreänkelt. k.

**Metsämaïissä, harv. (A. T.)** 3—4-*kyynäräinen puu t. pensas; luumarjat ensin vehreitä, lop. mustia, tav. 4-siemenisiä; terälehdet niin tällä kun edelliselläki lajilla hyvin pieniä.*

**Muist.** — Marjoista saadaan keittäen sangen hyvää ulostus-siirappia, soveliasta kaiken-ikäisille vesitaudissa, kovassa vatsassa, ähkyssä j. m. Niini keitevedessä vaikuttaa sekä ulostamiseksi että oksetukseksi. Marjoista, lokakuussa kypsyivistä, valmistetaan alunoin vehreätä maalariväriä. Kuori painaa keltaista. Puu-aine lujaa, soveliasta sorvareille y. m. Pihain ympärillen saadaan tästä puusta kauniita pensas-aitoja. Kasv. syksyllä marjan sydämistä.

## 60 heimo. — SAXIFRAGACEÆ. Kivirikkoisia.

**SAXIFRAGA L. Rimiriffo, Riffö. Stenbräcka.**

† Vartena lehditön vana; aluslehdet kokonaisia, hammaslaitaisia.

**S. nivalis L. Sumiriffo.** — Kukat haarovassa latvaryhmässä; terälehdet verhon pituisia; aluslehdet pyöreämäisiä t. vas-topuikeita, tylppäpäisiä, ruotijohteisella lavalla, tylppäsahaisia, m. kaljuja. — 2½ 7, 8 valk. t. punerv. k.

**Tunt. (K. Kv. P. L. Lv.)** 3—6 *tuuman pit.; yhdellä t. useammalla, tav. palleromaisella, väl. harsummalla kukkaryhmällä latvassa, us. 1:llä vähemmällä pitkulaisella suojuslehdellä. — Derma-sea Haw. Micranthes Don.*

**S. stellaris L. Tähtiriffo.** — Kukat haarovassa röyhyssä; terälehdet suikeita, alaspäistä verhoa pidemmät; lehdet pitkulais-

nalkkimaaisia, suippoja, harsusahaisia. — 2½ 7, 8 valk. k. —  $\beta$  comosa: tav. 1-kukkainen; röyhynä monta pientä suomumaisten lehtien ryhmäkettä; terälehdet puikeita, kynsillisiä.

Tunt. tav. (L. Lv.;  $\beta$  Lv.) *Terälehdet vähän epämukaisia*. — *Spathularia Haw.*

†† Varsi veltto, 4-tahkoinen vastakkaisista lehdistä: *Antiphylla Haw.*

*S. oppositifolia L.* Giniriffo. — Varsi rento, haarikas, yksinäisillä kukilla haarain latvassa; lehdet puikeita t. vastopuikeita, ripsilaitaisia kuin verholiuskatki, typäköitä, lanttopäisiä. — 2½ 6, 7.

Tunt. kallioilla (Kv. L. Lv.) *Pitkä ja hervoton; haarat ensimmältä 4-tahkoisia tiheistä lehdistä, joiden karvoilla ei ole nystyröitä; kukat sinisiä t. sinipunervia, harv. valkeita.*

††† Varsi lehtinen; lehdet kaikki hajallisia, soukkia ja kokonaisia: *Lejogyne Don.*

*S. aizoides L.* Tunturi-riffo. — Varsi haarova, rento, kohenevilla kukkahaaroilla; sikiäin yhteen kasvetunut sirottavaan verhoon, puoliksi sen alla; lehdet tasasoukkia, m. puoliliereitä, vähäisellä kololla läsnä päätä. — 2½ 7 kelt. k.

Tunt. tav. (L. Lv.) *Terä ei paljon pidempi verhoa; varsi lehdet väl. kaljuja, us. tönkeillä karvoilla laidoissa: S. autumnalis L. Sp. pl.*

*S. hirculus L.* Reltariffo. — Varsi haaraton, pysty, harvoilla, m. kellomaisilla, sikiäis-alaisilla kukilla; verho lop. alakääntöinen; lehdet suikulaisia, tylpäköitä. — 2½ 7, 8 kelt. k.

Rämeissä, turvesoissa (K. Kp. Kv. P. L. Lv.) 8—12 tuuman pituinen; terälehdet kahta t. enemmän pidemmät k. verho.

†††† Lehdet liuskaisia t. halkoisia.

\* Lehdet pyöreämäisiä t. munuamaisia.

*S. granulata L.* Mufusa-riffo. — Varsi suora, monikukkainen, ilman sipuli-umpuitta; lehdet munuamaisia, pykälaitaisia, pyöreämaisilla liuskoilla; juurakolla kimppu herneämäisiä mukuiloita. — 2½ 6, 7 valk. k.

Niit. (A. T. U.) ½-kyynäräinen, yli ½ tuuman pituisilla, kellomaisilla kukilla.

*S. cernua L.* Ruoffo-riffo. — Varsi vähän mutkitteleva, harvakukkainen, sipuli-umpuilla ylisissä lehtihangoissa; aliset lehdet munuamaisia, keskustaan asti halkaistut tav. 5:ksi, pyöreämaiseksi t. puikeaksi, lyhytsuippoiseksi liuskaksi. — 2½ 7, 8 valk. k.

Tunt. harv. (L. Lv.) *Noin vaaksan pituinen, hoikka ja tav. 1-kukkainen, pitkällä terälehdillä.*

*S. rivularis* L. *Puroriffo.* — Varsi koheneva, 1—2-kukkainen, umputon; aluslehdet ed., pyöreäis-tylpillä liuskoilla; yllsin varsilehti kokonainen, puikea. — ☉ 7, 8 valk. t. pun. k.

Tunt. harv. (L. Lv.) 1—3 tuuman pituinen; kukat ja terälehdet pieniä.

•• Varsi tiheillä vesoilla nalkkimaisista, 3—5-halkoisista lehdistä.

*S. cæspitosa* L. *Lupašriffo.* — Varsi 1—3-lehtinen, tav. harvakukkainen; kota m. kokonaan kukan-alainen, pikarimainen, pitkällen ulottavilla luoteilla; lehtiliuskat pitkulaisia t. suikeita, tylppämäisiä. — ☉ 6, 7 valk. t. kellak. k.

Tunt. (K. Kv. L. Lv.) *Sormenpituinen, vähän lyhytkarvainen.*

••• Varsi vesaton; lehdet nalkkimaisia, 3—7-halkoisia.

*S. adscendens* L. *Rohenus-riffo.* — Kukat tertussa t. haarovassa röyhyssä, 2 suojuslehdyykkää kukkaperäin tyvellä; lehdet vastopuikeita t. nalkkimaisia, 3—7-hampaisia, t. loivaan puikea- t. soikea-liuskaisia, tahmeita; kota noin perän pituinen, kukan-alainen. — ☉ ☉ 6, 7 valk. k.

Kallioilla, harv. (T. K.) *Varsi tukevampi ja pystyisempi sekä suorempi k. seuraavalla ja muuten kaikin osin isompi.* — *S. petraea* Gunn. *S. controversa* Sternb.

*S. tridactylites* L. *Mäfiriffo.* — Kukat ed.; lehdet nalkkimaisia, jakauneet keskustaan t. alemma 3:ksi, harv. 5:ksi suikeaksi, hyvin siirottavaksi liuskaksi, tahmeita; hedelmäperä tav. pidempi kun kukan-alainen kota. — ☉ 5, 6 valk. k.

Kallioilla ja hietämässä, harv. (A. T. U.) *Tav. 2—6 tuuman pituinen, hentoinen, haarova, pienikukkainen; väl. vähäinen, haaraton, kokonaisilla suikeilla lehdillä; kukkaperät lop. siirottavia ja tav. monin kerroin hedelmää pidemmät.*

### CHRYSO SPLENIUM L. Sinnunfilma. Guldpuhra.

*Chr. alternifolium* L. — Lehdet munuamaisia, vuorotaisia, päältä puolen harsukarvaisia; suojuslehdet puikeita; heteitä 8. — ☉ 5 kelt. k.

Hetteik. ja kost. paik. (E. — L. Lv.) *Yliset lehdet ryhmässä vähäisten, m. perättönten kukkain ympärillä.*

*Chr. tetrandrum* Th. Fr. — Lehdet ed., päältä puolen kaljuja; suojuslehdet nalkkimaisia; heteitä 4. — ☉ 6, 7 vehreänkelt. k.

Tunt. harv. (L.) *Kahta* — *monta kertaa pienempi ja hen-*  
*nompi k. ed.*

# 61 heimo. — CRASSULACEÆ. Mehuiskasveja.

## RHODIOLA L. Ruusujuuri. Rosenrot.

Rh. rosea L. — Kaksikotinen; kukat tiheissä latva-viuhkoissa; lehdet soikeita — pitkulaisia, litteitä, möyheitä. — 2 7, 8 kelt. k.

Tunt., merenrant. (Kv. L. Lv.) *Vähän seur. Leveälehtisen maksaruohon* muotoinen; juurakko mahkurainen, keltainen ja hyvänhajuinen. — *Sedum rhodiola* DC.

Muist. — Juurakko hyvänhajuinen, kuin ruusu-öljy. Siitä tehdään paikoin voidetta vanhoille haavoille. Myös kovaa päänsärköä vasten käytetään juurta ulkonaisesti murskattuna ja päälle sidottuna.

## SEDUM L. Maifaruho. Fetört.

† Lehdet leveitä, litteitä (ehkä paksuja).

S. telephium L. Semeälehtinen maifaruho. — Varsi pystöinen; kukat tiheissä, toistain 3-haarukkaisissa, palleromaisissa viuhkoissa; lehdet leveän-puikeita — suikeita, sahalaitaisia. — 2 8 vaaleankelt. k. —  $\beta$  purpureum: kukat punaisia.

Kallioilla, kivisein., turvekatoilla, tav. (E. — Pe. Kv.;  $\beta$  S.) *Lehdet ruodittomia, paksuja, meheviä, tav. vastakkaisia, vll. vuorottaisia.* — *S. maximum* Koch.

Muist. — Lehtiä käytettiin ennen polttohaavoihin, sormikoihin, peräpukamiin ja etikalla kastettuina varpaan känsiin. Mehua maidon-herasta nautittiin kerpukissa.

†† Lehdet m. liereitä.

S. acre L. Raffer maifaruho. — Kukat perättömiä viuhkossa; terälehdet paljon pidempiä kun suipot verholehdet; varsi-lehdet vuorottaisia, munanmoisia, tylppäpäisiä, kaljuja. — 2 6, 7 kelt. k.

Kuiv. paik. tav. (E. — P. Kv. Lv.) *Hyvin haarova rennoilla, monivuotisilla lehtivesoilla.*

Muist. — Kasvi (tuoreena) ulostuttaa, oksetuttaa, vesityttää, käytettiin kerpukissa ja us. vilutaudissa, kun joko kasvista puserrettua mehua t. keitetä nautittiin. Lehdet murskattuina ja mätähaavoille pantuina puhdistavat ne ja edistyttävät parannusta. Myös virmataudissa on kasvia ennen käytetty. Sen pulveria nautittiin neljännes t. puoli neljännesluotia erällään.

*S. sexangulare* L. Ruusikulmainen maffaruoho. — Kukat lyhytperäisiä, viuhkottain yhtyneissä tertuissa; varsilehdet liereitä, kaitais-pitkulaisia, tylppäpäisiä, kaljuja; varsilehdet tiheitä, 6-rivisiä. — 2/4 7 kelt. k.

Mäissä, harv. (A.) *Vaalean-vehreä, vähän sinertävä; ed. näköinen, soukemmilta, 6-rivisiltä lehdiltä eroitettava.*

*S. album* L. Valkkea maffaruoho. — Kukat haarovassa viuhkossa kaljuilla perillä; lehdet liereitä, pitkulaisia, tylppäpäisiä, sirottavia. — 2/4 7, 8 valk. k.

Kallioilla, harv. (A. T. U.) *Lehdet tav. punapilkkuisia; ponnet punasinervitä.*

Muist. — Mehua käytettiin vaimoväen vuotuja, mätähaavoja, ruumiin koita ja peräpukamia vasten.

*S. annuum* L. Bähä maffaruoho. — Kukat m. lehdettömässä viuhkossa; terälehdet tuskin verhoa pidemmät; varsilehdet tasasoukasti pitkulaisia, puoliliereitä, kaljuja, vähän ulospäisiä. — ☉ 6, 7 kelt. k.

Kuiv. paik. (A. — U. St. — S.) *Tav. pystöinen, 2—3-tuumainen, tumma, us. punapilkkuinen, vesaton t. pienillä vesoilla. — S. rupestre Fl. D.*

#### BULLIARDA DC. Pauniikko.

*B. aquatica* DC. — Kukat lehtihankaisia, epäperäisiä; lehdet tasasoukkia. — ☉ 6, 7 valk. k.

Järvenrant., kost. paik. harv. (E. — P. Kv.) 1/2—2 tuuman pituinen kasvi, us. möyheillä, m. dimämisillä lehdillä. — *Tillæa* L.

#### 62 heimo. — LYTHRACEÆ. Rantakukkaisia.

##### LYTHRUM L. Rantafukka. Fackelblomster.

*L. salicaria* L. — Kukat kiehkuroittain tähkässä; lehdet suikeita — pitkulaisia, vähän herttakantaisia, 2—3 vastakkain. harv. vuorottain. — 2/4 7, 8 pun. k.

Rant. tav. (E. — P. Kv. Lv.) 1—3 jalan pituinen; tähkä runsaskukkainen; lehdet sepokantaisia, väl. pehmeän-höykeitä.

Muist. — Lehtikeitettä käytettiin punatautiin, vatsatautiin, valkeaisen vuotoon, verisylykyn.

##### PEPLIS. Suhtafaa. Peplis.

*P. portula* L. — Kukat tav. terälehdettömiä; varsilehdet vastopuikeita t. lapiomaisia, vastakkaisia. — ☉ 7, 8 pun. k.

Vesikuopissa, järvenrant. (A. — K. St. H. S.) *Rento t. syvemmässä vedessä pystöinen; kukat pieniä, perättömiä, lehtihankaisia.*

### 63 heimo. — OENOTHERACEÆ. Helokkikasveja.

#### OENOTHERA L. Heloffi. Gultraf.

*O. biennis* L. — Heteet lanttopäisiä terälehtiä lyhemmät; varsilehdet puikean-suikeita, litteitä; varsi karheapilkkuinen ja karvainen. — 7, 8 pun. k.

Viljelömaissa, harv. (T. U.) *Kukat isoja, pitkätorvisia; kodat perättömiä suojuslehtien hangoissa. Tav. puutarhoista metsätynt.*

Muist. — Ranskanmaalla syödään juurta öljyn ja etikan kanssa niinhyvin raakana kuin kiehautettuna.

#### EPILOBIUM L. Horäma. Mjölke.

† Kukat epämukaisia, alaskaarevilla heteillä: *Chamaenerion* Scop.

*E. angustifolium* L. Maitohoräma. — Terttu monikkainen; lehdet hajallisia, suikeita, m. suorakulmaisesti suonisia. — 7 pun., harv. valk. k.

Mäkimaissa, mets. tav. (E. — L. Lv.) *Useimmin parinkynäräinen; tunturitienoissa kaikin puolin vähempi. — E. Gesneri Vill. E. spicatum* Lam.

Muist. — Haivenet sopivat täytteeksi tyynyihin j. n. e.; niistä taidetaan lankaaki kehrätä kynttilän sydämiksi. Juurivesat keväällä kelpaavat syödä parissina. Lehmät lypsävät hyvin tästä kasvista. Ansaitsisi viljeltää kivisessä ja multaisessa maanlaadussa, jossa metsää ynnä annetaan kasvaa. Juuret levenevät laajalta.

†† Kukat suunnallisia: *Lysimachion* DC.

\* Luotti 4-jakoinen, ulospäisillä liuskoilla.

*E. parviflorum* Schreb. Djaoräma. — Lehdet ruodittomia, suikeita, harseasti nyhäsaahaisia, lienteitä t. kaljuja; varsi liereä, tav. pehmytkarvainen. — 7, 8 pun. k.

Kost. paik., ojissa, harv. (A.) 2—3 vaaksan pituinen. — *E. pubescens* Roth.

*E. montanum* L. Mäfihoräma. — Lehdet hyvin lyhytruotisia, tav. puikeita, sahaampaisia, m. kaljuja. — 7, 8 pun., joskus valk. k. — *β collinum*: lehdet pieniä, monilukuisia; kukat kahta pienemmät.



Metsämaissa j. n. e. tav.  $\beta$  kuiv. paik. (E. — P. Kv.) *Toisintelea* 3-tuumaisesta kyynärän pituiseen;  $\beta$  tav. vaaksan pituinen 5—8:lla parilla pienempiä, soukempia lehtiä.

•• Luotti kokonainen t. lop. epämukaisesti liuskainen.

a — Varsi liereä, 2:lla selvällä, valkeanhöyteällä viirulla.

*E. origanifolium* Lam. *Setehoräma*. — Lehdet lyhytruotisia, puikeita, suippoja, sahaampaisia, kaljuja. — 4 7, 8 pun., harv. valk. k.

Tunt. hetepaik. (P. L. Lv.) 3—6 tuuman pituinen, väl. kooltaan k. keskimittainen *Mäkihorsma*. — *E. alsinifolium* Vill.

*E. alpinum* L. *Tunturi-horäma*. — Lehdet lyhytruotisia t. ruodittomia, soikeita — pitkulaisia, tylppäpäisiä, m. ehytlaitaisia, kaljuja. — 4 7, 8 pun., harv. valk. k. —  $\beta$  *dasycarpum*: kodat vaaleanhöyteitä.

Tunt. (Kv. P. L. Lv.) *Toisintelea* k. edellinenki 8—10-tuumaisesta ja m. pystisestä parin tuumaiseen ja rentoon 1—3:lla kukalla ylöskaarevassa latvassa. —  $\beta$  *E. nutans* Schmidt.

b — Varsi kalju, t. yleensä tasamukaisesti lienteä.

*E. roseum* Schreb. *Kuusu-horäma*. — Lehdet ruodikkaita, puikean-sukeita, harseasti hienosahaisia; varsi ylempänä lieminkäinen, 2-viiruinen johteisista ruodeista. — 4 7, 8 pun. k.

Kost. paik., läht. harv. (T.) 2—3 vaaksan pit., us. paljon haarova.

*E. palustre* L. *Suo-horäma*. — Varsi liereä, sileä, tasamukaisesti lieminkäinen; lehdet suikeita — tasasoukkia, ehyt. t. harseasti nyhälaitaisia; kodat lienteitä. — 4 7, 8 pun., harv. valk. k. —  $\beta$  *angustum*: lehdet kapeasti kaitaisia.

Kost. paik. tav. (E. — L. Lv.;  $\beta$  L. Lv.) *Toisintelea* paljon, haarattomana ja haarovana; lehdet muin  $\frac{1}{2}$  tuuman levyisiä. sormenpituaisia, muin linjan levyisiä, tuuman pituisia. —  $\beta$  *E. pal.  $\beta$  albescens* Wg.

*E. lineare* Mühl. *Pohjan horäma*. — Varsi liereä, muutamilla kohoisilla viiruilla, lieminkäinen; lehdet tasakaitaisia, ehytlaitaisia t. harseasti nyhähampaisia; kodat kaljuja. — 4 7, 8 valk. k.

Tunt. harv. (Lv.) Tuskin edellisen *toisintelosta*  $\beta$  eroitettava; kukat joskus punervia.

### CIRCÆA L. *Beiholehti*. Hexört.

*C. alpina* L. — Lehdet herttamaisia, harseasti juraham-

paisia, kiiltäviä, kalvosyrjäisillä ruodeilla; varsi ja kukkaperät kaljuja. — 2 6, 7.

Mets. kost. paik. (E. — P. Kv.) *Verho ja terä valkeita, harv. punervia.*

## 64 heimo. — HALORAGIDACEÆ. Ärviäisiä.

MYRIOPHYLLUM L. Ärviä. Kamblad.

*M. verticillatum* L. Siehifura-ärviä. — Kukat kaikki kiehkuroittain, kampamaisesti parijakoisten ylisten lehtien hangoissa; verho selvä; terälehdet pitkäveteisellä kynnellä. — 2 7 valk. k.

Vesikuljuissa, harv. (A. Ke. H. S.) *Kukkasuojukset pieniä, epäselviä; lehtiliuskat kaitoja, tasasoukkia.*

*M. spicatum* L. Tähtfä-ärviä. — Hede- ja emikukat kiehkuroittain lehdettömänä tähkänä; lehdet parijakoisia; terälehdet kynnettämiä; emikukat verhottomia. — 2 6, 7 valk. k.

Järv. ja selvemässä ved. (E. — L. Kv.) *Kukkasuojukset selviä, suomumaisia; hedekukat kiehkurassa välikköisen tähkän latvassa; emikiehkurat alempana.*

*M. alterniflorum* DC. Vuoro-ärviä. — Hedekukat vuorottaisia; emikukat kiehkuoroissa, alisimmat kiehkurat ylisimmissä lehtihangoissa; muuten k. ed. — 2 6, 7.

Järv. (E. — L. Lv.) *Kaikin osin paljon hienompi k. ed.; tähtä lyhempi, lehdetön, paitsi alisimmat emikiehkurat, jotka tav. ovat ylisten varsilehtien hangoissa.*

HIPPURIS L. Bejifuusi. Hästsvans.

*H. vulgaris* L. — Varsi nivelikäs, säteettäisillä, tasasoukilla — suikeilla, tylppäpäisillä lehdillä. — 2 6—8. —  $\beta$  maritima: lehdet 4—8-säteisiä, suikeita, aliset harvempia ja leveämpiä. —  $\gamma$  fluitans: varsi hervoton, laiehtiva; lehdet useampia, heinämäisiä.

Järvenrant. (E. — L. Lv.;  $\beta$  A. — U. St. — P. L. Lv.)

## 65 heimo. — POMACEÆ. Omenakasveja.

PYRUS L. Omenapuu. Äppel.

*P. malus* L. Omenapuu. Äppelträd. — Kukat perättömässä sarjassa; vartalot kannaltaan yhdistyneitä; lehdet puikeita, sahalahtaisia; hedelmä perästä sisään-painunut. — 2 5, 6 valk. t. punerv. k.

Lehtomäissä ja niituilla, harv. (A. U. H. S. K.) *Oksat usein orakärkisii; lehdet molemmin puolin kaljuja; hedelmänä: Omena.*

Muist. — Hedelmä yleiseen tuttu, ruokava ja terveellinen. Metsä-omenain puserretusta mehusta saadaan siiteriä ja etikkaa. Puuaine lujaa, hyvää sorvareille, puusepille j. n. e.

Kasvaa syksyisin siemenistä lihavassa, päivän-paisteisessa maassa.

*P. communis* L. Perunapuu. Pärönräd. — Kukat sarjoissa, kantaan asti erillisillä vartaloilla; lehdet puikeita, suipukoita, ehytlaitaisia t. hienosahaisia; hedelmä perää kohden soukkena. — h 5, 6 valk. k.

Ait. harv. (A.) *Metsistyneellä ovat haarat oraisia; lehdet lop. kaljuja, ainoastaan laidalta lienteitä; sikiäimet hienosti vanukkeisia; hedelmänä: Peruna.*

Muist. — Hyöty sama k. ed.

### SORBUS L. Pihlaja. Oxel, Rönn.

*S. aucuparia* L. Kotipihlaja. — Lehdet kokonaan parilehtisiä, sahalaitaisilla, alta kaljuilla t. hienohöynteillä lehdyköillä; kukat vähemmin tiheissä, m. tasalatvaisissa röyhyissä; hedelmä pitkulais-palleroinen. — h 5, 6 valk. k.

Vuorisissa mets., kylätien. tav. (E. — L. Lv.) *Hedelmä punainen: Pihlajanmarja. — Pyrus Gärtn.*

Muist. — Marjoja on ennen käytetty kivitaudissa ja vesi-um-messa: syötiin 10 t. useampi marja kerran kahdesti päivässä, pidempi aikaa.

Marjat, etenki vilunpanemat, antavat hyvästi paloviinaa, marjamehu siiteriä ja etikkaa. — Sikoja taidetaan lihottaa pihlajan-marjoilla. Niillä pyydystetään myös laululintuja. Puu kasvattaa kauniita, varjoisia lehtokujia. Taidetaan ympätä. On lujaa, kelpaava kaikellaisiin puukalu-töihin.

Kasv. marjoista, lokakuussa varjopaikkoihin ja mustaan multa kylvettyinä.

*S. fennica* Kalm. Suomen pihlaja. — Lehdet puikeita — pitkulaisia, kannalta pariosaisia, päätä kohden ainoastaan liuskaisia, sahalaitaisia, alta vaalean-höynteitä; kukat ed. — h 5, 6 valk. k.

Niit., kyl. harv. (A. T.) *Edellisen ja seur. vaiheinen marjapuu. — S. hybrida* L., Hn.

*S. scandica* Fr. Ruotfin pihlaja. — Lehdet puikean-pitkulaisia, pykä-liuskaisia, sahalaitaisia, alta höynteitä, vaaleanharmaita; kukat tiheässä huiskilossa. — h 6 valk. k.

Vuorimäissä, kylissä, harv. (T.) *Hedelmä punainen, marjainen*. — *Cratægus aria* α *L. Fl. Sv. Pyrus aria Sv. B.*

**CRATÆGUS L.** Drapihlaja. Hagtorn.

*Cr. oxyacantha* L. — Kukat sarjamaaisessa huiskilossa, 1—3-vartalaisia; lehdet vastopuikeita, tav. 3—5:llä loivalla liuskalla, kaljuja; verholiuskat leveän-puikeita, lyhytsuippoja. — h 5, 6 valk. k.

Mäkimaissa, harv. (A.) *Orapiikkinen pensas, punaisilla, marjamaaisilla, jauhokkailla hedelmillä ja tav. 2:lla vartalolla.*

Muist. — Marjat taidetaan katovuosina käyttää leivän asemaksi; paikoin niistä valmistetaan juomista. Puu kovaa, soveliaista tarvepuiksi; kasvattaa hyviä pensas-aitoja.

Kasv. aukeille kedoille lokakuussa siemenistä, jotka taimivat 2 vuoden päästä.

**COTONEASTER Med.** Tuhkapuu. Oxbär.

*C. vulgaris* Lindl. — Kukkaperät lehtihankaisia, 1—3-kukkaisia; lehdet tav. soikeita, ehytlaitaisia, alta hienosti ja tiheästi harmaan- t. valkeanhöyteitä. — h 6 valk. t. punerv. k.

Mäkimaissa (A. — K. St. Kv. Lv.) 2—4 jalan pituinen pensas, tav. punaisilla, marjamaaisilla hedelmillä. — *Mespilus cotoneaster* L.

66 heimo. — **ROSACEÆ.** Ruusukasveja.

1 parvi. — **Rosæ.**

**ROSA L.** Ruusu. Törnros.

† Piikit koukeroisia.

*R. canina* L. Orjanruusu. — Piikit tasamukaisia, koukeroisia; hedelmät puikeita — pitkulaisia, perineen kaljuja; lehdykät 2—3-parisia, soikeita — suikeita, sahalaitaisia. — h 6, 7 pun. t. valk. k.

Mäkimaissa j. m. tav. (A. — K. St. H. Pe.) *Lehdykät toisint. muin kiiltävind: var. nitida, muin sinertävind, himeind: var. opaca.*

Muist. — Hedelmästä valmistetaan lientä jäähdyttäväksi ja janon-sammuttavaksi juomaksi kuumetaudeissa. Ne kelpaavat myös tavallisiin ruokakeittoihin ja marjahilloksi. Taikka kuivataan ne, jauhetaan ja laitetaan velliksi, leiväksi j. n. e.

*R. dumetorum* Thuill. Mätiruusu. — Lehdykät lienteitä; hedelmät pitkänpalleroisia; muuten k. ed. — h 6, 7 pun. t. vaalak. k.

Mäkimaissa (A. U. Ke. St. H.) *Epäilemättä vaan edellisen toisintelo.* — *R. collina* Wg.

†† Piikit suoria, ehkä välistä vähän alaskaarevia t. epäkäyriä.

*R. tomentosa* Sm. *Ähoruufu.* — Piikit suoria; hedelmät pitkänpalleroisia t. soikeita, nystykarvaisilla perillä; lehdykät k. ed., soikeita t. puikean-suikeita. — h 6, 7 pun. t. valk. k.

Niittumäissä, harv. (A. U.) *Pidempi pensas, vähän pitkulaisilla, kovemmilla ja myöhäkypsyisemmillä hedelmillä k. seur.; verholiuskat parijakoisemmat ja sirottavammat, muin pysyviä kypsyymiseen, muin ennen menehtyviä. Tämä ja seur. laji usein tuskin eroitettavia, jos ei kypsyneistä hedelmistä; lehdykät molemmilla tois-sahaisia.*

*R. mollissima* Fr. *S̄haruufu.* — Piikit suoria; hedelmät palleroisia, pystyjä, nystykarvaisilla perillä; lehdykät 2—3-parisia, soikeita — pyöreämaisii. — h 6, 7 pun. t. valk. k.

Niittumäissä j. m. (A. — U.) *Matala pensas, us. tylppäpäisillä, epätasaisilla lehdillä, palleroisilla t. vähän litteämaisillä hedelmillä, jotka syyskuun puolivälissä kypsyvät; lähentyvillä, hiukan liuskaisilla, pysyvillä verholehdillä päässänsä.*

*R. cinnamomea* L. *Nurmiruufu.* — Piikit suoria; hedelmät palleroisia, perineen kaljuja; lehdykät 2—3-parisia, pyöreänpitkulaisia — vastopuikeita, enimm. tylppäpäisiä, yksikertaisesti sahalaitaisia, alta harmaanvalkeita ja tav. höyteitä. — h 6 pun. k.

Niit., metsämäissä (E. — L. Lv.) *Lehdykät välistä suip-poja, etenkin ylisemmät; korvaketten litteessä m. aina 2 piikkiä; hedelmät pieniä ja pehmeitä, tulipunaisia.* — *R. majalis* Retz. *R. cinerea* Sw. *R. spinosissima* Wg.

*R. karelica* Fr. *Rarjalan ruufu.* — Rungossa tiheältä suoria piikkejä ja sukasia; hedelmät pitkulaisia, vinoisia, perineen ylempää nystykarvaisia; lehdykät 2—3-parisia, pitkulaisia — puikeita, yksikertaisesti sahalaitaisia, harsukarvaisia; alta harmaahkoita. — h 6 pun. k.

Mäkimaissa, harv. (U. H. S. K. Kp. Kv. L.) *Verholiuskat tyveltä nystykarvaisia, kokonaisia, ehk' ei chylitaitaisia.*

## 2 parvi. — *Sanguisorbeæ.*

AGRIMONIA L. *Merijuuri.* *Äkermönja.*

*A. eupatoria* L. *Maarian merijuuri.* — Tertut pystyjä, peräkkäitä; lehdet epätasaisesti parijakoisia, puikean-pitkulaisilla

lehdyköillä; hedelmä-verho vastomunanmoinen, uurteinen tyveen asti, siirottavilla laitasukasilla. — 2½ 7 kelt. k.

Varjopaikoissa, harv. (A. T. H. S.) *Tav. 3—4 vaaksan pituinen, pitkällä, soukalla, tähkämisellä tertulla.*

Muist. — Kukat teenä terveellisiä. Paikoin käyt. myös juurta kuumetaudeissa.

A. pilosa Led. Karmainen merijuuri. — Tertut pitkäveteisiä, hentoja; lehdet parijakoisia 7—11:llä, alta vähän karvaisilla, jurasahaisilla lehdyköillä; hedelmä-verho vastokeilainen, syvä-uurteinen, tyveltä uurteeton, siirottavilla lähentyvillä sukasilla. — 2½ 7 kelt. k.

Varj. harv. (H. Ke. K.) — *A. eupatoria β davurica Link.*

### SANGUISORBA L. Punaloppu. Blodtopp.

S. officinalis L. — Tähkät palleromaisia t. pitkänpalle-roisia; heteet ei pidemmät terää; koko kasvi kalju. — 2½ 7, 8 pun. k. — *β polygama*: heteet hiukan terää lyhemmät; hedelmä-verhon torvi palle-kulmainen; varsi kalju.

Vetisillä niit. harv. (U.; *β Kv. Lv.*) *Lehdet parilehtisiä; tähkät veripunaisia.* — *β S. polygama F. Nyl., H. M. F.*

Muist. — Lehtiteetä käytettiin ennen punatautia ja muita sisällisiä verijuoksua vasten.

### ALCHEMILLA L. Poimulehti. Daggekåpa.

A. vulgaris L. Murmen poimulehti. — Lehdet munuamaisia, 7—9-liuskaisia, poimuksisia, pyöreämaisilla, ylt'ympäri sahalaisilla liuskoilla. — 2½ 5, 6 vehr. k.

Niit. tav. (E. — L. Lv.) *Muin kalju, muin karvainen.*

Muist. — Käyt. ennen vetotautia ja vatsatautia vasten.

A. alpina L. Tunturin poimulehti. — Lehdet kourajakoisia; lehdyköitä 5—9, suikeita, tylpällä, suipposahaisella päällä, alta silkkimäisiä. — 2½ 6, 7 vehr. k.

Tunturitien. (L. Lv.) *Kaikin osin edellistä pienempi.*

### 3 parvi. — *Dryadeæ.*

RUBUS L. Matuffa. Hallon, Hjortron etc.

† Varsi puutava.

R. idæus L. Maaran-matuffa. Hallon. — Varsi pysty, sukapiikkinen; aliset lehdet tav. 2-parisia, yliset (väl. kaikkiki) 3-sormisia t. yksikertaisia; lehdykät alta tav. valkeita; terälehdet pitkulaisia, pystyjä. — ½ 6, 7 valk. k.

Mäkimaissa, kiviraunioissa, tav. (E. — L. Lv.) *Toisintele kaikilla lehkillä 3-sormisina ja pitkulaisilla t. pyöreämaisillä, jonnekerran yhdeksi yhtyneillä lehdyköillä; marjat punaisia, harvoin valkeita: Vaderma, Vaaran, Vattu.*

Muist. — Vaaran-siirappia saadaan marjamehusta ja samasta verrasta sokuria. Hyvää ja terveellistä sekoittaa kuuma-  
taudin juomiin. Kukat hyvin sopivia hiestyttäväksi teeksi vilustumisessa ja moninaisissa muissa kohtaamisissa. Marjoista taide-  
taan myös viiniä valmistaa. Antavat hyvän maun paloviinalle, oluella, etikalla j. n. e.

R. cæsius L. *Sinimatuiffa*. — Varsi rento, liereä, kalju, tav. sinettävä, lyhyillä ja soukilla, suorilla piikeillä; lehdet 3-sormisia; lehdykät ohukaisia, puikeita, alta tav. lienteitä ja hiukan vaalahtavia; röyhy toiskertainen, vähän karvainen; terälehdet leveän-vastopuikeita. — ½ 6, 7 valk. k.

Kivisissä paik. harv. (A. U.) *Varsi saa joskus hyvin hyötyisissä varjopaikoissa 5-sormiset lehdet; röyhyhaarat väl. piikilliset t. nystykarvaiset; hedelmä sinettävä.*

Muist. — Käyt. kuin edellinenki.

#### †† Varsi ruohomainen.

R. saxatilis L. *Sillumatuffa*. Jungfrubär. — Varsi karhea, monikukkainen, suikertavilla lonkeroilla; kukkaperät harvoin kukkaa pidemmät; terälehdet suikeita, ei paljon verhoa pidemmät, varsilehdet 3-sormisia; hedelmänä muutamia, ei paljon yhtenäisiä kivihedelmiä. — ¼ 6 valk. k.

Kivisissä metsälehdöissä, tav. (E. — L. Lv.) *Hillukka isoilla, punaisilla kivihedelmöillä.*

R. castoreus Læst. *Säpin matuffa*. — Varsi harvakukkainen, tav. karhea ja lonkeroton; kukkaperät pitkäveteisiä; terälehdet monin kerroin verhoa pidemmät; varsilehdet 3-sormisia; hillukassa 5—7 kivihedelmystä. — ¼ 6, 7 pun. k.

Virtain ja puroin äyryissä, harv. (L.) *Edellisen ja seuraavan välimuoto; marjat hapahkoita.*

R. arcticus L. *Maaran-matuffa*. Åkerbär. — Varsi 1—3-kukkainen, piikitön ja lonkeroton; terälehdet m. vastopuikeita, pitkäveteisiä; varsilehdet 3-sormisia, tylppäsahaisia; hillukassa monilukuisia kivihedelmiä. — ¼ 6 pun. k.

Palomaissa, ojareunoilla j. n. e. (E. — L. Lv.) *Marjat mustanpunaisia, hapakan ryytimäisiä: Maamuuramia, Mesimarjoja.*

Muist. — Marjat hillottuna sokurin kera ovat oivallisia vahvistamaan ja virvottamaan kuumetaudissa.

Käyt. marjahilloksi; lisäävät viinille sekä voimaa että makua. Ovat makunsa ja hajunsa suhteen etevimpiä kaikista Euroopan metsäkasvoisista marjoista. Näistä taidettaisiin parhaimpia viinejä valmistaa Pohjanmailla.

Ist. ryytimaihin juurivesoilla tahi nuorilla taimilla varjoon. Pitää lumella ja havun-oksilla peitettämän pitkälle kevättä kun eivät kärsi yö-halvoja.

*R. chamæmorus* L. Muuran-matuffa. Hjortron. — Kakkikotinen; varsi 1-kukkainen; lehdet yksikertaisia, m. munuamaisia, 5—7-liuskaisia. — 2 6 valk. k.

Metsäsoissa (E. — L. Lv.) *Toisintee 4-lukuisilla kehösilla; marjat punaisia, lop. keltaisia: Suomuuramia.*

Muist. — Marjat luettiin ennen veren-selvittäviin lääkeisiin, vilvoittavat kuumetaudeissa ja käytettiin punataudissa, kerpukissa, keuhkotaudissa j. m. Hilloksi otetaan puhdistettuja epäkypsiä marjoja, jotka sekoitetaan kypsyneistä marjoista siirapin paksuiseksi edeltäkäsinkin keitettyyn liemeen.

### FRAGARIA L. Manfiffa. Smultron.

*Fr. vesca* L. Mhomanfiffa. — Hedelmäverho alaspäinen; emien pohjus kalju; kukkaperän karvat myötäisiä t. hiukan siirottavia, lehtiruotien ulospäisiä; lehdet 3-sormisia. — 2 5, 6 valk. k.

Mäissä ja metsissä, tav. (E. — P. Kv. Lv.) *Marjat löyhdiä, meheviä, helposti eriyviä.*

Muist. — Marjat vilavoittavat, sammuttavat janon, ulostavat helposti ja luullaan estävän luuvaloa. Keuhko- ja kivi-tautiset sanotaan myös havainneet hyvää niiden syömisestä.

Ovat maukkaimpia marjalajeja; jotkut eriluontoiset niitä kuitenkin eivät taida nauttia.

*Fr. elatior* Ehrh. Gyötömanfiffa. — Kukkaperien karvat suoraan ulospäisiä; muuten k. ed. — 2 5, 6 valk. k.

Niittumäissä, harv. (U.) *Isompi edellistä; eräät varsikot eivät hedelmöity koskaan.* — *Fr. magna* Thuill.

*Fr. collina* Ehrh. Mätfimanfiffa. — Verho sisäkääntöinen; emien pohjus karvainen; kukkaperien karvat ei paljon siirottavia, lehtiruotien ulospäisiä; lehdet 3-sormisia. — 2 5, 6 valk. k.

Kuivissa paik., mäissä, harv. (A. U.) *Marjat kovempia ja kiinnempiä pohjuksessa; toisintee isommilla ja vähemmällä kulla.*

### COMARUM L. Rurenjaffa. Kråklöfver.

*C. palustre* L. — Lehdet 2—3-parisia. — 2 6, 7 rusk. k. Soissa, tav. (E. — L. Lv.) *Terälehdet paljo lyhemmät verhoa.*



Muist. — Keite-vettä juurista käytettiin keltatautiin. Juuret myös painavat villaisen keltaiseksi.

POTENTILLA L. *Ḥanḥenjaḥfa*, *Ḥanḥiffi*. Fingerört.

† Lehdet parijakoisia.

*P. multifida* L. var. *lapponica* Nyl. *Ḥapin ḥanḥiffi*. — Varsi koheneva; aliset lehdet parijakoisia parihalkoisilla lehdyköillä, yliset m. sormi- t. monijakoisia, suikeilla t. tasasoukilla liuskoilla; kukat leveässä röyhyssä; terälehdet verhoa lyhemmät. — 2½ 7 kelt. k.

Kuiv. paik. harv. (Lv.) *Vaaksan pit.*; lehdet *alta harmaanhöyteitä, päältä m. kaljuja*.

*P. anserina* L. *Ḥetoḥanḥiffi*. — Varsi suikertava; lehdet moniparisia, erisuurilla lehtipareilla; lehdykät suipposahaisia; kukkaperät lehtihankaisia, 1-kukkaisia. — 2½ 7, 8 kelt. k.

Laitumilla, teillä, tav. (E. — L. Lv.) *Lehdet tav. valkeakarvaisia, erittäin alustalta, joka usein on hopeankarvainen*.

Muist. — Keitevesi kasvista, niinmyös sen puserrettu mehu on ennen käytetty keuhko- ja kivitaudissa; muuten se on vesityttävä ja vähän turvottava.

Kasvi osottaa vesi- ja lähdesuonia. Juuria käyt. parkitukseksi.

†† Lehdet sormijakoisia; verho 10-halkoinen; terälehtiä 5.

• Kaikki lehdet 3-sormisia.

*P. norvegica* L. *Ḥorjan ḥanḥiffi*. — Lehdykät suikeita — soikeita, syväсахaisia t. pykälaitaisia, alta karvaisia ja vehreitä; varsi ylempää toishaarukainen; terälehdet ei verhoa pidemmät. — (○) 6—8 kelt. k.

Kuivissa, väl. kost. paik. (E. — P. Kv.) *Usein 2—3 vaaksan pituinen, pienillä kukilla ja pian kuihtuvilla aluslehdillä*.

*P. nivea* L. *Ḥalfea ḥanḥiffi*. — Lehdykät vastopuikeita, nalkkimaisia, pykäsahaisia, alta tav. valkean-vanukkeisia; varsi koheneva, lop. sangen pitkällä perillä; terälehdet verhoa pidemmät. — 2½ 7 kelt. k.

Tunt. harv. (P. L. Lv.) *Lehdet alustalta hopeankarvaisia*.

•• Kaikki lehdet 5-sormisia, ainoasti kukkien lähellä väl. 3-sormisia.

*P. argentea* L. *Ḥalewa ḥanḥiffi*. — Varsi koheneva, ylempää röyhyksi haarova, lyhyillä suorilla kukkaperillä; lehdykät nalkkimaisia, alta tav. valkeanhöyteitä, m. kannasta alkain lius-

kahampaisia, edes- ja ulospäisillä hampailla, viimeinen pitkävetinen; laidat taaskääntöisiä. — 2½ 6, 7 kelt. k.

Kuivissa paik. tav. (E. — P. Kv.) *Varsi* ½-kyynäräinen; lehtien alusta lumivalkean höytedä, väl. m. paljas ja vehreänharmaa: *P. argentea* β *sordida* Fr.

*P. reptans* L. Soifero-hanhiffi. — Varsi pitkälle suikertava; kaikki lehdet 5-sormisia; kukkaperät yksinäisiä, lehtihankaisia, 1-kukkaisia. — 2½ 7, 8 kelt. k.

Niitunlaiteilla, harv. (A.) *Varsi usein monta jalkaa pitkä; kukat isoja.*

Muist. — Vähän turvottava niinkuin koko tämä suku.

\*\*\* Aluslehdet 5-, varsilehdet 3-sormisia.

*P. alpestris* Hall. Kewäthanhiffi. — Varret kohenevia, lienteitä ja harseasti lyhytkarvaisia kuin suorat kukkaperätki; aluslehdet 5-sormisia pitkulaisen-puikeilla korvakkeilla; varsilehdet 3-sormisia; lehdykät nalkkimaisesti vastopuikeita, syväsaiaisja, alta karvaisia. — 2½ 5, 6.

Kuiv. niittumäissä (E. — L. Lv.) *Varsi us. punainen; terälehdillä lähes kantaa mustempi, ruskeankellervä pilkku.* — *P. verna* L. *P. salisburgensis* Hænke. *P. maculata* Pourr., Hn.

+++ Verho enimm. 8-halkoinen ja terälehtiä 4: *Tormentilla* L.

*P. tormentilla* Scop. Rätwänä-hanhiffi. — Lehdet 3-sormisia; varsilehdet ruodittomia, suikeilla, syväsaiaisilla lehdyköillä ja m. kourajakaisilla korvakkeilla; varsi koheneva. — 2½ 6—8 kelt. k.

Mets., ahoilla, tav. (E. — L. Lv.) *Korvakkeet isoja, syväjakoisia.* — *Tormentilla erecta* L.

Muist. — Juuri turvottava; käytetään punataudissa, vatsurissa niin ihmisten kuin eläinten hyväksi. Juuri nahkain parkitukseksi m. tammenkuortaki parempi. Sen puruilla Lappalaiset painavat nahkan punaiseksi.

### SIBBALDIA L. Rätwänä.

*S. procumbens* L. — Lehdet 3-sormisia nalkkimaisilla, päästä 3-hampaisilla lehdyköillä; kukat ryhmässä. — 2½ 7, 8 kelt. k.

Tunturikasvi (L. Lv.) *Kukat pienukaisia lyhyissä, lop. pidenneissä, juurakosta lähtevissä haaroissa.*

## GEUM L. Relluffa. Kummer.

*G. urbanum* L. Ryläfelluffa. — Pehmytkarvainen; kukat pystyjä vastopuikeilla, harvoin verhoa pidemmillä terälehdillä, ilman näkyväisettä kynnettä; hedelmysten ota pidempi lyhytkarvaisia luotteja; aluslehdet isopäättöisesti parijakoisia, päätölehti tav. 3-liuskainen; varsilehdet 3-jakoisia, sahalaitaisia. — 2/4 6, 7 kelt. k.

Pensastoissa (E. — Pe. Kv.) 1—1½ jalan pituinen.

Muist. — Juuri ryyti-hajuinen, hiottava, vatsan vahvistava, käytettiin vilutauteja vasten, ja nautittiin ¼ luotia eräänsä 4 kertaa päivässä tois-päiväisessä, ja vähän enemmän kolmas-päiväisessä vilutaudissa. Samoin on sitä ennen käytetty vatsataudissa, veri- ja muissa juoksuissa, kouristuksissa, ähkyssä, hinkuyskässä. Juuri antaa myös hyvän maun kaljalle ja pidättää sen happanemasta.

*G. intermedium* Ehrh. Bälifelluffa. — Kukat nuokahtavia; terälehdet pyöreämäisellä lavalla, lyhyellä kynnellä; muuten k. ed. — 2/4 6, 7 kelt. k.

Pensastoissa, harv. (T. St.) Edell. ja seuraavan lajin seka-muoto, tav. milloin toiseksi, milloin toiseksi niistä luettu.

*G. rivale* L. Rrofelluffa. — Kukat nuokkuvia; terälehdet verhon pituisia pitkäveteisillä kynsillä; hedelmysten ota pitkäkarvaisten luottien pituinen; aluslehdet isopäättöisesti parijakoisia; varsilehdet 3-jakoisia. — 2/4 5, 6.

Vetisillä niit. tav. (E. — L. Lv.) Kukat m. rippuvia, vastoherttaisilla, vaaleankeltaisilla, ruskeaviiruisilla terälehdillä. Välistä kasvavat verholiuskat isoiksi liuskahampaisiksi lehdiksi, joten myös terälehtien luku lisääntyy: *G. hybridum* Wulf.

Muist. — Juurta käytettiin ennen kiinan asemesta vilutaudissa ja muissa k. ed.

## DRYAS L. Rapinmuotto. Fjellsippa.

*Dr. octopetala* L. — Lehdet kokonaisia, sahalaitaisia. — 2/4 8 valk. k.

Tunturik. (L. Lv.) Kukat m. kuin Vuokonkukkia; lehdet alta valkeanhöyteitä.

## 4 parvi. — Spirææ.

## SPIRÆA L. Angerwo. Spirea, Kassöta.

*Sp. ulmaria* L. Mesi-angerwo. — Varsi kulmikas; kukat viuhkoissa; lehdet pariosaisia, päätölehti isompi, 3-halkoinen, sivulehdykät kokonaisia, toissahaisia; hedelmukset kipertyneitä. — 2/4 6, 7 valk. k.

Kosteilla niit. tav. (E. — L. Lv.) *Kukat väkevän hajuisia.*

Muist. — Kukat luultiin taudin aineita ulos ajaviksi; käytettiin ihote-kuumeissa j. m. rohtuma-vioissa.

Lehmät ja vasikat ennen kuolevat nälkään, kun söisivät tätä kasvia.

*Sp. filipendula* L. *Sifo-angermo*. — Varsi liereä; kukat ed.; lehdet pariosaisia monilukuisilla, liuskaisilla lehdykkä-pareilla; hedelmykset suoria. — 4 7 valk. t. punerv. k.

Kuivilla niit. (A. T. U.) *Verholiuskat ja terälehdet* tav. 6—7; *juurihapset rippuvilla mukuloilla.*

Muist. — Juuria taidetaan katovuosina koota leivän-aineksi. Siat niitä mielisesti hakevat. Kukat antavat hyvän maun maidolle, kun sitä niiden kera keitetään.

## 67 heimo. — DRUPACEÆ. Luumarjaisia.

### PRUNUS L. Tuomi. Kirs.

† Kukkaperiä 1—3 samasta silmikosta, tuskin kukkia pidemmät; hedelmä sinettävästi härmäinen, litteämäisellä luulla.

*Pr. spinosa* L. *Oratuomi*. — Orapiikkinen pensas, 1—2:lla kaljulla kukkaperällä, palleroisilla sikiäimillä ja hedelmillä; lehdet suikean-vastopuikeita, hienosahaisia, m. kaljuja. — 4 5 valk. k.

Mäkimaissa, harv. (A.) *Kukoistaa ennen lehtiä t. lehtien puhkeamaisillaan ollessa: var. coetanea; hedelmät isoja sinettäviä marjoja; orat, us. 2 tuuman pituisia, saavat alkunsa kukoistavista sivu-oksista.*

Muist. — Marjat ovat vesityttäviä, käytetyt kivi- ja munuais-taudeissa. Kukista valmistetaan helposti ulostavaa teetä. Nuorista kuumaan veteen pannuista ja kuivatetuista lehden-aluista tulee hyvää teetä, m. kuin kiinalaista.

Marjoista, etenki vilunpanemista, valmistetaan maukasta viiniä. Ne murskataan sydämineensä ja pannaan viiniin. Oratuomi sopii hyvin pensas-aidoiksi kuiville nurmimaille.

†† Kukkia 1 — useampi sarjassa t. tertussa; hedelmä härmätön, palleroisella luulla: *Cerasus* Adans.

*Pr. cerasus* L. *Kirjiffä-tuomi*. Kersbär. — Kukat m. perättömässä sarjassa; lehdet soikeita, suippoja, hienosahaisia, ylt'ylä kaljuja, nystyrättömiä. — 4 5 valk. k.

Viljelöm. metsist. harv. (A.) *Lehdet lujia ja sileitä; hedelmä mustanruskea: Kirsimarja. — Cerasus acida* Backh. *C. vulgaris* Mill.

**Muist.** — Marjoista tumineen murskatuista tislataan viilistytävää juomaa, soveliaasta kuumetaudeissa. Marjamehua, sokurin kera keitetynä, käyt. paljo lääketten sekoituksiin. Marjat hyviä hilloksi.

**Kasv.** sydämistä elokuussa kypsyvistä, ja myös juurivesoista, löyhään, vähän kivikkoiseen mustamultaan.

**Pr. padus** L. Metfätuomi. Hägg. — Kukat pitkävetisissä, vähän veltoissa tertuissa; lehdet soikeita, suipposahaisia, 1—2:lla nystyrällä kannassa. — h 5, 6 valk. k.

**Metsäniit.** tav. (E. — L. Lv.) *Hedelmät mustia: Tuomenmarjoja.*

**Muist.** — Marjoja käyt. punataudissa. Sydämet murskatuina umpिताudissa, kuori vilutaudissa.

Marjat kelpaavat myös paloviinan poltoksi. Sydämineen murskattuina ja viiniin t. paloviinan pantuina ne antavat sille hyvän persikka-maun.

Tuonta hevoiset niin kamoovat, että, jos on yksi tahi pari tuomenpulkkaa heinissä, tervehinki hevoinen seisoo syömättä, jos olkoot heinät kuinka hyviä. Vuohilla ikään on tuomeen luonnollinen inho, erittäin kun kukoistaa. Sanotaan karkottavan myyriä, ja lehdet, eloon sekoitettuina, hiiret ladoista.

**Kasv.** siemenistä etenki alanko-maihin.

## 68 heimo. — PAPILIONACEÆ. Hernekukkaisia.

### 1 parvi. — Viciæ.

**LATHYRUS** L. Rätfelmä, Rätfin. Vial.

† Varsi 2:lla siipimäisellä särmällä.

**L. sylvestris** L. Metfänätfin. — Kukkaperät monikukkaisia; verhon 4 yliset hampaat m. yhtä suuria, leveän-äimämäisiä: lehdet 1-parisia, siivikkäillä ruodeilla ja suikeilla lehdyköillä; korvakkeet ei vartta leveämmät. — 2l 7, 8 pun. k. —  $\beta$  latifolius: lehdet pitkänpyöreitä — soikeita.

Niittumäissä (A. — K. St. — Kv.;  $\beta$  U.) *Lehdykät kaitoja, miekkamaisesti suippoja,  $\beta$ :n leveämpiä, tav. tylppiä, pieni ota päässä.* —  $\beta$  *L. platyphyllus* Retz.

**Muist.** — Ansaitsee viljentää kivisekaisessa maassa.

**L. palustris** L. Aronätfin. — Kukkaperät monikukkaisia; verhon 2 yliset hampaat suippoja, paljon lyhemmät ja leveämmät toisia; lehdet 2—3-parisia, suikeilla — tasasoukilla lehdyköillä ja siivittömillä, päältä puolen venhomaisilla ruodeilla; korvakkeet varren levyisiä. — 2l 7, 8 pun. k.

Vetisillä niit. (E. — P. L. Lv.) *Lehdykät 2 linjan levyisiä.*

†† Varsi 4-kulmainen, m. siivitön.

*L. pratensis* L. Murminäffin. — Kukkaperät monikukkaisia; lehdet 1-parisia; lehdykät suikeita, suippoja; kaikki verho-hampaat äimäpäisiä. — 2½ 7, 8 kelt. k.

Niit. tav. (E. — P. Kv. Lv.) *Toisintele leveämmillä ja kaidemmilla lehdyköillä, kaljuna ja valkeanhöyryednä.*

Muist. — Oivallinen heinälaaji niituilla. Kasv. siemenistä savisekaiseen maanlaatuun.

*L. maritimus* Big. Merinäffin. — Kukkaperät ed.; lehdet 3—8-parisia, soikeilla lehdyköillä ja isoilla, m. herttamaisilla korvakkeilla. — 2½ 7, 8 pun. k.

Somerikoissa merenrann. harv. (U. K. P. Kv. L. Lv.) *Toisintele kaljuna ja kuta kuinki karvaisena. — Pisum L.*

Muist. — Leivän aineeksi katovuosina käytetty.

OROBUS L. Linnunherne. Gökärter.

*O. niger* L. Musta linnunherne. — Varsi pysty, haarova, 4-kulmainen; lehdet 5—8-parisia, leveän-suikeilla lehdyköillä ja suikeilla, äimäpäisillä korvakkeilla. — 2½ 6, 7 purp. k.

Niittumäissä, harv. (A. H.) *Välistä kyynärän pituinen; mustenee helposti kuivaessa; palot pitkiä, monisiemenisiä.*

Muist. — Juuri leivän aineeksi soveliaasta.

*O. tuberosus* L. Syyliäinen linnunherne. — Varsi siivikäs, haaraton; lehdet 2—4-parisia, kaidan-suikeilla — pitkänpyöreillä lehdyköillä; korvakkeet nuolipuolikkaita, suippoja, tav. ruotia pidemmät. — 2½ 5, 6 purp. t. punasinerv., harvoin valk. k. —  $\beta$  tenuifolius: lehdet m. tasasoukkia.

Niittumäissä, harv. (T. U. H.;  $\beta$  T.) *Lehdykät tav. tylppäpäisiä.*

Muist. — Juuret keitettyinä maistuvat hyvältä ja ovat ruokavia.

*O. vernus* L. Renväinen linnunherne. — Varsi haaraton, alempaa tylppämaisesti 4-kulmainen, ylempää 3-tahkoinen, 1:llä tylpällä ja 2:lla ohuella, kaidalla kulmalla; lehdet 2—4-parisia puikeilla, pitkäsuipoilla lehdyköillä; korvakkeet nuolipuolikkaita, suippoja, tav. lyhemmät ruotia. — 2½ 5 pun. t. punasinerv. k.

Leht. (E. — P. Kv. Lv.) *Lehdykät usein tuuman levyisiä.*

VICIA L. Birna. Vicker.

† Tertut monikukkaisia, pitkäperäisiä.

*V. sylvatica* L. Rurenbirna. — Tertut moniparisia lehtiä pidemmät; lehdykät pitkulaisia, tylppiä; korvakkeet kuutavia, sukahampaisia. — 2½ 7, 8 valk., siniviiruisilla k.

Metsäniit. (E. — P. Kv. Lv.) *Lehdillä pitkä, haarova kärhi.*

V. *cracca* L. *Spirewirna.* — Lyhyesti lienteä; tertut lehtien pituisia; kukat suojuksettomia; verhon 3 aliset hampaat m. tasamukaisia, lyhyen-suikeita; purjeen lapa kynnen pituinen; lehdet moniparisia, lehdykät pitkän-suikeita, tylppä- ja otapäisiä; pal'ot liereitä, 6—10-siemenisiä; varsi hervoton. — 2/ 6—8 sin. k.

Pelloissa, niit. tav. (E. — L. Lv.) *Koko kasvi lyhyempi lienteä k. seur.; korvakkeet nuolipuolikkaita, ehytlaitaisia.*

V. *villosa* Roth. *Ruiswirna.* — Villa-höyteä; kukat suojuksettomia; verhon aliset hampaat pitkiä, äimämäisiä; teräpurjeen lapa kahta lyhyempi kynttä; lehdet moniparisia, lehdykät pitkulaisen-suikeita, höyteitä; pal'ot soikeita, harvasiemenisiä. — ☉  
 ) 7, 8 punasin. k.

Pelloissa, harv. (A.) *Kukat kahta isompia ja purpuraisempia k. ed., johon muuten kyllä liki vetää; palot 3—6-siemenisiä; korvakkeet ed.*

†† Kukkaperät sangen lyhyitä, 1 — harvakukkaisia.

V. *sæpium* L. *Uitowirna.* — Kukkaperät ylisissä lehtihangoissa, lyhyitä, 3—5-kukkaisia; pal'ot pystöisiä (välistä vaan 1—2); lehdet noin 5-parisia, pitkulais-puikeilla, ehytlaitaisilla lehdyköillä, joista viimeiset vähempiä. — 2/ 5, 6 purp. t. punasin. k.

Niittumäissä (E. — P. Kv. Lv.) *Varsi hervoton; lehdet sortoparisia.*

V. *sativa* L. *Ulowirna.* — Kukat parittain; pal'ot karvaisia; lehdet 5—7-parisia, lehdykät pitkulaisen-nalkkimaisia, poikki- ja otapäisiä; korvakkeet hammaslaitaisia; siemenet litteämäisiä. — ☉ 7 purp. k.

Pelloissa, harv. (A. — K. St. — Kp.) *Paljon isompi seuraavaista, leveämmillä, litteämmillä ja höyteämmillä pal'oilla.*

Muist. — Sen vehreät siemenet ovat mieluisimpia kotilinnuille, erittäin kyhkyisille. Kalliilla ajalla ja katovuosina taidetaan tämän ja muiden virnain siemenet, rukiilla sekoitettuina, käytettää leiväksi. Oivallinen rehukasvi.

V. *angustifolia* Roth. *Raitäwirna.* — Kukkia 1—2; pal'ot sangen lyhytperäisiä, ohuen lienteitä, lop. m. kaljuja; lehdet 3—4-parisia, lehdykät suikeita — tasasoukkia, alimmaisiet lyhempitä, lovipäisiä; korvakkeet hammaslaitaisia; siemenet palleroisia, sileitä. — ☉ 7 purp., harv. valk. k.

Pelt., mäissä j. n. e. (E. — P. Kv.) *2—4 vaaksan pituinen; lehdykät 1—2 linjan levyisiä; verhon hampaat tav. itseä verhoa lyhemmät.* — V. *sativa* β *nigra* L. V. *segetalis* Thuill.

ERVUM L. *Wirmilä*. Lins.

*E. hirsutum* L. *Peltowirmilä*. — Perät tav. monikukkaisia, ilman lisäkkeittä; terä verhoa pidempi; lehdet 6—8-parisia, m. tasasoukilla lehdyköillä; pal'ot höykeitä, 2-siemenisiä. — ☉ 6 7 vaaleansin. k.

Kuivissa paik., pelt. (E. — P. Kv.) *Kukat sangen pieniä*. — *Vicia Koch., H. M. F.*

*E. tetraspermum* L. *Mäfwirmilä*. — Perät 1—3-kukkaisia; lehdet 3—4-parisia, m. tasasoukilla lehdyköillä; pal'ot kaljuja, 4—6-siemenisiä. — ☉ 6—8 vaaleansin. k.

Kuivissa paik. harv. (A. — K. St. H. Kv.) *Kukat pieniä; verho lyhyt; lehdet typpöitä; toisintees 3-kukkaisilla tertuilla ja 5—6-siemenisillä pal'oilla*. — *Vicia Lois., H. M. F.*

2 parvi. — **Hedysareæ.**HEDYSARUM L. *Epinnättin*.

*H. obscurum* L. — Varsi pysty; lehdet 4—9-parisia, päätölehdellä; lehdykät pitkulais-puikeita — soikeita, kaljuja; tertut lehtihankaisia, peräkkäitä. — 2½ 7 punasinerv., harv. valk. k.

Tunturikasvi (Lv.) *Pal'ot kaljuja, nuokkuvia, m. tuumanpituisia*.

3 parvi. — **Astragaleæ.**PHACA L. *Peuranwirna*. Fjellvicker.

*Ph. frigida* L. — Varsi pysty; lehdet 4—5-parisia, lehdykät kummastaki päästä pyöreämäisiä; terttuja 2—4, tasapitkiä; pal'ot alaskääntöisiä, verhosta ulottavalla tyvellä. — 2½ 7 kelt. k.

Tunturikasvi, harv. (P. L. Lv.) — *Ph. alpina* L. *Fl. Sv.*

OXYTROPIS DC. *Seulanfärri*. Uddkök.

*O. campestris* DC. *Sellermä feulanfärri*. — Varsi kohe-neva, harsukarvainen; lehdet moniparisia suippoisilla, silkkimäisillä lehdyköillä; suojukset verhoa lyhemmät; pal'ot pystyjä, munanmoisia — pitkulaisia, pullakoita, pehmytkarvaisia. — 2½ 6, 7 kelt. k. — β *sordida*: kukat keltaisia sinipunervilla t. sinisillä pilkuilla, väl. kokonaan sinisiä; verhohampaat tasasoukempia ja pidempää.

Kuivissa paik., harv. (H. S. K. Kv. P.; β L. Lv.) *Pal'ot m. 2-pesäisiä, pullakoita*. — *Phaca* Wg. — β *Astragalus sordidus Willd.*

*O. lapponica* Gaud. *Sinnermä feulanfärri*. — Varsi sangen lyhyt, haarova, myötäkarvainen; lehdet noin 10—12-parisia,



suikeilla, suippoisilla, harmaanhöynteillä lehdyköillä; pal'ot alaskääntöisiä, m. liereitä, perättömiä. — 24 7 sinipun. k.

Tunturikasvi, harv. (L.) *Näködän kuin Kurenherne, sormenpituusilla terttuperillä, mutta vähemmällä ja harvemmillä kukilla; lehdet päältä väl. m. kaljuja.* — *Phaca montana* Wg. *Fl. L.*

#### ASTRAGALUS L. Kurenherne. Kloärter.

*A. alpinus* L. Tunturi kurenherne. — Varsi alussa sangen lyhyt, lop. koheneva; lehdet 8—10-parisia pitkulaisilla, alta pehmytkarvaisilla lehdyköillä, puikeilla tylppäpäisillä korvakkeilla; pal'ot 3-kulmaisia, verhosta ulottavalla tyvellä. — 24 6, 7.

Tunturitien. tav. (H. S. K. P. L. Lv.) *Varsi alussa tuskin sormen pituinen, sitte 6—10 tuuman pituinen, haarova; kukat tav. valkeita, siniviiruisia, väl. puhdassinisiä t. valkeita.* — *Phaca astragalina* DC. *Ph. minima* Less.

*A. oroboides* Horn. Lapin kurenherne. — Varsi koheneva; lehdet 5—7-parisia pitkulaisilla, tylpillä, kaljuilla lehdyköillä; korvakkeet ed.; terttuperät lehtiä pidemmät; pal'ot munanmoisia, alaskaarevia. — 24 7, 8 sin. k.

Tunt. harv. (Lv.) — *A. Leontinus* Wg. *Phaca oroboides* DC.

#### 4 parvi. — Trifoliæ.

#### LOTUS L. Matte. Gigelsärter.

*L. corniculatus* L. — Rento; mykeröt 2—6-kukkaisia; lehdykät ja korvakkeet puikeita t. soikeita; pal'ot suoria, tasasoukkia, ulos- t. alaskääntöisiä. — 24 5, 6 kelt. k. — *β crassifolius*: lehdet möyheitä, kaljuja.

Laitumilla j. n. e. *β* merenrant. (A. — K. H. S.) *Toisintele kaljuna ja höytenä: var. villosa.*

#### MEDICAGO L. Mailanen. Luzern.

*M. sativa* L. Ryhmömailanen. — Kukat tertussa, suojuksia lyhemmillä peryköillä; pal'ot kiekuraisia, varuttomia, m. kaljuja; lehdykät pitkulaisia — vastopuikeita, latvapuolelta hammaslaitaisia; yliset korvakkeet ehytlaitaisia, aliset vähän hampaallisia. — 24 6, 7 sinipunerv. k.

Niittutöyr. metsist. harv. (T. U.) *Varsi 1—2 jalan pit., m. pysty.*

*M. falcata* L. Pöörtänö-mailanen. — Kukat tertussa, tav. suojuksia pidemmillä peryköillä; pal'ot pitkulaisia, kuutavasti käyriä, varuttomia, lieminkäisiä; lehdykät pitkulaisia t. m. tasasoukkia, latvapuolelta hammaslaitaisia; varsi ylöskaareva. — 24 6, 7 kelt. k.

Pellonpient. metsist. harv. (U.) *Lehdykät soukempia k. ed.*  
*M. lupulina* L. Nurmimaailanen. — Kukat soikeissa, ti-  
 heissä, monikukkaisissa mykeröissä; pal'ot munuamaisia, varutto-  
 mia, 1-siemenisiä; lehdykät vastopuikeita, ehytlaitaisilla korvak-  
 keilla; varsi rento t. ylöskaareva. — ☉ 6–8 kelt. k.

Pient., teillä, harv. (A. T. U. S.) *Vähäinen, sangen pienillä*  
*kukilla, veltolla, haarovalla varrella.*

MELILOTUS Adans. Mesiffä. Honingsklöfver.

*M. macrorrhiza* Pers. Teemämesiffä. — Kukat pitkäve-  
 teisissä tertuissa, tasapitkillä terälehkillä; pal'ot munanmoisia, ly-  
 hytsuippoja, kurttuaisia, lieminkäisiä, lyhytperäisiä; aliset lehdykät  
 vastopuikeita, yliset pitkulaisia, sahalaitaisia; korvakkeet äimämai-  
 siä, eheitä. — ☉ 7 kelt. k.

Niit., tievars. metsist. harv. (A. T.) *Varsi koheneva, pitkä;*  
*kukat isompia kun seur. lajen.* — *Trifolium melilotus* L. *M. offi-*  
*cinalis* Willd.

*M. arvensis* Wallr. Ösman mesiffä. — Kukat ed., venho  
 lyhempi toisia tasamukaisia terälehtiä; pal'ot vastomunaisia, vä-  
 hän peräkkäitä, tylppiä, otapäisiä, m. kaljuja; lehdykät vasto-  
 puikeita, yliset pitkulaisempia, lanttopäisiä, loivaan sahapampai-  
 sia; korvakkeet ed. — ☉ 7 kelt. k.

Kuivissa paik. metsist. harv. (T. U.) *Lehtihampaat lyhyitä,*  
*tav. tylppiä, katoavia lehdykän tyvipuolella; pal'ot niin tällä kun*  
*ed. pitkälle verhosta ulottavia; kukat pienempiä ja vaalakampia k.*  
*ed.* — *M. officinalis* Lam., *H. M. F.*

Muist. — Kasvin varsi ja kukat ovat lievitäviä ja peh-  
 mittäviä; käyt. laastariksi ja käärehauteiksi.

Antaa hyvää elikon ruokaa. Taidetaan viljentää santaisissa  
 maissa.

*M. alba* Lam. Balfea mesiffä. — Tertut ja korvakkeet ed.;  
 kukan siivet ja venho purjetta lyhemmät; pal'ot munanmoisia, verk-  
 komais-kurttuaisia, kaljuja, perättömiä, puoleksi verhosisäisiä; leh-  
 dykät harsusahaisia. — ☉ 7, 8 valk. k.

Katuvars., viljelöm. harv. (A. — Ke. Pe.) *Varsi tav. pysty,*  
*väl. miehenpituinen ja pensasmaisesti haarova; erotetaan helposti pe-*  
*rättömistä paloista.* — *M. vulgaris* Willd.

TRIFOLIUM L. Apifa. Väpling.

† Verhot karvaisia, ei pullakoita.

*Tr. pratense* L. Nurmi-apifa. — Varsi koheneva, suora;  
 mykeröt tav. yksinäisiä, munanmoisia; verhon ali-hammas ei pal-

jon verhoa pidempi; lehdykät vastopuikeita — leveän-suikeita; korvakkeet puikeita, otapäisiä, karvaisia. — 2½ 6—8 pun. k.

Niit. tav. (E. — P. Kv. Lv.) *Mykerö tav. perätönnä suojuksen sisällä, väl. lyhyesti ulottava; verho ylt'yli karvainen; koko kasvi välistä silkkimäinen.*

Muist. — Kasvi on eläinten pehkuna yleisesti tuttu. Lihavammassa maassa taidetaan se niittää 2, 3 kertaa vuodessa. Semmoinen maa pitää uusilla siemenillä kylvettämän 3, 4 vuoden päästä. Syötössä on vaarinotettava, että tämä (niinkuin muutkin apilalajit) sekoitetaan olilla, sillä muuten se on liian väkevä, etenki alussa. Sanotaan paremmin enentävän lihavuutta kun maitoa lehmässä, jonkatähden erittäin sopiiki syötekarjalle. Kukista, kuiva-tuista ja jauhetuista, taidetaan katovuosina valmistaa leivän-ainetta, kuin kaikkienkin apilasten kukista. Myös painetaan niillä vil-lainen vehreäksi.

*Tr. medium* L. *Metjä-apila*. — Varsi koheneva, tav. mutkiva; mykerö palleroinen, yksinäinen, lop. peräkäs; verhon alisin hammas ei paljon itseä verhoa pidempi; lehdykät suikean-pitkulaisia; korvakkeet kaitaisia, äimäpäisiä, karvaisia. — 2½ 6—8 pun. k.

Niit., lehtomäissä, harv. (E. — Pe. Kv.) *Lehdykät m. chyt-laitaisia; mykeröt usein suojuksettomia; verhot m. kaljuja, karvaisilla hampailla. — Tr. flexuosum* Jacq.

*Tr. arvense* L. *Sänön-apila*. — Mykeröt peräkkäitä, hyvin karvaisia; verhohampaat sukamaisia, kahta pidemmät terää; lehdykät kaitaisia, päästä leveämpiä. — ☉ 6, 7 punerv. k.

Mäissä, harv. (A. — K. H. S. Kv.) *Koko kasvi lauhakarvainen; toisintele rentona ja siirohaaraisena: var. prostratum* Myr.

*Tr. montanum* L. *Mäti-apila*. — Varsi suora, pysty; mykeröt palleroisia, peräkkäitä, suojuksettomia; purje soukka, pitkä-veteinen, kahta pidempi siipiä; lehdykät leveän-suikeita, suippoja. — 2½ 7, 8 valk. k.

Kuivissa paik. harv. (A. — U. H. K.) *Juuri suikea; pal'ot 1-siemenisiä, karvaisia.*

†† Verhot kaljuja; purje sileä, pysty.

*Tr. hybridum* L. *Mifite-apila*. — Varsi koheneva, haaro-va; kukkaperät ylisistä lehtihangoista lähteviä; verhon hampaat tasapitkiä, suoria; lehdykät soikeita, tylppäpäisiä. — 2½ 7, 8 valk. t. punerv. k.

Niit. (A. — K. St. — S. Pe.) *On kuin Nurmi-apila mutta tav. valkeilla kukilla; paloissa valmistuu harvoin enempi kun 2 siementä.*

Muist. — Taidetaan hyvin edullisesti viljentää niituilla rehuksi.

*Tr. repens* L. *Wassea*-apila. — Varsi suikertava pitkillä lehtihankaisilla mykerö-perillä; lehdykät tav. vastopuikeita, lanttopäisiä; verhohampaat eripitkiä, suoria. — 2½ 6—9 valk. t. punerv. k.

Niit. tav. (E. — L. Lv.) *Toisinteleä m. puikeilla lehdyköillä.*

Muist. — Palkitsee yltäkyläisesti vaivan rehuksi viljennettynä. Kukat kelpaavat myös leivän-aineeksi.

(*Tr. montanum*).

+++ Verhot lop. rakkomaisesti pullistuneina.

*Tr. fragiferum* L. *Ranta*-apila. — Varsi rento; mykeröt palleroisia, peräkkäitä; verhon ylinen osa lop. pullakka, karvainen, ynnä kahden verhohampaan alaskaareva. — 2½ 7, 8 punerv. k.

Rant. harv. (A.) *Lehdykät vähäisiä, soikeita, hyvin suonisia ja vähän lanttopäisiä.*

++++ Purje tav. uurteinen alaskaarevalla päällä.

*Tr. spadiceum* L. *Muusta*-apila. — Varsi pysty; mykeröt tiheitä, pitkänpyöreitä, karvaisilla verhoilla; lehtiruodit pidemmät suikeita korvakkeita; kaikki lehdykät ruodittomia, pitkulaisia. — ☉ 6—8.

Niit. tav. (E. — P. Kv. Lv.) *Mykeröt ensimmältä kellakoita, sitte mustanruskeita, kiiltäviä.*

*Tr. agrarium* L. *Selta*-apila. — Varsi tav. pysty; mykeröt soikeita, tiheä-kukkaisia, hyvin uurteisilla purjehilla ja m. kaljuilla verhoilla; kaikki lehdykät ruodittomia, suikeita; korvakkeet suikeita, ei emäruotia lyhemmät. — ☉ 7 kelt. k.

Pelto- ja niittumäissä (A. — K. H. — Kv.) *Verhon hampaissa muutamia karvoja. — Tr. aureum* Poll.

*Tr. procumbens* L. *Rento*-apila. — Varsi tav. rento; mykeröt tiheitä, soikeita; purjeet ja verho ed.; päätölehdykkä ruodikas; korvakkeet puikeita, emäruotia lyhemmät. — ☉ 6, 7 kelt. k.

Kuiv. niit. harv. (H.) 6—10 tuuman pit.; lehdykät vastopuikeita, typäköitä. — *Tr. campestre* Schreb. *Tr. agrarium* Godr.

## 5 parvi. — *Genisteæ*.

ONONIS L. *Draffo*. Puktörne.

*O. hircina* Jacq. — Varsi pysty t. koheneva, ynnä haaroineen ylt'yli pitkillä tahmeilla karvoilla, aina varuton; lehdykät tav. puikeita; kukat parittain, m. tähkämäisesti. — 2½ 7 pun. k.

Rant. niit. harv. (U.) *Pahanhajuinen; varsi tankea.*

ANTHYLLIS L. *Maamaio*. Räkflor.

*A. vulneraria* L. — Varressa 2 lähinäistä mykeröä latvassa; lehdet parijakoisia; päätölehti isoin. — 2½ 7.

Niittumäissä, harv. (*A. U. H. S. L.*) *Kukat tav. keltaisia*. Muist. — Kasvi painaa keltaista.

## 69 heimo. — ERICACEÆ. Kanervakasveja.

1 parvi. — *Vaccinieæ*.MYRTILLUS Gilib. *Muštiffa*. Blåbär.

*M. nigra* Gil. Samallinen muštiffa. — Terä m. palleromainen; perät lehtihankaisia, 1-kukkaisia; lehdet puikeita, sahalaitaisia, kaljuja; varsi kulmikas. — 2½ 5 valk. t. punerv. k.

Metsissä, tav. (*E. — L. Lv.*) *Verho ehyt, rengasmainen; marjat mustansinisiä*. — *Vaccinium myrtillus* L.

Muist. — Marjat kuivina vähän kovettuvia, avulliset ulkotaloudissa. Marja-mehu vilvottava kuumeissa.

Marjoja syövät linnut. Niistä saadaan maukasta puuroa ruisjauhoilla sekoitettuna. Myös sanotaan mustikoista, puolukoista ja ruisjauhoista hyvää hapanta leipää tulevan. Mehulla painetaan punasinervää.

*M. uliginosa* Drej. *Suoluffa*. Odon. — Terä munanmaisesti kellomainen; perät erityisistä kukkasilmikoista; lehdet vastopuikeita, ehytlaitaisia, tylppäpäisiä, kaljuja. — 2½ 5, 6 valk. t. punerv. k.

Soissa, aroissa, tav. (*E. — L. Lv.*) *Marjat sinisiä, isompia kun edellisen, epäkulmikkaita*. — *Vaccinium* L.

Muist. — Marjat, paljolta syötynä, sanotaan vähän huumetuttavan päätä.

VACCINIUM L. *Puola*. Lingon.

*V. vitis-idæa* L. *Punapuola*. — Kukat terttuin latvassa, ulottavilla vartaloilla; lehdet vastopuikeita alaskääntöisillä, nyhä-sahaisilla laidoilla, alta pilkullisia. — 2½ 5 valk. t. punerv. k.

Metsämaissa, tav. (*E. — L. Lv.*) *Marjat punaisia, harv. valkeita*.

Muist. — Marjat ovat janon-sammuttavia, vilvottavia. Käyt. paljon kuumetaudeissa, erinom. puolukkavettä, jota helposti saadaan, lähdevettä päälle lyöden ja vähän sokuria sekaan.

Marjoista taidetaan valmistaa viiniäki. Niistä tulee myös sangen maukasta ja terveellistä marjahilloa. Lehdet taidetaan käyttää teeksi. Aitauksissa estää puolukka ruohonkasvua, ja on aina laihaan sekä viljentämättömän maadun osottaja.

## OXYCOCCUS Pers. Karpale. Tranbär.

*O. palustris* Pers. Suokarpalo. — Lehdet puikeita eheillä, alaskierteisillä laidoilla; varsi rihmamainen, suikertava, kalju; perät lienteitä. — 2½ h 5, 6 pun. k.

Rämeissä, tav. (E. — L. Lv.) *Marjat isoja, punaisia.* — *Vaccinium oxycoccus* L. *Schollera* Roth.

Muist. — Marjoilla on melk. sama voima ja hyöty kuin puoloilla; mutta maistuvat happamemmalta. Karpalo-siirappi, jota löytyy apteikeissä, on sangen maullista ja hyödyllistä kuumeissa, myöski lapsille vasten matoja.

Karpaloita saman verran keittosuolain kanssa käyttävät kultasepät viinikiven asemesta hopean valkeaksi keittämiseen.

*O. microcarpus* Turcz. Bähäkarfalo. — Lehdet m. kolmikkomaisia; perät kaljuja; muuten k. ed. — 2½ 5, 6 pun. k.

Syvemmissä soissa (U. St. — L. Lv.) *Hyvin kaunis kasvi, m. kolmea pienemmillä lehdillä, kukilla ja marjoilla k. ed.*

2 parvi. — *Ericææ*.

## ARCTOSTAPHYLOS Adans. Sianmarja. Mjölon.

*A. officinalis* Wimm. Punainen sianmarja. — Varsi rento; lehdet pitkulaisen vastopuikeita, nahkeita, ehytlaitaisia, sileitä, uurteis-suonisia. — 2½ h 5 punerv. k.

Kanervikoissa, tav. (E. — L. Lv.) *Ainavehreä punaisilla, mehettömillä marjoilla.* — *Arbutus uva-ursi* L.

Muist. — Lehdet sanotaan hyödyttäväiksi vesittimien sisälisissä haavoittumissa, jos niitä teelusikallinen eräänsä hienonnettuna nautitaan, tahi väkevänä teenä juodaan muutamain kerroin päivässä; ovat kovetuttavia, vaan ei ärryttäviä; pitää nautittaman pidempi aikaa.

Kasvia käyt. sangen paljon parkitukseen nahkain valmistuksessa. Painaa alunan kera harmaata. Siitä valmistetaan varsinasta kaupassa kulkevaa sumakki-painetta.

*A. alpina* Spr. Musta sianmarja. — Varsi rento; lehdet vastopuikeita, sahalaitaisia, alta epäsileitä, kohosuonisia. — 2½ h 6 valk. k.

Tunt. (Kv. P. L. Lv.) *Lehdet kuivuvat talveksi; marjat mustia, meheviä.*

## ANDROMEDA L. Suofuffa. Blomris.

*A. polifolia* L. Punerma suofuffa. — Perät sarjamaisesti latvassa, munanmoisilla kukilla; lehdet suikeita — tasasoukkia, alaskierteisillä laidoilla, alta harmaanvalkeita. — h 5, 6.

Soissa, tav. (E. — L. Lv.) 1—2 vaaksan pituinen, ihanilla valkean-punervilla kukilla.

Muist. — On kovetuttava, niinkuin muutkin sukulaisensa. Arvellaan vahingolliseksi lampaille. — Silkinpainajat käyttävät lehtiä ja varsia kaleppelin asemesta väriksi.

A. tetragona L. *Bälfea fuofuffa*. — Perät yksinäisiä, lehtihankaisia, kellomaisilla kukilla; lehdet m. kolmikulmaisia, nuolikantaisia, neliratisesti limittäisiä. — h 7 valk. k.

Tunt. kasvi, harv. (L. Lv.) 1—3 vaaksan pituinen, pensastava, ikään kuin iso kanerva. — *Cassiope DC.*

A. hypnoides L. *Bähä fuofuffa*. — Kukkaperät yksinäisinä latvassa, kellomaisilla kukilla; lehdet äimämäisiä, tiheästi lähinäisiä. — 4 h 7, 8.

Tunt. kasvi (L. Lv.) *Pieni, ainavehreä, ikäänkuin sammale; kukat valkeita, punervilla laiteilla*. — *Cassiope DC.*

#### CASSANDRA Don. *Waimero*. Finnmyrten.

C. calyculata Don. — Kukat yhtäällisessä tertussa, 2-jakoisella lisäverholla; lehdet pitkulaisia. — h 5, 6 vaaleankelt. k.

Soissa (U. St. — Kv. P. Lv.) 2—3 jalan pituinen pensas. — *Andromeda L.*

#### CALLUNA Salisb. *Kanerwa*. Ljung.

C. vulgaris Sal. — Kukat yhtäällisissä tertuissa; lehdet vastakkaisia, ruodittomia, nuolikantaisia. — h 8, 9 pun. t. valk. k.

Kankailla, tav. (E. — L. Lv.) *Haarat lähinäisistä lehdistä 4-kulmasia; väl. nämät kasvettuvat ulos ja tulevat äimämäisiksi, kaitaisiksi; toisintee kaljuna ja lientsädnä*. — *Erica L. C. erica DC.*

Muist. — Laihduttaa maan; katoa tav. kun maa aidataan ja lannoitetaan, tahi lehtipuilla istutetaan. Taidetaan elikon-ruuaksi hätätilassa koota, parahiten syksyllä myöhään. Paikoin sekoitetaan kanervan-kukkia ruisjauhoihin ja leivotaan leiväksi.

Sala-ojain täytteeksi peltoihin ja niittuihin on kanerva hyvin sovelias. Varsi käyt. parkitukseksi.

#### PHYLLODOCE Salisb. *Kurenkanerwa*. Lappljung.

Ph. cœrulea Sal. — Kukat nuokkuvia, peräkkäinä ryhmin latvassa; lehdet tasasoukkia, karhealaitaisia. — h 7, 8 punasin. k.

Tunt. kasvi (P. L. Lv.) 3—8 tuuman pituinen. — *Andromeda L. Menziesia Sm.*

#### AZALEA L. *Gieffilö*. Azalé.

A. procumbens L. — Kukat latvassa; lehdet pitkulaisia,

tylppäpäisiä, kaljuja, alaskierteisillä laidoilla; varsi lamova. — h 7, 8 pun. k.

Tunt. kasvi (P. L. Lv.) *Haarat sormenpituisia, puutavia; lehdet ainavehreitä. — Loiseleuria Desv. Chamaledon Link.*

### RHODODENDRON L. Capinruusu. Alpros.

Rh. lapponicum Wg. — Kukat sarjoin latvassa, kaljute-räisiä; lehdet puikeita, tylppäpäisiä, pilkullisia, pihkanyppeisiä. — h 6, 7 punasinerv. k.

Tunt. harv. (L.) *Jonkun tuuman pituinen pensaskasvi, ai-noasti haarain latvat lehdillä ja kukilla yli maakamaran; heteitä 5 t. 10, pidemmät terää. — Azalea L.*

### LEDUM L. Suopursu, Pursu. Squattram.

L. palustre L. — Lehdet tasasoukkia — pitkulaisia, alas-kierteisillä laidoilla, alta ruskeavillaisia. — h 6 valk. k.

Rämeissä, tav. (E. — L. Lv.) *Kyynäräinen pensas; kukat tiheässä sarjassa.*

Muist. — Lehdet ja kukat sanotaan avullisiksi rohtuma-vioissa, sisällisesti teenä, ja ulkonaisesti keite-vetenä pesuiksi. Keite-vesi käyt. myöski punataudissa, hingussa j. n. e. Ryssöljyä tislataan suonpursuista ja koivuntuohesta; sitä Venäjällä käyt. nahkain valmistuksessa. Kaljaan pantuna vaikuttaa kasvi pääki-vun. Keite-vesi karkottaa syöpäläiset eläimistä ja sioista, kun heitä sillä pestään; niin myös luteet vuoteista.

### 3 parvi. — **Pyroleæ.**

#### PYROLA L. Talvilehti, Talviffi. Vintergrön.

† Palhot tyvipuoletta pyöreämäisesti levenneitä; vartalo näkymätön.

P. umbellata L. Sarjatalviffi. — Kukkia 3—6, sarjassa; lehdet nalkkimaisia, pääpuolelta sahalaitaisia. — 2½ h 8 punerv. k.

Havumets. harv. (T. U. H. S.) *Noin vaaksan pituinen pen-saskasvi; lehdet m. säteettäisiä, tylppäpäisiä t. lyhytsuippoja. — Chimaphila Nutt.*

†† Hedeponsien kannassa 2 erityistä, toisistaan siirot-tavaa sarvea; vartalo pitkä: *Moneses* Salisb.

P. uniflora L. Yksitukka-talviffi. — Varressa yksi ainoa alaskaareva kukka; lehdet suipposahaisia. — 2½ 7 valk. k.



Kosteissa mets. (E. — L. Lv.) *Sormenpituinen*; *kukat hyvähajuisia*; *hedelmä pysty*. — *Chimaphila* Fr. *Moneses grandiflora* Sal.

+++ Palhot äimämäisiä; ponnet ilman erityisittä sarvitta, vartalo pitkäveteinen. (Kukat tertussa).

*P. rotundifolia* L. Pyöreä-talwiffi. — Kukat avonaisia suorassa, monikukkaisessa tertussa; verholiuskat suikeita, ulospäisiä; vartalo alaskaareva, terää pidempi; ruodit pyöreämäisten lehtien pituisia. — 2½ 7, 8 valk. k.

Mets. tav. (E. — L. Lv.) *Lehdet 1 ½ tuuman pituisia*.

*P. chlorantha* Sw. Vähreä-talwiffi. — Kukat avonaisia suorassa, monikukkaisessa tertussa; verholiuskat kolmikkomaisia, myötäisiä; lehdet ruotejansa lyhemmät; vartalo ed. — 2½ 7, 8 vaaleankelt. k.

Havumets. (E. — P. Kv.) *Lehdet tuuman kokoisia*.

*P. media* Sw. Keltatalwiffi. — Kukat pallero-puolikkaita, vähän sulletuita, liereässä tertussa; vartalo suora, lyhyesti ulottuva; lehdet pyöreämäisiä. — 2½ 7, 8 valk. k.

Mets. harv. (E. — P. Kv.) *Kukat kahta isommat k. seur.*

*P. minor* L. Vähätalwiffi. — Kukat m. palleroisia, sulletuita, suoralla, teräsisäisellä vartalolla; muuten k. ed. — 2½ 7, 8.

Lehtimets. j. n. e. (E. — L. Lv.) *Kukat valk. t. punerv., pienempiä k. edell. lajeilla; lehdet väl. soikeamaisia*. — *P. rosea* Sm.

*P. secunda* L. Sivupuoli talwiffi. — Kukat pitkulaisia yhtäällisessä tertussa; lehdet soikeita, suippoja, hienosahaisia. — 2½ 7, 8.

Mets. tav. (E. — L. Lv.) *Kukat vehreän-vaaleita; vartalo suora, terää paljon pidempi*.

## MONOTROPA L. Mäntykukka. Gultopp.

*M. hypopitys* L. — Terttu nuorempana alaskaareva; laitakukissa 8 hedettä. — 2½ 7, 8 kelt. k.

Mets. harv. (A. — U. St. H. S.) *Koko kasvi vaaleankeltainen, lehdetön, suomuinen; terälehdet ja heteet karvaisia; juurena tukku homeenkaltaisia hapsia ja kellakkaisia mukuloita, ryhmettyneitä mullan ja vieraskasvien juurihapsien kanssa*. — *M. hirsuta* Nolte. *Hypopitys multiflora* Scop.

## 70 heimo. — EMPETRACEÆ. Variksenmarjaisia.

EMPETRUM L. Variksen-marja. Kråkris.

*E. nigrum* L. — Rento, m. kalju pensas; lehdet neulamaisia, tasasoukkia, pitkulaisia, vaaleampi juova alustassa. — h 4, 5.

Kankailla j. n. e. tav. (*E. — L. Lv.*) *Matala pensaskasvi; lehdet tyhjäsuisia, laidat ikäänkuin alaskiertyneitä ja selkä-juovaan yhtyneitä; kukat lehtihankaisia, pieniä, mustan-punasinervillä terälehdillä ja ponsilla; marjat mustia.*

Muist. — Marjoja syövät linnut, väl. ihmisetki; sanotaan vaikuttavan huumasta ja pääkipua; alunan kera painavat paperin punaiseksi.

## 71 heimo. — EUPHORBIACEÆ. Tyränesteisiä.

EUPHORBIA L. Tyräneeste, Tyräffi. Råfmjolk.

† Isommat kehäliuskat 2-sarvisia.

*E. esula* L. Monijäbe-tyräffi. — Sarja monisäteinen; sarjavaruksen lehdet leveän-suikeita, sarjukan munuamaisia; varsi-lehdet tasasoukka-suikeita, suippoja, kaikki tasamukaisia. — 2 7, 8 kelt. k.

Pelt., kiviseinillä, harv. (*H. Ke.*) *Noin 3 vaaksan pituinen; lehdet 2—4 linjan levyisiä, haaralehdet vähän leveämpiä.*

*E. peplus* L. Kolmijäbe-tyräffi. — Sarja 3-säteinen; varus-lehdet puikeita; varsilehdet ruodikkaita, vastopuikeita, ehytlaitaisia. — ☉ 7—9 kellanvehr. k.

Viljelöm. harv. (*A. T. U.*) *Puolen jalan pit., vähän siniveh-reä kasvi.*

†† Kehäliuskat sarvettomia.

*E. palustris* L. Suo-tyräffi. — Sarja monisäteinen, ensin 3-, sitte 2-jakoisilla säteillä; varuslehdet puikeita; varsilehdet suikeita, tylppäpäisiä; haarat hedelmättömiä. — 2 6 kelt. k.

Suoniit. harv. (*U. Ke.*) *Väl. 2-kyynäräinen, pensasmainen iso kasvi.*

*E. helioscopia* L. Biiijäbe-tyräffi. — Sarja ensin 5-, sitte 3-, viimein 2-jakoinen; varus- ja varsi-lehdet vastopuikeita, nalkkimaisia, hienosahaisia. — ☉ 7—9 kelt. k.

Viljelömaissa, pelt. harv. (*A. — K. H. S.*) *Väl. sormenpitui-nen ja haaraton.*

Muist. — Mehua käytettiin ulkonaisesti savipuoliin, syyliin

ja päärupiin. Kaikki Tyränesteet ovat kovin ulostuttavia, ja hyödyttävät vesitandissa, mutta varottomilla vaarallisia.

### MERCURIALIS L. Sinijuuri. Bingel.

*M. perennis* L. — Varsi haaraton; lehdet ruodikkaita, puikean-suikeita, takkuisia; emikukkien yhteinen perä pitkäveteinen; juuri suikertava. — 24 5.

Lehdoissa, harv. (A. — Ke.) *Lehtihangoissa harsuja tähtiä pienillä, vehreillä kukilla; musteneepi kuivaessa.*

Muist. — Vahingollinen sekä ihmisillen, että eläimille.

## 72 heimo. — PORTULACACEÆ.

### MONTIA L. Setelaali.

*M. fontana* L. — Lehdet vastakkaisia, m. lapiomaisia. — ☉ 6—8 valk. k.

Vetisissä paik., vesihuovuisia (E. — L. Lv.) *Ikään kuin pieni Tähtimö; kukat valk.; kodat alaskaarevia; siemenet mustia.*

## 73 heimo. — PARONYCHIACEÆ.

### HERNIARIA L. Tyräruoho. Vägört.

*H. glabra* L. — Lehdet pitkulaisia — vastopuikeita, kaljuja; kukat monilukuisia, ryhmin ylisissä lehtihangoissa. — 24 7, 8.

Kuivissa paik. harv. (A. — Ke. H. S.) *Pieni, maahan litistynyt; kukat pieniä, kellanvehreitä, väl. tähtämäisinä, lehtisinä ryhminä.*

### SCLERANTHUS L. Jäsenheinä. Knafvel.

*Scl. annuus* L. Vehreä jäsenheinä. — Kehäliuskat suipuja, jos hiukan kalvolaitaisia, aina siirottavia. — ☉ 6, 7 vehr. k.

Mäissä, pelt. tav. (E. — Pe. Kv.) *Vehreämpi, varpamaisemmin levennyt k. seur.*

*Scl. perennis* L. Baalea jäsenheinä. — Kehän liuskat tylp-päpäisiä, leveällä kalvolaidalla, lop. litteästi sulkeuneet hedelmän ympäri. — 24 6.

Mäissä, harv. (Ke.) *Sormen pituinen, sinertävä; lehdet äimämäisiä; kukat levedemmän kalvolaitansa takia vaalakammat k. edellisen.*

## 74 heimo. — POLYGONACEÆ. Tatarkasveja.

POLYGONUM L. Tatar. Knäfva.

† Varsi pysty, haaraton, yksinäinen tähkä latvassa; heteitä 8: *Bistorta* Tourn.

P. *bistorta* L. Konnantatar. — Tähkä pitkulais-munanmoinen; lehdet puikeita typäkällä t. herttamaisella kannalla, ruotijohteisella lavalla, yliset sepokantaisia. — 2½ 6, 7 punerv. k.

Kosteissa niit. harv. (Kv. Lv.) Varsi 3—4 jalan pit. paksulla juurakolla; lehdet alta puolen vaalean-harmaita.

Muist. — Juuri on turvottava ja jumova. Siperiassa käyt. juurta ruuaksi.

P. *viviparum* L. Turmitatar. — Tähkä suikea t. tasasoukka; lehdet tasasoukkia — leveän-sukeita, päätä ja kantaa kohden suippoja, alaskierteisillä laidoilla. — 2½ 6 valk. t. punerv. k.

Niit. tav. (E. — L. Lv.) Tähkä kukoistaa ensin alhaalta, ja kasvattaa pieniä sipuli-umppuja hedelmän asemesta.

Muist. — Siemeniä syövät kanat ja hanhet. Juuria koovot Samojedilaiset lyhyinä suvi-aikoinaan, ja käyttävät poron lihan kera ruuaksi.

†† Varsi tav. haarova, lehdettömillä tähkillä t. tertuilla latvassa; vartaloita 2—3, tav. yhdis-tyvisiä: *Persicaria* Gärtn.

P. *amphibium* L. Vesitatar. — Heteitä 5; kukkatähkä yksinäinen, pitkulainen, kaljuperäinen; lehdet pitkulaisia, hiukan herttamaisella kannalla. — 2½ 7, 8 vaaleanpun. k. — β terrestre: pysty; lehdet leveämmältä kannalta suikeita, suippoja; heteet kehää lyhemmät, emit pidemmät.

Vesipaik. (E. — L. Lv.) 1—1½ jalan pit. kalju, suikertavalla juurella; β takkuisilla lehdillä.

P. *lapathifolium* L. Ufontatar. — Heteitä 6; vartalot hiukan yhdis-tyvisiä; tähkät pitkulaisia, karhea-nystyisillä perillä; lehdet puikeita — leveän-sukeita; tupekkeet ilman näkyvittä karvoita; pähkylät litteitä, lanttosivuisia. — ☉ 7, 8 vaaleankelt. t. punerv. k. — β nodosum: lehdet molemmin puolin vehreitä; varsinivelet hyvin turvonneita. — γ incanum: lehdet alta harmaita, tav. vaalean-höyteitä; tupekkeet vähän ripsisiä.

Viljelömaissa j. n. e. (E. — P. Kv.) Lehdet kalseita, keskeltä us. isolla mustalla pilkulla. — γ P. *incanum* Schmidt.

P. *persicaria* L. Hanhentatar. — Heteitä 6; vartalot m. keskustaan asti yhdistyneitä; tähkät pitkulaisia, kaljuperäisiä; tu-

pekkeet pitkällä ripsikarvoilla; lehdet suikeita, kaljuja, alta ei paljon vaaleampia; pähkylät osittain litteitä, osittain 3-särmäisiä. — ○ 7, 8 pun. t. valk. k.

Vetisissä paik., rannoilla, katuilla (A. T. U.) *Enimmät kukat vaan 2-luottisia.* — *P. biforme* Wg.

P. mite Schrank. Mrotatar. — Heteitä 6; tähkät kapean tasasoukkia, harsuhko-kukkaisia ja veltoja; kehä nystyrätön; vartalo yhdistyneet m. luottiin asti; lehdet pitkäveteisen suikeita — tasasoukkia, litteitä; tupekkeet ed. — ○ 7—9 pun. t. valk. k. — β minus Huds.: pienempi; lehdet tasasoukkia; kukat ja pähkylät kahta pienempiä.

Kosteissa paik. harv. (T. — K. St. — Kv.; β T. U. H.) *Veltoimpi edellistä, ohuilla, soukilla lehdillä ja harsuilla tähkillä; lehdet ja varsi lauhamakuisia.* — *P. laxiflorum* Weihe. — β *P. mite* \* *strictum* Fr.

P. hydropiper L. Mfantatar. — Heteitä 6; tähkät tasasoukkia, harsukukkaisia, veltoilla latvoilla; kehä nystypilkkuinen; vartalo yhdis-tyvisiä; lehdet suikeita, aaltolaitaisia, sukalaitaisella tupekkeella. — ○ 8, 9 kelt. t. punehtavilla k.

Ojissa j. n. e. tav. (E. — Pe. Kp.) *Lehdillä on tuikean katkera maku; kehä usein 4-jakoinen.*

Muist. — Kasvi tuoreena muserrettu, iholle pantuna, nostaa rakkoja. Vedessä keitettyä pidetään suussa vasten hammas-särkyä. Mehu vedellä sekoitettuna hoetaan poisottavan ruskon eli päivetyksen ja huunpuremat.

+++ Kukkia 1—4 lehtihangoissa t. lehtisissä tähkissä; vartalo erillisiä: *Avicularia* Meisn.

P. aviculare L. Giantatar. — Heteitä 5—8; varsi tav. rento ja haarova, resaliuskaisilla tupekkeilla; lehdet suikeita — soikeita, karhealaitaisia, suonisia; pähkylät hienopilkkuisia, m. kiil-lottomia. — ○ 5—10 valk. t. punerv. k.

Viljelöm., pihossa, rant. tav. (E. — L. Lv.) *Toisintees paljon, parin tuuman pituisesta ja pystystä kyynäräiseen, varpamaiseen ja rentoon.*

Muist. — Mieluinen ruoka sioille, jonkatähden kasvia monin paikoin nitetään kesäruuaksi porsaille ja ihmisille. Myös syövät sitä halukkaasti kanat, hanhet ja muut linnut. Siemenet kelpaavat leivän-asemeksi.

++++ Varsi köynneliäs; tertut lehtihangoissa; vartalo yksinäinen, 3-kyhmyisellä luotilla: *Tinearina* Meisn.

P. convolvulus L. Rierretatar. — Varsi kulmikas; lehdet

herttamaisen nuolikantaisia, suippoja; kukat pitkäveteisissä, har-  
suissa tertuissa; kehälehtien selkä tylppä; pähkylät hienopilkku-  
isia, kiillottomia. — ☉ 7.

Viljelöm. tav. (E. — P. Kv. Lv.) *Kukkaperykät lyhempiä  
kun sisältä valkeat, ulkoa vehreät kukat.*

Muist. — Siemenet taidetaan käyttää kuin tattari.

P. dumetorum L. Rointatar. — Varsi m. liereä; kehä-  
lehtien selkä kalvosiipinen; pähkylät sileitä ja kiiltäviä; muuten  
k. ed. — ☉ 7.

Metsämaissa, ahoissa (A. — K. St. — S.) *Kukkaperykät  
kukan pituinen; kehä valkeilla kalvosyrjillä.*

### RUMEX L. Hieraffa. Syra.

Kaikki t. useimmat kukat täysineuvoisia: *Lapathum  
Tourn.*

\* Ne 3 hedelmän sulkevaa kehälehteä \*) nystermällä va-  
rustettuja.

R. maritimus L. Merihieraffa. — Kukkakiehkurat tiheästi  
lähinäisiä; nystermälliset kehälehdet levyyttäneä pidemmillä su-  
kahampailla; varsilehdet m. tasasoukkia. — ☉ 7, 8.

Meri- ja järvirant. harv. (K.) *Hedelmän valmistuessa keller-  
tävä; lehdet tav. aaltolaitaisia.*

R. hydrolapathum Huds. Rantahieraffa. — Tertut ti-  
heäkukkaisia, m. pystöisiä; kehälehdet pitkulais-kolmikkomaisia,  
kaikki nystermällisiä, m. ehytlaitaisia; kaikki varsilehdet litteitä,  
sukeita. — ☉ 7.

Rannoissa, harv. (A. St. Ke.) *Varsi 2—3-kyynäräinen; alus-  
lehdet 1—2 jalan pituisia, suippoja kummastaki pädstä, vaalean-  
vehreitä. — R. aquaticus Fr. R. acutus Wg. Fl. Sv.*

R. obtusifolius L. Rointahieraffa. — Tertut (kukka- t.  
hedelmä-haarat) tyveltä harittavia, harsukukkaisia, erinäisillä kie-  
hkuilla ja leveän-sukeilla suojuslehdillä alisissa kiehkuroissa; ke-  
hälehdet kolmikkomaisia, lähempää kannan suippo-hampaisia,  
kaikki nystermällisiä; aluslehdet herttamaisia, tav. tylppäpäisiä;  
varsilehdet kaidempia, kaikki litteitä. — ☉ 7.

Kosteissa paik., kylätien. harv. (A. Ke.) *3—5 jalan pitui-  
nen; lehdet puikean-herttamaisia, usein sangen isoja, hedelmän val-  
mistuessa vehreinä pysyviä, ei kuivuvia. — R. sylvestris Wallr.*

R. crispus L. Sulihieraffa. — Tertut tiheä-kukkaisia, m.

\*) Kun kehälehdistä seuraavassa mainitaan, ymmärretään ainoasti kolmea  
sisäistä, jotka sulkevat pähkylän. Kukat tämän suvun vehreitä t. ruskeamaisia.

pystyjä; kaikki 3 kehälehdet nystermällisiä, herttamaisia, ehytlaitaisia; lehdet suikeita, suippoja, aaltoisia. — 24 7.

Kost. paik. (A. — U. St. H.) *Kehälehtien nystermät isoja, tav. yksi isompi toisia, jotka väl. eivät kasvakaan; varsilehdet hedelmän valmistuessa kuivuvia.*

•• Kehälehdet paljaita (nystermättömiä t. epäselvillä nystermillä).

*R. domesticus* Hn. *Сепюһиэраффа*. — Tertut tiheä-kukkaisia, pystyjä; kehälehdet pyöreämäisiä, herttamaisia, ehytlaitaisia, paljaita; varsilehdet leveän-sukeita, aaltoisia, us. herttakantaisia. — 24 7, 8.

Kylätien., rannoissa, tav. (E. — L. Lv.) 1—1½ kyynäräinen; varsilehdet hedelmän valmistuessa vehreinä pysyviä; aluslehdet m. pitkulaisia, väl. vinoherttaisella kannalla. Aaltoiset varsilehdet ja leveät syväherttaiset kehälehdet erottavat sen seuraavasta. — *R. aquaticus* β *Wg.* *R. longifolius* *DC.*

*R. hippolapathum* Fr. *Бөһиһиэраффа*. — Tertut ed.; kehälehdet puikeita, typäkkä-kantaisia, tylppäpäisiä, paljaita, ehytlaitaisia; varsilehdet leveän-herttaisia, litteitä; terttujen suojuslehdet puikean-sukeita. — 24 7.

Rannoissa (E. — L. Lv.) 2—3-kyynäräinen; aluslehdet isoja, m. kolmikkomaisia, väl. veripunaisella ruodilla ja selkäsuonella; varsilehdet us. m. suorasivuisesti herttamaisia. — *R. aquaticus* *L.*

Muist. — Keite-vettä juurista nautittiin ennen savipuoliin ja muihin rohtuma-vikoihin.

†† Kaksikotisia; lehdet nuoli- t. keihäskantaisia: *Acetososa* *Tourn.*

*R. acetosa* *L.* *Суоһаһиэраффа*. — Kehän sisälehdet herttamaisia, pyöreämäisiä, ehytlaitaisia, ulkopuoliset alaskaarevia; varsilehdet leveän-sukeita — puikeita, nuoli-, harvoin herttakantaisia. — ( 6, 7. — β *alpestris* *Hn.*: lehdet puikeita, herttakantaisia, kohosuonisia.

Niit. tav. (E. — L. Lv.; β Lv.) 1—1½ jalan pit. punaisilla kukilla, happamen makuisilla lehdeillä.

Muist. — Juuri ja tuore kasvi hyödyttävät kerpukissa. Viinillä sekoitettua mehua käytetään hammasten pesuksi, kun kerpukista syöpyvät. — Sanotaan lisäävän talia elukoissa, ja vastustavan Leiniköin kirpeyttä. Juurilla Lappalaiset ja Norjalaiset painavat keltaista. Lehtiä haudutetaan ja käyt. liemiin ja salatiksi ja koko kasvia jauhoilla sekoitettuna varaleiväksi kovina aikoina. Lehdeillä Lappalaiset valmistavat happamen maitonsa.

*R. acetosella* L. *Ἀχούρια*. — Kehälehdet puikeita, ehyltäläisiä, ulkopuoliset myötäisiä; varsilehdet suikeita — tasasoukkia, tav. keihäskantaisia 2:lla ulospäisellä liuskalla kannassa. —  $\gamma$  6, 7. —  $\beta$  multifidus: lehdet monijakoisia, tasasonkilla liuskoilla.

Kuivissa paik. tav. (E. — L. Lv.)  $\frac{1}{2}$ —1 jalan pit., tav. punaisen näköinen; lehdet väl. hyvin soukkia, muin yhtä, muin kumpaaki kantaliuskaa vailla.

Muist. — Luullaan laihduttavan maata.

### OXYRIA Hill. *Ὠξυρία*. Syrling.

*O. digyna* Hill. — Lehtiä m. ainoasti juuressa, munuamaisia, kokonaisia t. lovipäisiä. —  $\gamma$  7.

Tunturipuroissa (L. Lv.) 1—2 vaaksan pituinen, tuumanlevyisillä lehdillä. — *Rumex* L. *Rheum* Wg. *O. reniformis* Hook.

### KÖENIGIA L. *Κοηνίγια*. Rurentatar.

*K. islandica* L. — Yliset lehdet ryhmistyneitä kukkain ympäri, varsilehdet vuorottaisia, m. lapiomaisia, tylppäpäisiä, kaljuja. —  $\odot$  7, 8 kellahtavilla k.

Tunt. harv. (L. Lv.)  $\frac{1}{2}$ —2 tuuman pit., mehevä, hyvin pienikukkainen kasvi; lehdet tupekkeilla.

## 75 heimo. — THYMELEACEÆ. Näsiäkasveja.

### DAPHNE L. *Νάφι*. Tibast.

*D. mezereum* L. — Kukat perättömiä, 3—5 yhdessä ryhmittäin varren sivuissa ennen lehtiä. —  $\gamma$  5, 6 pun. k.

Aroisilla metsäniit. (E. — P. Kv. Lv.) *Kyyndräinen pensas*, jonka suikeat lehdet ilmautuvat vasta hyvánhajuisten kukkien perästä; luumarjat punaisia, myrkyllisiä.

Muist. — Kuorta kiitetään hyväksi leinissä. Otetaan 2—3 vuotisista varsista, leikellään tuuman pituisiksi paloiksi ja pannaan sille paikalle, johon leini tahdotaan muuttaa. Tämä vetää pitkäänsä, mutta vähemmällä kivistyksellä kun juntukka (pansluuka) tahi sinappitaikina. Pitää muutettaa päivä päivältä 1—2 linjaa. Käyt. myös käärmeen piston päälle. Sanotaan hampassärkyä lievittävän, kun pannaan hampaalle. Vilutaudissa on välistä ollut apua marjoista, jotka kuitenkin ovat myrkyllisiä ja hyvin varosasti käytettäviä. Niistä tehdään myös voidetta mätähaavoihin ja koihin. Sama voide, vatsalle pantuna, helpottaa kovan vatsanväänteen, ja hammastaudin, kun pidetään poskella.



Koko kasvi sisältää erin-omaisen kirpeyden, liiatenki marjat. Kuusi marjaa ovat tappaneet koiran. Käyt. susien ja muiden vahingollisten petojen kuolettamiseksi. Kanat ja hanhet kuitenkin syövät niitä vahingotta.

## 76 heimo. — ELÆAGNACEÆ. Kilsekasveja.

HIPPOPHAË L. *Tryni*. Haftorn, Finnbär.

*H. rhamnoides* L. — Lehdet tasasoukka-suikeita, alta valkea-kilseisiä. — h 5.

Merenrant. harv. (A. St. Pe. P.) *Noin 3-kyynäräinen, orainen pensas, varhaisilla, pienillä, kellakkaisilla kukilla lehtihangoissa; hedelmä marjamainen, keltainen.*

## 77 heimo. — ULMACEÆ. Jalavakasveja.

ULMUS L. *Sälawa*. Alm.

*U. montana* Sm. *Nurmijalawa*. — Kukat 5—6-heteisiä, perät m. kupua lyhemmät, palleromaisissa ryhmissä; hedelmät puikeita t. pyöreämaisiiä, m. kaljuja, päästä loivaan 2-halkoisia; lehdet pitkulaisia — vastopuikeita, äkisti supistuneella päällä, tois-sahaisia, päältä puolen tav. karheita. — h 5, 6.

Metsäniit. (A. — K. St. H.) *Pitkä puu ruskeamaisilla kukilla lehdettömässä oksassa; lehdet vinokantaisia.*

Muist. — Kuori (sisämäinen, etenki 2-vuotisista oksista) käytettiin keite-vedeksi rohtumiin, savipuoliin ja vesitaudissa sisälisesti nauttien. Puu on soveliaista tarve-puiksi, kärryn-aisoiksi, pyöriksi j. n. e. — Taidetaan istuttaa lehtokujiksi, lähellä kasvavan ruohon vahingotta. Lehdet syksyllä koottuna, kuivatetuna kelpaavat talviruunaksi lampaille ja lehmille. Kasvaa kuivassa mullassa osittain siemenistä, jotka kesäkuussa kypsyvät, osittain vesoista tahi oksista, joita alussa kastetaan ahkerasti.

*U. effusa* Willd. *Stynäjalawa*. — Kukat 6—8-heteisiä, perät kupua monin kerroin pidemmät; lehdet toissahaisia; hedelmät höyteälaitaisia. — h 5.

Kylissä, harv. (T. Ke. St. H. Kv.) *Kukat 3—7 linjan pituisilla perillä. — U. ciliata Ehrh. U. pedunculata Lam.*

## 78 heimo. — URTICACEÆ. Nokkoiskasveja.

## HUMULUS L. Humala. Humle.

*H. lupulus* L. — 4 7 kellanvehr. k.

Leht. vuortenjuurilla, raunioissa, harv. (T. — K. St. H. S. Kp.) *Köynnelys, karhea kasvi, kouramaisilla, karheilla lehdillä.*

Muist. — Hedelmä vatsan vahvistava. Käyt. keitettyinä kääreiksi ajettumisiin ja ulkonaisiin vikoihin, myöski vatsalle vävähämmissä madoista j. n. e. Siemeniä nautitaan vatsan kovuudessa ulostuttavana tahi pehmittävänä aineena.

Sekoitetaan yleisesti kaljaan ja olueen, karvaudellansa estämään happanemista ja lisäämään voimaa. Sen ensimmäisiä taimia, ehkä vähemmin maukkaita, taidetaan keväällä syödä, ja ovatki terveellisiä.

Ist. paraasti kiviperään. Juuria pitää löyhällä mullalla mullattaman, seivästettämän, perattaman j. n. e.

## URTICA L. Roffonen. Nässla.

*U. urens* L. Rautanoffonen. — Yksikotinen; lehdet vastakkaisia, soikeita, liuskasahaisia; ruodit tav. pidempiä kun parittaiset kukkaryhmät. — ☉ 6, 7 kellanvehr. k.

Viljelöm. tav. (E. — L. Lv.) *Vähempi ja vaaleamman vehreä kun seuraava.*

Muist. — Väkevää keite-vettä on käytetty vasten lennäh-televää luuvaloa.

*U. dioica* L. Pöstitiis-noffonen. — Kaksikotinen; lehdet vastakkaisia, kuta kuinki herttamaisia, suippoja, jurasahaisia; ruodit terttumaisia kukkaryhmiä lyhemmät. — 4 6, 7 vehr. k.

Viljelömaissa, tav. (E. — L. Lv.) *Toisintele leveämmillä ja kaidemilla — puikean-suikeilla lehdillä.*

Muist. — Puserrettua mehua kuin myös keite-vettä juurista on ennen käytetty vasten kerpukkaa, keuhkotautia, verijuoksua j. n. e., 1 t. 2 ruokalusikallista päivässä; siemeniä nautittiin matolääkkeenä. Nokkosen poltto parantuu päälle sivutusta öljystä t. kermasta.

Lisää maitoa lypsylehmissä. Myös lampailten on se ruuaksi hyvää ja terveellistä. Pitää sitä varten varhain leikattaman. Soveltias ja terveellinen keväällä lehtikaaliksi. Varret taidetaan hoitaa kuin pellava kehräyksiin. Siemenet kanain ruuaksi. Mesiäispihain ympäri hyvä istutettaa, sillä se pois pidättää sammakot, jotka luullaan haittaavan mesiäisten parvettumista.

Kasv. sekä juurista että siemenistä lannoitetuissa kivi-mäissä.

## 79 heimo. — CHENOPODIACEÆ. Savikkakasveja.

## ATRIPLEX L. Matija. Grāmalla.

*A. hortensis* L. Tarhamaltja. — Varsi pysty; lehdet her- takkeis-kolmikkomaisia, mutkahampaisia, molemmin puolin yhden- värisiä; hedelmä-verhon liuskat pyöreämäisiä, ehytlaitaisia, epä- otaisia, kantaan asti erillisiä. — ☉ 7, 8 vehr. k.

Viljelömaista metsist., harv. (*A. St.*) 1—3 jalan pit.; isoilla. *us. punaisilla t. kelt. lehdillä.*

*A. hastata* L. Suolamaltja. — Rento t. lojottavilla haa- roilla; lehdet keihäskantaisesti kolmikkomaisia, suoraan ulospäi- sillä kantaliuskoilla, mutkahampaisia; hedelmä-verhot nelikulmai- sia, yhdiskantaisia, laidoin ja sel'in hampaisia. — ☉ 7—9 vehr. k. —  $\beta$  salina: pysty, lehdet alta valkea-kehnäisiä.

Rant., kost. paik.;  $\beta$  merenrant. (*E. — P. K.*) *Toisinteleen pal- jon, muin lamovana, muin pystöisenä; lehdet isompia t. pienempiä. jurahampaisia t. m. eheitä; hedelmä-verhot muin pieniä muin isoja j. n. e. — A. latifolia* Wg. *A. patula* Sm.

*A. patula* L. Peltomaltja. — Varsi tav. pysty; aliset haa- rat ristikkäisesti lojottavia; yliset lehdet suikeita — tasasoukkia, ehytlaitaisia, aliset puikean-sukeita, 2:lla pitkäveiteisellä, edespäi- sellä liuskalla kannassa; hedelmä-verhot nelikulmaisia, suippoja, ehytlaitaisia t. vähän hampaisia, pinnaltaan sileitä t. hienoham- paisia, yhdiskantaisia. — ☉ 6—9. —  $\beta$  salina-*erecta*: pysty, vehreän-hallava; lehdet pitkänpuikeita. —  $\gamma$  salina-*prostrata*: lamova, tav. punerva; lehdet soukempia ja möyheämpiä.

Viljelöm. tav.;  $\beta$  ja  $\gamma$  merenrant. (*E. — L. Lv.*) *Väl. sa- tunnaisista syistä rento; lehdet toisintelevät leveydessä ja hampai- suudessa, niinkuin hedelmäverhotki suuruudessa. — A. angustifo- lia* Sm.

*A. littoralis* L. Merimaltja. — Varsi ja haarat pystyjä; lehdet tasasoukkia; hedelmäverhot suipukoita, pinnalta ja laidoilta hampaisia. — ☉ 6—8 vehr. k.

Merenrant. harv. (*A. T. U.*) *Lehdet  $\frac{1}{2}$ —2 linjan levyisiä; toisinteleen isommilla ja vähemmilla hedelmäverhoilla sekä väl. ren- noilla varsilla.*

## BLITUM L. Muro. Rödmalla.

+ Kukkaverho hedelmän kypsyessä pullakka, mehevä, jo- ten hedelmä-ryhmät lop. ovat kuin punaisia marjoja.

*Bl. virgatum* L. Haran-muro. — Varsi lehdestävä lat- vaan asti; kukkaryhmät lehtihankaisia; lehdet keihäskantaisen t. kolmikkomaisen puikeita, epämukaisesti suippohampaisia. — ☉ 6, 7

vehr. k. —  $\beta$  chenopodioides: hedelmä-ryhmät mehettömiä, vehreitä.

Viljelöm. metsist., harv. (A. T. U. St. S.;  $\beta$  St.) *Lehdet leveä- ja typpäkkä-kantaisia, hyvin hampaisia; valmiit kukkaryhmät ikään kuin mansikoita.*

†† Hedelmä-ryhmät ei marjamaisia: *Chenopodium* L.

*Bl. rubrum* Reich. Punamuro. — Lehdet puikeita, tylppäpäisiä, syvästi tylppähampaisia, paksuja, kiiltäviä; kukkaryhmät haarovia, toiskertaisia, vähän lehdestäviä; kaikki siemenet, paitsi latvakukan, syrjittäisiä. —  $\odot$  7—9 vehr. t. pun. k.

Viljelöm. (A. — K. H. S. Pe. Kv.) *Varsi ja kukkaryhmät väl. punaisia; lehdet m. liuskahampaisia.*

Muist. — Pidetään vahingollisena lampaille.

*Bl. glaucum* Koch. Sianmuro. — Lehdet pitkulaisia t. puikean-pitkulaisia, tylppäpäisiä, mutkaisesti ja loivaan tylppähampaisia, alta siniharmaita; kukkaryhmät lehdettömissä tertuissa; siemenet osiksi lappeallaan, osiksi syrjällään. —  $\odot$  8, 9 vehr. k.

Kaduilla (A. — K. H. S. Pe. Kv.) *Varsi tav. rento, harvemmin pysty.*

*Bl. bonus-Henricus* Mey. Samimuro. — Lehdet keihäskantaisen kolmikkomaisia, m. ehytlaitaisia; varsi pysty, tiheillä tähkämäisillä, ylempää lehdettömillä kukkaryhmillä; kaikki siemenet syrjällään. —  $\mathcal{A}$  6—8 vehr. k.

Teillä, piholla, harv. (A. T. K. S.) *Varsi haaraton, 1—2 jalan pit.; aliset lehdet ruodikkaita.*

Muist. — Lehdet pidetään hyvinä hauteeksi ajettuneille jaloille, juuri keuhkotautisille lampaille sisään annettuna.

Lehtiä taidetaan myös käyttää ruuaksi liemiin ja kaaleihin. (*Bl. virgatum*  $\beta$ ).

CHENOPODIUM L. Samiffa. Svinmälla.

† Lehdet hammaslaitaisia.

*Ch. hybridum* L. Vahteri-samiffa. — Lehdet hertakkeisia, suipukoita, syvästi mutkalaitaisia, harvoilla mutta sangen järeillä hampailla; kukkaryhmät haarovassa röyhysssä; siemenet kolea-pilkkuisia. —  $\odot$  7, 8 vehr. k.

Viljelöm. harv. (A. T.) *1—3 jalan pit.; lehdet ohuita, isoja, vehreitä, Vahterin lehtien näköisiä.*

*Ch. urbicum* L. Ryläsamiffa. — Lehdet kolmikkomaisia, jurahampaisia, tahi m. ehytlaitaisia; kukkaryhmät pitkäveteisissä, pystöisissä tähkissä, osittain varren latvassa, osittain lehtihangoissa; siemenet sileitä. —  $\odot$  7, 8 vehr. k.

Kylissä, kaduilla (A. T. U. H. S.) *Lehdet tav. paksuhkoita, sinervitä ja kiillottomia.*

Muist. — Lehdet kelpaavat kaaliruuksi. Siemenistä tulee maukasta puuroa, ja jauhettuina taidetaan niitä panna leipomisiin.

*Ch. album* L. *Sauhofamiffa.* — Lehdet puikeita, tylppähampaisia, yliset suikeita, tav. ehytlaitaisia, kiillottomia, us. alta valkea-kehnäisiä; kukkaryhmät haarovissa tähkissä; siemenet hienopilkkuisia, kiiltäviä. —  $\odot$  7—9 kelt. k. —  $\beta$  *cymigerum*: ryhmät harsuissa viuhkoissa, tav. ulospäisillä haaroilla.

Viljelömaissa, tav. (E. — L. Lv.)  $\frac{1}{2}$ —4 jalan pit., vaaleanvehreä, hyvin kehnäinen. —  $\beta$  *Ch. viride* L.

†† Lehdet ehytlaitaisia.

*Ch. polyspermum* L. *Rentoſamiffa.* — Lehdet puikeita, kaljuja, vehreitä; kukkaryhmät latvassa ja lehtihangoissa, lop. haarovina, harsuina röyhyinä; heteitä tav. 3. —  $\odot$  7, 8 vehr. k.

Viljelöm., rant. harv. (A. — K. St. — S.) *Kupu auki, ei sulettu ison punaruskean siemenen ympäri; lehdet pyöreämäisesti tylpäkötä.*

Muist. — Mieluinen ruoka kaloille lammikoissa.

### SALSOLA L. *Rifoffi.*

*S. kali* L. — Varsi rento, tav. karvainen; lehdet liereitä, terävästi äimäpäisiä; kukat yksinäisiä, lehtihankaisia; kupuliuskain lisäkkeet lop. pyöreäpäisiä ja siirottavia. —  $\odot$  7, 8 valk. t. punerv. k.

Merenrant. harv. (U.) *Tav. lamova, haarova kasvi, piikillinen otapäisistä, tankeista lehdistä; kupu-lisäkkeet muodostuvat siementen valmistuessa.*

### SALICORNIA L. *Suola-ŕitti.* Glasört.

*S. herbacea* L. — Varsi haaraton t. vastakkaisilla, puikelo-latvaisilla haaroilla; nivelvälit ylempää vähän laajenneita ja lovipäisiä. —  $\odot$  7, 8.

Merenrant. harv. (A. T. P.) *Toisint. pystynä ja rentona: var. prostrata.*

Muist. — Soota-suolaa saadaan tästä kasvista polttamisella. Se on pehmittävää ja ulostuttavaa; käyt. keltataudissa, kaatuva-taudissa, kerpukissa j. n. e.

Lasi-tehtaissa on soota hienompaan lasiin välttämättömästi tarpeellista. Valmistetaan paljon Hispaniassa, Englannissa j. n. e. Kasvia pannaan kuoppaan ja poltetaan tuhkakksi, lisätään taas uu-

sia (kasveja) päälle ja poltetaan, ja tehdään sitä tekoa, siksi että kuoppa tulee täyteen tuhkaa, joka sitte kovettuneena kokkareiksi on valmis kauppatavara. Tätä suolaa saadaan ei ainoasti Suolayrtistä vaan myös monesta muusta merikasvista.

## 80 heimo. — CUPULIFERÆ. Kehtokantaisia.

### QUERCUS L. Tammi. Ek.

Qu. robur L. — Yhteinen hedelmäperä monin kerroin lehtiruotia pidempi; lehdet lyhytruotisia, pitkulaisia, tav. mutkaliuskaisia, pyöreämäisillä liuskoilla, kaljuja. — h 5.

Metsissä, niit. harv. (A. — Ke. St. H. Pe.) *Iso puu, yksikesäisillä lehdillä, jotka juuri harvoin ovat liuskattomia ja m. sui-keita.* — *Qv. pedunculata Ehrh.*

Muist. — Kuori ja lehdet kovin jumoavaa vetävää laatua. Kuori, pienennettynä ja punaviinassa liotettuna, käyt. revehtymiseen ja peräsuolen putoukseen ulkovoiteena. Tammenlehtiä sekoitetaan kulkutus-veteen kielen rampaudessa. Myös keitevettä käyt. sisällisissä verenjuoksuissa, ulko- ja punataudeissa, siltään tahi saunakukkain seassa.

Puulaji on soveliainta kaikista laivarakennuksiin, jonkatähden vanha laki sen määrää ruunun omaksi, laivaston ylläpitämiseksi. Myös puukalun tekoihin ja nikkaruksiin soveliaista.

Kuori on parhaita nahkan parkitukseen. Rautavihtrillin kera se painaa mustaa; johon hedelmä-verho on vielä m. voimalisempaa. Kaleppelit tammen lehdillä ovat erään höyntiäisen pesiä ja talvisijoja; ne kasvavat isommiksi ulkomaan tammissa. Tammenterhoja taidetaan käyttää kahvin asemesta joko siltään tahi tavallisten kahvipapuin lisäyksellä. Lasten rauhaisvikoihin, röhkätautiin, on terhokahvi hyvin terveellistä.

Kasv. hyvin kypsistä terhoista löyhään maahan. Katajamäissä se parhaiten menestyy; niituilla tukehuttaa muut lähelliset kasvit.

### CORYLUS L. Pähkinäpuu. Hassel.

C. avellana L. — Lehdet m. pyöreitä, hertta-kantaisia, suipukka-päisiä, pitkulaisilla tylppäpäisillä korvakkeilla; kehtokanta kellomaisesti auki, resahampaisilla liuskoilla. — h 4.

Metsäniit. (A. — K. St. H.) *Lehdet ohuita, epäsoleita, tois-sahaisia; kukostaa ennen lehteä.*

Muist. — Pähkinät ovat yleiseen tuttuja. Niiden sydämistä saadaan melk. puoliksi hyvää öljyä, joka vetää vertoja manteli-öljylle.

Haarat käyt. astia-vanteiksi, isommiksi koreiksi j. n. e.

Kasv. sekä pähkinöistä että aaluvista. Edistyttää ruohon kasvua ja lisää hyvää ruokamultaa.

## 81 heimo. — SALICACEÆ. Pajukasveja.

### POPULUS L. Haapa. Poppel, Asp.

*P. tremula* L. — Lehdet pyöreämäisiä, jurahampaisia, molemmiin puolin vehreitä ja kaljuja, litteämäisillä ruodeilla. — h 5.

Metsissä, nit. tav. (E. — L. Lv.) *Pitkä puu, pitkällä harmaanhöyteillä norkoilla ennen lehdestymistä; aaluvain lehdet herttamaisia, höyteitä.*

Muist. — Keväällä vuotaa haavasta, kuin koivustaki, hyvää mahalaa. Lehtiä taidetaan eduin koota talviruuaksi eliköille, paitsi lampaille, joille eivät sovi. On laskettu yhden ison haavan antavan tynnyrin mitan riistotuita lehtiä, jotka vastaavat 2:lle leiviskälle heiniä. Lehdet pitää etenni riistottaman, taidetaan myös koota varisneina, jolloin niissä vielä on enin osa vehreyttä ja hyvyttä jällellä.

Haapa on kevyttä ja valkeata puulajia. Ei mätäne pian, jonkatähden on kestävä vesirakennuksiin j. n. e. Havaitaan harvoin madon syömänä. Kuori sanotaan karkoittavan sirkat. Polttopuuna antaa vähän kuumuutta, ei yhtään hiiliä, mutta hyvää tuhkaa saipuan-keittoon.

Kasv. aaluvista. Missä haavat kasvamaan alkavat, siinä ne itse mieluisesti leveävät, kun saavat olla rauhassa ja aidataan.

### SALIX L. Paju. Pil, Vide.

† Puita t. isompia pensaskasveja, vähimmäksikin jalan pituisia ja pidempiä; norkkosuomut yhdenvärisesti vaalean-keltaisia; joka kukassa 2 mesinystyrää. Lehdet lop. kaljuja.

*S. pentandra* L. Haalapaju. — Heteitä 4 t. useampi \*); kodat lop. lyhytperäisiä, kaljuja, lyhytvartalaisia \*\*); lehdet pitkulaisia — vastopuikeita, suipukoita, hieno- ja tiheäsahaisia, kaljuja, nystyrä-ruotisia. — h 5, 6.

Metsäniit. tav. (E. — L. Lv.) *Tav. 3—5 kyynärän korkuinen pensas, väl. jotenkin pitkä puu; lehdet selvän-vehreitä, kiiltäviä.*

\*) Kun heteistä ei mitään mainita, on niitä aina kaksi.

\*\*) Vartaloa sanotaan lyhyeksi, kun se on luotteja lyhempi, pitkäksi t. pitkävetiseksi, ollessa niitä pidempi.

Muist. — Kuorta käytetään vilutautia vasten. Otetaan 2- t. 3-vuotisista haaroista, ja annetaan 1, 2 teelusikallista kuivattuna ja pienennettynä, joka 3:mas tahi 4-jäs tiima väli-aikoina, sittekun ulostus-ainetta edeltäkäsin on tarpeeksi nautittu.

Siemenhaivenet tämän ja muiden pajulajien taidetaan koota ja käyttää puumulin asemesta. Lehdet painavat keltaista. Puu on sovelias lehtokujiksi ja pensas-aidoiksi. Kasv. helposti aaluvista.

*S. fragilis* L. Salama-paju. — Heteitä 2, 1:llä sisä- ja 1:llä ulkonystyrällä kannassa; kodat ed.; norkot veltoja; lehdet suikeita, soukka- ja tav. vinopäisiä, sahalaitaisia, kaljuja, alta jäänkarvaisia. — h 5.

Rannoilla j. m. metsist. (A. T. U. St. H. S.) *Puu tyveltä lojottavilla haaroilla ja oksilla, jotka ovat niin hauraat hangoista, että ne tuulessa helposti poikki taittuvat ja, veteen jouduttuaan, vieddään toisialle ja juurittuvat rannoille; syksy-oksien korvakkeet hertta- puolikkaita. On yleisesti viljelty pajupuu.*

Muist. — Kuori (oksista) käyt. vilutaudissa, kuin edellisestä sanottu on.

Lehto-kujina tievarsilla antaa se hyvän ja vilpeän varjon. Kasv. helposti maahan lyödyistä paksummista oksista vetisiin paikkoihin. Hedepuu tähän on soveliaampi, sillä emien haivenet ryötävät kedon.

*S. amygdalina* L. Pohjapaju. — Heteitä 3; kodat munanmoisia, peräkkäitä, kaljuja, m. vartalottomia; lehdet pitkulaisia — suikeita, suippoja, sahalaisia, kaljuja, alta jäänkarvaisia. — h 5, 6.

Rant. harv. (P. Lv.) *Puu t. tav. puumainen pensas; lehdet 2—3 tuuman pit., väl. tuumanlevyisiä, lyhytsuiippoisia; korvakkeet puolihertakkeisia.*

(*S. myrtilloides, arbuscula*).

++ Puita t. isompia pensaita; norkkosuomut ainakin päästä ruskeita; joka kukassa 1 mesinystyrä.

\* Kodat perättömiä t. mesinystyrää lyhemmällä perällä; vartalo pitkäveteinen; lehdet vanhempinaki karvaisia (paitsi *S. acutifolia*).

*S. acutifolia* Willd. Härmäpaju. — Norkot hyvin höyteitä; kodat kaljuja, pitkäveteisellä vartalolla; lehdet suikean-kaitaisia, sahalaitaisia; korvakkeet suikeita; oksien kuori härmäisen sinettävä. — h 5.

Hietamaissa, harv. (Ke.) *Puu t. korkea pensas pienillä, veltoilla haaroilla; lehdet kummastaki päästä suiippoisia. — S. pruinosa Wimm.*



*S. Læstadiana* Hn. Tuhkapaju. — Kodat lyhytperäisiä, harmaanhöykeitä; lehdet pitkulaisen-suikeita, tav. suippoja, harsusti epä-nyhälaitaisia, alta tiheästi harmaanhöykeitä, kiillottomia. — h 6.

Tunt. tienoilla, harv. (L.) *Pidempi pensaskasvi, väl. puu; norkot pitkät, m. sormenpaksuisia, sangen tiheä-kotaisia; lehdet tav. suippoja, molemmin puolin tiheästi hienohöykeitä, etenkin alta harmaanvanukkeisia, mutta kiillottomia.* — *S. canescens* Fr.

*S. lapponum* L. Rapin paju. — Kodat perättömiä, valkeavillaisia; lehdet soikeita — suikeita, suippoja, tav. ehytlaitaisia, etenkin alta kiiltävästi valkean-höykeitä, laidat vähän alaskierteisiä. — h 5, 6. —  $\beta$  *elliptica*: lehdet pitkänpyöreitä t. puikeita, suippoja.

Soissa, tav. (T. — L. Lv.) 2–4-kyynäräinen pensas, lop. 3 tuuman pituisilla, paksuilla lehdillä, toisintelevilla pitkäveteis-suikeista puikeisiin, muuttelehtavilla myös höyteydessä hamaan lähes kaljuihin. — *S. limosa* Wg.

*S. glauca* L. Sinettämä paju. — Kodat tav. perättömiä, villaisia, lyhytvartalaisia; norkkoperä lehdestävä; lehdet suikeita — leveän-soikeita, tylppäpäisiä, tav. ehyt- ja litteä-laitaisia, siteitä, pehmythöykeitä. — h 5, 6. —  $\beta$  *pallida*: lehdet ehytlaitaisia, kaljuja, alta jäännäksisiä. —  $\gamma$  *subnigricans*: lehdet pitkulaisia t. suikeita, hienosahaisia, kuivaessa helposti mustenevia.

Tunturikasvi, tav. (P. L. Lv.;  $\gamma$  L.) Noin 2-kyynäräinen pensas, molemmin puolin valkean-höykeillä, harvoin kaljuilla lehdillä; vartalo lyhempi kuin muilla lajeilla tässä jaossa, tuskin luotveja pidempi.

*S. lanata* L. Villapaju. — Kodat m. perättömiä, kaljuja, pitkäveteisellä vartalolla; norkot perättömiä t. lyhyillä pienilehtisillä perillä; lehdet soikeita t. pyöreämäisiä, alta verkkomaisista kohosuonistansa epätasaisia. — h 6. —  $\beta$  *chrysantha*: norkot höykeitä pitkistä, kullankeltaisista karvoista.

Tunturikasvi (L. Lv.) 2–4 jalan pituinen pensas, paksuilla ja leveillä lehdillä, jotka toisintelevät hyvin villaisista lähes kaljuihin, ja ovat alta vähän koleita verkkosuonista; norkot haarain latvassa, paksuja ja harmaan- t. kellankarvaisia.

•• Kodat pitkä- t. selväperäisiä (perä vähintäki 2 kertaa mesinystyrää pidempi); vartalo lyhyt t. puuttuva.

a — Lehdet, varsinkin nuorempina, kurttuaisesti epätasaisia ja verkkosuonisista, us. harmaan-höykeitä.

*S. caprea* L. Raitapaju. — Norkot tav. perättömiä ja leh-

dettömiä \*); kodat peräkkäitä, villaisia, lyhytvartaloisia; lehdet pitkulaisia — vastopuikeita, suipukoita, lop. aaltolaitaisesti jura-hampaisia t. sahausia, päältä kaljuja, alta harmaanhöykeitä t. karvaisia; haarat kaljuja. — h 4, 5.

Metsäniit. (E. — L. Lv.) *Jokseenki pitkä puu, väl. pitkä pensas; lyhyt- ja paksunorkkoinen; oksat sileäkuorisia; korvakkeet kuin hanhenjalka.*

Muist. — Kuorta Lappalaiset käyttävät nahkain valmistukseen. Puulaji on kevyttä ja sitkeää, käyt. kaikellaisiin puukalu-töihin. Lehdet ovat sangen mieluisia eläimille.

Kasv. kauneiksi lehtokujiksi ja pensas-aidoiksi. Ei tukehuta ruohonkasvua.

S. cinerea L. *Wepipaju*. — Norkot perättömiä, m. lehdetömiä; kodat peräkkäitä, villaisia, epävartaloisia; lehdet suikeita t. pitkulaisia, keskustalta t. niskalta leveämmät, lyhytsuippoisia, sahalaitaisia, päältä lienteitä, alta tav. harmaanhöykeitä; korvakkeet leveitä, m. munuamaisia; kukoistavaiset haarat vitsamaisia, höykeitä. — h 4, 5.

Rant., ojissa j. n. e. tav. (E. — L. Lv.) *Pensas, ei paljon haarovilla, vitsamaisilla, pysteisillä oksilla; lehdet aalto-sahampaisia; alta m. valkeita; toisintele ohukaisilla, molemmin puolin vehreillä lehdillä: var. virgultosa Fr. — Väl. tuskin edellisestä lajista erotettava.*

Muist. — Kuorta käyt. nahkain parkitukseen, oksia korkeiksi, viikatteen-nieiksi j. n. e. On haitallinen suoniituilla, joilla pensastaa sangen paljon ja valloittaa ruohomaata; mutta hyödykäs hakamaissa, sillä eläimet syövät sen lehtiä.

S. aurita L. *Wipapaju*. — Norkot m. perättömiä ja lehdetömiä; kodat peräkkäitä, tav. höykeitä, epävartaloisia; lehdet vastopuikeita, lyhyellä, taaskääntöisellä päällä, m. ehytlaitaisia, lop. harsusti hienohampaisia, päältä lienteitä, alta tav. harmaanhöykeitä, epätasaisia. — h 4, 5.

Vetisillä metsäniit. tav. (E. — P. Kv.) *3—6-kyynäräinen pensas, ruskealla, m. kaljulla kuorella oksissa; leveillä, usein munuamaisilla korvakkeilla; lehdet toisintelevat paljon. — S. cinerea Sv. B.*

S. depressa L. *Santopaju*. — Kodat pitkäperäisiä, sangen lyhytvartaloisia, tav. silkkilienteitä; lehdet leveän-sukeita — soikeita, ehytlaitaisia t. harsusti nyhäsaursia, tav. kaljuja, alta jääänkarvaisia. — h 5, 6. —  $\beta$  cinerascens: lehdet isompia, har-

\*) Paitsi joitakuita harvoja suomumaisia lehdyköitä, jotka tav. ovat norkon tyvellä, tahi verhovat vanhempain norkkojen väl. pitkistynyttä perää.

su-lienteitä, päältä lop. kaljuja. —  $\gamma$  livida: jalan pit. pensas ohuilla, m. läpikuultavilla lehdillä.

Kosteilla metsäniit. (E. — L. Lv.;  $\beta$  L. Lv.) 1—3 jalan pituinen pensas; norkot lyhyillä, kuta kuinki lehdestävillä perillä, väl. m. perättömiä. Ei mustene kuivaessa; toisintees hyvin harvoin valmiilla siemenkodilla kaljuina.

**b** — Lehdet aina sileitä, tav. soukkia, ehytlaitaisia, nuorempina silkkimäisiä (paitsi *S. myrtilloides*).

*S. repens* L. Rämepaju. — Kodat pitkäperäisiä, pitkulaisia, lyhytvartalaisia; lehdet pitkulaisia — soikeita, tav. ehytlaitaisia, nuorempina alta silkkimäisiä, lop. jäänkarvaisia. —  $\eta$  4, 5.

Soissa (E. — P. Kv.) Matala pensas, haaroin ainoasti maasta kohoava; lehdet vanhempina us. ihan kaljuja, toisinnellen m. tasasoukista soikeisiin; ponnet keltaisia.

*S. rosmarinifolia* L. Rämepaju. — Kodat lyhytperäisiä, suikeita, valkeanhöykeitä, lyhytvartalaisia; lehdet suikean-keltaisia, ehytlaitaisia, alta silkkimäisiä, lop. kaljuja. —  $\eta$  4, 5.

Kosteassa santam. harv. (A. — Ke. St. H. Pe. Kv.) Tuskin kyynäräinen pensas kynnenpituksilla, lyhytperäisillä norkoilla ja mustilla hede-ponsilla; lehdet hyvän tuuman pituisia, tuskin 2 linjan levyisiä. Luultavasti vaan edellisen toisintelo.

*S. myrtilloides* L. Suosuffa-paju. — Kokonaan kalju; kodat peräkkäitä, m. vartalottomia, lehdet pyöreän-soikeita t. pitkulaisia, lanttokantaisia, tylppiä, ehytlaitaisia, alta sinettäviä. —  $\eta$  6.

Tunt. tien., niit. tav. (E. — L. Lv.) Kyynärän pit., kokonaan kalju pensas, ainoastaan norkkosuomuin päässä on tav. muutamia pitkiä karvoja; norkkoperät pitkiä, lehdestäviä; korvakkeet pieniä, puikeita t. ei ollenkaan.

\*\*\* Kodat pitkä- t. selväperäisiä, pitkävetisellä t. pitkällä vartalolla; lehdet lop. kaljuja (paitsi *S. versifolia*).

*S. versifolia* Wg. Tunturi-paju. — Kodat pitkä-peräisiä, tav. hienokarvaisia, pitkävetisellä vartalolla; norkkoperä lehdestävä; lehdet suikean-pitkulaisia, viistosuippoisia, ehytlaitaisia, alta lienteitä, kohosuonisia, vähän alaskierteisillä laidoilla. —  $\eta$  6.

Tunturikasvi, harv. (L. Lv.) Matala pensas 1—1½ tuuman pituisilla, etenkin alta lienteillä lehdillä; toisintees kaljuilla kodilla.

*S. nigricans* Sm. Ruštenema paju. — Kodat munanmoisista, äimäsuippoja, norkkosuomuin pituisilla perillä ja pitkävetisellä vartalolla; lehdet pitkulaisia — puikeita t. vastopuikeita, aaltoisesti sahalaitaisia, alta kohosuonisia ja lop. jäänkarvaisia; korvakkeet herttapuolikkaita. —  $\eta$  5. —  $\beta$  borealis Fr.: lehdet

lop. isoja, soikeita t. puikeita; norkkoperät pitkäveteisiä, lehdestäviä.

Metsäniit. tav. (E. — L. Lv.;  $\beta$  L. Lv.) *Pensas himedn-vehreillä, kuivaessa m. aina mustenevilla lehdillä; toisintees paljon, kaljuilla, karvakkaisilla ja villaisilla kodilla, kaljuilla ja höyteillä lehdillä j. n. e.* — *S. phyllicifolia* Auett.

*S. phyllicifolia* L. Mettäpaju. — Kodat selväperäisiä, hienokarvaisia, väl. kaljuja, jokseen pitkäveteisellä vartalolla; lehdet suikeita — soikeita, nyhälaitaisia, kaljuja, alta jäänkarvaisia. — h 5, 6.

Rant., niit. j. m. tav. (T. — L. Lv.) 3—8 jalan pituinen pensas; lehdet päältä kiiltävästi vehreitä, eivät mustene kuivaessa; oksat tumman-ruskeita, kiiltäviä; kukkiminen, kuin edellisenki, lehden puhkeamisen aikana; korvakkeita tavataan hyvin harvoin, nekin juuri pienehköitä, pitkulaisia, hampaisia. — *S. bicolor* Koch.

*S. hastata* L. Remin paju. — Kodat peräkkäitä, pitkulaisia, kaljuja, lyhyellä, luottien pituisella vartalolla; lehdet soikeita — pitkulaisia, nyhäsahaisia, kaljuja, alta jäänkarvaisia, verkkosuonisia. — h 5, 6.

Tunt. tienoilla j. m. (P. L. Lv.) 1—3-kyynäräinen pensas; lehdet toisinteevat suikeista puikeisiin ja herttamaisiin, ovat tankeita ja litteälaitaisia, eivät ki mustene kuivaessa; korvakkeet isoja, hertta-puolikkaita, kulmalaitaisia; norkkoperät lehdestäviä. — *S. malifolia* Sm.

Muist. — Kuorta pitäisi ennen kaikkia koetettaa vilutaudissa.

+++ Hyvin matalia (harvoin yli  $\frac{1}{2}$ -kyynäräisiä) pensaita; norkkosuomut k. ed. jaossa; mesinystyrää tav. 2.

*S. myrsinites* L. Mustiffa-paju. — Kodat m. perättömiä, höyteitä, pitkäveteisellä vartalolla; lehdet soikeita t. vastopuikeita, sahalaitaisia, verkkosuonisia, nuorempina pitkäkarvaisia, lop. kaljuja, molemmin puolin vehreitä ja kiiltäviä. — h 5, 6.

Tunt. (L. Lv.) 3—12-tuumainen, väl. kyynäräinen paksulehtinen pensas, tuumanpituisilla, paksuilla, pystyillä norkoilla, tav. oksain päässä.

*S. arbuscula* L. Rääpiöpaju. — Kodat lienteitä, lyhytperäisiä, vähän pitkäveteisellä vartalolla; lehdet pitkulaisia — suikeita, keskeltä leveämpiä ja nyhäsahaisia, kaljuja, kiiltäviä, alta harmaanvehreitä. — h 5, 6.

Tunt. harv. (L. Lv.) Tav. 1—2-vaaksainen, joskus pidempiki; lehdet  $\frac{1}{2}$ —1 tuuman pitkiä, päältä kiiltäviä, alta himeitä; norkot soukkia lyhyellä lehdestävällä perällä.

*S. polaris* Wg. Rähäpaju. — Kodat m. perättömiä, munanmoisia, villaisia t. pehmytkarvaisia, pitkäveteisellä vartalolla; lehdet pyöreitä t. soikeita, ehytlaitaisia, kaljuja ja sileitä. — h 6, 7.

Tunturikasvi, harv. (L. Lv.) *Ainoasti oksien lehdelliset ja kukalliset latvat näkyvissä maan päällä; lehdet sileämpiä, ei niin kurttusuonisia k. seuraavalla, väl. lovipäisiä.*

*S. herbacea* L. Raimaispaju. — Kodat m. perättömiä, tav. kaljuja, lyhytvartalaisia; lehdet tav. m. kehrämäisiä, tylppä-t. lovipäisiä, kaljuja, nyhälaitaisia, verkkosuonisia, epätasaisia. — h 6, 7.

Tunturikasvi (L. Lv.) *Kasvutapa kuin edellisellä, joka niin kuin tämäkin uskottavasti on kaikkein pienimpiä pensaskasveja.*

*S. reticulata* L. Silmupaju. — Kodat perättömiä, höy-teitä, m. vartalottomia; lehdet m. kehrämäisiä t. pitkänpyöreähköitä, eheillä, alaskierteisillä laidoilla, alta valkeankarvaisia t. jäänharmaita, koleita verkontapaisten kohosuoniensa välillä. — h 6.

Tunturikasvi (L. Lv.) *Kasvutapa m. kuin edellisilläki; pak-sulla varrella ja haaroilla, enemmältään maan alla; lehdet pak-suja, tav. tuuman levyisiä, väl. vähän pitkulaisia, aina pyöreästi tylppäpäisiä.*

(*S. hastata, repens, rosmarinifolia*).

## 82 heimo. — BETULACEÆ. Koivukasveja.

### BETULA L. Koivu. Björk.

*B. verrucosa* Ehrh. Rauduäkoivu. — Lehdet epänelisiä t. nelikulmaisia, soukalla pitkäveteisellä päällä, toissahaisia, aina kaljuja; hedelmä-norkot veltoja, pitkulaisen liereitä, suomuvin sivuliuskat suoraan ulos- t. vähän alaspäisiä keskiliuskasta; siipi-hedelmä soukempi ja paljo lyhempi ympäröitsevää kalvolaitaa. — h 5. —  $\beta$  rhomboidea: lehdet nelikulmaisia t. nelikulmais-pui-keita (keskeltä t. niskalta leveämpiä), yksikertaisesti sahalaitaisia. —  $\gamma$  laciniata: lehdet m. parijakoisia, suikeilla ja suipukoilla liuskoilla.

Mets. ja kuivilla niit. tav. (E. — P. Kv.;  $\beta$  T.;  $\gamma$  St.) *Pitkä puu, valkealla, us. pykeisellä ja epätasaisella päälyskuorella t. tuohella, usein soukilla rippuvilla oksilla: var. pendula; vesat nyylläisillä oksilla ja kaljuilla lehdillä.* — *B. alba* L. *B. odorata* Reich.

Muist. — Hikikylypy (kun paneutaan paljaalla ruumiilla tuoretten koivulehtien sisään maata) sanotaan parantavan leinin. Säälistys-taudin (luuvalon) särkyä vasten käytetään tuoreita koivunlehtiä, joita sidotaan särkevän jäsenen ympäri. Koivun mahalaa on myöskin juotu vastanimitettyissä taudeissa. Siitä taide-

taan keittää hyvää siirappia; 60:stä kannusta saadaan lähes kannu siirappia kokoon keittämällä. Myös viiniä saadaan mahalasta keittämällä, sokeroittamalla ja käyttämällä. Tököttiä eli ryssäliä keitetään koivun tuohesta. Mehu, jota hikoilee happamista koivupuista valkean hohteessa käytetään voiteena luuvalossa. Tuohianturat, sukien sisällä pidetyt, tuottavat kadonneen jalkahien jälensä ja hyödyttävät ylösnousneessa leinissä ja jalkasäryssä.

Lehtiä käyt. ruuaksi eläimille. Puulaji kovaa ja lujaa, on soveliasta puukalu-töihin ja rakennus-aineiksi. Visakoivu (*saxatilis*) on erittäin soveliasta sorvaus- ja puusepän töihin, tuohi katoiksi ja kuori nahkain parkitukseen. Lehdet painavat kellaista; alunan kera keitetyistä saadaan niistä maaliväriä.

Kasv. siemenistä syys-aikana kuivaan laihaan multaan, etenki palo- ja takamaille. Koivun lehden ensi puhkeamisessa pitää kevätkuoko kylvettämän.

*B. pubescens* Ehrh. *Hies-koivu*. — Lehdet puikeita — vähän herttamaisia, suippoja, epämukaisesti sahalaitaisia; norkot ed.; suomuin sivuliuskat enemmän edespäisiä; hedelmä kaidempi, vaan ei paljon lyhempi kalvolaitaansa; vesain oksat ja lehdet höykeitä. — h 5. —  $\beta$  tortuosa: pienempi puu mutkittelevalla rungolla ja lyhyillä oksilla, jyreästi nyhäsahaisilla lehdillä.

Mets. ja kosteissa paik. tav. (E. — L. Lv.;  $\beta$  Lv.) *Puu kuin edellinenki, sileämmällä ja valkeammalla tuohella, puikeammilla ja vähemmin suipoilla lehdillä, us. rippuvilla oksilla: var. pendula*. — *B. glutinosa* Wallr., *H. M. F. B. odorata* Bechst., *Hn.*

*B. intermedia* Thom. *Seä-koivu*. — Lehdet pyöreänpuikeita — soikeita, epämukaisesti toissahaisia, suipukoilla sahampailla; norkot soikean-pitkulaisia, lyhytperäisiä, pystyjä; suomuin liuskat m. tasamukaisia, soukkia, edespäisiä; hedelmä kalvolaitaansa pituinen ja levyinen. — h 6.

Tunt. harv. (K. Kv. Pe. P. L. Lv.) *Noin 3-kyynäräinen pensas, väl. pieni puu; hyvin lähisukuinen ed. ja seur., josta se eroaa suipoilla lehdillään.*

*B. alpestris* Fr. *Tunturi-koivu*. — Lehdet m. pyöreitä, tylppäpäisiä, vähän epämukaisesti sahalaitaisia, alta tasaisia; norkot k. ed.; suomuliuskat m. tasamukaisia, puikeita, edespäisiä; hedelmä kalvolaitaansa tav. leveämpi. — h 5.

Tunturilaks., harv. (L. Lv.) *2—3-kyynäräinen pensas; lehdet kuin Vaivais-koivulla, ehkä usein tuuman levyisiä. Näyttää, ynnä ed. kanssa, olevan sekalaji Hies-koivusta ja seuraavasta, joiden kera sekaisin harvalta kasvaa*. — *B. fruticosa* Less. *B. alba*  $\delta$  Wg.

*B. nana* L. *Baimais-koivu*. — Lehdet m. kehrämäisiä, nyhäsahaisia, tylppähampaisia, alta verkkomaisesti kohosuonisista; hedelmänorkot ed.; suomuliuskat m. tasamukaisia, tasasoukasti pitkulaisia; hedelmät kalvolaitaansa leveämmät. — h 5, 6.

Nevoissa, etenki tunturitien., tav. (T. — L. Lv.)  $1-2\frac{1}{2}$  jalan pituinen pensas, kynnensuuruisilla lehdillä; norkkosuomuin liuskat yhtä suuria, typpäköitä, ei paljon toisistaan sirottavia.

Muist. — Lehdet antavat tummemman keltavärin kun tavallisen koivun. Juurista punotaan koreja. Lappalaiset käyttävät tätä vuoteensa pohjaksi sekä polttopuiksi.

### ALNUS Gärtn. Leppä. Al.

*A. glutinosa* Willd. *Sermaleppä*. — Lehdet pyöreämaisiiä t. vastopuikeita, typpäkkä- t. lanttopäisiä, toissahaisia, alta suonikulmissa höykeitä, muuten kaljuja ja vähän tahmeita. — h 3, 4.

Mets., vesien vierissä, tav. (E. — Pe. Kv.) *Korkea puu, väl. pensas, varhaisilla kukilla paljaalla oksalla.* — *Betula alnus* L.

Muist. — Lehdet lammasten talviruuaksi pitää riistottaman heinäkuun lopulla. Kelpaavat myös ruuaksi sioille mäsken ja akanain seassa. Lattialle levitettyä lehti sanotaan karkottavan syöpäläiset. Lepän ja pajunkuoren puruja ruisjauhoilla sekoitettuna sanotaan hyväksi ruusun voiteeksi.

Puulaji on kaunistaa, punalehtavaa. Käyt. puusepän töihin, erinomattain juuret päälysteeksi pöydille, piironkeihin j. n. e. Kuori painaa ruskeata ja punaista, vihtrillin kanssa mustaa. Nahkoja mustutetaan vedessä keitetyillä lepänkuorilla, prisiljalla ja vihtrillillä. Ei mikään puu kestä paremmin mädäntymistä veden alla. Sopii siis pylväiksi vedenpäällisille rakennuksille. Leppäpylväillen ovat kaupungit *Venetsia*, *Ravenna* isommaksi osaksi raketut. Vesirännit, maansisäiset rumput, pumppuhirret j. n. e. tehdään parhaiten tästä puusta.

Kasvaa osittain syys- ja lokakuussa otetuista siemenistä, jotka kylvetään syksyllä tahi keväällä, osittain juurivesoista tahi tuoreista seipäistä, jotka taidetaan maahan pistää keväällä ennen silmikkoin puhkeamista. Siten taidetaan kosteaan maahan kunnis lepikkö pian kasvatettaa. Leppä parantaa ruohonkasvun ja maanlaadun, ja joki-äyräät tulevat sen juurista lujemmiksi.

*A. incana* Willd. *Sarmaa leppä*. — Lehdet puikeita t. soikeita, suippoja, jyreästi toissahaisia, alta vaaleampia, hienokarvaisia t. lienteitä. — h 3, 4. —  $\beta$  *pinnatifida*: lehdet m. parijakoisia. — \* *pubescens* Tausch.: lehdet typpäköitä t. epäsuippoisia, alta karvaisia t. harsulienteitä, m. vehreitä.

Kost. paik. tav. (E. — L. Lv.;  $\beta$  H.; \* U. St. — L. Lv.)  
*Matala puu tahi pensas, valkeammalla ja sileämmällä kuorella k. edell., eikä tahmea-lehtinen; kukostaa paljaalla oksalla varhemmin kun sekä Tervaleppä että Pähkinäpuu; toisinteesä kuta kuinki höyteillä lehdillä.* — *Betula alnus*  $\beta$  L. — \* *A. barbata* Mey. *A. hybrida* Al. Br.

Muist. — Lehti on parempaa kun edellisen. Kasv. kuin edellisestä sanottiin.

### 83 heimo. — MYRICACEÆ. Suomyrttisiä.

MYRICA L. Suomyrtti. Pors.

M. gale L. — Pensaskasvi; norkot lyhytsuippoisilla suomilla; lehdet suikean-nalkkimaisia, päästä sahapampaisia. — h 4, 5.

Soissa, rannoilla (E. — P. Kp.) *Kyynäräinen pensas; kukat paljaalla oksalla, ruskeissa, pystöissä norkoissa; vullista yksikotinen.*

Muist. — Kasvia, etenki hedelmiä ja lehtiä, on pienennettynä ja öljyllä sekoitettuna käytetty vasten kapia ja rohtumia. Myös on keitevesi kiitettävää syöpäläisiin päässä, vaatteissa, seinissä j. n. e. kun niitä sillä pestään.

On muinen käytetty humalan asemesta juomiseen, jonkatähden vanha laki sitä kieltää toisen maalta kokoamasta.

### 84 heimo. — CONIFERÆ. Käpykasveja.

PINUS L. Petajä. Furu.

P. sylvestris L. Mänty. Tall. — Neulasat pysyviä, parittaisia, tönkeitä, litteämaisiiä, käpyjen pituisia; kävyt munaiskeilamaisia, peräkkäitä, alaskääntöisiä; suomut paksumpia päästä. — h 5, 6.

Mets. tav. (E. — L. Lv.) *Pitkä puu; nuoremmat haarat härkiläisiä.*

Muist. — Keite-vesi sekoitetuista nuorista männyn keristä, voikukan juurista ja kypsistä muserretuista katajan marjoista, johon lyödään puserrettua piparruutin mehua ja jotain happoa, on terveellinen (verenpuhdistava) ja tehosa juoma kerpukkiin, luuvaloon, sulkua ja pöhötautiin. Sitä juodaan muutamia lasillisia päivässä. Mäihä (jälsi) on hyödyllinen ensin keväällä syödä vasten matoja sekä kerpukia. Kun kuori haavoitetaan puuhun



asti, juoksee siitä kesällä pihkamaista nestettä, joka jäähmetty itsestäänsä tavalliseksi paksuksi terpentiiniksi. Se on ulkonaisesti puhdistava ja parantava haavoja. Tervavettä käyt. varjelus-aineeksi vasten rokkoa ja muita tarttuvaisia tauteja. Sitä tehdään, kun kortteliin tervaa lyödään kannu vettä, jota puulastalla yksi tunti yhä sekoitetaan, ja sitte vuorokauden seisonunna kaadetaan eri-astiaan. Sitä nautitaan muutamia ryyppyylaseja päivässä. Pikiä pidettiin ennen kauvemmin aikaa laastarina kainalojen välissä vasten kiinteätä yskää ja heikkoa rintaa.

Kuivista, pihkaisista petäjän kannoista poltetaan tervaa, jonka hyöty on yleisesti tuttu. Petäjä käyt. yleisesti hirsiksi, rakennus-aineiksi j. n. e., sen sisuskuori leivän aineeksi katovuosina ja eläinten ruuaksi, neulaset muokattuna täytteeksi makuu-vaatteisiin j. n. e.

Kasv. siemenistä, jotka pitää vilua vasten sammalilla peitettämän.

*P. larix* L. *Sehtifuufi*. *Lärkträd*. — Neulaset vuosittain varisevia, alussa tukuttaisia, litteitä; käpy munanmoinen, pysty; suomut litteä- ja tylppäpäisiä. — b 5, 6.

Kasvatus-maissa, metsist. (Ke.) *Vähempi puu, monilukuisilla neulasilla tukuissa, jotka lop. osittain kasvavat oksiksi yksinäisillä ja erindisillä, pitkillä neulasilla.* — *Larix europæa* DC. *L. decidua* Mill.

Muist. — Kun puu haavoitetaan, juoksee siitä pihkamaista nestettä, jota kutsutaan venetsian terpentiiniksi; se on ulkonaisesti haavoja puhdistava ja parantava.

Sisällisesti on kaikki terpentiinini vesityttävää, mutta myös kiihottavaaki.

*P. abies* L. *Quuñ*. *Gran*. — Neulaset pysyviä, yksinäisiä, hajallisia, vähän 4-kulmaisia, otasuippoja, yhdenvärisesti vehreitä; käpy keilamainen, rippuva; suomut litteitä typäkällä, nirhahampaisella päällä. — b 5, 6. —  $\beta$  *viminalis*: pitkillä, m. yksikertaisilla ja liereillä, rippuvilla oksilla. — \* *obovata* Turcz.: käpy pitkäläisempi; suomut m. vastopuikeita, pyöreällä, ehytläisellä päällä.

Metsissä tav. (E. — L. Lv.:  $\beta$  U. H.; \* Pe. — L. Lv.) *Pieni puu, ohuimpina oksilla oksilla.* — *Abies excelsa* DC. *Pine* *europæa* Lindl. — \* *Abies sibirica* Rupr. *P. orientalis* Th. Pl. Hb.

Muist. — Sen ensimmäiset lehdillä puhkeavat kasvanneet nähtään käytettäväksi kuin määryt herkut. Kuusen pihka on haavoja parantavaa. Neulasia syövä eläin rehun pautteessa, ja hevosille syövästä siitä ilmanki tervettä. Pihkasta tehdään hartsia.

kun pihka keitetään, pannaan sekaan viini-etikkaa, ja kiehutetaan kuivaksi. Kuori kiitetään parkituttavan nahkan, niin ettei se kangistu pakkaisesta eikä kovetu vedestä. Kuusenkävyt painavat ruskeata. Juurista punotaan köysiä ja kudotaan vasuja; oksia käytetään vanteiksi astioille.

Puulaji on löyhää ja keveätä; käyt. soittokaluin tekoihin j. n. e.

Kasv. siemenistä niinkuin mäntykin.

### JUNIPERUS L. Kataja. En.

*J. communis* L. — Neulasia 3 säteettäin, tasasoukkia, äimämäisiä, suippoja, pidemmät kun hedelmä. —  $\gamma$  6. —  $\beta$  nana: neulaset leveämpiä, m. suikeita, käyriä t. limittäisiä, ei paljon pidemmät hedelmää.

Metsissä, tav. (E. — L. Lv.;  $\beta$  P. L. Lv.) *Pensas, harvoin matala puu, sinisillä marjamaisilla, kuivahkoilla hedelmillä: Katajan-marjoja.* —  $\beta$ :n neulaset pitkulaisempia ja myötäisempiä, paljon eriyvä  $\alpha$ :sta, joksi se kuitenkin tuntureilla selvästi muuttuu: *J. nana* Willd.

Muist. — Keite-vettä murskatuista katajanmarjoista ja hakuista katajan havuista juodaan eduin vesi- ja sulku-taudeissa, kerpukissa j. n. e. Höyryä tästä juomasta käytettiin vasten huonoa kuuloa ja korvanuhoa; höyryn annettiin nousta korvaan raintorvesta. Katajanmarjat ja havut käyt. savuttamiseksi huoneissa vasten tarttuvaisia tauteja. Katajanöljyä pyhkäistään rammoille jäsenille ja luun-särkyyn. Koko puussa on hienoa pihkaa, joka on tehollista, hiestyttävää, vesityttävää, puhdistavaa, j. n. e. Puu on tehollisinta liki juurta.

Marjat käyt. juomaan, hilloksi j. n. e. Niistä taidetaan myös keittää paloviinaa. Kuorista saadaan niiniä köysiksi, matoiksi j. n. e. Puulaji on kovaa, soveliasta juoma-astioiksi ja muiksi. Katajan-pihkaa kootaan muuriaisilta, ja löytyy muuriaispesien alla; sitä käyt. keitin-öljyihin (vernissoihin), ja hienonnetuna raapituksiin paperille, ettei muste (läkki) levene ja käy lävitse.

Samaan aikaan kun kataja ja tuomi kukoistavat, kutee lahna.

### TAXUS L. Marjafuufi. Idgran.

*T. baccata* L. — Oksat litteitä kahtaallisista, tasasoukista, litteistä neulasista; kukat perättömiä, lehtihankaisia; hedenorkko palleroinen. —  $\gamma$  5.

Metsissä, harv. (A.) *Vähemmän kuusen pituinen, ehkä enem-*

asti, juoksee siitä kesällä pihkamaista nestettä, joka jäähmettyy itsestänsä tavalliseksi paksuksi terpentiiniksi. Se on ulkonaisesti puhdistava ja parantava haavoja. Tervavettä käyt. varjelus-aineeksi vasten rokkoa ja muita tarttuvaisia tauteja. Sitä tehdään, kun kortteliin tervaa lyödään kannu vettä, jota puulastalla yksi tunti yhä sekoitetaan, ja sitte vuorokauden seisonunna kaadetaan eri-astiaan. Sitä nautitaan muutamia ryyppylaseja päivässä. Pikiä pidettiin ennen kauvemmin aikaa laastarina kainalojen välissä vasten kiinteätä yskää ja heikkoa rintaa.

Kuivista, pihkaisista petäjän kannoista poltetaan tervaa, jonka hyöty on yleisesti tuttu. Petäjä käyt. yleisesti hirsiksi, rakennus-aineiksi j. n. e., sen sisuskuori leivän aineeksi katovuosina ja eläinten ruuaksi, neulaset muokattuna täytteeksi makuu-vaatteisiin j. n. e.

Kasv. siemenistä, jotka pitää vilua vasten sammalilla peitettämän.

*P. larix* L. *Sehtifuufi*. *Lärkträd*. — Neulaset vuosittain varisevia, alussa tukuttaisia, litteitä; käpy munanmoinen, pysty; suomut litteä- ja tylppäpäisiä. — h 5, 6.

Kasvatus-maissa, metsist. (Ke.) *Vähempi puu, monilukuisilla neulasillaukuissa, jotka lop. osittain kasvavat oksiksi yksinäisillä ja erinäisillä, pitkillä neulasilla*. — *Larix europæa* DC. *L. decidua* Mill.

Muist. — Kun puu haavoitetaan, juoksee siitä pihkamaista nestettä, jota kutsutaan venetsian terpentiiniksi; se on ulkonaisesti haavoja puhdistava ja parantava.

Sisällisesti on kaikki terpentini vesityttävää, mutta myös kiihottavaaki.

*P. abies* L. *Ruufi*. Gran. — Neulaset pysyviä, yksinäisiä, hajallisia, vähän 4-kulmaisia, otasuippoja, yhdenvärisesti vehreitä; käpy keilamainen, rippuva; suomut litteitä tyypäkällä, nirhahampaisella päällä. — h 5, 6. —  $\beta$  *viminalis*: pitkillä, m. yksikertaisilla ja liereillä, rippuvilla oksilla. — \* *obovata* Turcz.: käpy pitkälaisempi; suomut m. vastopuikeita, pyöreällä, ehytlaitaisella päällä.

Metsissä, tav. (E. — L. Lv.;  $\beta$  U. H.; \* Pe. — L. Lv.) *Pitkä puu, altapuolen litteillä oksilla*. — *Abies excelsa* DC. *Picea vulgaris* Link. — \* *Abies obovata* Rupr. *P. orientalis* Th. Fr., Hn.

Muist. — Sen ensimmäiset keväällä puhkeavat kasvanneet taidetaan käyttää kuin männyn kerkät. Kuusen pihka on haavoja parantavaa. Neulasia syövät eliköt rehun puutteessa, ja hevosille syötetään niitä ilmanki terveydeksi. Pihkasta tehdään hartsia.

kun pihka keitetään, pannaan sekaan viini-etikkaa, ja kiehutetaan kuivaksi. Kuori kiitetään parkituttavan nahkan, niin ettei se kangistu pakkaisesta eikä kovetu vedestä. Kuusenkävyt painavat ruskeata. Juurista punotaan köysiä ja kudotaan vasuja; oksia käytetään vanteiksi astioille.

Puulaji on löyhää ja keveätä; käyt. soittokaluin tekoihin j. n. e.

Kasv. siemenistä niinkuin mäntykin.

### JUNIPERUS L. Kataja. En.

*J. communis* L. — Neulasia 3 säteettäin, tasasoukkia, äimämäisiä, suippoja, pidemmät kun hedelmä. —  $\gamma$  6. —  $\beta$  *nana*: neulaset leveämpiä, m. suikeita, käyriä t. limittäisiä, ei paljon pidemmät hedelmää.

Metsissä, tav. (E. — L. Lv.;  $\beta$  P. L. Lv.) *Pensas, harvoin matala puu, sinisillä marjamaisilla, kuivahkoilla hedelmillä: Katajan-marjoja.* —  $\beta$ :n neulaset pitkulaisempia ja myödisempiä, paljon eriyvä  $\alpha$ :sta, joksi se kuitenkin tuntureilla selvästi muuttuu: *J. nana* Willd.

Muist. — Keite-vettä murskatuista katajanmarjoista ja hakatuista katajan havuista juodaan eduin vesi- ja sulkutaudeissa, kerpukissa j. n. e. Höyryä tästä juomasta käytettiin vasten huonoa kuuloa ja korvanuhoa; höyryn annettiin nousta korvaan rätintorvesta. Katajanmarjat ja havut käyt. savuttamiseksi huoneissa vasten tarttuvaisia tauteja. Katajanöljyä pyhkäistään rannoille jäsenille ja luun-särkyyn. Koko puussa on hienoa pihkaa, joka on tehollista, hiestyttävää, vesityttävää, puhdistavaa, j. n. e. Puu on tehollisinta liki juurta.

Marjat käyt. juomaan, hilloksi j. n. e. Niistä taidetaan myös keittää paloviinaa. Kuorista saadaan niiniä köysiksi, matoiksi j. n. e. Puulaji on kovaa, soveliasta juoma-astioiksi ja muiksi. Katajan-pihkaa kootaan muuriaisilta, ja löytyy muuriaispesien alla; sitä käyt. keitin-öljyihin (vernissoihin), ja hienonnettuna raapituksiin paperille, ettei muste (läkki) levene ja käy lävitse.

Samaan aikaan kun kataja ja tuomi kukoistavat, kutee lahna.

### TAXUS L. Marjakuusi. Idgran.

*T. baccata* L. — Oksat litteitä kahtaallisista, tasasoukista, litteistä neulasista; kukat perättömiä, lehtihankaisia; hedenorkko palleroinen. —  $\gamma$  5.

Metsissä, harv. (A.) *Vähemmän kuusen pituinen, ehkä enem-*

asti, juoksee siitä kesällä pihkamaista nestettä, joka jäähmettyy itsestänsä tavalliseksi paksuksi terpentiiniksi. Se on ulkonaisesti puhdistava ja parantava haavoja. Tervavettä käyt. varjelus-aineeksi vasten rokkoa ja muita tarttuvaisia tauteja. Sitä tehdään, kun kortteliin tervaa lyödään kannu vettä, jota puulastalla yksi tunti yhä sekoitetaan, ja sitte vuorokauden seisonunna kaadetaan eri-astiaan. Sitä nautitaan muutamia ryyppylaseja päivässä. Pikiä pidettiin ennen kauvemmin aikaa laastarina kainalojen välissä vasten kiinteätä yskää ja heikkoa rintaa.

Kuivista, pihkaisista petäjän kannoista poltetaan tervaa, jonka hyöty on yleisesti tuttu. Petäjä käyt. yleisesti hirsiksi, rakennus-aineiksi j. n. e., sen sisuskuori leivän aineeksi katovuosina ja eläinten ruuaksi, neulaset muokattuna täytteeksi makuu-vaatteisiin j. n. e.

Kasv. siemenistä, jotka pitää vilua vasten sammalilla peitetään.

*P. larix* L. *Ėĥtifuufi*. Lärkträd. — Neulaset vuosittain varisevia, alussa tukuttaisia, litteitä; käpy munanmoinen, pysty; suomut litteä- ja tylppäpäisiä. — h 5, 6.

Kasvatus-maissa, metsist. (Ke.) *Vähempi puu, monilukuisilla neulasillaukuissa, jotka lop. osittain kasvavat oksiksi yksinäisillä ja erinäisillä, pitkillä neulasilla.* — *Larix europæa* DC. *L. decidua* Mill.

Muist. — Kun puu haavoitetaan, juoksee siitä pihkamaista nestettä, jota kutsutaan venetsian terpentiiniksi; se on ulkonaisesti haavoja puhdistava ja parantava.

Sisällisesti on kaikki terpentini vesityttävää, mutta myös kiihottavaaki.

*P. abies* L. *Ruufi*. Gran. — Neulaset pysyviä, yksinäisiä, hajallisia, vähän 4-kulmaisia, otasuippoja, yhdenvärisesti vehreitä; käpy keilamainen, rippuva; suomut litteitä typäkällä, nirhahampaisella päällä. — h 5, 6. —  $\beta$  viminalis: pitkillä, m. yksikertaisilla ja liereillä, rippuvilla oksilla. — \* *obovata* Turcz.: käpy pitkulaisempi; suomut m. vastopuikeita, pyöreällä, ehytlaitaisella päällä.

Metsissä, tav. (E. — L. Lv.;  $\beta$  U. H.; \* Pe. — L. Lv.) *Pitkä puu, altapuolen litteillä oksilla.* — *Abies excelsa* DC. *Picea vulgaris* Link. — \* *Abies obovata* Rupr. *P. orientalis* Th. Fr., Hn.

Muist. — Sen ensimmäiset keväällä puhkeavat kasvanneet taidetaan käyttää kuin männyn kerkät. Kuusen pihka on haavoja parantavaa. Neulasia syövät eliköt rehun puutteessa, ja hevosille syötetään niitä ilmanki terveydeksi. Pihkasta tehdään hartsia.

kun pihka keitetään, pannaan sekaan viini-etikkaa, ja kiehutetaan kuivaksi. Kuori kiitetään parkituttavan nahkan, niin ettei se kangistu pakkaisesta eikä kovetu vedestä. Kuusenkävyt painavat ruskeata. Juurista punotaan köysiä ja kudotaan vasuja; oksia käytetään vanteiksi astioille.

Puulaji on löyhää ja keveätä; käyt. soittokaluin tekoihin j. n. e.

Kasv. siemenistä niinkuin mäntykin.

### JUNIPERUS L. Kataja. En.

*J. communis* L. — Neulasia 3 säteettäin, tasasoukkia, äimämäisiä, suippoja, pidemmät kun hedelmä. —  $\gamma$  6. —  $\beta$  nana: neulaset leveämpiä, m. suikeita, käyriä t. limittäisiä, ei paljon pidemmät hedelmää.

Metsissä, tav. (E. — L. Lv.;  $\beta$  P. L. Lv.) *Pensas, harvoin matala puu, sinisillä marjamaisilla, kuivahkoilla hedelmillä: Katajan-marjoja.* —  $\beta$ :n neulaset pitkulaisempia ja myönteisempiä, paljon eriyvä  $\alpha$ :sta, joksi se kuitenkin tuntureilla selvästi muuttuu: *J. nana* Willd.

Muist. — Keite-vettä murskatuista katajanmarjoista ja hakatuista katajan havuista juodaan eduin vesi- ja sulkutaudeissa, kerpukissa j. n. e. Höyryä tästä juomasta käytettiin vasten huonoa kuuloa ja korvanuhoa; höyryn annettiin nousta korvaan rätintorvesta. Katajanmarjat ja havut käyt. savuttamiseksi huoneissa vasten tarttuvaisia tauteja. Katajanöljyä pyhkäistään rammoille jäsenille ja luun-särkyyn. Koko puussa on hienoa pihkaa, joka on tehollista, hiestyttävää, vesityttävää, puhdistavaa, j. n. e. Puu on tehollisinta liki juurta.

Marjat käyt. juomaan, hilloksi j. n. e. Niistä taidetaan myös keittää paloviinaa. Kuorista saadaan niiniä köysiksi, matoiksi j. n. e. Puulaji on kovaa, soveliasta juoma-astioiksi ja muiksi. Katajan-pihkaa kootaan muuriaisilta, ja löytyy muuriaispesien alla; sitä käyt. keitin-öljyihin (vernissoihin), ja hienonnettuna raapituksiin paperille, ettei muste (läkki) levene ja käy lävitse.

Samaan aikaan kun kataja ja tuomi kukoistavat, kutee lahna.

### TAXUS L. Marjakuusi. Idgran.

*T. baccata* L. — Oksat litteitä kahtaallisista, tasasoukista, litteistä neulasista; kukat perättömiä, lehtihankaisia; hedenorkko palleroinen. —  $\gamma$  5.

Metsissä, harv. (A.) *Vähemmän kuusen pituinen, ehkä enem-*

*män pensastava; ennättää kuitenkin tämän suuruuden; hedelmät punaisia, marjamaisia.*

Muist. — Puulaji on kovaa ja punajuomuista, soveliasta kaikellaisiin puukalu-tekoihin.

## 85 heimo. — CALLITRICHACEÆ. Vesitähtisiä.

CALLITRICHE L. Vesitähti. Vattengröna.

† Kukat kahden valkean, käyrän suojuslehden sisällä.

*C. stagnalis* Scop. Reräinen vesitähti. — Kaikki lehdet alisetki lapiomaisia, pitkäveteisellä, soukalla, ruotimaisella kannalla, pyöreän-pitkulaisella, 3- t. useampi-suonisella lavalla; hedelmä siipipalteisilla kulmilla, pysyvillä, alaskaarevilla vartaloilla. — ☉ 6, 7.

Ves. harv. (A.) *Isompi seuraavia; lehden lapa parin linjan pituinen ja m. saman levyinen; heteet 2 linjan pituisia; hedelmän 4 kulmaa ristittäin ulospäisiä.*

*C. verna* L. Reräinen vesitähti. — Lehdet pitkulaisen lapiomaisia ja kaitakantaisia, t. tasasoukkia, edelliset 3-, jälkimäiset 1-suonisia; hedelmä sivulta litistynyt, m. tylpillä kulmilla, pystöisillä, menehtyvillä vartaloilla. — ☉ 5—9. —  $\beta$  *divaricata* Sæl.: varsi suikertava, ylöspäisillä haaroilla; lehdet tasasoukkia, lovipäisiä; suojukset ja vartalot menehtyviä; hedelmät ulospäisillä kulmilla. —  $\gamma$  *repens*: kaikki lehdet pitkulaisia, 3-suonisia. —  $\delta$  *minima*: pikkurainen, suikertava t. pystöinen; kaikki lehdet tasasoukkia.

Vesivier. ja ves. tav. (E. — L. Lv.;  $\beta$  U.) *Lehdet 2 linjan levyisiä; hedelmät kuin litteähkö risti.*

†† Suojuslehdetön.

*C. autumnalis* L. Sytyinen vesitähti. — Kaikki lehdet erinäisiä, tasasoukkia, typäköitä t. lovipäisiä, yksisuonisia; hedelmän kulmat ohukaisia, siipimäisiä. — ☉ 7, 8.

Vedessä (E. — L. Lv.) *Kasvaa pystöisenä ja pitkän pituuttaan haaraisena; aina veden alla, tekevä kuitenkin pitkälle haaroihin runsaasti hedelmiä, kahta isompia kun edellisten; ponnat m. palhottomia.*

## 86 heimo. — CERATOPHYLLACEÆ. Karvalehtisiä.

CERATOPHYLLUM L. Karvalehti. Flohår.

*C. demersum* L. — Lehdet säteettäin, hapsimaisesti tois-  
haarukkais-jakoisia; pähkylät pitkänpalleroisia, otasuippoja ja  
tyveltä piikillisiä, sileitä. — 4 7, 8.

Vesikuljuissa, harv. (A. T. U. H. S. Kv.) *Kasvi liereä toinen  
toisensa hiukan peittävistä lehdistä.*



*män pensastava; ennättää kuitenkin tämän suuruuden; hedelmät punaisia, marjamaisia.*

Muist. — Puulaji on kovaa ja punajuomuista, soveliasta kaikellaisiin puukalu-tekoihin.

## 85 heimo. — CALLITRICHACEÆ. Vesitähtisiä.

CALLITRICHE L. Vesitähti. Vattengröna.

† Kukat kahden valkean, käyrän suojuslehden sisällä.

*C. stagnalis* Scop. Reijäinen vesitähti. — Kaikki lehdet alisetki lapiomaisia, pitkäveteisellä, soukalla, ruotimaisella kannalla, pyöreän-pitkulaisella, 3- t. useampi-suonisella lavalla; hedelmä siipipalteisilla kulmilla, pysyvillä, alaskaarevilla vartaloilla. — ☉ 6, 7.

Ves. harv. (A.) *Isompi seuraavia; lehden lapa parin linjan pituinen ja m. saman levyinen; heteet 2 linjan pituisia; hedelmän 4 kulmaa ristittäin ulospäisiä.*

*C. verna* L. Remäinen vesitähti. — Lehdet pitkulaisen lapiomaisia ja kaitakantaisia, t. tasasoukkia, edelliset 3-, jälkimäiset 1-suonisia; hedelmä sivulta litistynyt, m. tylpillä kulmilla, pystöisillä, menehtyvillä vartaloilla. — ☉ 5—9. —  $\beta$  *divaricata* Sæl.: varsi suikertava, ylöspäisillä haaroilla; lehdet tasasoukkia, lovipäisiä; suojukset ja vartalot menehtyviä; hedelmät ulospäisillä kulmilla. —  $\gamma$  *repens*: kaikki lehdet pitkulaisia, 3-suonisia. —  $\delta$  *minima*: pikkurainen, suikertava t. pystöinen; kaikki lehdet tasasoukkia.

Vesivier. ja ves. tav. (E. — L. Lv.;  $\beta$  U.) *Lehdet 2 linjan levyisiä; hedelmät kuin litteähkö risti.*

†† Suojuslehdetön.

*C. autumnalis* L. Sytyinen vesitähti. — Kaikki lehdet erinäisiä, tasasoukkia, typäköitä t. lovipäisiä, yksisuonisia; hedelmän kulmat ohukaisia, siipimäisiä. — ☉ 7, 8.

Vedessä (E. — L. Lv.) *Kasvaa pystöisenä ja pitkin pituuttaan haaraisena; aina veden alla, tekevä kuitenkin pitkälle haaroihin runsaasti hedelmiä, kahta isompia kun edellisten; ponnat m. palhottomia.*

## 86 heimo. — CERATOPHYLLACEÆ. Karvalehtisiä.

CERATOPHYLLUM L. Karvalehti. Flohår.

*C. demersum* L. — Lehdet säteettäin, hapsimaisesti tois-haarukkais-jakoisia; pähkylät pitkänpalleroisia, otasuippoja ja tyveltä piikillisiä, sileitä. — 2 7, 8.

Vesikuljuissa, harv. (A. T. U. H. S. Kv.) *Kasvi liereä toinen toisensa hiukan peittäivistä lehdistä.*

### III. — SIRKATTOMIA.

87 heimo. — EUISETACEÆ. Kortekasveja.

EUISETUM L. Rorte. Fräken.

† Tähkävarsi haaraton t. säteettäisillä haaroilla. Ei talvehtiva.

\* Tähkävarsi haaraton ja pian variseva, t. hedelmöidessä ja jälkeen kasvavilla haaroilla. Kevätkasveja.

E. arvense L. Peltoforte. — Tähkävarsi haaraton, pian variseva, väljillä vaalahkoisilla tupilla, syvään halenneet mustanruskeiksi, suikeiksi liuskoiksi; hedelmätön varsi tav. yksikertaisilla, 4- t. 3-särmäisillä sädehaaroilla. — 24 4, 5\*). —  $\beta$  alpestre: paljon hennompi; hedelmättömät varret rentoja.

Savimaissa, tav. (E. — L. Lv.) *Tähkävarsi aikaisempi kun sädehaarainen, joka usein pysyy rentona, jolloin aliset haarat uudestaan jakauvat.*

Muist. — On jumova ja vesityttävä. Luullaan olevan eläimille vahingollinen. Hävitetään pelloista lannoittamisella ja viireällä kyntämisellä.

E. pratense Ehrh. Nurmiforte. — Tähkävarsi tav. kasvatava yksikertaisia, 3—4-särmäisiä, ulospäisiä haaroja; tupet hiukan avaroita ja vaaleita, kalvomaisilla, ruskeilla, suipukoilla liuskoilla; hedelmätön varsi k. ed. — 24 4, 5. —  $\beta$  serotinum: tähkä- ja haaravarsi samasta juurakosta lähteviä; tupet 4—6-halkeisia.

Niit. tav. (E. — L. Lv.;  $\beta$  L.) *On edellisen muotoinen, mutta kaikin osin hentoisempi; ensi-hedelmöimisessä m. ilman sädehaarain aihehtakaan, jotka sitte vähitellen kasvavat, kuitenkin väljäyvät puuttumaan. — E. amphibolium Retz. E. umbrosum Willd.*

---

\*) Salasiittiöissä osottaa numero sitä kuuta, jona hedelmä-laite on oikein valmistunut, tai itiöpesäkkeet valmiita hellittämään itiöitä, jolloin ne ovatki tultavia.

*E. sylvaticum* L. Metjåforte. — Tähkävänren sädehaarat uudestaan jakauneet 3-särmäisiksi säde-haarukoiksi; tupet harvoilla (tav. 3:lla), m. puikeilla, tylppäpäisillä, vaaleanruskeilla liuskoilla. — 2 5, 6. —  $\beta$  capillare: haarat ja haarukat pitkiä, suoraan ulospäisiä, m. hapsimaisia.

Metsäniit. tav. (E. — L. Lv.) *Haarat tav. kaarevasti alaspäisiä, toiskertaisia, kasvavia kukkimisen jälestä.*

•• Tähkävarsi sädehaarainen (väl. haaraton) täysikasveneilla haaroilla hedelmöimisen aikana. Kesäkasveja.

*E. palustre* L. Mroforte. — Varsi monipillinen, tav. haarainen, 6—8-juovainen; haarat 4—5-särmäisiä, m. pystyjä; tuppihampaat äimämäisiä, mustanruskeita, valkealla kalvolaidalla. — 2 6, 7. —  $\beta$  polystachyon: kaikki sädehaarat pitkäveteisiä, m. tasakorkeita ja tähkikkäitä.

Kosteissa niit. (E. — L. Lv.;  $\beta$  Kv.) *Eräissä varsissa usein ei ole sädehaaroja; toiset haarauvat tyveltä kukoistaviksi sivuvarsiiksi.*

Muist. — On vahingollinen hevoisille; lammasten sanotaan siitä villansa kadottavan.

*E. fluviatile* L. Rantaforte. — Varsi yksipillinen, monijuomuinen t. -uurteinen, haaraton t. tav. 5-tahkoisilla haaroilla; tuppihampaat äimämäisiä, mustia, m. kalvolaidattomia. — 2 6, 7. —  $\beta$  limosum: varsi haaraton t. joilla kuilla harvoilla, lyhyillä, tav. paksummilla sädehaaroilla.

Vedessä, tav. (E. — L. Lv.) *Varsi paksu, kyynäräinen isolla, mustalla tähkällä;  $\alpha$ :n, joka kasvaa syvemmässä, us. juoksevassa vedessä, haarat tav. monilukuisia, 3—5-tuumaisia, soukkia; mutta ojissa j. n. e. kasvava  $\beta$  on us. haaraton taikka vaan harvalukuisilla (1—6:lla) lyhemmillä ja paksummilla haaroilla. —  $\beta$  E. limosum L.*

†† Varsi ainoasti haarova alemmaa t. juurakosta, sädehaaraton. Talvehtiva.

*E. hiemale* L. Rangaeforte. — Varsi yksipillinen, moniuurteinen, karhea; tupet pian menehtyvillä, kalvomaisilla hampailla, jonka takia tulevat typäköiksi ja nyhälaitaisiksi. — 2 5, 6.

Metsissä (E. — P. Kv.) *Varsi kova, hanhen kynän paksuinen; tupet valkeita, tyveltä mustarenkaisia.*

Muist. — On, kuin moni muuki kortelaji, vahingollinen eläimille. Kaikellaisia puutöitä taidetaan sillä silotella.

*E. scirpoides* Mich. Suv-forte. — Varsi monipillinen,

hoikka, 4–5-tahkoinen, us. rento t. koheneva; tupet mustia, valkealaitaisilla hampailla, sukamaisilla menehtyvillä päillä.

Metsäsoissa, harv. (Kv. P. L. Lv.) *Haarova tyveltä monilukuisiksi, us. rennoiksi varsiksi*. — *E. variegatum var. scirpoides* Hn.

## 88 heimo. — POLYPODIACEÆ. Saniaisia.

### POLYPODIUM L. Smarre. Bergsöta.

*P. vulgare* L. Rallio-imarre. — Varsikkolehti parijakoinen, liuskat vuorottaisia, pitkulaisen tasasoukkia, tylppäpäisiä, päättä kohden nyhäsahaisia, yliset vähempiä; pesäryhmät kahden puolen lehtiliuskain suonta. — 2 6, 7.

Vuor. ja kiv. tav. (E. — L. Lv.) 6–8 tuuman pituinen; juurakko suikertava.

Muist. — Juurakko hyvämakuinen, lievittävä rintataudissa. Sekoitetaan pienennettynä ruokalusikallinen jauhopuuroon maidon kera syötäväksi. Keitevettä nautitaan luuvalossa ja kerpukissa.

*P. phegopteris* L. Korpi-imarre. — Varsikkolehti parilehtinen; parilehdet m. vastakkaisia, ruodittomia, yliset yhteensuottuvia, 2 aliset alaskaarevia, kaikki syväjakoisia m. ehytlaitaisilla, hienokarvaisilla liuskoilla. — 2 8, 9.

Metsämaissa, tav. (E. — L. Lv.) *Noin ½-kyynärän pituinen*.

*P. dryopteris* L. Mettä-imarre. — Varsikkolehti toistain parilehtinen, piiriltään m. kolmikkomainen; parilehdet vastakkaisia, lehdykät \*) parijakoisia nyhälaitaisilla ja tylppäpäisillä liuskoilla. — 2 7, 8.

Mets., kivisein. tav. (E. — L. Lv.) *½-kyynäräinen, pehmeä saniainen*.

*P. rhæticum* L. Tunturi-imarre. — Varsikkolehti toistain — kolmisparinen, piiriltään leveän-sukea; parilehdet vuorottaisia; lehdykkäin liuskat pitkulaisia, sahaampaisia; ryhmät pyöreitä, erinäisiä. — 2 8.

Tunturikasvi, harv. (P. L. Lv.) *Kyynärän pituinen ja vaakasan levyinen; lehtiliuskat tasamukaisia*. — *P. alpestre* Hoppe, Hn.

### WOODSIA RBr. Siivi-yrtti.

*W. ilvensis* RBr. — Varsikkolehti suikea — tasasoukka,

\*) Varsikkolehti, kun on toiskertainen, jakauupi ensin parilehdiksi, parilehdet lehdyköiksi ja lehdykät liuskoiksi.

parilehtinen; parilehdet parijakoisia, liuskaisilla t. hammaslaitaisilla lehdyköillä; varsisuomuinen. — 24 7. —  $\beta$  hyperborea: varsikko-lehti m. tasasoukka, parilehtien liuskat 3—5, m. ehytlaitaisia.

Kallioraum.;  $\beta$  tuntur. (E. — L. Lv.;  $\beta$  P. L. Lv.) *Vaaksan pituinen, mustanvohreä, lop. alta ruskeanhöyryä;  $\beta$  vähäisempi, usein ainoasti 1—2-tuumainen ja kaidempi.* — *Acrostichum* L. *Polypodium* Sw. —  $\beta$  *W. hyperborea* RBr.

#### ASPIDIUM Sw. Spärflä. Taggbräken.

*A. lonchitis* Sw. — Varsikkolehti m. tasalevyinen, parilehtinen; parilehdet kuutavia, piikkisahaisia; lehtivarsi suomuinen. — 24 7, 8.

Vuorten juurella, harv. (L. Lv.) *Varsikkolehdet tupastavia, 2—3 vaaksan pituisia, 2 tuuman levyisiä.* — *Polystichum* Roth.

#### POLYSTICHUM Roth. Alwejuuri. Skogsbräken.

*P. thelypteris* Roth. Suomen alwejuuri. — Varsikkolehti ulottuva varren keskustaan t. vähän alemma, parilehtinen; parilehdet pitkäveteisen-sukeita, parijakoisia, kaljuja, lyhytsuipoilla, ehytlaitaisilla liuskoilla, hedelmällisten laidat alaskierteisiä; ryhmät lähellä laitaa, yhteenjuottuvia. — 24 7—9.

Rant. (A. — K. H.) *Hyvin hauras, vaaleanvohreä; juurakko pitkä, suikertava ja haarova.* — *Aspidium* Sw. *Lastrea* Presl.

*P. filix-mas* Roth. Dietjän alwejuuri. — Varsikkolehti parilehtinen, pitkälaisen-sukea piiriltään; parilehdet suikeita, pitkänsuippoja, syvästi parijakoisia; liuskat pitkälaisia, pyöreän-tylppiä, tylppänyhäisiä, väl. pykälaitaisia; ryhmät monilukuisia, pyöreitä, lähempänä selkäsuonta. — 24 7, 8.

Mets. tav. (E. — Pe. H. S. K.) 4—6 vaaksan pituinen, kasvava pensaanmoisena; toisinteele pykälaitaisilla liuskoilla puolitiheen selkäsuonta. — *Aspidium* Sw. *Lastrea* Presl.

Muist. — Juurakko hyvin tehoisa vasten matoja, erittäinkin lapamatoa. Tämän ja muiden saniaisten tuhkasta taide-taan saipua valmistaa, ja kuivatetut lehdet käyttää polstarien täytteeksi.

*P. cristatum* Roth. Niitun alwejuuri. — Varsikkolehti parilehtinen, piiriltään kapean-sukea; parilehdet puikeita, parijakoisia; liuskat tav. ehytlaitaisia, puikeita, pyöreän-tylppiä, terävästi nyhäisahaisia, harvoilla (2—8:lla) ryhmillä. — 24 7, 8.

Nev. ja tuppaisissa metsäniit. harv. (A. — K. H. St.) *Tankeampi laatuaan k. seur., jonka muotoinen muuten on.* — *Polypodium callipteris* Ehrh. *Aspidium* Sw. *Lastrea* Presl.

*P. spinulosum* DC. Norwen alvejuuri. — Varsikkolehti toistain — kolmisparinen; parilehtien lehdykät parihalkoisia t. parijakoisia pitkulaisilla, piikkisahaisilla liuskoilla; varsi suomui-  
nen. — 2 7, 8.

Metsämaissa, tav. (E. — L. Lv.) *Toisinteleo paljon.* — *Aspidium* Sw. *Lastrea Presl.*

### CYSTOPTERIS Bernh. ♂iffo. Stenbräken.

*C. fragilis* Bernh. — Varsikkolehti parilehtinen, suikea piiriltään; parilehdet parihalkoisia t. parijakoisia hampaisilla, liuskaisilla t. toisjakoisilla lehdyköillä ja tylppähampaisilla liuskoilla. — 2 7, 8.

Vuor., kivisein. j. m. tav. (E. — L. Lv.) 3—10 tuuman pituinen, hento ja hauras; jakaumisessaan sangen muuttelava, m. yksikertaisesta kolmesti parilehtiseen. — *Polypodium* L. *Aspidium* Sw. *Cyathea Roth.*

### ASPLENIUM L. Hiirenporras. Länke.

† Varsikko-lehti toistain — kolmisparinen, lehdykät kan-  
nalta leveitä: *Athyrium* Roth.

*A. filix-femina* Sm. Metjäinen hiirenporras. — Varsikko-  
lehti suikea, toistain parilehtinen; parilehdet alempana vastak-  
kaisia; lehdykät syvästi parihalkoisia, saha- t. hammaslaitaisilla  
liuskoilla, alimmaisiet epämukaisia, etumainen isompi; ryhmät pit-  
kulaisia, käyrähhöitä. — 2 7, 8. —  $\beta$  *complicatum*: parileh-  
det S:n mukaisesti käyriä, alaskaarevilla, loivempi-liuskaisilla leh-  
dyköillä.

Metsämaissa, tav. (E. — L. Lv.;  $\beta$  A. St.) *Noin kyynärän  
pituinen; varsi suomuinen alempaa;  $\beta$  kahta vähempi.* — *Polypo-  
dium* L. *Aspidium* Sw.

*A. crenatum* Fr. Ryhäinen hiirenporras. — Varsikkolehti  
kolmikkomainen piiriltänsä, kolmisparinen; päätöliuskat leveän-  
pitkulaisia, pyöreän-tylppiä, t. melk. poikkipäisiä, tylppänyhäisiä;  
ryhmät pitkulaisehkoita, käyriä. — 2 8.

Tunturiseut. harv. (H. S. Kv. Lv.) *Lehti noin 10 tuuman  
levyinen ja pituinen ilman ruodittaan; liuskat vähän ikään k. ed.,  
hedelmällisten lehtien syvempiä, vähän pykänhäisiä.* — *A. sibiricum*  
*Turcz. Aspidium Smft.*

(*A. ruta-muraria*).

†† Varsikkolehti jaottomilla, pyöreämäsillä parilehdillä.

*A. trichomanes* L. Lumpura hiirenporras. — Parilehdet

yksikertaisia, ruodittomia, pyöreämäisesti puikeita, loiva-nyhäisiä. — 24 7.

Kallioraum. (A. — K. St. — Kv.) *Koko lehtivarsi latvaan asti tumpura, vaaksanpituinen.*

A. viride Huds. Vihreä hiirenporras. — Parilehdet sangen lyhytruotisia, puikeita, pykänhäisiä. — 24 7, 8.

Kallioraum. harv. (K. Kv.) *Lehtivarsi vihreä, ainoasti alhaalta ruskea; muuten hyvin edellisen muotoinen.*

††† Varsikkolehti haarova tasasoukilla t. nalkkimaisilla, tyveltä soukilla lehdyköillä t. liuskoilla.

A. ruta-muraria L. Raunioinen hiirenporras. — Varsikkolehti piiriltään pitkulainen — puikea, haarova useiksi vastopuikeiksi, kokonaisiksi t. liuskaisiksi, nyhälaitaisiksi lehdyköiksi. — 24 6, 7.

Kallioraum., kivisein. harv. (K. Kv.) *Lehdykät pituuttaan verraten leveämpiä ja nyhäisempiä kun molempain seuraavien.*

A. Breynii Retz. Vuorolehtinen hiirenporras. — Varsikkolehti haaraton, m. tasasoukka; lehdykät useampia, vuorottaisia, suikean-nalkkimaisia, epämukaisesti pykäläitaisia. — 24 6, 7.

Kallioraum. harv. (A. T.) *3-4-tuumainen. — A. alternifolium Wulf. A. germanicum Weiss.*

A. septentrionale Hoffm. Pohjoinen hiirenporras. — Varsikkolehti latvalta liuskottu 2—3:ksi tasasoukaksi, vähän pykäläitaiseksi, suipukaksi lehdykäksi. — 24 6, 7.

Kallioraum. (A. — K. St. H. Kv.) *Vaaksan pituinen. — Acrostichum L.*

## PTERIS L. Sanajalka. Ormbunke.

Pt. aquilina L. — Varsikkolehti kolmikkomainen, kolmisparinen; loppuliuskat pitkulaisia, tylppäpäisiä, viimeiset yhteenjuottavia ehyeksi päätöliuskaksi. — 24 8, 9.

Mets., tievars. j. m. tav. (E. — Pe. Kp.) *Iso saniainen; varsikkolehti väl. karvainen, etenkin alustalta: var. pubescens.*

Muist. — Juurakkoa käyt. vasten matoja. Annos 2, 3 pientä lusikallista pulverina 2 ottein päivässä. Englannissa käyt. kasvia polttopuun asemesta. Tuhkasta, vedessä keitetystä, valmistetaan saipua-palloja. Juurakko suikertaa syvältä maassa ja laihduttaa lähellä olevat kasvit. Lehdet valkenevat vähimmästäki hallasta.

## STRUTHIOPTERIS Willd. Rotkanjiipi. Strutsbräken.

Str. germanica Willd. — Hedelmättömät varsikkolehdet



parilehtisiä, parijakoisilla lehdyköillä ja ehytlaitaisilla, tasamukaisilla liuskoilla. — 24 8, 9.

Ojanotkoissa (E. — P. Kv.)  $1-1\frac{1}{2}$ -kynnäräinen; hedelmälliset lehdet ovat yksikertaisempia ja paljon vähempiä, tuuttimaisesti lähentyneitten hedelmättömäin varsikkolehtien keskellä. — *Osmunda struthiopteris* L. *Onoclea* Sw.

#### BLECHNUM L. Kampafaniain. Kambräken.

*Bl. spicant* Roth. — Varsikkolehti pitkäveteisen suikea, parijakoinen; liuskat vuorottaisia, pitkulaisia, tylpäköitä, tasakulkevia; hedelmälehdet soukemmilla, suippoisilla liuskoilla. — 24 7, 8.

Vuorijuur. harv. (A.)  $1\frac{1}{2}$  tuuman levyinen, yli puolen kynnärän pit. korea saniaiskasvi. — *Osmunda* L. *Bl. boreale* Sw.

#### ALLOSORUS Bernh. Stefu. Krusbräken.

*A. crispus* Bernh. — Varsikkolehti puikea, kolmisparinen; lehdykät vuorottaisia; loppuliuskat pitkulaisia — vastopuikeita, pykälaitaisia; hedelmällisten lehtien liuskat kapean-sukeita, ehytlaitaisia. — 24 7, 8.

Tunturikasvi, harv. (L.) 3—9 tuuman pit. — *Osmunda* L. *Pteris* Sm. *Onoclea* Sw. *Cryptogramma* RBr.

### 89 heimo. — OPHIOGLOSSACEÆ, Kärmeenkielisiä.

#### BOTRYCHIUM Sw. Noidanluffo. Läsgräs.

*B. lunaria* Sw. Mäfeinen noidanluffo. — Varsikkolehti yksinäinen, m. ruoditon, varren keskustassa, parijakoinen; lehdykät kuutavasti puolipyöreitä. — 24 7, 8. —  $\beta$  *adanthifolium*: lehdykät m. herttamaisesti kolmikkomaisia, pykälaitaisia t. pari-luksia.

Laitum. (E. — L. Lv.;  $\beta$  P.)  $\frac{1}{2}-1$  vaaksan pituinen. — *Osmunda lunaria* L. —  $\beta$  *B. boreale* Milde.

*B. matricariifolium* Al. Br. Lypäffä noidanluffo. — Varsikkolehti ed., lähtevä paljon ylempää varren keskustaa, puikea piiriltään, toistain parilehtinen; lehdykät puikeita, tylppäpäisiä, tasasoukilla, typäköillä, tav. ehytlaitaisilla liuskoilla. — 24 6, 7.

Laitum. harv. (U. H. Kv.) Vaaksan pituinen; lehti tuuman pituinen ja levyinen, paksu ja tankea. — *B. rutaceum* Willd. *B. lanceolatum* Rupr., H. M. F.

*B. virginicum* Sw. Virginian noidanluffo. — Varsikko-

lehti varren keskustasta lähtevä, kolmesti parijakoinen; äärimäiset liuskat typäköitä, hammaslaitaisia. — 24 7.

Vuorijuur. harv. (K.) 8—10 tuuman pituinen, sangen korea saniainen; lehti 2—3 tuuman levyinen, m. kolmesti pariosainen; itiöpesäkkeet pienempiä kun edellisillä lajeilla. — *B. anthemoides* Presl.

*B. matricarioides* Willd. Mottonen noidanluffo. — Lehdet 1—2, pitkäveteis-ruotisia, lähteviä varren tyvestä, kolmikkomaisia, toistain parilehtisiä; lehdykät puikeita, pykälaitaisia t. liuskaisia. — 24 8, 9.

Laitum. harv. (E. — L. Lv.) 6—8 tuuman pituinen; lehdet 2 tuuman levyisiä. — *B. rutaceum* Sw., Hn. *B. rutæfolium* Al. Br. *Osmunda lunaria* δ L. Fl. Sv.

### OPHIOGLOSSUM L. Rärmeenfieli. Ormskalle.

*O. vulgatum* L. — Lehti puikea — pitkulainen. — 24 7, 8.

Niit. ja laitum. harv. (A. U. Pe.) Lehti yksinäinen, varren keskustassa, kokonainen; juuri kimputtu.

## 90 heimo. — ISOËTACEÆ. Lahnaruohoisia.

### ISOËTES L. Lahnaruoho. Braxengräs.

*I. lacustris* L. — Lehdet äimämäisiä, m. puoliliereitä, tankeita, mustanvehreitä; isommat itiöt (itiösikiäimet) sileitä, 3-kulmaisia, kellertäviä. — 24 7, 8.

Järvien pohjassa, aina veden alla (T. — L. Kv.) Lehdet 2—7 tuuman pituisia, tankeita, tav. miten milloinki ulospäisiä, äkisti lyhytsuippoisia, kannalta 4-lokeroisia; itiöt suuremmat k. seuraavalla.

*I. echinospora* Dur. — Lehdet ed., notkeampia, vaaleanvehreitä; isommat itiöt monilukuisilla, hienoilla, haurailta suksilla, valkeita. — 24 7, 8.

Järv. k. ed. (T. — L. Lv.) Lehdet päästä kaidempia k. ed., vähitellen soukkenevia, vedestä otettuina kokoon kaatuvia, ei tankeita; itiöt valkeita k. liitu, pienempiä k. ed.

## 91 heimo. — LYCOPODIACEÆ. Liekokasveja.

### LYCOPodium L. Sief. Lummer.

*L. complanatum* L. Rästafiefo. — Varsi suikertava; kohenevat haarat toishaarukkaisia, litteitä; lehdet 4-rivisiä, ylinen

ja alinen rivi varsimyötäisiä, epäselviä; tähkät peräkkäitä, tav. parittaisia. — 24 8. —  $\beta$  *sabinifolium*: haarat pystöisiä, m. tasalatvaisia; lehdet suikeita.

Mets. (E. — L. Lv.;  $\beta$  Ke.) *Lehdet kasvavat yhteen litteiksi haaroiksi; toisintees 1:llä, 2:lla ja 4:llä tähkällä tähkä-perässä.* —  $\beta$  *L. chamæcyparissus* Al. Br.

Muist. — Värikasvina merkillinen. Painaa prisiljan kera villaisen siniseksi. Muiden lisäys-ainetten kanssa se antaa useita keltavärejä.

*L. alpinum* L. Tunturi-liefo. — Varsi suikertava; haarat pystöisiä, selvästi 4-kulmaisia 4-rivisistä, limittäisistä, suipoista lehdistä; tähkät perättömiä, tav. yksinäisiä, liekeitä. — 24 8.

Tunturikasvi (P. L. Lv.) *Tähkät harvinaisia, väl. parittaisia.*

*L. clavatum* L. Ratinliefo. — Varsi suikertava; lehdet hajallisia, käyriä, hapsipäisiä, suonettomia; tähkät peräkkäitä, parittaisia, liekeitä, puikeilla karvattomilla suomilla. — 24 7, 8.

Mets. tav. (E. — L. Lv.) *Ikään kuin hieno kuusenhavu.*

Muist. — Siemenpöly, tav. kutsuttu matojauhoiksi, käyt. nilkisyteen eli ihottumiseen (helytymiseen); tuleen viskattuna leimahtaa palamaan ja käyt. sentähden leikki-tulituksiin. Vasikat ja lehmät syövät kasvia keväällä. Viini-astioihin ripustettuna parantaa käymiseen tulleen viinin. Lonkeroista punotaan lattiamattoja.

*L. annotinum* L. Riidenliefo. — Varsi suikertava, pystyhaarainen; lehdet hajallisia, tav. 5-rivisiä, siirottavia, kapean-suikeita, otapäisiä, pääpuolelta nyhäsahaisia; tähkät yksinäisiä, perättömiä, liekeitä. — 24 4—8.

Mets. tav. (E. — L. Lv.) *Lehdet tav. yksisuonisia.*

*L. inundatum* L. Ronnanliefo. — Varsi rento, juurrehtiva; lehdet hajallisia, ylöspäisiä, yhtäällisiä, kapean-suikeita, ehytlaitaisia; tähkä perätön, lehdestävä. — 24 7—9.

Liejuisissa nevaniit. harv. (U. H. S. K. Pe.) 2—4 tuuman pituinen, kaarevasti suikertava; tähkähaarat lyhyitä, pystöisiä, juurrehtivissa niveleissä; lehdet m. tasasoukkia.

*L. selago* L. Ketunliefo. — Varsi toishaarukainen; haarat pystyjä, m. tasapitkiä; lehdet tasa-hajallisia, suikeita, ehytlaitaisia; itiöpesäkkeet lehtihankaisia. — 24 6—10.

Mets., vuor. tav. (E. — L. Lv.) *Haarat tiheitä, tönkeitä, m. sormenpaksuja.*

Muist. — On kovin ulostuttava, raastava, sisälliseen käytäntöön vaarallinen. Keitevesi on ennen ulkonaisesti käytetty vasten mustelmia ja ajettumisia lankeamisesta ja loukkaamisesta.

SELAGINELLA Spring. Mähkä. Dverglummer.

*S. spinulosa* Al. Br. — Varret tupastavia; lehdet hajallisia, sirottavia, suikeita, suipukoita, otahampaisia; itiöpesäkkeet perättömissä, lehdestävissä tähkissä. — 2 7, 8.

Kost. niit. (A. K. Kv. P. L. Lv.) 1—3 tuuman pituinen, pehmeä. — *Lycopodium selaginoides* L.





## Kasvien toisinto-nimiä.

*Acer platanoides*: vaahder, vaahtera, vahterainen, vahteria, valama.

*Achillea millefolium*: aivastusruoho, häränhäntä t. -kukka, juhaninkukka, kaljanen, karvakello, ketohumala, kirokukka, kuivan-maan-heinä, kuperkeikka, kyörtänö-ruoho, kärsä- t. lavantautiheinä, mäntäpää, nenäheinä t. -ruoho, nenästi, nenätiisti, pellonpöhkärä, -pyökäri, -vanha, -vanhanen, -vanhatin, -vanhin t. -vanhus, peltohumala t. -ruoho, piennarkukka, pietarinkukka t. -ryyni, puntarpää, pyörtänä-pöllö, -ruoho, -tollakka t. -tollo, rautaheinä t. -ruoho, ryynikukka, satahinen, satahisen-lehti, satalatva t. -lehti, siankärsä t. -siera, sieranheinä t. -ruoho, tuhatlatva.

*A. ptarmica*: aivastus-juuri, juhaninkukka, pärskyheinä t. -ruoho, sappi- t. siankärsän-ruoho.

*Aconitum lycoctonum*: hammasheinä.

*Acorus calamus*: kalmajuuri, kalmus, vuohenmieikka.

*Actæa spicata*: kristohverin-ruoho, sammakon-marja t. -yrtti.

*Agrimonia eupatoria*: maarian-kateja, peltomynjä.

*Agrostemma githago*: kulppa, kulppu, ohrakukka, punalainen.

*Aira flexuosa* j. m.: kasteheinä, -korre t. -korsi, kastikainen, koiranruoho, nurmiheinä, nurmikas, säärinurmi, vihilä, vihiläinen, vihiläs.

*Ajuga pyramidalis*: ämmänsuurus.

*Alchemilla vulgaris*: ahmalo, haavalehti, hiirenhame, hikiahmalo, kannusruoho, körtti- t. lakkahaina, maarian-ruoho, raani- t. röjyheinä.

*Alisma plantago*: eläimen-, koiran- t. lehmänkieli.

*Alliaria officinalis*: kynsilaukan-yrtti, pernaruoho.

*Allium oleraceum* j. m.: laukkaheinä, piirtolaukka, purju, puur- t. ruoholaukka, sipuliheinä.

*Alnus glutinosa*: hyöty-, maa-, maito-, rauta- t. tervasleppä.

*A. incana*: hikiäis- t. valkea-leppä.

*Alopecurus pratensis*: isonurmi, puntarpää, ruis- t. tähkääpää-heinä, äijänparta.

*Andromeda polifolia*: maitoheinä, nevakanerva, suoheinän-kukka, vaiveri, variksen-lapa.

*Androsace septentrionalis*: kynsiruoho, ryhmyliäinen.

*Anemone hepatica*: haavalehti, kalma-, keuhko-, kirsi-, kylmä t. maksakukka, risti-lehti, siniruskonen, vilukka, vilukukka.

*A. nemorosa*: haavalehti, päivänkakkara, vuohenherukka, -kukka, -silmutka, -silmä t. -vuokkonen.

*Angelica sylvestris*: karhun-yrtti, rytiputki, seppel, ukontorvi.

*Antennaria dioica*: katin- t. kissankäpälä, lampaanjäkälä.

*Anthemis arvensis*: suorama, saaramen-, saaronin- t. sauramenkukka.

*A. cotula*: harakan- t. koirankukka, päivänkakkara.

*A. tinctoria*: häränkieli t. -silmä, loomu, veriheinä.

*Anthoxanthum odoratum*: hajuheinä, maarianruoho.

*Anthriscus sylvestris*: koirankumina t. -putki, pietarin-putki, ruiskuheinä.

*Anthyllis vulneraria*: akanhammas.

*Apera spica-venti*: kastenurmi, kastike, punalatva, rölly, veriheinä.

*Aquilegia vulgaris*: leijona, rupuliruoho.

*Arctostaphylos officinalis*: jauhopuolukka, kangasporkki t. -puola, sianmarja, -puola t. -varsi.

*Artemisia absinthium*: koiruoho, koiso, koisso, mali.

*A. campestris*: ruoppiuoho.

*A. vulgaris*: häränhätä, koturi, villi koiruoho.

*Asperugo procumbens*: hatikas, saksankieru, terhus, tervaruoho.

*Asperula odorata*: maarianpahna.

*Asplenium ruta-muraria*: rauniainen.

*A. septentrionale*: ruumiinkoura.

*Aster tripolium*: kallioinen, koiransilmä, peltovilla, verimaksaheinä.

*Astragalus alpinus*: luuvalo-ruoho.

*Atriplex patula*: savi-ke.

*Avena fatua*: ukonkaura.

*Barbarea vulgaris*: akanruis, narsku.

*Batrachium marinum* j. m.: ahvenankaura, hiushienä, limo, raani- t. vedenkukka, vita, viita, vuoheinä.

*Betula alba*: aho-, alasta-, arokoivu, hikiäinen, hyöty-, kangas-, korpi-, liero-, ni-verä-, noro-, orko-, pahka-, patvikoivu, rautiainen, riippa-, solki-, suo-, suokko-, visakoivu.

*B. nana*: mätäräs-, nälkäkoivu, vaiveri, varpakoivu.

*Bidens tripartita*: kariainen, keltatahkiainen, sikaruoho.

*Blitum bonus-Henricus* j. m.: jäsenheinä, saviruoho, savi-ke, savipuolen-heinä.

*Botrychium lunaria*: lukkoruoho.

*Brassica campestris*: koirannauris, narsku, pitkäsen-kylvö t. -palko, varpusen-nauris.

*Briza media*: jänisheinä, värisemisen-ruoho.

*Bromus secalinus*: hanhenkaura, kastari, luste, lustus, ripsikattara, ruiskattara t. -luste.

*Butomus umbellatus*: ruoko, sarpa.

*Calamagrostis epigeios*: kahila.

*C. lanceolata*: haararuoho, ruoko.

*C. stricta*: ohraheinä.

*C. sylvatica*: juoliainen, ruisheinä.

*Calla palustris*: lehmänkieli, suovehka, vehma.

*Calluna vulgaris*: kangaskanerva t. -ärviä, nummenvarsi, siekki, siekkilö.

*Calltha palustris*: keltaherukka, -kukka t. -savi-ke, kevätherukka, kuoleman-, kylmä-t. lahnankukka, lehmänherukka, lika-, loben-, lullin- t. lumikukka, ojarontukka, sammakon-kukka, sarkinummi, sorsankukka, ukonlehti t. -lumme, vasikan-silmä, vilukukka.

*Calypso borealis*: tohtorin kukka.

*Camelina fætida*: ahde- t. kitkopellava.

*Campanula glomerata*: hökäheinä, pääskynkello.

*C. latifolia*: hevoisen-kello, leveälehti-kello.

*C. persicifolia*: iso sinikello.

*C. rotundifolia*: harakan-hattu, hiiren-, kissan- t. poronkello, pääskynhattu, sappi-t. sinikello.

*Capsella bursa-pastoris*: hiirenkorva, karaheinä, koiranpellava, latukka, lehmän-noriheinä, leini-, lusikka- t. maannousema-ruoho, maansuutuntainen, revon-kaura, saippo- t. sätkäheinä, tasku, ukonnarsku.

*Cardamine pratensis*: luhtakaali, maankrassi, ukkosen-heinä.

*Carduus crispus*: ohdake, orjanruoska, pisteljäinen, pistilkäinen, ruotsakko, venäläinen.

- Carex*: hiirenheinä, luhtaruoho, neva- t. piippaheinä, piippo, ruoste- t. sarkaheinä, sianheinä, -karva t. -villa, taarna, vesi- t. viilleheinä, vihvilä.
- Cassandra calyculata*: hanben- t. kurenpaju, rimpi.
- Catabrosa aquatica*: kastikkainen, lauha, säärinurmi.
- Centaurea cyanus*: elo- t. ohrakukka, popaheinä, ruiskukka, sinikauno.
- C. jacea*: kovayrtti, pajuheinä, punakauno.
- C. scabiosa*: harjakukka, rautayrtti, ruiskukka.
- Cerastium vulgatum*: polviäijä, vesirikko.
- Chara fragilis*: pernsruoho.
- Chelidonium majus*: keltajuuri t. -varsi, keltataudin-varsi, maapähkänä, pääskysen-ruoho, raveheinä, savi- t. veriruoho.
- Chenopodium album* j. m.: saviainen, saviheinä.
- Chrysanthemum leucanthemum*: harakan-hattu t. kauno, päivänkakkara, -kukka t. -kämmen, papinkukka.
- Chrysosplenium alternifolium*: lumikukka.
- Cicuta virosa*: eläinten-myrkky, isojuuri, -ruoho t. -yrtti, jaloyrtti, katko, kärmeen-putki, myrkkijuuri, -putki t. -ruoho, syötän- t. villiputki.
- Circæa alpina*: noidan-yrtti.
- Cirsium arvense* j. m.: karhisinen, karrikas, kasakkaheinä, kurrikas, kärrike, lam-masheinä, luhtakaali, lädäke, lääde, läätkä, nikanyrtti, ohdakas, ohtain, orjan-ruoska, piikkiäinen, piiska, piiskunlehti, pirunpiikki, posta, pyynkaali, ruostakko, tiister, valkeanpuolen- t. valvaten-lehti, ärripurri.
- C. heterophyllum*: harjaheinä.
- C. lanceolatum*: karrikas, ohtainen.
- C. oleraceum*: onsi- t. vesi-ohdake.
- Clinopodium vulgare*: kissanminttu, mehiläis-kanerva.
- Comarum palustre*: hanhenheinä t. -paju, harakanmarja, kiertolaisheinä, sametti-kukka, suo-apila, suolisto, varsanpolvi.
- Conium maculatum*: isojuuri t. -yrtti.
- Convallaria majalis*: kieliheinä, koirankielonen, noriheinä, vilkka, vilkunvalkku.
- C. polygonatum*: harakallion-heinä, kuiva noriheinä, kurenkukka, mäkivehka, palo-ruoho, verevä-juuri.
- Convolvulus arvensis*: aidankierto, kieruruoho, peltokello, pyöriäruoho, virna.
- Corallorrhiza innata*: oravanmarja.
- Cornus suecica*: hepomarja t. -puola, kananklotti, kukon-, kärmeen- t. madonmarja, sianrousi t. -rousku, ukonmarja.
- Corydalis solida* j. m.: karvaruoho, pähkärä.
- Corylus avellana*: pähkynä, pähkämä.
- Cotoneaster vulgaris*: koiranpuu.
- Cratægus oxyacantha*: neulainen, saksanpihlaja.
- Crepis tectorum*: sjankärsä t. -silmä.
- Cuscuta europæa*: humala- t. kieräheinä, koiran-, koiso- t. nukulois-humala, tap-purasilkki, varpusen-ruoka, villihumala.
- Cynoglossum officinale*: hapsiheinä, koirantakkiainen.
- Daphne mezereum*: nasia, nasina, näsen, näsiniini, näsinä, näsiän; näsiän- j. n. e. -marja, -pensas, -varpa, -vitsa, riidenmarja-pensas, riisipuu.
- Datura stramonium*: neulaomena.
- Delphinium consolida*: ritarinkannus.
- Dianthus deltoides*: aillasheinä, harjaruoho, Jesuksen kengännauba, linnun t. neit-synsilmä, orpolapsen kukka, pirttiheinä, pääskynhattu, ruisnunu, ruumiinkukka, verishmalo.
- D. superbus*: ristinlehti.
- Digraphis arundinacea*: helvenheinä, kärmeen- t. luunurmi, ruko.
- Draba verna*: kynsiruocho, ruiskukka.



- Drosera longifolia* j. m.: itkulehti, kiho-, kiima-, kiri- t. kirkiheinä, kyynnellehti.  
*Echinosperrum lappula*: kärmeensilmä.  
*Echium vulgare*: sinikuntteri.  
*Elymus arenarius*: hina, rantabeinä t. -kaura, ruisvehnä, veriheinä.  
*Empetrum nigrum*: harakan-haasikka, -marja, -mustikka, -raakku t. -varvas, raakun-marja t. -varsi, siantiitukka t. -mustikka, variksenmarja.  
*Enodium caeruleum*: kaste t. kiviheinä.  
*Epilobium angustifolium*: hepohäntä, horma, hormu, häränhäntike, Jesuksen-kukka, maitiainen, maito- t. palohorma, rieskaruoho, tuliheinä t. -vormu, tuulensäari, vormuruoho.  
*Equisetum arvense*: härkinheinä, karvakarrikas, ketunhäntä, kukonkuusi, käenpetkel, partaruoho, pukin- t. äijänparta.  
*E. fluviatile*: oja- t. vesikorte.  
*E. hiemale*: hosi, hosiainen, huosio, rautakorte t. -ruoho, rieti.  
*E. palustre*: karva- t. suokorte, vesiahma.  
*Erigeron acris*: koiransilinä, peltovilla, verimaksabeinä.  
*Eriophorum angustifolium* j. m.: herijuhannes, kirsiheinä, kuren-untuva, kylmä nukkaheinä, käenpetkel, lohkama, luike, luikka, luikko, luippa, luippu, lullaheinä, mustapää, niittuvilla, nokinenä, nukkaheinä, nurmivilla, piirtoluikka, pumpuliheinä, päistärsäkki, rutas, ruttaheinä, suovilla, töppypää, vaivaisen-villa, valkeapää, vibvilä, villaheinä, villake, villapää, virvelö.  
*Erodium cicutarium*: kuovinkuono, paimenen-neula, pistoheinä, suokurpan-nokka, toukka.  
*Ervum hirsutum* j. m.: hiirenherne, -näkä, -palko, -papu t. -riista, vaivaisen-herne, virna.  
*Erysimum cheiranthoides*: narsku, pamppu, ukon-istukas t. -nauris, ämmänruis.  
*Eupatorium cannabinum*: väriruoho.  
*Euphorbia palustris*: paranmaito, pirunrieska.  
*Euphrasia officinalis*: hammasheinä, jamakka, koiran-, riisi-, nori-, nummen- t. vai-vaisten-kukka.  
*Ficaria ranunculoides*: sydämmen-ruoho.  
*Filago montana*: jänönjäkära, kissankäpälä, rupaheinä.  
*Fragaria vesca*: malla, mantsimarja.  
*Fraginus excelsior*: saaren-, saari- t. sarapuu.  
*Fumaria officinalis*: ematus, emäruoho, härki-, hökä- t. köhäheinä, liñnunherne, maasappi, peltokrassi, reväisin-, ruusu-, sydänriisi- t. tattariheinä, vähä karva-ruoho.  
*Gagea lutea* j. m.: neularuoho, varpusen-rieska.  
*Galeopsis tetrahit* j. m.: imeke, nukulvainen, peippi, peipponen, pihainen, piikkiäinen, pillike, pilliäinen, pitike, pitiäinen, toukoruoho.  
*Galium aparine*: hatikas, hattiainen, kiero-, minkka- t. polviheinä, satapolvi, tarttuvainen virna, tervabeinä.  
*G. boreale*: hepomatara, rieskaruoho, vesiahmalo.  
*G. mollugo* ja *palustre*: kiertiäinen.  
*G. uliginosum*: maharainen.  
*G. verum*: emäntäkukka, hanhenvormu, keltakakkara t. -ruoho, maarianpahna, maiteri, mehiläiskukka, oikea matara, ruumiinheinä, räutänä, sydänriisi-heinä.  
*Gentiana amarella*: horkkaheinä, pässinkellukka, vilutaudin-yrtti.  
*G. campestris*: karvakello, kuismanruoho.  
*Geranium pratense*: harakankello t. -kukka.  
*G. sanguineum*: hiirennokka, leinikukka, veriruoho.  
*G. sylvaticum*: jamakkanori-, kiro- t. kuismanheinä, käenkukka, leini-, mäntä- t. pistosheinä, sirkun- t. variksen-hattu, virumaheinä.

- Geum rivale* j. m.: ampiais- t. karvakellu, kiertolais-, kirous- t. kuppaheinä, lam-  
paankelloin, nälike-juuri, papunoriheinä, pääsinimuna, verinori-heinä.
- Glechoma hederaceum*: katinnäre.
- Glyceria fluitans* j. m.: luhtaheinä.
- Heleocharis palustris*: sarpio, sälli.
- Helianthemum vulgare*: auringon-kokeet, sisiliskon-varsi.
- Heracleum sibiricum*: karhunputki t. -yrtti, sepel, ukontorvi.
- Herniaria glabra*: suolimulkun-ruoho.
- Hieracium pilosella* j. m.: hiirenkorva, laampaanjäkälä, maitokukka, mäkikupu, sian-  
silmä.
- Hierochloë borealis*: hajuruoho.
- Hippuris vulgaris*: hevonhantä, kukonkuusi, vesiriisi-heinä.
- Holcus lanatus*: maasara.
- Humulus lupulus*: hiiva, taponlehti.
- Hyoscyamus niger*: hammasheinä, hammastaudin-yrtti, hullukaali t. -ruoho, karhun-  
kaali, kiukkujuri, siankaali, villitupakka.
- Hypericum perforatum*: juhannes- t. kakaisen-kukka, sianveriheinä, veriruoho.
- Hypericum quadrangulum*: ajosheinä, hepomatara, bikiähmälö-heinä, juhanneksen-  
minttu, kiroruoho, kuismapaise-, puisman-, tsaju-, uisman-, verapuu- t. viina-  
heinä.
- Hypochaeris maculata*: patukka.
- Impatiens noli-tangere*: leiniruoho.
- Inula helenium*: aalanninjuuri, oolanti.
- Iris pseudacorus*: miekkaheinä, vuohenmiekka.
- Isatis tinctoria*: morsianruunu.
- Isoëtes lacustris*: vita.
- Juncus*: arpaheinä, piippa, piirtoheinä, sarpa.
- Juniperus communis*: kataa, katava.
- Lamium album*: mukulvainen, nuplukainen, piikkiäinen, piiskoheinä, piitiäinen, pilli-  
käs, porro, porrinkainen, sianleuka t. -nukulainen, toukoruoho, valkopillikkäs.
- L. amplexicaule*: imiäinen, kiima-, kirppu- t. piitisheiuä, punapillikkä.
- Lappa minor* j. m.: nakkiaainen, porriainen, tahkiainen, takkiainen, tarttisainen, ukon-  
heinä, -lehti, -tupakka t. -yrtti, ämmänkenkä.
- Lathyrus pratensis* j. m.: hiirenherne, -näkä t. -riista, jänoksen-käpälä t. -uätkin,  
keltanätkin, kurenpapa, linnunherne, maite, nätinruoho, nätkimä, nätkin, nä-  
kymä, virne, virveli, virvilä, voiheinä.
- Ledum palustre*: kanirikka, lunsio, nevakanerva t. -rahka, rautapursu, suokanerva,  
-kursu t. -pursu.
- Lemna trisulca* j. m.: kokamus, laava, lanas, limma, pikku litukka, sorsanleipä,  
vedenkukostus, -märkä t. -visa, vesisherne t. -raani.
- Leonurus cardiaca*: ahdepellava, haisunukulainen, silalainen, sydämen-vahvistus.
- Lepidium rudemale*: katukrassi, maan-nousema, raasi, raunukka.
- Libanotis montana*: porkkana.
- Lichen*: hapena, haven, jäkälä, karmu, karve, luppa, naava, ohanto, rämmen, räm-  
mäle, tierä.
- Linaria vulgaris*: ahdepellava, luuvalo- t. sianhammas-heinä.
- L. minor*: koiranpään- t. vasikan-yrtti.
- Linnæa borealis*: harakankello, hillikkö, kirki-, lemme-, luoma-, luuvano- t. ram-  
paruoho, rampine, sirkunkello, tyräheinä, uuvana, volmakukka, vana, venymä-,  
virma- t. viruntaheinä.
- Linum catharticum*: kitko- t. kitupellavas, kitveli, nälkä- t. sianpellava.
- Listera cordata* j. m.: oravanmarja.
- Lithospermum arvense*: kivitaudin-siemen, rakkokivenmarja, rusko- t. verevä-juuri

- Lolium perenne* j. m.: hajuruoho, hyöty, luoho, luste, lustus, lustuva, paharuoho, ruisheinä.
- Lonicera xylosteum*: höysipuu, kuusa, kuusanta, kuuselma, ojakka.
- Lotus corniculatus*: akanhammas.
- Luzula campestris* j. m.: sarpa, sarva.
- Lychnis flos-cuculi*: pääskynekukka.
- Lycopodium annotinum*: riisiruoho, virveli.
- L. clavatum*: harakan-varvas, kissan- t. ketunlieka, kärpäsen-ruuti, nihtiruoho, pyynpaula, riekonhantä, siivilä-heinä, siivilä-ruoho, variksen-lapa, -lape t. -varvas.
- L. complanatum*: kelta, keltakaunis, keltataudin-varsi, maankelta, noidankaali, riisiruoho.
- L. selago*: harakan-varvas, kelta, mähkä, riidenheinä, sammassuoho.
- Lycopsis arvensis*: punainen häränkieli.
- Lycopus europæus*: kalaheinä, rantakukka t. -minttu.
- Lysimachia vulgaris*: kuismankukka, kuismanpaiseruoho, matara, puismaruoho.
- Lythrum salicaria*: kuisma- t. puismaheinä, pukinparta, rantapuna.
- Majanthemum bifolium*: hiirenkorvan-lehti.
- Malaxis paludosa*: oravanmarja.
- Malva borealis*: hiirenkakon-lehti, katinjuusto, kissannauris.
- Matricaria chamomilla*: juhanneksen-kukka t. -nunnu, juhannus, kameli- t. kanelikukka, päivänkakkara, vuohensilmä.
- Medicago falcata*: linneus.
- Melampyrum sylvaticum* j. m.: mäite- t. maitoheinä, pietarin-papu, variksen-jyvä, voiheinä.
- Melandrium pratense* j. m.: paukkuheinä, rautaharkun-, sametti- t. tervakukka, tuuliahmalo-heinä.
- Melilotus officinalis*: amur, haisukka, tesmän t. usmanruoho.
- Mentha arvensis*: kalsheinä, käenminttu, metsämeirami, minttu, pelto-, ranta- t. vesiminttu.
- Menyanthes trifoliata*: peuranvehka, raake, raatan, raattama, radake, rajake, rajakka, rataikko, sorsankukka, vehka, vesiahmalo.
- Milium effusum*: hikiheinä, kasteheinä, satalatva.
- Myosotis arvensis* j. m.: ikävän-kukka, kuisma- t. kuivanori-heinä, orpolapsen-, sametti- t. savikukka, sinisirkkunen, sormuskukka, sydäuriisi-heinä, vilukukka.
- Myosurus minimus*: viilaruoho.
- Myrica gale*: merihumala, pursurahka, pyöräruoho, rahka, suorahka.
- Nardus stricta*: harjasheinä, hirvennurmi, hiukuruoho, jussi, jussikko, jussinparta t. -takku, jäkinparta, jäkki, jökkö, kelhä, rautaheinä, savikka, sianharjas, -kamara, -karila t. -takku, ukonparta.
- Nasturtium amphibium*: krassi, nenäruoho, sirkansilmä, vesikrassi.
- N. armoracia*: pipari- t. äikäjuuri.
- Nuphar luteum*: belokka, keltainen kilpilehti, keltanupukka, -pulpukka t. -upukka, kouralehti .-(k. seur.)
- Nymphæa alba*: hanhenkukka, -plumppu t. -upukka, harakankilpi, ihmisen-pulppu, kajakka, kajakan-ulpakko, kilpi, kilpilehti, kilpiö, kilpukka, kilukka, kilvenkukka t. -lehti, kilupukukka, kupukka, kuupukka, lemme, lemmeenlehti, lippi, lippilehti, litukka, lommakko, lummukka, lumpeenpappi, lupu, lupukka, nupukka, näkin-kenkä, -kilpi t. -lehti, näsekkä, näsäke, näsäköyte, piikapumppunen, piisku, plumppu, plumpunen, plumusen-lehti, pulppu, pulpukka, pumpula, päiväkukka, siankukka, -pulpukka t. -pumpula, sorsan-upukka, tillukka, ulpakko, ulppu, ulpukka, umme, umpeenlehti, upukka, valkea-kilpilehti, -nupukka j. n. e., varsan-upukka.
- Odontites rubra*: kylvökukka, nälkä-riisiheinä, peltohumala t. -kanerva, sänkikukka.

*Oenanthe phellandrium*: tervaneva, vesiruuusun-lehti.

*Ophrys myodes*: ahdepellava.

*Orchis maculata*: aatamin ja eevan-, hiiden-, juhanneksen- t. kiesuksen-kämmen, kiimaheinä, käenvaippa, käkiheinä, kämmäjuuri, kärneenkieli, käsipaija, mulkkujuuri, pirunkämmä.

*Origanum vulgare*: metsämirrami, nestepuna, sydämmenvahvistus, uniruoho.

*Orobis vernus*: mettisen-ruoka.

*Oxalis acetosella*: jänöksen-apilas, -kakkara, -kännö t. -leipä, ketunleipä, käen-apilas, -kakko t. -leipä, revonsuola, suven-ihana.

*Oxycoccus palustris*: karpala, karpale, kurenkarpala t. -marja.

*Oxyria digyna*: apro.

*Paris quadrifolia*: karhun, kuoleman- t. kärmeenmarja, kärnä, madonkukka, noitu-, nori- t. pistomarja, siankärnä, sudensilmä.

*Parnassia palustris*: hevoisenkengän-kukka, häränsilmä, luuvalo- t. luuvana-kukka, päivänkämmen, sian- t. varsankavion-kukka, yksilehtinen.

*Pastinaca sativa*: palsterakka, palsternakka.

*Pedicularis palustris*: heinä- t. katinkuusi, kukonkarahtaa t. -kuusi, kurenpolvi, kuusiheinä, lohikukka, näreheinä, oravan-kuusi, pöhöheinä, sammakon-ruoho, taskunäre, veden- t. vesikuusi.

*Petasites frigida*: näkinkenkä, ukonlumme.

*P. officinalis*: ämmänkenkä.

*Peucedanum palustre*: suo-inkiväri.

*Phleum pratense*: hiirenhäntä, istukas- t. istuttama-heinä, kissanhäntä, kylvö- t. luppiheinä, madonhäntä, puntarpää, päntä- t. pätkäheinä, pökökastikas, ruis- t. siemenheinä.

*Phragmites communis*: kitusarpa, lehtikahila, luikka, luippa, pilli, rimpi, ruoko, ruokokahilas, ryti, rytynen, sarpa, sarpio, sarva.

*Pimpinella saxifraga*: kangas- t. koirankumina, pietarin-yrtti, sydän- t. sydänriisiheinä, vanneruoho.

*Pinguicula vulgaris*: piimäruoho.

*Pinus abies*: honka-, hyöty-, janhus-, kangas-, kara- t. karanko-kuusi, karsti, kartsi, kartti-, korpi-, lyly-, mannel-, mannikas-, mantila- t. norokuusi, näre, rapa- t. räkäkuusi.

*P. larix*: säksannäre.

*P. sylvestris*: aihkimänty, havupuu, honka, hyötymänty, janbus, jouhinhonka t. -mänty, joubipuu, kartti, kangaspetäjä, lylymänty, mänty, nurmipuu, näre, raitamänty, rapa- t. räkähonka, suopetäjä, verimänty.

*Plantago lanceolata*: ämmänsuurus.

*Pl. major*: kasakan-ruoho, kouru-, laastar- t. nukenlehti, raaniheinä, raudanlehti, rautaheinä, -lehti, -piiska t. -ruoho, sammakon-ruoho.

*Platanthera bifolia*: noriheinä.

*Poa annua* j. m.: hilve, hilvi- t. kastiheinä, kastikkainen, nurmiheinä, nurmikas, nurmikas-lauha, ruohoheinä, vihviläinen, vihviläs.

*Polemonium caeruleum*: viinakukka.

*Polygonum amphibium*: koirankieli-heinä, raanilehti, ruisheinä, rusko- t. tuliruoho.

*P. aviculare*: hanhenpolvi, jäsen-, kala-, kanan- t. kartano-ruoho, katinhumala, kirvelä- t. kusiruoho, linnuntatar, maanurmi, pellon- t. peltokanerva, piha-, tuli- t. täiruoho, varsapolvi.

*P. convolvulus*: hevonkusiainen, humala- t. kierreheinä, koiranhumala t. -tattari, pelto-kello, pyöräruoho, rotan- t. siantattari, syhelmä-ruoho, tattariheinä, vesiluste vinkeriäinen, vismaheinä.

*P. dumetorum*: koirantattari.

*P. hydropiper*: hanhenpolvi, kasteruoho, koirankieli, kukontupakki, ruska- t. rusko-

- ruoho, satapolvi, siiankulkua - t. sittaheinä, tuliruoho, varsanpolvi, vesiluste, viihava-ruoho.
- P. persicaria*: kirpun-, koirankusi- t. kusiruoho, lehmänkieli, rusko- t. varsanpolvi-ruoho.
- P. viviparum*: hevoisen-kusiainen, siantatar.
- Polypodium vulgare*: himarre, imake, imartinjuuri, imartti, kallion-makiainen, kallioyrtti, kiven-imeke, -kimala, -makuainen t. -tupakki, kiviyrtti, makea-juuri, makiainen, mesijuuri, mähänmakeus t. makuainen.
- Polystichum filix-mas*: hiirenporras, härkyläinen, kananjalat t. -riskä, kanerva, ketunviilta, konnan-koura, korpiloikko, kotkansiipi, kuoleman-ruoho, kuolleen-koura, -ruoho t. -vuode, kärmeen- t. riisiruoho, ruumiin-mujuna, sammakonporras, sanajalat, sanikka, sänäjalat, tuulen-koura, variksenvarvas, vila- t. virokaarne, ämmäntussu.
- Polytrichum*: harakan-ohra, hiirenruis, hukansammal, ketun- t. kurenruis, kyyhkynnokka, -ruis t. -touko, käenjyvä, -nisu t. -petkel, käsi- t. lempisammal, neitsenhius, rahkasammal, sudenpetkel t. -sammal, valkea-sammal, variksen-ruis.
- Potamogeton natans* j. m.: ahvenen-haura, ahvenheinä, -kaura, -lumme, maltsa t. ruoho, hauinvita, koirankieli, limo, lita, läätä, meriterhu, vesimaltsa.
- Potentilla anserina*: hanhen-, leini-, ruusun- t. suoniruoho, tulikukka.
- P. argentea*: hopea- t. lennätysheinä, päivän-ampuma, suo-apila, tulenlento-heinä.
- P. norvegica*: leini- t. noriheinä, päivän-ampuma, solmuheinä.
- P. reptans*: ryömiäinen, viisilehtinen.
- P. tormentilla*: hepomatar, lärvenä, mukula-juuri t. -matara, nunnamatara, nummen-nuppu, numminauris, närvenä, punajuuri, päivän-ampuma, rätväne-juuri, vatsa- t. veriruoho, värvenä- t. väänne-juuri.
- Primula farinosa*: naisten kirusheinä.
- Pr. veris*: lehmänkieli, orhipää, säynään-kukka.
- Prunella vulgaris*: ampiais-kukka, kuismapaase-heinä, lieriäinen, metsähumala, siniapilas, suopillike, tervanori-heinä.
- Prunus padus*: tuomikka.
- Pr. spinosa*: seepuu.
- Pteris aquilina*: hiirenporras, härkylä, johetus, kanerva, kuolleen-koura, liesu, sammakon-porras, sanan- t. sanenjalat, saniainen, sanikka, sänäjalat, variksenvarvas.
- Pulmonaria officinalis*: imekäs, keuhokkainen.
- Pulsatilla vernalis*: kangas- t. kylmäkukka.
- P. vulgaris*: katinkello, kissan sinikello, lumikka, lumi- t. vilukukka.
- Pyrola chlorantha*: myyränkorva.
- P. rotundifolia* ja *secunda*: käen- t. luuvalon-kukka, myyränkorva, mäntyruoho, noriheinä, varsankavion-kukka.
- P. umbellata*: karhunkukka, vispiläinen.
- P. uniflora*: ruumiinmadon-yrtti.
- Pyrus malus*: metsä-onienä- t. -äpylä-puu.
- Ranunculus acris*: harakan-kukka, hepohörä, herukka, juhannus, kelta- t. kärpäsenkukka, kärpäsen-silmä, lehmänheruti, leini-, luuvalo-, makkara- t. meummaarikukka, peltokello, piimä- t. pikariheinä, setkan-, särensappi-, sätkin-, sätkä-, taula- t. tervakukka, tuliheinä, -kukka t. -nunu, visvabeinä, voikkukanen.
- R. flammula*: leinikukka, vesileini, tulinnu.
- Raphanus raphanistrum*: pölkkyheinä, reikas, rietikka, rytkä, räpäkää, ukon-istukas, -nauris t. -palko.
- Rhamnus cathartica*: kitsepuu, tirna, tyrnä, maarianpuu.
- Rh. frangula*: heisipuu, koiranhöysi t. -kusipuu, ojakka, paatain, paatama, paaterma, paatsain, paatsas, paatsin, paattama, pahjatin, pabtana, pajahdin, pajehka, pajahama, pajakas, pajake, pajakka, pajatin, pajatsi, pajatsin, pajatti, pakatsin, pakatsu, patsama.

*Rhinanthus major* ja *minor*: kukkaro-, lapa-, laukka- t. nappiheinä, peltolaukku, pilliäinen, ropo-, tasku- t. tenkaheinä.

*Ribes alpinum*: taikinainen, taikinamarja t. -pensas, vasikan-marja.

*R. grossularia*: karvamarja, karvikka, oivukka, pistävä-marja, tikkel- t. tikkenperipensas.

*R. nigrum*: herukka, hiestama, hiestan, hiestana, kallo, kolli, ludinmarja, mustahe-  
rukka, musta viinamarja, ojakas, ojake, ojakainen, ojukka, oivuke, oivukka,  
ourukka, siestama, siestan, siestar, siestarinainen, siestarlainen, siesteri, siesteriäi-  
nen, siesturi, vitsamustikka, ämmäkkö.

*R. rubrum*: punaheerukka, -siestare t. -viinamarja-pensas.

*Rosa canina*: hevonna, kiulakko, kokatsu, orjanruoska t. -tappura, tappura-pehko  
t. pensas, tappuri.

*Rubus arcticus*: hevokka, hevonna, hippokainen, karvamansikka, kirpilä, luhdi-  
kas, luhdikka, maamuuran, maaran, mesikko, mesimansikka t. -marja, muuran,  
oriho, vattu.

*R. caesius*: sinivaterma j. n. e. (k. *R. idæus*).

*R. chamæmorus*: hilla, lakka, lintti, luppä, löttö, muurama, muuran, muuro, neva-  
t. suomarja, suomuuran, valakko, valokas, valokka, valokki.

*R. idæus*: faaran, faderma, hallan, maarama, maaran, vaapukka, vaarama, vaaran,  
vaaranvattu, vaaterma, vaderma, vagarmo, vako, vaterma, vattu, vavarna, vavo.

*R. saxatilis*: hilla, hillikka, billukka, illukka, kissanlillukka t. -marja, kivi- t. liisan-  
lillukka, lillikka, lillu, lillukka, lillunmarja, limpsikka, linnikka, linnukka, lin-  
tikka, lintti, lintukka, neitsenmarja, ruotukka, ämmänhillikkä, -lillikka, -litukka  
t. -viinamarja.

*Rumex acetosa*: hierukka, kiloruoho, muikiainen, peltosuolake, ruskoruoho, suola-  
heinä, suolakas, suolake, suolakka, suola- t. virnasruoho.

*R. acetosella*: suolaheinä, suolakka, suolakukka.

*R. crispus*: tuliheinä.

*R. domesticus* j. m.: heipakka, hepoherranlehti, hepohiera, -hierake, -hierakka, -hie-  
rikä, -hierukka, -hiira t. -hiirakka, hevonniera j. n. e., bevoisen-virnas, koiran-  
suolake, tulenlentoheinä, tuliheinä, -ohdake t. -ruoho, virake.

*R. hippolapathum* j. m.: savipuolenjuuri t. -ruoho, vesisuolake, vähä hevonniera j. n. e.

*Sagittaria sagittifolia*: keihäänlehti, lima, limo.

*Salix caprea*: hajava, lempipaju, raaja, vahvapaju.

*S. cinerea*: kori-, nahka-, parkki-, vesi-, virna-, virpa- t. vitsapaju.

*S. fragilis*: halaja, halapaju, halava, haleva, halopaju, jalaja, jalava, raita, ranta- t.  
vironpaju.

*S. glauca*: virnaja, virnapaju.

*S. pentandra*: hala- t. hanhenpaju, ojabalava, raita, vahvapaju.

*Saxifraga granulata*: papelo-juuri.

*Scirpus lacustris*: kaakonruoho, kahila, kahilas, kahla, kaihila, kaihla, kaisila, kaisla,  
kasila, keppikahila, kiita, piuru, rantakaisla, ronki, ruoko, ryti, suorsake, suor-  
sanruoka, äijänsauva.

*Sc. maritimus*: merikahila, ryti, sarpa, sarpio, sarva, sarvu.

*Sc. palustris*: luikka, sarpio, sälli.

*Scleranthus annuus*: hammasheinä.

*Scl. perennis*: riisiheinä.

*Scorzonera humilis*: sianjuuri.

*Scrophularia nodosa*: leika-, leikka- t. leukaruoho, sianleuan-lehti, sianleuka, syy-  
len-, syylin- t. syyjänjuuri.

*Scutellaria galericulata*: kuismahanheinä.

*Sedum acre*: ahmalo-heinä, kukonlehti t. -marja, lukonmarja, maista, murre- t. vilu-  
ruoho, vuorensammal.

*S. album*: kukonlehti t. -marja.

- S. telephium*: ahmalo- t. ahmena-ruoho, jänneksen-kaali, kelliomaksa, kukon- t. kärmeenkaali, sianleuka, tontunparta, viluruoho.
- Senecio vulgaris*: keltakukkanen, kivakko.
- Silene inflata*: hammasheinä, horma, kanttura-, kukkaro-, rakko- t. solmunoriheinä, tuuli-ahmalo.
- S. nutans*: raudanhaavan-ruoho.
- S. rupestris*: papunoriheinä.
- Sinapis arvensis*: koiranpalko, palkoheinä, pamppu, peltosinappi, ukonkaali, -nauris t. -palko.
- Sisymbrium sophia*: palkoheinä, savuruoho, ukonkrassi.
- Solanum dulcamara*: koisonpuu t. -vitsa, leinipuu t. -vitsa, nuorikuoru, verinori-varpa (miesten).
- S. nigrum*: koison- t. kuisaheinä.
- Solidago virgaurea*: keltainen kukka, kuismaheinä (naisten), kultatalva t. -ruoska, paimensauva, piiskun- t. pyytlehti, tarttuneenruoho, viinakukka, vähä-leiniruoho.
- Sonchus arvensis*: kurholainen, maitiruoho, maitoheinä, -ohdake t. -putki, pistiäinen, valvaten-lehti.
- Sorbus aucuparia*: pihjala, pihlava.
- S. scandica*: härkäpuu, ola, olakoivu.
- Sparganium natans*: akanhapsi, konnanhytelmä, lima-, luhta-, t. mustapää-ruoho, näkinheinä t. -hius, näkähiuksen-lehti, uistinheinä, vita.
- Sp. ramosum*: mustapää luhtaruocho, vikateheinä.
- Spergula arvensis*: haaru, hatikas, härkinheinä, härkki, pellavas-heinä, satapolvi, satapuheenkukka, solmuheinä, tähtiruoho.
- Sphagnum*: karvasammal, kuohu, nältä, nätä-, rahka- t. suosammal.
- Spiraea filipendula*: karjaruocho, kivenkimalainen, leiniruoho, mynttivormu, sianmal-las t. -maltsa, vormu, ankeriäs.
- Sp. ulmaria*: angelma, angervainen, ankeliaan-kukka, ankeriaan-heinä, -raisma t. -rihmus, ankeriainen, ankerias- t. ankeriasruoho, horma, hormu, horsmu, humalaheinä, kolmu- t. leiniruoho, ojahormu, vormu, ängelmä, ängervä, ankeriäs.
- Stellaria glauca* ja *graminea*: asmalonkukka, hammas- t. jäsenheinä, kanansilmä, niitun- t. pellonhatikas, revennyt-, tähti- t. vesiheinä.
- St. holostea*: tähdikäs, tähtiö.
- St. media*: arho, kanannokkimo, mallasruoho, maltsa, muro, nätä- t. saviruoho, sianmaltsa, vataruocho, vesiarho, -heinä t. -ruoho.
- Stratiotes aloides*: aina-viheriäinen, kievana.
- Succisa pratensis*: kärmeenpisto-juuri, pirunpurema.
- Symphytum officinale*: mustajuuri, paimensauva, räkäjuuri.
- Tanacetum vulgare*: juhannes-kukka, kiroraani-heinä, kynsillinen, madonsiemen-, nappi- t. pietarinkukka, pietar- t. puskuruoho, seffertin- t. säkfärtinsiemen.
- Taraxacum officinale*: häkkipillapää, hökkörä, höyhenheinä, höytypää, isänkukka, julmu, kelta- t. kultakukka, maitiainen, maitoheinä, pörhä- t. pörhöpää, pörrin-käinen, pörröpää, siankukka- t. silmä, villapää, voiheinä, -kukka t. -nunu.
- Taxus baecata*: neulainen, neulaniini, punakataja.
- Thlaspi arvense*: kukkaro-, lapa-, latukka- t. laukkaheinä, laukku, lutikka-, lutukka-, lätäkkä-, maannousema-, nappi-, penninki-, raba-, tasku- t. tenkaheinä.
- Thymus serpyllum*: harakan-varvas, kangaskanerva, muistoruocho, nummenkukostus, saju-, sydänriisi- t. verinori-heinä.
- Tilia parvifolia*: lehmus, niini- t. vennäpuu.
- Tragopogon pratensis*: myskin-yrtti.
- Trichera arvensis*: jamakas, lammashheinä, matoruocho, papelo-juuri, syyhelmä-ruoho, syyhelmö.
- Trientalis europæa*: harakan-marja, lehmänkieli, sydänmarja- t. valkea mäkikukka.
- Trifolium agrarium*: kuiva-ahmalo.

- Tr. arvense*: jänönkäpälä, kirppu- t. (naisten) luuvaloheinä, peltto-apilas.  
*Tr. medium*: paulakukka t. -ruoho, paulantupsu, pelttopaula, tupsukukka.  
*Tr. pratense*: sakelma, ahmalo, akelma, apeli, apelias, apelinen, apelista, apila, apilas, härkyli, imiäinen, imiäis-heinä, imuruoho, lykkyheinä, maitokukka, mas-malo, mesiheinä, näkin, nätin, nätkelmä, nätkin, onniheinä, peltto-, puna- t. punapää-apilas, seppeli.  
*Tr. spadicum*: atulais-kukka, kuiva-ahmalo, luuvalo-heinä, musta- t. mustapää-apilas, seppeli.  
*Trichophorum cæspitosum*: luikka.  
*Triglochin maritimum* j. m.: suolaheinä, suolakka, jussinparta, vihviläinen, vihviläs.  
*Triodia decumbens*: nata.  
*Tripleurospermum inodorum*: harakan-, juhannin-, koiran-, nappi- t. papinkukka, päivänkakkara, vuobensilmä.  
*Triticum repens*: juola, juolain, juolas, juolavehma t. -vehnä, kattara, koirankaura t. -ruoho, lusteheinä, ruisheinä t. -ruoho, satalatva, valkea-juuri, viileheinä.  
*Trollius europæus*: hepoheinä, humala-, juhanneksen-, kelta- t. kirkkokukka, kullerokapu, lokaheinä, lupunkukka, maanpulpukka, mollo, mäki-ulpukka, noidanvalttikka, viluruoho.  
*Turritis glabra*: metsäkaali, pitkäsen-palko, sappiheinä, sultaani, vitsaruoho.  
*Tussilago farfara*: hevoisen-kavio, kirsi-, kylmä-, lahnan- t. leskikukka, sammakon-lehti, varsanjalka t. -kavio, vierulehti, yskäruoho.  
*Typha angustifolia* j. m.: lima, limo, näkinvalttikka, palpaheinä, sudenkurikka t. -miekkä, väinäntaimi, ämmänkulta.  
*Ulmus montana*: aleja, jalain, jalaja, kynneppää, kynneppuu t. -pää.  
*Urtica dioica*: mukkonen, nokkeinen, nokkonen, nokolvainen, nokulainen, nokulvainnen, notkonen, nukuljainen, nukulvainen, nupulainen, nupulkainen, polttarainen, polttiainen, riikolais-viholainen, siilo, tsiilaa, vihalainen, viholainen, viholjainen, vihulainen, ämmänkieli.  
*U. urens*: kusiais-nokkonen j. a. e., rautilainen, rautilkainen, sieranokkonen, tuhka-polttorainen.  
*Utricularia vulgaris*: virma- t. viruma-heinä.  
*Vaccinium uliginosum*: hevoisen-juopuka t. -mustikka, huolukka, juolas, juolikka, juomikka, juominkainen, juomukka, juopikka, juotikka, juovikka, juovikko, juovukka, koiranjuolukka, -marja t. -mustikka, oivukka, rautapuolukka.  
*V. vitis-idaea*: puolan, puolakka, puolama, puolukka.  
*Valeriana officinalis*: hammasjuuri, karjan- t. koiranruoho, ruton- t. ruttojuuri, äkkiheinä.  
*Veratrum album*: aivastus- t. pärskyjuuri, siänkärsän-ruoho, sipatti.  
*Verbascum nigrum*: kissankynttilä, köhkä-, köhä- t. peitsiruoho.  
*V. thapsus*: hammasruoho, hepohiera, härkä-, hökä-, köhkä- t. köhäheinä, köyhän-tupakki, löylylehti, madon- t. metsätupakka, metsän-ämmänkenkä, peitsi-, röhkö- t. sikaruoho, ukontupakka, valkenlehti, yhdeksänväkinen, yskäheinä.  
*Veronica beccabunga*: ampiaiskukka, nisellysruoho, siankaali t. -kapusta.  
*V. chamædrys*: kuismaheinä (miesten), maaminttu, maan-nori-, napariisi-, romuska- t. rosmukkaheinä, tuhkurin-ruoho.  
*V. longifolia*: koiranhäntä, siannokulainen, tähkäpää-yrtti.  
*V. officinalis*: kuivanoriheinä, leini- t. ramparuoho, sajuheinä, sinikainen, tädyn-ruoho.  
*V. serpyllifolia*: ikävän-kukka, noriheinä, orpolapsen-kukka, sinuri.  
*Viburnum opulus*: koiranheisi-, -helis-, -helsi-, -hersi-, -höisi-, -höistö- t. -höysipuu, kuusan, ojakoivu, päähten- t. ämmänpuu.  
*Vicia cracca*: hiirenherne, -kaura, -nätkin, -nätkä-, -papu t. -rokka, härkyli, kuren-papu, -riista, -virvilä t. -värppä, linnunherne t. -papu, näkinheinä, nätkelmä, nätkin, sininätkymä, variksen-herne, virne, virveli, virvilä.



*V. saepium*: elo- t. hiirenherne, kurenpapu, nätkin, virveli, virvelä, virvilä.

*V. sativa*: kurenherne j. m. k. ed.

*V. sylvatica*: variksen-herne.

*Viola canina*: kuivanori-heinä (urospuolen), noriheinä, savikukka, variksenleipä, var-sankaali t. kavio.

*V. tricolor*: emintimen-kukka, emintimä, harakan-bettu, hospi-, huora- t. jamakka-nori-heinä, kanansilmä, kolmi- t. lempikukka, lesken-, pellavas- t. pistoheinä, päivänkakkara, tervaheinä, varsanpolvi, äitipuolen-kukka, äitipuoli.

*Viscaria vulgaris*: tervaheinä, -kukka, -lillike t. -nunu.

*Zostera marina*: kokalmus, kokamus, merenajokas.



## Kasviheimoin ja sukuin latinaiset nimet \*).

- Abies* 366.  
*Abrotanum* 207.  
*Absinthium* 206.  
*Acer* 396, 269.  
**Aceraceæ** 130, 269.  
*Acetosa* 348.  
*Achillea* 342, 205.  
*Acinos* 240.  
*Aconitum* 217, 279.  
*Acorus* 141, 186.  
*Acrostichum* 373, 375.  
*Actæa* 211, 279.  
*Adoxa* 163, 269.  
**Adoxaceæ** 130, 269.  
*Ægopodium* 118, 268.  
*Æthusa* 126, 267.  
*Agrimonia* 194, 322.  
*Agropyrum* 158, 159.  
*Agrostemma* 184, 302.  
*Agrostis* 25, 144.  
*Agrostis* 145, 152.  
*Aira* 35, 148.  
*Aira* 149, 152.  
*Ajuga* 229, 244.  
*Alchemilla* 58, 323.  
*Alectorolophus* 254.  
**Algæ** 140.  
*Alisma* 151, 192.  
**Alismaceæ** 124, 191.  
*Alliaria* 271, 284.  
*Allium* 137, 194.  
*Allosorus* 409, 376.  
*Alnus* 372, 364.  
*Alopecurus* 20, 143.  
**Alsinnaceæ** 134, 303.  
*Alsine* 183, 307.  
*Alsine* 304, 307, 309.  
*Alsinella* 308.
- Alyssum* 267, 289.  
*Ammadenia* 307.  
*Anchusa* 76, 234.  
*Anchusa* 235.  
*Andromeda* 167, 339.  
*Andromeda* 340.  
*Androsace* 81, 260.  
*Anemone* 222, 277.  
*Angelica* 117, 265.  
*Antennaria* 330, 210.  
*Anthemis* 343, 205.  
*Anthericum* 191.  
*Anthoxanthum* 28, 141.  
*Anthriscus* 128, 263.  
*Anthyllis* 293, 338.  
*Antiphylla* 313.  
*Antirrhinum* 250.  
*Apargia* 226.  
*Apera* 26, 145.  
*Aquilegia* 218, 279.  
*Arabis* 280, 285.  
*Arabis* 286.  
**Araceæ** 123, 186.  
*Arbutus* 339.  
*Archangelica* 265.  
*Arctium* 217.  
*Arctophila* 152, 153.  
*Arctostaphylos* 166, 339.  
*Arenaria* 181, 307.  
*Arenaria* 308, 309.  
*Armeria* 133, 262.  
*Armoracia* 287.  
*Arnica* 332, 208.  
*Arrhenaterum* 150.  
*Artemisia* 328, 206.  
*Arundo* 142, 145—147.  
**Asclepiadaceæ** 129, 245.  
*Asclepias* 245.

\*) Pienemmät numerot osottavat sivua, isommat suku-numeroa (siv. 45—120). Vinokirjaimilla merkityt nimet osottavat toisinto-nimiiä.

*Asperugo* 78, 238.  
*Asperula* 61, 230.  
*Aspidium* 402, 373.  
*Aspidium* 374.  
*Asplenium* 406, 374.  
*Aster* 340, 211.  
*Astragalus* 295, 334.  
*Astragalus* 333.  
*Athamanta* 267.  
*Athyrium* 374.  
*Atriplex* 394, 352.  
*Avena* 83, 149.  
*Avenella* 148.  
*Avicularia* 346.  
*Azalea* 87, 340.  
*Azalea* 341.  
  
*Baldingera* 142.  
**Balsaminaceæ** 132, 291.  
*Barbarea* 272, 286.  
*Bartsia* 247, 254.  
*Bartsia* 253.  
*Batrachium* 227, 274.  
*Behen* 299.  
*Berteroa* 289.  
*Betonica* 233, 241.  
*Betula* 378, 362.  
*Betula* 364, 365.  
**Betulaceæ** 138, 362.  
*Bidens* 325, 203.  
*Bistorta* 345.  
*Blechnum* 408, 376.  
*Blitum* 105, 352.  
*Blysmus* 179.  
*Blyttia* 144.  
**Boraginaceæ** 128, 234.  
*Botrychium* 411, 376.  
*Brachypodium* 51, 157.  
*Brassica* 277, 282.  
*Brassica* 283.  
*Breca* 216.  
*Briza* 41, 155.  
*Bromus* 38, 155.  
*Bromus* 157.  
*Bryonia* 380, 310.  
*Bulliarda* 64, 316.  
*Bunias* 258, 281.  
*Bunias* 282.  
*Bunium* 268.  
*Butomus* 165, 192.  
  
*Cakile* 259, 282.  
*Calamagrostis* 23, 145.  
*Calamintha* 242, 239.

*Calla* 140, 186.  
**Callitrichaceæ** 139, 368.  
*Callitriche* 365, 368.  
*Calluna* 154, 340.  
*Caltha* 223, 278.  
*Calypso* 354, 197.  
*Camelina* 266, 289.  
*Campanula* 95, 231.  
**Campanulaceæ** 127, 231.  
**Caprifoliaceæ** 127, 230.  
*Capsella* 262, 288.  
*Cardamine* 275, 284.  
*Cardamine* 286.  
*Carduus* 322, 215.  
*Carduus* 216, 217.  
*Carex* 367, 159.  
*Carlina* 320, 215.  
*Carum* 119, 268.  
*Cassandra* 168, 340.  
*Cassiope* 340.  
*Castilleja* 250, 253.  
*Catabrosa* 44, 151.  
*Caulinia* 195.  
*Cenolophium* 115, 266.  
*Centaurea* 326, 214.  
*Cephalanthera* 357, 198.  
*Cerastium* 189, 305.  
*Cerastium* 303.  
*Cerasus* 329.  
**Ceratophyllaceæ** 139, 369.  
*Ceratophyllum* 374, 369.  
*Cerefolium* 264.  
*Chærophylllum* 129, 263.  
*Chærophyllym* 264.  
*Chamæledon* 341.  
*Chamænerion* 317.  
*Chamæorchis* 352, 199.  
*Chamæplium* 283.  
*Cheiranthus* 283.  
*Chelidonium* 210, 280.  
**Chenopodiaceæ** 138, 352.  
*Chenopodium* 104, 353.  
*Chimaphila* 341, 342.  
*Chironia* 247.  
*Chrysanthemum* 346, 203.  
*Chrysosplenium* 160, 314.  
*Cicerbita* 219.  
*Cicuta* 121, 267.  
*Cineraria* 333, 208.  
*Cinna* 144, 151.  
*Circæa* 8, 318.  
*Cirsium* 321, 216.  
**Cistaceæ** 133, 295.  
*Cistus* 296.

*Clinopodium* **243**, 240.  
*Cnicus* 216, 217.  
*Cochlearia* **265**, 289.  
*Cochlearia* 287.  
*Cœloglossum* **350**, 200.  
**Colchicaceæ** 124, 192.  
*Colpodium* **43**, 151.  
*Comarum* **206**, 325.  
**Coniferæ** 139, 365.  
*Conioselinum* 266.  
*Conium* **122**, 263.  
*Conringia* 286.  
*Convallaria* **139**, 193.  
**Convolvulaceæ** 127, 233.  
*Convolvulus* **89**, 233.  
*Corallorrhiza* **362**, 197.  
**Cornaceæ** 130, 262.  
*Cornus* **63**, 262.  
*Corydalis* **290**, 280.  
*Corylus* **377**, 355.  
*Cota* 205.  
*Cotoneaster* **197**, 321.  
*Cotula* 204.  
**Crassulaceæ** 135, 315.  
*Cratægus* **198**, 321.  
*Cratægus* 320.  
*Crepis* **317**, 220.  
**Cruciferæ** 131, 281.  
*Cryptogramma* 376.  
*Cucubalus* 299, 300.  
**Cucurbitaceæ** 134, 310.  
**Cupuliferæ** 138, 355.  
*Cuscuta* **109**, 234.  
*Cyathea* 374.  
*Cynanchum* **108**, 245.  
*Cynoglossum* **73**, 237.  
*Cynosurus* **48**, 157.  
*Cynosurus* 144.  
**Cyperaceæ** 122, 159.  
*Cypripedium* **363**, 196.  
*Cystopteris* **404**, 374.  
  
*Dactylis* **36**, 157.  
*Danthonia* 150.  
*Daphne* **153**, 349.  
*Datura* **90**, 248.  
*Dejeuxia* 145.  
*Delphinium* **216**, 279.  
*Dentaria* **274**, 284.  
*Dermasea* 312.  
*Deschampsia* 148.  
*Dianthus* **176**, 302.  
*Diapensia* **86**, 245.  
*Digraphis* **21**, 142.

**Dipsacaceæ** 127, 226.  
*Draba* **268**, 290.  
*Draba* 282.  
*Dracocephalum* **240**, 241.  
*Drosera* **134**, 299.  
**Droseraceæ** 133, 298.  
**Drupaceæ** 136, 329.  
*Dryas* **208**, 328.  
  
*Echinospermum* **74**, 237.  
*Echium* **68**, 237.  
**Elæagnaceæ** 138, 350.  
**Elatinaceæ** 134, 310.  
*Elatine* **164**, 310.  
*Elymus* **50**, 158.  
*Elymus* 159.  
*Elyna* 159.  
**Empetraceæ** 137, 343.  
*Empetrum* **383**, 343.  
*Enodium* **42**, 151.  
*Epilobium* **158**, 317.  
*Epipactis* **358**, 198.  
*Epipactis* 199.  
*Epipogium* **355**, 199.  
**Equisetaceæ** 139, 370.  
*Equisetum* **397**, 370.  
*Erica* 340.  
**Ericaceæ** 136, 338.  
*Erigeron* **341**, 212.  
*Eriophorum* **13**, 176.  
*Eriophorum* 177.  
*Erodium* **285**, 294.  
*Erophila* 290.  
*Ervum* **301**, 333.  
*Erysimum* **270**, 283.  
*Erysimum* 284, 286, 287.  
*Erythræa* **85**, 247.  
*Eupatorium* **324**, 213.  
*Euphorbia* **195**, 343.  
**Euphorbiaceæ** 137, 343.  
*Euphrasia* **245**, 254.  
*Eyrythalia* 246.  
*Eutrema* **281**, 282.  
  
*Farsetia* 289.  
*Fedia* 228.  
*Festuca* **37**, 156.  
*Festuca* 151, 153, 157.  
*Ficaria* **225**, 275.  
*Filago* **331**, 211.  
*Fluminia* **40**, 151.  
*Fragaria* **204**, 325.  
*Frangula* 312.  
*Fraxinus* **395**, 245.

**Fumaria** 289, 281.  
**Fumariaceæ** 131, 280.  
**Fungi** 140.  
  
**Gagea** 138, 194.  
**Galeopsis** 237, 242.  
**Galium** 62, 228.  
**Gentiana** 84, 246.  
*Gentiana* 247.  
**Gentianaceæ** 129, 246.  
*Geracium* 220.  
**Geraniaceæ** 133, 292.  
**Geranium** 286, 292.  
*Geranium* 294.  
**Geum** 207, 328.  
*Githago* 302.  
**Glaux** 67, 259.  
**Glechoma** 230, 241.  
**Glyceria** 45, 152.  
**Gnaphalium** 329, 209.  
*Gnaphalium* 210, 211.  
**Goodyera** 356, 199.  
**Gramineæ** 121, 142.  
**Gymnadenia** 348, 200.  
**Gypsophila** 177, 303.  
  
*Habenaria* 200.  
**Halianthus** 180, 307.  
**Haloragidaceæ** 135, 319.  
**Haloscias** 123, 266.  
**Hedysarum** 294, 333.  
**Heleocharis** 16, 178.  
*Heleochloë* 152.  
**Helianthemum** 212, 295.  
*Hepatica* 277.  
**Heracleum** 112, 264.  
**Herninium** 353, 199.  
**Herniaria** 103, 344.  
**Hesperis** 269, 284.  
*Heterotrichum* 215.  
**Hieracium** 316, 221.  
*Hieracium* 220.  
**Hierochloë** 32, 141.  
**Hippophaë** 384, 350.  
**Hippuris** 2, 319.  
**Holcus** 31, 148.  
*Holcus* 142, 148.  
*Honkenya* 307.  
*Hoppea* 208.  
**Humulus** 385, 351.  
**Hydrocharidaceæ** 125, 196.  
**Hydrocharis** 391, 196.  
*Hydrochloë* 152.  
**Hyoscyamus** 92, 248.

**Hypericaceæ** 133, 295.  
**Hypericum** 306, 295.  
**Hypochæris** 309, 226.  
*Hypopitys* 342.  
  
**Impatiens** 100, 291.  
*Intybus* 220.  
**Inula** 338, 211.  
**Iridaceæ** 125, 196.  
**Iris** 12, 196.  
**Isatis** 260, 288.  
**Isoëtaceæ** 140, 377.  
**Isoëtes** 398, 377.  
  
**Jasione** 96, 233.  
**Juncaceæ** 123, 187.  
**Juncus** 142, 188.  
**Juniperus** 392, 367.  
  
*Knautia* 227.  
**Kobresia** 366, 159.  
**Kœnigia** 53, 349.  
  
**Labiataæ** 128, 238.  
**Lactuca** 313, 219.  
*Lælia* 281.  
**Lamium** 235, 243.  
*Lapathum* 347.  
**Lappa** 319, 217.  
**Lapsana** 318, 219.  
*Larbreæ* 303.  
*Larix* 366.  
**Laserpitium** 111, 264.  
*Lastrea* 373, 374.  
**Lathræa** 244, 257.  
**Lathyrus** 299, 330.  
**Ledum** 171, 341.  
*Lejogyns* 313.  
**Lemna** 4, 186.  
**Leontodon** 310, 226.  
**Leonurus** 234, 242.  
**Lepidium** 261, 288.  
**Lepigonum** 182, 309.  
*Leucanthemum* 203.  
**Libanotis** 127, 266.  
**Lichenes** 140.  
**Ligularia** 336, 208.  
*Ligusticum* 266.  
**Liliaceæ** 124, 193.  
*Limnochloë* 177, 178.  
**Limosella** 253, 253.  
**Linaria** 254, 250.  
**Linnæa** 256, 231.  
**Linum** 284, 295.

*Listera* **359**, 198.  
*Lithospermum* **69**, 236.  
*Lithospermum* 237.  
*Littorella* **371**, 261.  
*Lobelia* **97**, 233.  
**Lobeliaceæ** 127, 233.  
*Loiseleuria* 341.  
*Lolium* **49**, 157.  
*Lonicera* **98**, 230.  
*Lotus* **304**, 334.  
*Luzula* **143**, 187.  
*Lychnis* **187**, 302.  
*Lychnis* 301.  
**Lycopodiaceæ** 140, 377.  
*Lycopodium* **399**, 377.  
*Lycopodium* 379.  
*Lycopsis* **77**, 235.  
*Lycopus* **9**, 239.  
*Lysimachia* **79**, 258.  
*Lysimachia* 259.  
*Lysimachion* 317.  
**Lythraceæ** 135, 216.  
*Lythrum* **193**, 316.  
  
*Majanthemum* **59**, 193.  
*Malachium* **188**, 303.  
*Malaxis* **361**, 197.  
*Malva* **288**, 292.  
**Malvaceæ** 133, 292.  
*Maruta* 205.  
*Matricaria* **315**, 204.  
*Medicago* **305**, 334.  
*Melampyrum* **249**, 256.  
*Melandrium* **186**, 301.  
*Melandrium* 300.  
*Melanosinapis* **273**, 283.  
*Melica* **30**, 147.  
*Melica* 151.  
*Melilotus* **302**, 335.  
*Melissa* 240.  
*Mentha* **228**, 238.  
**Menyanthaceæ** 128, 244.  
*Menyanthes* **83**, 244.  
*Monsiesia* 340.  
*Mercurialis* **389**, 344.  
*Mertensia* 237.  
*Mespilus* 321.  
*Micranthes* 312.  
*Microstylis* 197.  
*Milium* **22**, 144.  
*Mæhringia* 307.  
*Molinia* 151, 152.  
*Moneses* 341, 342.  
*Monotropia* **173**, 342.

*Montia* **54**, 344.  
*Mühlenbergia* **24**, 144.  
*Mulgedium* **315**, 218.  
**Musci** 140.  
*Myagrum* 288, 289.  
*Myosotis* **75**, 235.  
*Myosotis* 238.  
*Myosurus* **136**, 275.  
*Myrica* **386**, 365.  
**Myricaceæ** 138, 365.  
*Myriophyllum* **375**, 319.  
*Myrrhis* **130**, 263.  
*Myrtillus* **157**, 338.  
  
**Najadaceæ** 125, 195.  
*Najas* **381**, 195.  
*Nardosma* 213.  
*Nardus* **18**, 141.  
**Nartheciaceæ** 124, 191.  
*Nasturtium* **276**, 287.  
*Naumburgia* **80**, 259.  
*Neottia* **360**, 198.  
*Neottia* 199.  
*Nepeta* **232**, 241.  
*Neslia* **257**, 288.  
*Norna* 197.  
*Nuphar* **215**, 270.  
*Nymphæa* **214**, 270.  
**Nymphæaceæ** 131, 270.  
  
*Odontites* **246**, 254.  
*Enanthe* **124**, 267.  
*Oenothera* **159**, 317.  
**Oenotheraceæ** 135, 317.  
*Oglifa* 211.  
**Oleaceæ** 128, 245.  
*Onoclea* 376.  
*Ononis* **292**, 337.  
**Ophioglossaceæ** 140, 376.  
*Ophioglossum* **412**, 377.  
*Ophrys* **351**, 199.  
*Ophrys* 197.  
**Orchidaceæ** 125, 196.  
*Orchidium* 197.  
*Orchis* **347**, 201.  
*Orchis* 200.  
*Origanum* **231**, 239.  
*Ornithogalum* 194.  
*Orobis* **298**, 331.  
*Osmunda* 376, 377.  
*Oxalis* **287**, 294.  
*Oxycoccus* **156**, 339.  
*Oxyria* **145**, 349.  
*Oxytropis* **297**, 333.

*Pæonia* **219**, 280.  
*Papaver* **209**, 280.  
**Papaveraceæ** 131, 280.  
**Papilionaceæ** 136, 330.  
*Paris* **162**, 193.  
*Parnassia* **132**, 298.  
**Paronychiaceæ** 137, 344.  
*Pastinaca* **114**, 264.  
*Pedicularis* **252**, 255.  
*Peplis* **144**, 316.  
*Peristylis* 200.  
*Persicaria* 345.  
**Personatæ** 129, 249.  
*Petasites* **335**, 213.  
*Peucedanum* **113**, 265.  
*Phaca* **296**, 333.  
*Phaca* 333, 334.  
*Phalaris* 142.  
*Phellandrium* 267.  
*Phippsia* 152.  
*Phleum* **19**, 142.  
*Phoenixopus* 219.  
*Phragmites* **27**, 147.  
*Phyllodoce* **169**, 340.  
*Picea* 366.  
*Picris* **311**, 219.  
*Pimpinella* **120**, 268.  
*Pinguicula* **6**, 258.  
*Pinus* **379**, 365.  
*Pisum* 131.  
**Plantaginaceæ** 129, 261.  
*Plantago* **60**, 261.  
*Platanthera* **349**, 200.  
*Pleurogyns* 246.  
**Plumbaginaceæ** 130, 262.  
*Poa* **46**, 153.  
*Poa* 151, 152.  
**Polemoniaceæ** 128, 244.  
*Polemonium* 88, 244.  
*Polygala* **291**, 291.  
**Polygalaceæ** 132, 291.  
*Polygonatum* 193.  
**Polygonaceæ** 137, 345.  
*Polygonum* **161**, 345.  
**Polypodiaceæ** 140, 372.  
*Polypodium* **401**, 372.  
*Polypodium* 373, 374.  
*Polystichum* **403**, 373.  
**Pomaceæ** 135, 319.  
*Populus* **387**, 356.  
*Porrum* 195.  
**Portulacaceæ** 137, 344.  
*Potamogeton* **65**, 182.  
**Potamogetonaceæ** 123, 181.

*Potentilla* **205**, 326.  
*Prenanthes* 219.  
*Primula* **82**, 259.  
**Primulaceæ** 129, 258.  
*Prunella* **239**, 240.  
*Prunus* **196**, 329.  
*Pteris* **407**, 375.  
*Puccinellia* 152.  
*Pulmonaria* **71**, 237.  
*Pulsatilla* **221**, 277.  
*Pyrethrum* 204, 205.  
*Pyrola* **172**, 341.  
*Pyrus* **200**, 319.  
*Pyrus* 320.

*Quercus* **376**, 355.

**Ranunculaceæ** 131, 270.  
*Ranunculus* **226**, 270.  
*Ranunculus* 274, 275.  
*Raphanus* **283**, 281.  
*Raphanistrum* 281.  
*Rapistrum* 288.  
**Rhamnaceæ** 134, 311.  
*Rhamnus* **101**, 311.  
*Rheum* 349.  
*Rhinanthus* **248**, 254.  
*Rhodiola* **388**, 315.  
*Rhododendron* **170**, 341.  
*Rhynchospora* **15**, 179.  
*Ribes* **102**, 311.  
**Ribeslaccæ** 134, 311.  
*Rochelia* 238.  
*Roripa* 288.  
*Rosa* **202**, 321.  
**Rosaceæ** 135, 321.  
**Rubiaceæ** 127, 228.  
*Rubus* **203**, 323.  
*Rumex* **146**, 347.  
*Rumex* 349.  
*Ruppia* **66**, 182.

*Sagina* **191**, 308.  
*Sagittaria* **373**, 192.  
**Salicaceæ** 138, 356.  
*Salicornia* **1**, 354.  
*Salix* **382**, 356.  
*Salsola* **106**, 354.  
*Samolus* **94**, 259.  
*Sanguisorba* **57**, 323.  
*Sanicula* **110**, 269.  
*Satyrion* 199, 200.  
*Saussurea* **323**, 215.  
*Saxifraga* **175**, 312.

**Saxifragaceæ** 135, 312.  
*Scabiosa* 227.  
*Scandix* 263.  
*Sceptrum* 251, 255.  
*Scheuchzeria* 150, 191.  
*Schoenus* 179, 180.  
*Schollera* 339.  
*Scirpus* 17, 178.  
*Scirpus* 159, 178.  
*Scleranthus* 174, 344.  
*Scorzonera* 308, 219.  
*Scrophularia* 255, 250.  
*Scutellaria* 238, 240.  
*Sedum* 192, 315.  
*Selaginella* 400, 379.  
*Selinum* 116, 266.  
*Senecio* 337, 208.  
*Serapias* 198, 199.  
*Serratula* 215, 216.  
*Sesleria* 47, 143.  
*Setaria* 29, 144.  
*Sibbaldia* 135, 327.  
**Silenaceæ** 133, 299.  
*Silene* 178, 299.  
*Sinapis* 278, 282.  
*Sisymbrium* 282, 283.  
*Sisymbrium* 284, 286, 287.  
*Sium* 125, 268.  
*Smilacina* 193.  
**Solanaceæ** 129, 248.  
*Solanum* 93, 248.  
*Solidago* 339, 212.  
*Sonchus* 314, 218.  
*Sorbus* 199, 320.  
*Soyera* 220.  
*Sparganium* 369, 180.  
*Spathularia* 313.  
*Spergella* 308.  
*Spergula* 190, 309.  
*Spergula* 308.  
*Spergularia* 309.  
*Spiræa* 201, 328.  
*Spirodela* 186.  
*Stachys* 236, 242.  
*Statice* 262.  
*Staurogeton* 186.  
*Stellaria* 179, 303.  
*Stellaria* 305, 308.  
*Stenhammaria* 70, 237.  
*Stratiotes* 390, 196.  
*Struthiopteris* 410, 375.  
*Subularia* 264, 291.  
*Succisa* 56, 227.  
*Swertia* 246.

*Symphytum* 72, 234.  
**Synanthereæ** 126, 203.  
*Tanacetum* 327, 206.  
*Taraxacum* 312, 225.  
*Taxus* 393, 367.  
*Telmatophace* 186.  
*Thalictrum* 220, 275.  
*Thlaspi* 263, 288.  
**Thymeleaceæ** 137, 349.  
*Thymus* 241, 239.  
*Thymus* 240.  
*Thyselinum* 266.  
*Tilia* 213, 292.  
**Tiliaceæ** 132, 292.  
*Tillæa* 316.  
*Tineararia* 346.  
*Tofieldia* 148, 191.  
*Tormentilla* 327.  
*Tragopogon* 307, 219.  
*Trichera* 55, 226.  
*Trichodium* 144.  
*Trichophorum* 14, 177.  
*Trientalis* 152, 259.  
*Trifolium* 303, 335.  
*Triglochin* 147, 191.  
*Triodia* 39, 150.  
*Tripleurospermum* 344, 204.  
*Trisetum* 149.  
*Triticum* 52, 158.  
*Triticum* 157.  
*Trollius* 224, 278.  
*Turritis* 279, 286.  
*Turritis* 285.  
*Tussilago* 334, 213.  
*Typha* 368, 181.  
**Typhaceæ** 123, 180.  
**Ulmaceæ** 138, 350.  
*Ulmus* 107, 350.  
**Umbelliferæ** 130, 263.  
*Urtica* 370, 351.  
**Urticaceæ** 138, 351.  
*Utricularia* 7, 257.  
**Utriculariaceæ** 129, 257.  
*Vaccinium* 155, 338.  
*Vaccinium* 338, 339.  
*Vahlodea* 34, 148.  
*Valeriana* 10, 227.  
**Valerianaceæ** 127, 227.  
*Valerianella* 11, 228.  
*Veratrum* 149, 192.  
*Verbascum* 91, 249.



*Veronica* **5**, 251.  
*Viburnum* **131**, 227.  
*Vicia* **300**, 331.  
*Vicia* 333.  
*Vilfa* 145.  
*Vincetoxicum* 245.  
*Viola* **99**, 296.  
**Violaceæ** 133, 296.

*Viscago* 300.  
*Viscaria* **185**, 302.  
*Wahlbergella* 301.  
*Woodsia* **405**, 372.  
*Zannichellia* **364**, 181.  
*Zostera* **3**, 181.

---

## Kasvisukuin suomalaiset ja ruotsalaiset nimet.

Alaffi 186, 381.  
 Aljofas 3, 181.  
 Aljuruoho 241, 239.  
 Aljantaali 229, 244.  
 Alfiteia 218, 279.  
 Akleja 279.  
 Al 364.  
 Alm 350.  
 Alpi 79, 258.  
 Alpros 341.  
 Alwejuuri 403, 373.  
 Alptaiayrtti 240, 241.  
 Amur 144.  
 Andmat 186.  
 Angelika 265.  
 Angerwo 201, 328.  
 Anisruoho 120, 268.  
 Apel 319.  
 Apila 303, 335.  
 Arho 181, 307.  
 Arnifa 332, 208.  
 Arohumala 239, 240.  
 Aroluote 51, 157.  
 Ask 245.  
 Askört 208.  
 Asp 356.  
 Aster 211.  
 Ateri 340, 211.  
 Auranfuffa 184, 302.  
 Axsvingel 157.  
 Azalé 340.

Bandtång 181.  
 Bartsia 254.  
 Bergmynta 240.  
 Bergsöta 372.  
 Betonika 241.  
 Bingel 344.  
 Binka 212.  
 Bittermjölk 219.  
 Björk 362.

Björnfloka 264.  
 Bladtåg 187.  
 Blindnässla 242.  
 Blodtopp 323.  
 Blomris 339.  
 Blomvass 192.  
 Blåbär 338.  
 Blågull 244.  
 Blåklocka 231.  
 Blåkunt 237.  
 Blåsläst 301.  
 Blåstört 257.  
 Blåtätel 151.  
 Bockrot 268.  
 Bolmört 248.  
 Bonässla 242.  
 Boört 208.  
 Brakved 311.  
 Braxengräs 377.  
 Brudgran 200.  
 Brunell 240.  
 Brunskära 203.  
 Bullerblomster 278.  
 Bulliarda 316.

Cerast 305.

Daggkåpa 323.  
 Daggört 299.  
 Darrgräs 155.  
 Desmansblomma 199.  
 Dosta 239.  
 Draknos 241.  
 Dufkulla 259.  
 Dverglummer 379.  
 Dvergyxne 199.  
 Dyblad 196.  
 Dyört 253.

Ek 355.  
 Ekorrbär 193.

Elfexing 143.  
 Elm 158.  
 Emäffi **289**, 281.  
 En 367.  
 Eñfiö **82**, 259.  
 Fackelblomster 316.  
 Fetört 315.  
 Fibler 226.  
 Fjellsippa 328.  
 Fjellvicker 333.  
 Fingerört 326.  
 Finnbär 350.  
 Finnmyrten 340.  
 Finntätel 151.  
 Fjällarfve 309.  
 Fjällrot 257.  
 Flenört 250.  
 Flockblomster 213.  
 Flohår 369.  
 Flugblomster 250.  
 Flugyxne 199.  
 Fogelört 291.  
 Fräken 370.  
 Furu 365.  
 Fänting 303.  
 Förgätmigej 235.  
 Getnos 240.  
 Giggelsärter 334.  
 Glasört 354.  
 Glis 285.  
 Gran 366.  
 Groblad 261.  
 Grodhår 274.  
 Grådådra 289.  
 Gråmålla 352.  
 Guckuskor 196.  
 Guldpuhra 314.  
 Guldris 212.  
 Gultopp 342.  
 Gultraf 317.  
 Göklyst 302.  
 Gökskälla 277.  
 Gökärter 331.  
 Haapa **387**, 356.  
 Haariffö **191**, 308.  
 Hafre 149.  
 Haftorn 350.  
 Hagtorn 321.  
 Hajuheinä **24**, 144.  
 Haliffa **70**, 237.

Hallon 323.  
 Hammasjuuri **274**, 284.  
 Hanhenjalta **205**, 326.  
 Hanhiffi 326.  
 Hapro **145**, 349.  
 Harajuuri **362**, 197.  
 Harafanhattu **344**, 204.  
 Harmio **267**, 289.  
 Harsyra 294.  
 Hartimjan 239.  
 Hassel 355.  
 Hatiffa **190**, 309.  
 Haura **364**, 181.  
 Heifi **131**, 227.  
 Helmiffä **30**, 147.  
 Heloffi **159**, 317.  
 Helpi **21**, 142.  
 Helting 310.  
 Heruffa **315**, 218.  
 Hetefaaä **54**, 344.  
 Hexört 318.  
 Hieraffa **146**, 347.  
 Hiirenhäntä **136**, 275.  
 Hiirenporraa **406**, 374.  
 Hillsko 260.  
 Hilpi **44**, 151.  
 Hina **39**, 150.  
 Hirwenjuuri **338**, 211.  
 Hjortron 325.  
 Honingsklöfver 335.  
 Horäma **158**, 317.  
 Hufanputti **126**, 267.  
 Hülluruoho **90**, 248.  
 Humala **385**, 351.  
 Humalamieraä **109**, 234.  
 Humle 351.  
 Hundexing 157.  
 Hundfoka 263.  
 Hundrofva 310.  
 Hundtunga 237.  
 Hvitarfve 307.  
 Hvitkullor 204.  
 Hägg 330.  
 Häpytannus **100**, 291.  
 Härffi **189**, 305.  
 Härtylä **402**, 373.  
 Häränfieli **76**, 234.  
 Häränfilmä **309**, 226.  
 Hästfibler 208.  
 Hästhof 213.  
 Hästsvans 319.  
 Hökblomster 221.  
 Höstklocka 246.

Idgran 367.  
 Igelknopp 180.  
 Iliaffo 269, 284.  
 Imarre 401, 372.  
 Imiffä 71, 237.  
 Isalawa 107, 350.  
 Johannisört 295.  
 Jordrefva 241.  
 Jordrök 281.  
 Jungfrubär 324.  
 Jungfrulin 291.  
 Jungfrutoffel 197.  
 Juoluffa 338.  
 Jäffärä 329, 209.  
 Jätälä 140.  
 Jäfenheinä 174, 344.  
 Kaali 277, 282.  
 Kafveldun 181.  
 Kafvelhirs 144.  
 Kaista 17, 178.  
 Kafjiffo 359, 198.  
 Kalfleka 278.  
 Kallgräs 255.  
 Kallioinen 341, 212.  
 Kalsojuuri 141, 186.  
 Kalmus 186.  
 Kamblad 319.  
 Kambräken 376.  
 Kamexing 157.  
 Kamnäfva 294.  
 Kampasaniain 408, 376.  
 Kanantaali 272, 286.  
 Kanerwa 154, 340.  
 Kannusruoho 254, 250.  
 Kanuffa 63, 262.  
 Kardborre 217.  
 Karhiainen 322, 215.  
 Karhunheinä 148, 191.  
 Karpalo 156, 339.  
 Karwalehti 374, 369.  
 Karwasruoho 111, 264.  
 Kassöta 328.  
 Kastiffa 23, 145.  
 Kastifja 250, 253.  
 Kataja 392, 367.  
 Kattero 84, 246.  
 Katfo 122, 263.  
 Kattara 38, 155.  
 Kattfot 210.  
 Kattmynta 241.  
 Kattost 292.  
 Kaunoffi 326, 214.

Kaura 33, 149.  
 Keiholehti 373, 192.  
 Keiso 121, 267.  
 Kello 95, 231.  
 Kelluffa 207, 328.  
 Keltamo 210, 280.  
 Keltano 221.  
 Keltanunnu 316, 221.  
 Kersbär 329.  
 Ketto 317, 220.  
 Keulanfärki 297, 333.  
 Kielo 139, 193.  
 Kierto 89, 233.  
 Kihoffi 134, 299.  
 Kiloffi 106, 354.  
 Kilpuffa 391, 196.  
 Kirttiheinä 348, 200.  
 Kirs 329.  
 Kirsimarja 329.  
 Kirskäl 268.  
 Kisjanminttu 232, 241.  
 Kitterö 311, 219.  
 Kitupellawa 266, 289.  
 Kiurunkannus 290, 280.  
 Kiwiriffo 175, 312.  
 Kiwiyrtti 405, 372.  
 Klint 214.  
 Kloärter 334.  
 Kloört 239.  
 Klätt 312.  
 Knafvel 344.  
 Knappsäf 178.  
 Knapprot 198.  
 Knäfva 345.  
 Kohoffi 299.  
 Kohoruoho 178, 299.  
 Kohvete 256.  
 Koiranfieli 73, 237.  
 Koirannauris 380, 310.  
 Koiranputki 128, 263.  
 Koiranruoho 36, 157.  
 Koiso 93, 248.  
 Koivu 378, 362.  
 Konnanmarja 211, 279.  
 Konvalje 193.  
 Korallrot 197.  
 Korndådra 288.  
 Kornell 262.  
 Korskäl 275.  
 Korte 397, 370.  
 Kottanfiipi 410, 375.  
 Krasse 288.  
 Krasfi 275, 284.  
 Krepe 220.

Krusbräken 376.  
 Kråklöfver 325.  
 Kråkris 343.  
 Kuirimo 289.  
 Kuiriruoho 265, 289.  
 Kuismo 306, 295.  
 Kufonfannus 216, 279.  
 Kullero 224, 278.  
 Kumina 119, 268.  
 Kummer 328.  
 Kummin 268.  
 Kungsljus 249.  
 Kungsspira 255.  
 Kurenherne 295, 334.  
 Kurenjalja 206, 325.  
 Kurenkanerva 169, 340.  
 Kurenmieffa 12, 196.  
 Kurennoffa 285, 294.  
 Kurenpolwi 286, 292.  
 Kurentatar 53, 349.  
 Kurho 320, 215.  
 Kuusjama 98, 230.  
 Kuusi 366.  
 Kuusio 252, 255.  
 Kynsimö 268, 290.  
 Kyrvel 263.  
 Käl 282.  
 Käeffö 277.  
 Käentaali 287, 294.  
 Käentukka 187, 302.  
 Käenminttu 242, 239.  
 Käenrieska 138, 194.  
 Käensilmä 221, 277.  
 Käenwirju 363, 196.  
 Kämmeffä 347, 201.  
 Käpälä 330, 210.  
 Käringkruka 244.  
 Käremeentielä 412, 377.  
 Kärfämö 342, 205.

Kahnaruoho 398, 377.  
 Kapinhiipi 43, 151.  
 Kapinnättin 294, 333.  
 Kapinpalko 281, 282.  
 Kapinruusu 170, 341.  
 Kapinruofo 208, 328.  
 Lappljung 340.  
 Lappskära 215.  
 Pauha 35, 148.  
 Pauffa 137, 194.  
 Pauffu 248, 254.  
 Pehdoffi 349, 200.  
 Pehmus 213, 292.  
 Peiniffä 226, 270.

Pemniiffi 75, 235.  
 Peppä 372, 364.  
 Pestenlehti 334, 213.  
 Pemäffö 150, 191.  
 Piefö 399, 377.  
 Piesu 409, 376.  
 Pima 66, 182.  
 Pimaska 4, 186.  
 Lin 295.  
 Lind 292.  
 Lindådra 289.  
 Lingon 338.  
 Linnea 231.  
 Pinnunherne 298, 331.  
 Pinnunkaali 318, 219.  
 Pinnunruoho 291, 291.  
 Pinnunfilmä 160, 314.  
 Lins 333.  
 Ljung 340.  
 Lobelia 233.  
 Poiffo 404, 374.  
 Lomme 288.  
 Losta 155.  
 Puhtakaali 144, 316.  
 Puiffa 16, 178.  
 Pumme 214, 270.  
 Lummer 377.  
 Lungört 237.  
 Puoho 26, 145.  
 Pupiffa 47, 143.  
 Puste 49, 157.  
 Putuffa 262, 288.  
 Luzern 334.  
 Lysing 258.  
 Långrofva 251.  
 Länke 374.  
 Läsgräs 376.  
 Pääte 323, 215.  
 Läkeört 269.  
 Lärkträd 366.  
 Lök 194.  
 Löcrym 284.  
 Lönn 269.

Maahumala 230, 241.  
 Maamuurama 324.  
 Maapähkänä 225, 275.  
 Maarianheinä 32, 141.  
 Maariankämä 350, 200.  
 Madra 230.  
 Mailanen 305, 334.  
 Maite 304, 334.  
 Maitiainen 312, 225.  
 Maitiffa 249, 256.

Maſſaruoho **192**, 315.  
 Maſſa **394**, 352.  
 Maſwa **288**, 292.  
 Malört 206.  
 Maſſiffa **204**, 325.  
 Maratti **61**, 230.  
 Marjaſuſi **393**, 367.  
 Maruna **328**, 206.  
 Maſmalo **293**, 338.  
 Matara **62**, 228.  
 Meirami **231**, 239.  
 Meſſheinä **31**, 148.  
 Meſſiffä **302**, 335.  
 Meſſifuffa **353**, 199.  
 Meſſimarja 324.  
 Meſſjäſirveli **129**, 263.  
 Meſſjäſumina **116**, 256.  
 Meſſjänemä **355**, 199.  
 Meſſjäſtähti **152**, 259.  
 Minttu **228**, 238.  
 Miſſne 186.  
 Mjuktätel 148.  
 Mjölklomſter 226.  
 Mjölke 317.  
 Mjölkröt 265.  
 Mjölktitel 218.  
 Mjölön 339.  
 Monke 233.  
 Morſinko **260**, 288.  
 Moſſatof 177.  
 Munſſi **96**, 233.  
 Muro **105**, 352.  
 Muſrumpa 275.  
 Muſtiſſa **157**, 338.  
 Mutayrtti **253**, 253.  
 Myggblomſter 197.  
 Mynta 238.  
 Myragh 179.  
 Myſkegräs 141.  
 Myſkört 269.  
 Mälla 353.  
 Måra 228.  
 Måhſſä **400**, 379.  
 Måſiminttu **243**, 240.  
 Månty 365.  
 Måntyſuffa **173**, 342.  
 Najas 195.  
 Naſſu **278**, 282.  
 Nala **37**, 156.  
 Nattviol 284.  
 Nauhuſ **336**, 208.  
 Nauriſ 282.  
 Neckblad 270.

Neckros 270.  
 Neidententä **354**, 197.  
 Neidontſeli **68**, 237.  
 Neidonwaippa **358**, 198.  
 Neiliffä **176**, 302.  
 Nejlika 302.  
 Nenätti **276**, 287.  
 Niittuwilla **13**, 176.  
 Noidanluffo **411**, 376.  
 Nottkonen **370**, 351.  
 Nouſuruoho **261**, 288.  
 Nuffi **81**, 260.  
 Nufula **234**, 242.  
 Nunneört 280.  
 Nuottaruoho **97**, 233.  
 Nurmiffa **46**, 153.  
 Näſva 292.  
 Näſſinruoho **381**, 195.  
 Närwänä **135**, 327.  
 Näſſä **153**, 349.  
 Näſſla 351.  
 Näſtrot 198.  
 Näſſelmä **299**, 330.  
 Nätfin 330.  
 Nätä **183**, 307.  
 Odon 338.  
 Odört 263.  
 Ohdate **321**, 216.  
 Ohraſheinä **257**, 288.  
 Olvon 227.  
 Omenapuu **200**, 319.  
 Oraſſo **292**, 337.  
 Oraſſilaja **198**, 321.  
 Oraſſanmarja **59**, 193.  
 Orho **351**, 199.  
 Orhuſſa **352**, 199.  
 Ormbunke 375.  
 Ormrot 219.  
 Ormſkalle 377.  
 Orwoffi 296.  
 Orwontuffa **99**, 296.  
 Oſmantäämi **368**, 181.  
 Oxbär 321.  
 Oxel 320.  
 Oxtunga 234.  
 Paattſama **101**, 311.  
 Paddbär 279.  
 Paddſot 238.  
 Paſaputti **124**, 267.  
 Paju **382**, 356.  
 Paſſolauffa **271**, 284.  
 Paſſapſo **369**, 180.

- Palsternakka 264.  
 Pantaheinä **29**, 144.  
 Pasternakka **114**, 264.  
 Pauni t. Paunikko **64**, 316.  
 Peijooni **219**, 280.  
 Peippi **235**, 243.  
 Pellawa **284**, 295.  
 Peltosaali **11**, 228.  
 Peltowilla **337**, 208.  
 Penninggräs 254.  
 Peplis 316.  
 Perhokukka **108**, 245.  
 Pernaruoho **282**, 283.  
 Perunapuu 320.  
 Pestrot 213.  
 Pesäte **360**, 198.  
 Petonia **233**, 241.  
 Petäjä **379**, 365.  
 Peuranjuuri **127**, 266.  
 Peuranvirna **296**, 333.  
 Pietaryrtti **327**, 206.  
 Piggfrö 237.  
 Pihlaja **199**, 320.  
 Piippo **143**, 187.  
 Piirtoheinä **15**, 179.  
 Piistä **339**, 212.  
 Pil 356.  
 Pillite **237**, 242.  
 Pilört 192.  
 Pion 280.  
 Piparruutti 287.  
 Pittäpalko **280**, 285.  
 Piuru **40**, 151.  
 Plister 243.  
 Poimulehti **58**, 323.  
 Polört 245.  
 Poppel 356.  
 Pors 365.  
 Prestkrage 203.  
 Prustrot 192.  
 Pufinparta **307**, 219.  
 Puktörne 337.  
 Punakko **247**, 254.  
 Punalatwa **324**, 213.  
 Punalappu **57**, 323.  
 Pungyxne 200.  
 Punga **94**, 259.  
 Puntarpää **20**, 143.  
 Puola **155**, 338.  
 Purju **171**, 341.  
 Purtojuuri **56**, 227.  
 Putti **117**, 265.  
 Pähkinäpuu **377**, 355.  
 Pähämö **236**, 242.  
 Päiwänkukka **346**, 203.  
 Päiwännuoto **212**, 295.  
 Pärönträd 320.  
 Pärstajuuri **149**, 192.  
 Pölkkyheinä **279**, 286.  
 Raani **371**, 261.  
 Raate **83**, 244.  
 Rannitti **67**, 259.  
 Rantasaali **180**, 307.  
 Rantakukka **193**, 316.  
 Rantaputti **123**, 266.  
 Rantasappi **85**, 247.  
 Rantasinappi **259**, 282.  
 Rantawehnä **50**, 158.  
 Rantarytti **9**, 239.  
 Rast 235.  
 Rasti **77**, 235.  
 Ratamo **60**, 261.  
 Rannitti **177**, 303.  
 Raunionrytti **72**, 234.  
 Renfana 206.  
 Rentukka **223**, 278.  
 Repe 157.  
 Retikka **283**, 281.  
 Ribs 311.  
 Riddarsporre 279.  
 Rikko 312.  
 Rimpä **165**, 192.  
 Rosenrot 315.  
 Ruohoneilikka **133**, 262.  
 Ruoko **27**, 147.  
 Ruusolatwa **34**, 148.  
 Ruusjuuri **69**, 236.  
 Ruusokki **325**, 203.  
 Ruttojuuri **335**, 213.  
 Ruusu **202**, 321.  
 Ruusujuuri **388**, 315.  
 Ruusuoruho **55**, 226.  
 Rym 283.  
 Räckentraf 286.  
 Rätklor 338.  
 Råmjölk 343.  
 Råpelsö **41**, 155.  
 Rättika 281.  
 Rödkulla 254.  
 Rödmålla 352.  
 Rölleka 205.  
 Rölle **25**, 144.  
 Rönn 320.  
 Rörflen 142.  
 Rörhven 145.

Saarni **395**, 245.  
 Sahalehti **390**, 196.  
 Saftantirveli **130**, 263.  
 Salsofi 219.  
 Sammallasmeja 140.  
 Sanajassa **407**, 375.  
 Sandling 307.  
 Sanfula **110**, 269.  
 Sara **367**, 159.  
 Sarate **366**, 159.  
 Carpio **151**, 192.  
 Saunafuffa **345**, 204.  
 Saunio 204.  
 Sauramo **343**, 205.  
 Samiffa **104**, 353.  
 Senap 282.  
 Sianmarja t. -puola **166**, 339.  
 Sietfilö **87**, 340.  
 Sientä 140.  
 Sifojuuri **308**, 219.  
 Silén 299.  
 Silmäruoho **245**, 254.  
 Simafe **28**, 141.  
 Sinappi **273**, 283.  
 Siniheinä **42**, 151.  
 Sinijuuri **389**, 344.  
 Sinilatva **88**, 244.  
 Sippa 277.  
 Sirkunymä **74**, 237.  
 Skogsbräken 373.  
 Skogsfru 199.  
 Skogslilja 198.  
 Skogsviol 200.  
 Skärfrö 288.  
 Skörbjuggsört 289.  
 Slokgräs 147.  
 Slotterblomma 298.  
 Sminkrot 236.  
 Smultron 325.  
 Smånarf 308.  
 Smörblomster 223.  
 Snarrefva 234.  
 Solmuheinä **182**, 309.  
 Solvända 270.  
 Solögon 270.  
 Sorjanheinä **45**, 152.  
 Sorjanputti **125**, 268.  
 Sorjimo 152.  
 Spergel 309.  
 Spikklubba 248.  
 Spirea 328.  
 Springkorn 291.  
 Sprängört 267.  
 Sprödört 303.

Spåmanstistel 215.  
 Squattram 341.  
 Starr 159.  
 Stenbräcka 312.  
 Stenbräken 374.  
 Stjernört 303.  
 Stillfrö 283.  
 Stinknässla 242.  
 Stormhatt 279.  
 Strandfoka 266.  
 Strandling 259.  
 Strandportlake 307.  
 Strandpryl 261.  
 Strandsenap 282.  
 Strutsbräken 375.  
 Strätta 268.  
 Stäkra 267.  
 Sudenmarja **162**, 193.  
 Sufapää **48**, 157.  
 Suojuuri **113**, 265.  
 Suofuffa **167**, 339.  
 Suolafe **147**, 191.  
 Suolayrtti **1**, 354.  
 Suomuffa **244**, 257.  
 Suomuurama 325.  
 Suomyrtti **386**, 365.  
 Suopurju 341.  
 Suowalltu **361**, 197.  
 Suowehta 186.  
 Suomilla **14**, 177.  
 Svalting 192.  
 Svalört 280.  
 Svartsenap 283.  
 Svinmälla 353.  
 Svärdslilja 196.  
 Sylört 291.  
 Syra 347.  
 Syrting 349.  
 Synsläjuuri **255**, 250.  
 Säf 178.  
 Säfserot 266.  
 Sälting 191.  
 Sänfio **246**, 254.  
 Sättin **227**, 274.  
 Sötblomster 204.

Taggbräken 373.  
 Taitainen **319**, 217.  
 Tall 365.  
 Talswiffi t. Talswilehti **172**, 341.  
 Tammi **376**, 355.  
 Tandsvingel 150.  
 Tandört 284.  
 Tæfuheinä **263**, 288.



Tatar **161**, 345.  
 Terhi **78**, 238.  
 Terwaffo **185**, 302.  
 Tešmanyrtti **163**, 269.  
 Tešmä **22**, 144.  
 Tibast 349.  
 Timjan 239.  
 Timotejgräs 142.  
 Tistel 216.  
 Tjärblomma 302.  
 Tofsblomster 209.  
 Tolta 218.  
 Tomttistel 215.  
 Tomtört 219.  
 Toste 311.  
 Tranbär 339.  
 Trift 262.  
 Trollbär 248.  
 Trollört 193.  
 Try 230.  
 Tuhkapuu **197**, 321.  
 Tuhko **333**, 208.  
 Tuholatwa **115**, 266.  
 Tulenlento **331**, 211.  
 Tulitukka **91**, 249.  
 Tulkört 245.  
 Tuomi **196**, 329.  
 Turnipši 282.  
 Tusengyllen 247.  
 Tyrni **384**, 350.  
 Tyräffi t. Tyränešte **195**, 343.  
 Tyräruoho **103**, 344.  
 Täg 188.  
 Täbnye 251.  
 Tähtiö 142.  
 Tähtäheinä **19**, 142.  
 Tähtimö **179**, 303.  
 Tätyruoho **5**, 251.  
 Tätört 258.  
 Törnros 321.  
 Uddkök 333.  
 Ufonhattu **217**, 279.  
 Ufonnauris **270**, 283.  
 Ufonpalko **258**, 281.  
 Ufonparta **18**, 141.  
 Ufonputti **112**, 264.  
 Ullblomster 211.  
 Unikko **209**, 280.  
 Upukka **215**, 270.  
 Uuwana **86**, 245.

Waaran t. Waderma 324.  
 Wahteri **396**, 269.

Waiwero **168**, 340.  
 Walffu **357**, 198.  
 Vallmo 280.  
 Vallört 234.  
 Waltiffa **251**, 255.  
 Walwatti **314**, 218.  
 Wanamo **256**, 231.  
 Wariffenmarja **383**, 343.  
 Vass 147.  
 Vass-svingel 151.  
 Wata **188**, 303.  
 Vattenalös 196.  
 Vattengröe 152.  
 Vattengröna 368.  
 Vattenklöfver 244.  
 Vattenkrasse 287.  
 Vattennate 182.  
 Wattu 324.  
 Watuffa **203**, 323.  
 Wehfa **140**, 186.  
 Wehna **52**, 158.  
 Vejde 288.  
 Welholehti **8**, 318.  
 Vendelrot 227.  
 Berijuuri **194**, 322.  
 Wefialpi **80**, 259.  
 Wefiherne **7**, 257.  
 Wefifuusi **2**, 319.  
 Wefirikko **164**, 310.  
 Wefitähti **365**, 368.  
 Vial 330.  
 Vicker 331.  
 Vide 356.  
 Vifva 259.  
 Wihwilä **142**, 188.  
 Wiinapensas **102**, 311.  
 Wildhvete 158.  
 Wildkyrfvel 263.  
 Wildpersilja 267.  
 Wildsallat 219.  
 Willaffo 208.  
 Willifaafi **92**, 248.  
 Wiluffo **182**, 298.  
 Vinbär 311.  
 Vinda 233.  
 Vintergrön 341.  
 Vinterkrasse 286.  
 Viol 296.  
 Wirmajuuri **10**, 227.  
 Wirna **300**, 331.  
 Wirwilä **301**, 333.  
 Wita **65**, 182.  
 Woifuffa **310**, 226.  
 Wuohentaafi **313**, 219.

Buohennoffa **238**, 240.

Buohenputti **118**, 268.

Buoffo **222**, 277.

Vårbrådd 141.

Vårlök 194.

Vårälskling 290.

Vägört 344.

Väpling 335.

Yrne 201.

Yöfönlehti **6**, 258.

Yöwiffa **356**, 199.

Åkerbär 324.

Åkerhven 145.

Åkerkullor 205.

Åkermönja 322.

Åkersallat 228.

Åkervädd 226.

Ålandsrot 211.

Älmäruoho **264**, 291.

Ängelmä **220**, 275.

Ängsborst 141.

Ängsgröe 153.

Ängshven 144.

Ängskaffe 143.

Ängskrasse 284.

Ängsruta 275.

Ängssvingel 156.

Ängståtel 148.

Ängsull 176.

Ängsvädd 227.

Äppelträd 319.

Ärenpris 251.

Ärviä **375**, 319.

Ögontröst 254.

## Selityssanoja.

*Aaltolaitainen*, vågig, vågbräddad 15.

*aaluva*, rottelning.

*ainavehreä*, alltid grön 16.

*akana*, agnfjäll, skal 27.

*akanamainen*, agnlik 23.

*alahuuli*, nedre läpp, underläpp 26.

*alaskaareva*, nedböjd 8.

*alaskierteinen*, tillbakarullad.

*alaskääntöinen*, nedviken 19.

*alaspäinen*, tillbakaböjd 8, 25.

*alittainen*, underliggande.

*alkio*, embryo, grodd 39.

*alus*, *aluspuoli* t. *alusta*, undre bladsida, undertill 9.

*aluskorvake*, ryggstipel 16.

*aluskuori*, inre hinna, kärnhinna 38.

*aluslehti*, rotblad 9.

*ammottava*, gapande, gapformig 26.

*apulehdetön*, utan stipler 7.

*apulehdykkä*, småstipel.

*apulehti*, bladskärm, stipel 16.

*apulehtinen*, stipelbärande 7.

*aukko*, hudöppning, klyföppning.

*avauva*, uppspringande 29.

*avoin* t. *avonainen*, öppen 41.

*avosuinen*, gapande.

*Edeskääntöinen* t. *-päinen*, fram-åtriktad.

*ehedä*, odelad, hel 10.

*ehyttilaitainen*, helbräddad 10.

*eloneste*, näringssaft.

*emi*, pistill 23, 30.

*emikukka*, pistillblomma, honblomma 24.

*eminorkko*, pistill-hänge, honhänge 20.

*emipieli*, pistillfot 30.

*emähaara*, hufvudgren.

*emäruoti*, allmänt bladskäft 10, 12.

*emäsarja*, allmän blomflock 21.

*emävarsi*, stam 5.

*epähede*, falsk ståndare 41.

*epähedelmä*, falsk l. oäkta frukt 32.

*epäkantainen*, oliksidig vid basen 14.

*epäliuskainen*, ojemmt flikad 12.

*epäluukainen*, till antalet obestämd 29.

*epämarja*, oäkta bär 32.

*epämukainen*, olikformig 25.

*epämääräinen*, af obestämdt antal.

*epänelinen*, deltaformig, deltoisk 14.

*epäperäinen*, oegentlig, falsk, oäkta 4.

*epärenkainen*, med otydlig ring 43.

*epäsahainen*, ojemmt l. olikformigt sågad 11.

*epäselvä*, otydlig.

*epäsuuntainen*, oregelbunden 26.

*epätasainen*, ojemn 12.

*epävärinen*, otydligt färgad.

*epäyhtinen*, till en del fribladig, till en del sambladig 25.

*erikoppinen*, skildgömmig 34.

*erikukkanen*, småblomma 21.

*erilehtinen*, fribladig 24, 25, 41.

*erillinen* t. *erinen*, skild, fristående, fri 17, 29.

*erineuvoinen*, skildkönad 21, 23.

*erinäinen*, åtskild, aflägsnad 8.

*eriparinen*, olikparig 12.

*eripitkä*, olika hög, oliklång 29.

*erisopuinen*, diklinisk, skildkönad 24.  
*erisuuntainen*, riktad åt olika håll. 13.  
*erivärinen*, färgad (icke grön) 16, 25.  
*esialkio*, proëmbryo, förgrödd 42.

*Haarahanka*, grenvinkel, grenveck 8.  
*haarahankainen*, utgående l. fästad i grenvecket 8.  
*haarakarvainen*, med gaffelformigt klufna hår, gaffelhårig 2.  
*haaralehti*, grenblad 9.  
*haarapäinen*, tudelad, gaffellik 2.  
*haararuotinen*, dubbelt sammansatt (blad) 12.  
*haarasuoninen*, grennervig 10.  
*haaraton*, grenlös, hel, enkel 3.  
*haarikas*, mycket grenig 7.  
*haarova*, grenig 3, 7.  
*haarukka*, smågren 5.  
*haarukka-ruotinen*, mer än dubbelt sammansatt (blad) 12.  
*hahtuvamainen*, visplik 32.  
*haihtohaarainen*, upplöst i grenar, söndergrenad 7.  
*haihtöily*, etherisk olja.  
*haihtuva*, söndergrenad 7.  
*haiven*, frukttjun, fjun 35.  
*haiveninen* t. *haivenpäinen*, försedd med frukttjun, fjunbärande 35.  
*haiventöyhtö*, fjunpensel.  
*hajallinen*, spridd, strödd 8.  
*hakarainen*, vektaggig 1.  
*halkinainen* t. *halkoinen*, klufven 2, 9, 11.  
*halkopäinen*, tvåklufven 15.  
*hallava*, grågul.  
*hammaslaitainen*, tandad 11.  
*hammasluomainen*, uppspringande med tänder 37.  
*hammaspäinen*, tandad i spetsen 15.  
*hankakorvake*, bladvecksstipel, ledstipel 16.  
*hapahko*, syrlig.  
*hapsi*, rottåga, -tråd, -hår 3.  
*hapsimainen*, hårlig, hårfin 14, 32, 35.  
*hapsinen*, tågig, trådig, hårig 3.  
*haritettu* t. *harittava*, med ut-

böjd spets, utspärrad 13, 18.  
*harju*, ås 35.  
*harjuväli*, åsdäld 36.  
*harkko*, blomspira 20.  
*harsea* t. *harsu*, gles.  
*harsukarvainen*, gleshårig.  
*harva* t. *harvinainen*, fåtalig, få.  
*hattumainen*, hättelik, hattformig, fatlik 26.  
*hatuinen*, sträfluden 1.  
*hauras*, skör, spröd 6.  
*hede*, ståndare 23, 28.  
*hedekukka*, hanblomma, ståndarblomma 24.  
*hedelmä*, frukt 23, 32.  
*hedelmäys*, karpell, småfrukt 34.  
*hedenorkko*, hanhänge, ståndarhänge 20.  
*hedepohjus*, ståndarfäste 30.  
*heimo*, familj.  
*heinäkaskvi*, graminé, gräsväxt.  
*heinäkukka*, gräsblomma 27.  
*heinävarsi*, strå 6.  
*helminauhainen*, perlbandslik 3.  
*helve*, inre agnfjäll, blomfjäll 27.  
*hento* t. *hentoinen*, svag, vek 6.  
*hernekukka*, fjärlblomma, ärtblomma 26.  
*hertahtava* t. *hertakkeinen*, något hjertlik.  
*herttakantainen*, med hjertlik bas 15.  
*herttamainen*, hjertlik 14.  
*herttapuikkea*, hjertligt äggrund.  
*herttapuolikas* t. *-puoliskoinen*, halft hjertlik 15.  
*hervoton*, slak 6.  
*hienohampainen*, fintandad, småtandad 11.  
*hienonyhäinen*, finnaggad, smånaggad 11.  
*hienosahainen*, finsågad 11.  
*hillukka*, sammansatt stenfrukt 38.  
*hilse*, hinnaktigt skal.  
*hilseinen*, hinnskalig 4.  
*himed*, matt, glanslös 16.  
*hivushieno*, hårfin.  
*hohkamainen*, svampaktig 6.  
*hoikka*, späd, spenslig 6.  
*hoikkanivelinen*, smalledad 6.  
*hormi*, mjölksafts-gång.  
*huippusärmikäs*, pyramidformig.  
*huiskilo*, blomqvast 20.

*huntu*, plättsvepe, svepefjäll 42.  
*huokonen*, hudöppning, klyföppning.

*huuli*, läpp 26, 27.

*huulikkeinen*, nästan läppformig 26.

*huulimainen*, läppformig 24, 26.

*huumaava*, narkotisk, döfvande.

*höytiäisvesa*, vattenskott.

*hännykkä*, pollenmassans fot 30.

*härkilähaarainen*, kransgrenig.

*härkiläinen*, kranssittande 8.

*härmdäinen*, daggöfverdragen, dag-gig, daggblå 2.

*höytedä*, luden 1.

*höyty*, ludd.

*Idä*, växtämne, grodd 39.

*ilmajuuri*, luftrot 2.

*ilma-lokero*, luftlakun.

*ilmasiittiä*, fanerogam 23.

*imäke*, sugrör.

*irtonainen*, fristående, fri, skild, 33.

*isohampainen*, groftandad.

*isopäätäinen*, med stor ändflik 1. toppblad.

*isolahainen*, grofsågad 11.

*istukka*, fröfäste, fäste 33.

*itime*, rotämne, brodd 39.

*itiö*, spor, groddkorn 23, 41.

*itiöhedelmä*, sporangie, sporfrukt 41, 42.

*itökasvi* t. *itiöllinen*, sporväxt, groddkornsväxt 23.

*itiöpesäke*, sporangie, sporfrukt, sporgömmä 42.

*itösikidiä*, arkegonie 42.

*itsevarainen*, sjelfständig, fri 30.

*Jaettu* t. *jakoinen*, delad 11.

*jakaumaton*, odelt, hel 5.

*jakopäinen*, tvådelt 15.

*jaokkeinen*, nästan delad.

*jakso*, serie.

*jauhea* t. *jauhokas*, mjölig.

*jauhomainen*, mjöllick 39.

*johteinen*, nedlöpande 10, 32.

*jouhimainen*, tagellik.

*joustava*, elastisk.

*joustin*, springtråd 43.

*joutava*, tom. öfverflödig.

*joutoponsinen*, outbildad, ofrukt-bar (ståndare) 29.

*joutosuojus*, tomt blomskärm 17.

*jumova*, sammandragande (smak).

*juomuinen*, strimmig 2, 7.

*juovikas*, fårad 2, 7.

*jurashainen*, grofsågad 11.

*juurakko*, rotstock 5.

*juurenniska*, rothals 2.

*juuri*, rot 2.

*juurihapi*, rottåga, -tråd 3.

*juurihöyty*, rotludd 3.

*juuriperä*, rotblomskäft 19.

*juurrehtiva*, rotsläende 7.

*juurukka*, rotämne 39.

*jyväke*, hinnfrukt 34.

*jyväpidätin*, frukthållare 35.

*jyväpuolikas*, frukthalfva, delfrukt 35.

*jällä*, växtslem.

*jäläinen*, limaktig 2, 18, 39.

*jäykkä*, stadig, styf.

*Kaarehtava*, något nedböjd.

*kaareva*, bågligt böjd, båglik 7.

*kaarisuoninen*, bågnervig 10.

*kaarnainen*, korkbarkig 2.

*kahdappäinen*, tvåsidig 8.

*kahdeksa-säteinen*, åtta i kran 13.

*kahdenkertainen*, dubbel 24.

*kahdesti*, dubbelt 11.

*kahtaallinen*, tvåsidig 8.

*kaihera*, spenslig.

*kaitainen*, jemnbred 14.

*kaitavälinen*, med smal skilje-vägg, smalväggig 37.

*kaksihaarainen*, tvågrenig 2.

*kaksihalkoinen*, tvåklufven 11.

*kaksihampainen*, tvåtandad.

*kaksiheteinen*, tvåmännig.

*kaksihuulinen*, tvåläppig, läpp-formig 26.

*kaksijakoinen*, tudelt 11.

*kaksijuovainen*, tvåfårad; med två oljekanaler 1. -ränder 36.

*kaksikorvakkeinen*, tvåörad.

*kaksikotinen*, dioik, tvåbyggare 24.

*kaksikukkainen*, tvåblommig 27.

*kaksikuntainen*, diadelfisk, två-kullad 29.

*kaksikynsinen*, med två klor 26.

*kaksilaitainen*, tvåvalvig, -skalig, -väggig 32.

*kaksilehtinen*, tvåbladig 24, 25.

- siliuskainen*, tvåflikig 11.  
*silohkoinen*, tvådelad 34.  
*silokeroinen*, tvårummig 31.  
*sineuvoinen*, tvåkönad 24.  
*siosainen*, helt och hållet 1.  
 ill basen tudelt 11.  
*tsiparinen*, tvåparig 12.  
*tsipesäinen*, tvårummig 31.  
*tsipäinen*, tvåspetsad 28, 29.  
*ksiratinen* t. -rivinen, tvåradig 13, 18, 20, 29, 31.  
*ksisarvinen*, tvåhornad 29.  
*ksisirkkainen*, dikotyledon 40.  
*ksisorminen*, tvåfingrad 13.  
*ksisärmikäs*, två- 1. tveeggad 6.  
*ksitahkoinen*, tvåsidig 6, 20.  
*ksitahkulainen*, tvåskifvig.  
*ksittain* limilaskuinen, tvåsidigt omfattande hvarandra 18.  
*aksivaltias*, didynamisk, tvåväldigt 29.  
*aksivarainen* (korvake), fastväxt vid både stjelken och bladskaftet 17.  
*aksivuotinen*, tvåårig 3.  
*aksivärinen*, tvåfärgad, olikfärgad 16.  
*taksoishedelmys* t. -jyvä, dubbel skalfrukt 35.  
*kaksoismukula*, dubbel rotnöl 5.  
*kale*, yttre agnfjäll, skärmfjäll 27.  
*kalju*, glatt 1.  
*kaljustuva*, kal-, glattblifvande 1.  
*kallas*, sned 7.  
*kalpamainen*, sabelformig 14.  
*kalsea*, kort sträfhårig 1.  
*kalteva* t. *kalitto*, sned 3, 39.  
*kalvo*, hinna.  
*kalvokulmainen* t. -laitainen, hinnkantad.  
*kalvomainen*, hinnaktig 16, 34.  
*kalvosuomuinen*, hinnfjällig 2.  
*kampalaitainen*, kamffikad 12.  
*kampela*, vind 13.  
*kannas*, tvärvägg, led 36.  
*kannatuslehti*, stödblad 18.  
*kannus*, sporre 25, 27.  
*kannustettu*, försedd med sporre 25, 26.  
*kansiluomainen*, uppspringande med lock 37.  
*kanta*, bladbas 9.  
*kantahalkoinen*, fotlikt klufven 12.  
*kantajakoinen*, fotlikt delad 12.  
*kantamainen*, fotlik 12.  
*kantaosainen*, fotlikt grunddelad 12.  
*kantasuoninen*, fotnervig 10.  
*kapeakantainen*, mot basen afsmalnande 14.  
*karhea*, sträf 1.  
*karkea*, skarp 1.  
*karvahampainen*, hårtandad.  
*karvainen*, hårig 1.  
*karvaniskainen*, topphårig 3.  
*karva-otainen*, hårduddig.  
*karvatvyyttö*, hårpensel.  
*karvoitus*, hårbeklädnad, hårihet.  
*kasvanne*, årsskott, nyskott 9.  
*kasvi*, växt.  
*kasvi-alkio*, växt-embryo, växtämne, grodd 23.  
*kasviyuustuainen*, värtkasein.  
*kasvikunta*, växtriike.  
*kasviliima*, gluten, växtlim.  
*kasvineste*, växtsaft.  
*kasvio*, flora, växtbeskrifning.  
*kasvisto*, herbarium, växtsamling.  
*kasvuparinen*, tilltagande parbladigt 12.  
*katkottu*, afbruten, afbiten 15.  
*katteinen*, täckt 18.  
*kauna*, kronfjäll 27.  
*kehivä*, periferisk 39.  
*kehkerä*, konvex, kullrig 15, 21.  
*kehndäinen*, mjölig 2.  
*kehrä*, skifva (lök) 4; disk 22.  
*kehräkukkanen*, diskblomma.  
*kehrämdäinen*, cirkelrund 14; disk- 1. skifformig 21, 39.  
*kehto*, blomholk, holk 17, 21.  
*kehtokanta*, bägarfoder, skål 18.  
*kehtolehdykkä*, holkblad 17.  
*kehtosuomu*, holkfjäll 17.  
*kehä*, blomhylla, hylle 23.  
*kehäke*, fruktkrona, topprand 1.  
 -kant 35.  
*kehäkkeinen*, försedd med fruktkrona, toppkantad 35.  
*kehättön*, utan hylle, bar 24.  
*keihopuolikast* t. -puolikainen, halft spjutlik 14.  
*keikkä*, bakåtkrökt, krökt 2.  
*keikkuva*, rörlig.  
*keilamainen*, konisk, kägelformig, -lik 3, 22, 31.

*kellomainen*, klocklik 25.  
*kelmusdtainen*, strålvis delad i utskott 33.  
*kerkkä*, årsskott, nyskott 9.  
*kesi*, öfverhud, yttre frukthud 33.  
*keskellinen*, central, i midten af 39.  
*keskettävä*, centripetal 19.  
*keskieräinen*, felslagen, outvecklad.  
*keskiharju*, midtås 35.  
*keski-istukka*, fröfäste i frögömmets midt, centralfäste 33.  
*keski-istukkaisesti yksikoppinen*, enkelgömmig med centralfäste 33.  
*keskikohtainen*, central 39.  
*keskilaitainen*, fästad på midten af frögömmets väggar 33.  
*keskilaitais-kelmuinen*, utväxt i strålar från midten af frögömmets väggar 33.  
*keskipieli*, centralstift 33.  
*ketto*, öfverhud 8, 38.  
*kiehkura*, blomkrans, krans 21.  
*kiekkuva*, gungande, rörlig 29.  
*kiekurainen*, snäckvriden 36, 39.  
*kieleke*, bladsnärp, snärp 17.  
*kielekkeinen*, tunglik, bandformig 26.  
*kieloinen*, tungformig 14.  
*kieloiskukkaisto*, tungblomster 21.  
*kieloiskukkainen*, tungblomstrig 21.  
*kiemura*, rullknippe, -klase 22.  
*kierteinen*, vriden 27.  
*kierteisrihmus*, spiraltråd 43.  
*kiertosirkkainen*, med spiralformigt inrullade hjertblad 40.  
*kiertynyt*, omvriden 13.  
*kiherä*, krusig 16.  
*kiiltävä*, glänsande 16.  
*kiinnittynyt*, vidväxt.  
*kiinteinen*, tilltryckt, sluten 25.  
*kiiveksiä*, rotsläende 7.  
*kilpimäinen*, sköldformig, -lik 10.  
*kilpisuoninen*, sköldnervig, stjernnervig 10.  
*kilseinen*, stjernfjällig 2.  
*kinputtu*, hopknippad, knippvis 3.  
*kiperä* t. *kipertynyt*, hoprullad, sammanvriden.

*kiuhtava*, skiftande.  
*kivi*, kärnsten, sten 33, 38.  
*kivihedelmä*, småstenfrukt 38.  
*kivihedelmä* t. -marja, stenfrukt 34, 38.  
*kivonen*, småsten 38.  
*koheneva*, uppstigande 7.  
*koho-* t. *kohoinen*, upphöjd.  
*koiraskukka*, hanblomma 24.  
*kokonainen*, ogrenad, odelad, hel 9, 10, 24.  
*kolea*, smågropig, gropig 15.  
*kolmesti*, trefaldt, -dubbelt 11.  
*kolmihaarainen*, tregrenad 2 \*).  
*kolmikkomainen*, triangelformig 14.  
*kolmikulmainen*, trekantig 6.  
*kolmishaarukkainen*, upprepadt tregrenig 8.  
*kolmisparinen*, tredubbelt parbladig 13.  
*kolmissorminen*, tredubbelt fingrad 13.  
*kolmisdrämdinen*, treeggad 6.  
*kolmisäteinen*, tre i krans 13.  
*kolmitahkoinen*, tresidig 6.  
*komero*, enrummigt frögömme 33.  
*koppi*, frukthylle, frögömme 32.  
*koppilo*, blomkorg 21.  
*korsi*, strå 6.  
*korvakantainen*, öronflikad 15.  
*korvake*, stipel 16.  
*korvalehdykkä*, öronflik.  
*kota*, kapsel, fröhus 37.  
*kotelo*, blomhölster, hölster 17.  
*koteloinen*, försedd med hölster 20.  
*koteloton*, utan hölster, naken 20.  
*koukero* t. *koukistunut*, krökt.  
*koukeroinen*, klolik 2.  
*koukkupiikkinen*, krotaggig 1.  
*koukkusukainen*, krokborstig 1.  
*kourahalkoinen*, handklufven 12.  
*kourajakoinen*, handlikt delad, fingerdelt 12.  
*kouraliuskainen*, handflikig 12.  
*kouramainen*, handlik 12.  
*kourasuoninen*, handnervig 10.  
*kouruinen* t. *kourumainen*, rännformig 9, 15.  
*kovasukainen*, styfborstig 35.

\*) Yhdyssanoista alulla kolmi- katso: kaksi-.

*vera*, konkav, urgröpt 15.  
*vihtuva*, förvissnande 16, 24.  
*vivakuorinen*, torrskalg 34.  
*ukallinen*, blombarande.  
*ukanaihos*, blommans knoppläge 28.  
*ukanalainen*, sittande under blomman, nedanstående 31, 33.  
*ukanalku*, blomman före utsprickningen, blomknopp 23.  
*ukanpoimi*, blomknopp 23.  
*ukanpäällinen* t. *-sisäinen*, sittande öfver l. inom blomman, ofvanstående 31, 33.  
*kukinto*, blomningssätt 19.  
*kukka-akana*, inre agnfjäll, blomfjäll 27.  
*kukkaisto*, blomster 21.  
*kukkalehti*, blomblad, stödblad 9.  
*kukkamöykky*, blomkaka 22.  
*kukkapallero*, liten blomgyttring, blomnystan 20.  
*kukkaperä*, blomskaft 19.  
*kukkapesä*, blomläger 22.  
*kukkaromainen*, krukformig 26.  
*kukkaryhmä*, blomgyttring 22.  
*kukkasilmikko*, blomöga 18.  
*kukkasini*, anthokyan.  
*kukkavarsi*, gemensamt blomfäste, blomspindel 19.  
*kukkavarus*, blomsvepe.  
*kukostus*, blomställning 19.  
*kulhomainen*, tallricksformig, fatlik 26.  
*kullankarvainen* t. *-keltainen*, guldgul.  
*kulmaharju*, kantås 36.  
*kulmallinen*, vinkel-, veckliggande 40.  
*kulmikas*, kantig 6.  
*kulonkarvainen*, gulblå.  
*kumolla*, upp och nedvänd.  
*kuopurainen*, smågropig 22.  
*kuori*, omklädnad, skal 38; bark 8.  
*kuorusjyvä*, skalfrukt 35.  
*kupera*, konvex, kullrig 15.  
*kupu*, blomkalk, kalk 23.  
*kupula*, upphöjning, kula.  
*kupura*, hvälfad knöl 41.  
*kupurasulkuinen*, tillsluten af knölar 41.

*kupusukanen*, kalkborst 27.  
*kupuva*, bukig 9.  
*kureinen*, rynkad.  
*kurkka*, gurfukt 38.  
*kurtistunut*, sammanskrynkad.  
*kurttuinen*, hopskrynkad, skrynklig 15, 28.  
*kutistunut*, hopkrympt, sammantryckt.  
*kuultava*, genomskinande.  
*kuultopilkkuinen*, genomskinligt punkterad 16.  
*kuusikulmainen*, sexkantig \*).  
*kuutava*, mänlik 14.  
*kuvertunut*, hvälfad 26.  
*kyhmy*, knöl.  
*kyhmymäinen*, knöllick 26.  
*kynsi*, klo 25.  
*kypäri*, hjälm 26, 27.  
*kypäripeitteinen*, hjälmagrad 28.  
*kälpeä*, torrhinnig 16.  
*kämmekkäinen*, handformig 5.  
*käppyräinen*, snäckformigt hopsrullad 19.  
*käpy*, kotte 20.  
*kärhentelevä*, klängande.  
*kärhedä*, snärjande 1.  
*kärhi*, klänge 7, 9.  
*kärhikäs* t. *kärhinen*, klängebärande 10.  
*kärhipäinen*, klängespetsad.  
*kärkevä*, taggspetsig 15.  
*kärki*, spets, stickande udd.  
*käyrä*, inåt krökt, krökt 2.  
*käämimäinen*, spolfformig.  
*käärymäinen*, sammanrullad 19.  
*köynneliäs*, slingrande 7.  
*köynnösjuomuinen*, spiralstrimmig.  
*köynnöskaavi*, slingerväxt.  
*köynnöskierteinen*, spiralvriden.  
*köynteinen*, spiralformig.  
*Laajennettu*, utvidgad, vidgad.  
*lahko*, ordning.  
*laidallinen*, kantliggande 40.  
*laide*, bräm 24.  
*laiehtiva*, flytande, simmande 7, 13.  
*laita*, (blad) kant 9; fruktskal, valvel 32.

\*) Yhdyssanoista alulla *kuusi* kalso: *kaksi-*, *kolmi-*.



- laita-istukka*, fröfäste på valvler-  
nas sidor 33.  
*laitaistukkaisesti yksikoppinen*, en-  
kelgömmig med sido-fröfästen  
34.  
*laitajuuruinen*, med kantliggande  
rotämne 40.  
*laitakelmuihin*, utgående i strålar  
från valvlerna 33.  
*laitakukkanen*, kantblomma.  
*laitalehti*, kölblad 26.  
*laitaluomainen*, uppspringande  
längs efter valvlernas midt 37.  
*laitalähtöinen*, uppspringande ge-  
nom lösryckning från skilje-  
väggarna 37.  
*laitavierinen*, kantlagd 28; fast-  
värt vid valvlerna 33.  
*laitto*, flytande 7, 13.  
*laji*, art.  
*laki*, gomhvalf, gom 26.  
*lakki*, mössa.  
*lakkimainen*, huffik.  
*lama* t. *lamova*, utbredd 7.  
*lanttopäinen*, i spetsen intryckt  
15.  
*lapa*, bladskifva, skifva 9, 25.  
*lapakko*, blomspindel, axfäste 19.  
*lapiomainen*, spadlik 14.  
*lappeallaan*, fästad på flatsidan,  
plattliggande.  
*laskuinen*, viken.  
*latva*, topp, spets.  
*latvahinen*, i toppen l. spetsen.  
*latvalehtinen*, toppbladig.  
*latvaluomainen*, öppnande sig i  
toppen 29.  
*latvapalteinen*, toppkantad.  
*latvaperäinen*, fästad vid l. ut-  
gående från toppen l. spetsen,  
toppstående 28, 31, 32.  
*latvasilmikko*, terminalknopp, änd-  
knopp 18.  
*latvasuojus*, toppskärm 17.  
*latvavarainen*, toppalstrande 7.  
*latvavihne*, agnborst utgående från  
agnens spets 27.  
*latvus*, toppstycke.  
*lauhakarvainen*, mjukhårig.  
*lauhea*, len, mjuk.  
*lava*, blomsterfäste, fäste 21.  
*lehava*, lummig.  
*lehdennarpi* t. *-jälki*, bladärr 18.  
*lehdenkanta*, bladbas 9.  
*lehdennalaita*, bladkant 9.  
*lehdennalapa*, bladskifva 9.  
*lehdennapinta*, bladtyta.  
*lehdentä*, phyllodie, bladämne 10.  
*lehdestävä*, bladbärande 9.  
*lehdetön*, bladlös, naken 6.  
*lehdyykkä*, småblad 10.  
*lehdyykkä-korvake*, småbladsstipel,  
småstipel 16.  
*lehtevä*, mycket bladig 6.  
*lehtiaihos*, örtbladens knoppläge  
18.  
*lehtihanka*, bladveck 9.  
*lehtihankainen*, utgående från l.  
fästad i bladvecket 9.  
*lehtinen*, bladig 6.  
*lehtipari*, bladpar 12.  
*lehtiruoti*, bladskäft 9.  
*lehtisilmikko*, bladknopp 18.  
*lehtituppi*, bladslida.  
*lehtivehredä*, klorofyll, bladgröna.  
*lehtivesa*, grenskott, bladskott 3.  
*lehvakka*, bladrik, rikbladig 6.  
*lenko*, nedböjd 7.  
*levennyt*, utbredd, vidgad.  
*leveäkantainen*, bredare l. utvid-  
gad vid basen 14, 28.  
*leveäkeilamainen*, pyramidformig.  
*leveälätväinen*, bredare mot top-  
pen l. spetsen 28.  
*leveäväläinen*, med bred skiljevägg,  
bredväggig 37.  
*lieminkäinen*, finluden.  
*lientä*, småluden 1, 18.  
*lierä*, cylindrisk, valsformig, trind  
6, 22.  
*lihava*, köttig 16.  
*liikasilmikko*, adventivknopp, till-  
fällig knopp 18.  
*liisimäinen*, kliartad 2.  
*liistoinen*, bladig (lök) 4.  
*liite*, fruktfog, fog, söm 32, 35.  
*liiteluomainen*, uppspringande  
längs efter sömmanne 37.  
*liiteperäinen*, fästad längs efter  
valvlernas kanter vid frögöm-  
mets fogar 33.  
*liiteponsinen*, med sammanhän-  
gande knappar 29.  
*liitesivu*, fogyta 35.  
*liittoinen*, sammansatt 10, 34.  
*likaharmaa*, smutsgrå.  
*likeinen*, närsittande.  
*liijamainen*, liljeartad 26.

*limikierteinen*, hopvriden 28.  
*limilaskuinen*, omfattande hvar-  
 andra, ömsesidigt omfattande  
 18.  
*limitetty* t. *limittäinen*, tegellagd  
 7, 13, 18.  
*linjainen*, en linie lång.  
*lisko*, långskida, skida 37.  
*lisäjuuri*, birot 2.  
*lisäke*, bihang, utskott 26, 29.  
*lisäkehto*, biholk, foderholk 17.  
*lisäkkeinen*, försedd med bihang  
 1. utskott 25.  
*lisälehti*, bikronblad 41.  
*lisälehtinen* (terä), med bikron-  
 blad 41.  
*lisäosa*, bidel, bihang 41.  
*lisäterä*, bikrona 41.  
*lisäverho*, ytterfoder, foderhülle 17.  
*litistynyt*, plattad, vidgad 9.  
*littedä*, platt 6, 15, 22.  
*littedäinen*, hoptryckt, tillplat-  
 tad 6.  
*litu*, fröskida, skida 36.  
*liukka*, småskida, skida 37.  
*liuska*, flik 11.  
*liuskainen* t. *liuskottu*, flikig 1.  
 flikad 11.  
*lokkohedelmä*, skildgömmig frukt  
 34.  
*loikertava*, smygande 7.  
*loisio* t. *loiskasvi*, parasit, snylt-  
 växt 4.  
*loiva*, grund.  
*lojottava*, horisontel, vågrät 3, 8.  
*lokerö*, rum 29, 31.  
*lokeroinen*, bikaklik 22.  
*longertava*, krypande, smygande  
 7.  
*lonkero*, utlöpare, örtrefva, ref-  
 va 8.  
*lovipäinen*, urnupen 15.  
*lukiinverkkoinen*, spindelväfshå-  
 rig 1.  
*luokka*, klass.  
*luoma*, spricka, remna 29.  
*luotti*, märke 32.  
*lusto*, årsring.  
*luu*, kärnsten, sten 33, 38.  
*luu-hedelmä* t. -marja, stenfrukt  
 38.  
*luutava*, benhård.  
*lyhytaikuinen*, snart affallande,  
 flyktig 16, 24.

*lyyrymäinen*, lyrformig 11.  
*lühentyvä*, samstående 13.  
*lähetysten*, närmad.  
*lähinen* t. *lähinäinen*, när sittan-  
 de, tätsittande, gyttrad 8.  
*lähtevä*, affallande 35.  
*lähtövärinen*, mistande sin färg,  
 bleknande.  
*läikkivä*, skiftande.  
*länkävä*, klängande.  
*läpikantainen*, genomborrad 10.  
*läpikuultava*, genomskinlig.  
*läpiluomainen*, uppspringande  
 med små, runda öppningar 37.  
*läpipisteinen*, genomstungen 16.  
*läpipäinen*, genomborrad 32.  
*läpituutuva*, genomlöpande, fort-  
 löpande 7.  
*lövästyt*, genomborrad.  
  
*Maha*, insida, buksida 40.  
*mahasaua*, buksöm, öfre l. in-  
 sida 36.  
*makkura*, stjelk-knöl.  
*mahkurainen*, knölig 3.  
*maitias*, mjölksaftig 3.  
*maljamainen*, skålformig 25.  
*malto*, fruktkött 33, 38.  
*maltoinen*, köttig 33.  
*malvamainen*, malvaartad 26.  
*manto*, hvitved, splint 8.  
*marja*, bär 34, 37.  
*marjahedelmä*, bärfukt 34.  
*marjamainen*, bärlik 38.  
*marjakäpy*, bärkotte 20.  
*marjo*, blomsterfäste 21.  
*mehevä*, *mehinen* t. *mehuinen*, saft-  
 full, saftig 3, 6, 16, 33.  
*menehtyvä*, affallande (senare) 24.  
*mesihuokonen*, honingspor 41.  
*mesijuomu*, honingsstrimma 41.  
*mesijuova*, honingsfäll.  
*mesikannus*, honingsporre 41.  
*mesikolo*, honingsgrop 41.  
*mesineste*, nektar, honingssaft.  
*mesinystyrä*, honingsglandel 41.  
*mesipide*, honingsgömma 27.  
*mesivare*, honingsfjäll 27.  
*miekkamainen*, svärdlik 14.  
*monihaarainen*, månggrenig 7.  
*monikesäinen*, fler- l. mångårig,  
 fortvarande 16.  
*monikoppinen*, flergömmig 34.  
*monikuntainen*, mångkullad 29.

*moniperäinen*, sammansatt 2.  
*monisikiäinen*, flerklyftig, sammansatt (lök) 4.  
*monisirkkainen*, polykotyledon 40.  
*monisuuntainen*, riktad åt många håll.  
*monivartinen*, flerstjelkig 3.  
*monivuotinen*, perenn, mångårig 3 \*).  
*mukaparin*, likformigt parbladig 12.  
*mukula*, stamknöl, stjelknöl, knöl 5.  
*munanmoinen*, äggformig 16.  
*munapyöred*, omvändt bägarlik 25.  
*munuaiskantainen*, med njurlik bas 14.  
*munuaispuolikas*, halft njurlik.  
*munuamainen*, njurformig, -lik 14.  
*murea*, spröd.  
*mutka*, bugt 11.  
*mutkahampainen*, bugttandad.  
*mutkaileva* t. *mutkikas*, bugtig 11.  
*mutkalaitainen*, bugtbräddad 11.  
*mutkittileva* t. *mutkiva*, flerböjd 7.  
*muuttovädrinen*, ombytande färg.  
*mykertynyt*, hop-, sammangyttrad.  
*mykerö*, blomhufvud 21.  
*myöhdäinen*, sen 20.  
*myötdäinen*, tilltryckt 17.  
*myötäkarvainen*, tilltryckt hårig.  
*myötäsuuntainen*, framåtriktad.  
*määrätlukuinen*, af ett bestämdt antal 29.  
*möyhyä*, köttig 3, 16, 33.

*Naamattava*, maskerad, svalgformig 26.  
*naaraskukka*, honblomma 24.  
*nahkea*, läderartad 16, 34.  
*nalkinmoinen*, viggformig 16.  
*nalkkimainen*, vigglik 14.  
*napa*, fröärr, nafvelgrop, nafvel 40.  
*napalappu*, nafveltäcke, -värta 40.  
*napaniekka*, nafiad.  
*napapilkku*, nafvelfläck 40.  
*napasuoni*, frösträng, nafvelsträng 31.

*napaviiva*, nafvellinie 41.  
*nasta*, stift.  
*nauhamainen*, bandformig 6.  
*naurismoinen*, rofformig 3.  
*neilikkämäinen*, nejlikeartad 26.  
*nelihalkoinen*, fyrklufven.  
*nelihampainen*, fyrtandad.  
*nelikolkkainen*, kvadratisk.  
*nelikulmainen* t. -sivuinen, romboidisk, rutformig 14.  
*nelivalti*, fyrväldig 29 \*\*).  
*nesteveto*, saftströmning.  
*nestime*, kärl.  
*nestimekasvi*, kärlväxt 121.  
*neulamainen*, barrlik 14.  
*neulonen*, barr.  
*neuvoton* (kukka), gallblomma, könlös 24.  
*nielu*, pipöppning, svalg 24.  
*nielumainen*, svalgformig.  
*niini*, bast, innanbark 8.  
*niinisolu*, bastcell, -fiber.  
*nikarainen*, bucklig.  
*nila*, bast, innanbark 8.  
*nilasolu*, bastcell, -fiber.  
*nirhalaitainen* t. *nirhotu*, söndergnagad, gnagad 10.  
*nirkko*, smal- och något styfspetsig 15.  
*niska*, rothals 2; stället strax nedom spetsen, mellan spetsen och midten.  
*niskavihn*e, agnborst utgående strax under agnens spets 27.  
*nivel*, led 36.  
*nivel-* t. *nivelikäs*, ledad 5, 6.  
*nivelitön*, oledad 6.  
*nivelkarvainen*, med ledade hår 2.  
*nivellisko*, ledskida 37.  
*nivelpalko*, ledbalja 36.  
*nivelväli*, ledstycke.  
*nojusukainen*, plattborstig 1.  
*nokimusta*, sammetssvart, kol-svart.  
*norkko*, hänge 20.  
*notkea*, böjlig 6.  
*nouseva*, höjande sig öfver jorden, öfverjordisk 40.  
*nuijamainen*, klubbik 28, 31.  
*nulokulmainen*, trubbkantig, hörnig 6.

\*) Yhdyssanoista alulla *moni-* katso: *kaksi-* *kolmi-*.

\*\*) Yhdyssanoista alulla *neli-* katso: *kaksi-* *kolmi-*.

nuokahtava, något lutande 7.  
 nuokkuva, lutande 7.  
 nuolikantainen, pillik 15.  
 nuolipuolikas, halft pillik.  
 nuppinainen, knapplik 32.  
 nuttura, flockull 1.  
 nutturainen, flockullig 1.  
 nyhyllaitainen, smånaggad.  
 nyhämpainen, naggtandad 11.  
 nyhäinen t. nyhällaitainen, nag-  
 gad 10.  
 nykeröpitäinen, rundadt trubbig.  
 nystermä, grynlik knöl, gryn.  
 nystermöllinen t. nystervöinen, gry-  
 nig 5.  
 nysteröpillikuinen, grynprickig.  
 nysty t. nystyrä, glandel, körtel 2.  
 nystykarvainen, glandelhårig 2.  
 nystysulkuinen, tillsluten af knö-  
 lar 41.  
 nyylä, vårtlik knöl, vårta.  
 nyyläinen (nyhäinen), med vår-  
 tor, vårtig 2.  
 närvi, barkhud, öfverhud 8.  
 nöhtämäinen, filspånslik 39.

Odaton, utan spröt, sprötlös 1.  
 ohutsürmäinen, skarpeggad 6.  
 okainen, kroktaggig 2.  
 okakärkinen, taggspetsig.  
 oksa, qvist 5.  
 oksalehti, qvistblad 9.  
 olki, halmstrå, halm 6.  
 omena, äpplefrukt 38.  
 onsi t. ontelo, ihålig 22.  
 onteva, konkav, urgröpt 21, 22.  
 ora, torntagg, torn 9.  
 orakärkinen, tornspetsig.  
 oralaitainen, tornbräddad 11.  
 osainen, till basen 1. helt oeh  
 hållet delad, grunddelt 11.  
 ota, udd, spröt 2.  
 otahedelmä, sprötspetsig små-  
 frukt.  
 otainen, uddig, sprötspetsad 1.  
 -spetsig 35.  
 otapäinen, udd-, sprötspetsad 15.  
 otasahainen, uddsågad 11.

Paalujuuri, pårlot 3.  
 paanuttu, tegellagd 7, 18, 28.  
 pahkasipuli, knöllök 4.  
 pakkuroiva, korallikt förgrenad,  
 korallgrenig.

paikallinen, fläckig 2.  
 palho, ståndarsträng, sträng 28.  
 paljas, naken, bar 7, 18, 39, 41.  
 paljaspäinen, bartoppad, naken 35.  
 paljassiemeninen, gymnosperm,  
 barfröig 39.  
 paljastuva, kalblifvande 1.  
 palko, ärtbalja, balja 36.  
 palle, fruktkrona, krona 35.  
 palleroinen t. palleromainen, klot-  
 lik, -formig 5, 16, 22, 26.  
 pallistettu, kantad 39.  
 pallopuolikas t. -puoliskoinen, half-  
 klotformig.  
 palmu, hänge 20.  
 palmuvarsi, palmstam 5.  
 palomusta, svartbränd, svedd.  
 parihalkoinen, parklufven 11.  
 parihuulinen, tvåläppig.  
 parijakoinen, pardelt 12.  
 parikaarteinen, lyrformigt par-  
 delt, lyrformig 11.  
 parilehtinen, enkelt parbladig,  
 parbladig 12.  
 pariosainen (parittainen), par-  
 bladigt delad 12.  
 parivaltias, dubbelt tvåväldig 30.  
 parrakas, skäggig 1.  
 parta, skägg.  
 parvi, flock.  
 patsasmainen, pellarlik, -formig.  
 pehmeä, mjuk, vek 16.  
 pehmytpiikkinen, mjuk-, vektäg-  
 gig 1.  
 pehmytsukainen, mjukborstig 35.  
 peitetty t. peitteinen, beklädd, be-  
 täckt, täckt.  
 pensainen, buskartad 5.  
 pensastava, halft buskartad, half-  
 buske 5.  
 perhomainen, fjärillik 26.  
 perhottava, nästan fjärillik 26.  
 perunamainen, päronformig.  
 perykkä, enskildt flockskaff, små-  
 stråle 21.  
 perä, blomskaft 19.  
 peräinen, vidfästad, fästad.  
 perähaarus, smågren, -skaft 19.  
 peräkäs, skaftad 19, 21.  
 perätön, oskaftad, sittande 19, 21.  
 pesittelevä, nästan fierrummig 33.  
 pesä, rum 31.  
 pesäjakoinen, nästan tvårummig  
 36.

*pesäryhmä*, sporfruktsgyttring, fruktplätt 42.  
*pidätin*, hållare 30.  
*pielus*, torus, blomdyna, -valk 30.  
*pihkanyppynen*, kådprickig.  
*piikillinen*, taggig 1.  
*piikki*, tagg 1, 2, 9.  
*piikkisukainen*, borsttaggig 1, 36.  
*pikarimainen*, bägerlik 25.  
*pilkullinen*, prickig, punkterad 22.  
*pillikkeinen*, pip-, rörformig.  
*pillikukkaisto*, pip-, rörblomster 21.  
*pillikukkainen*, rörblomstrig 21.  
*pillikäs* t. *pillimäinen*, pipig, rörformig 6, 16.  
*pinta*, yta; öfverhud 38.  
*pintapu*, hvitved, splint 8.  
*pistinlaitainen*, nålbräddad.  
*pistinsukainen*, nålborstig 1.  
*pitkinpoimuinen*, på längden veckad, längsveckad 15.  
*pitkittävä*, obegränsad 8.  
*pitkulainen*, aflång 14.  
*pitkänpalleroinen*, aflångt klotlik, ellipsoidisk 5, 16.  
*pitkänpyöreä*, elliptisk 14.  
*pitkättävä* t. *pitkävetäinen*, utdragen.  
*piukka*, rak och styf, stadig 7.  
*pohjaheteinen*, thalamiflorus, blomdelarne utgående från fruktfästet, fästblommig 30.  
*pohjaperäinen*, fästad vid basen, nedanstående 28.  
*pohjus*, fruktfäste, fäste 30.  
*poikittain*, på tvären 29.  
*poikkilaskuinen*, viken på tvären 40.  
*poikkipiirtainen*, kringskuren 37.  
*poikkipoimuinen*, tvärveckad 15.  
*poikkipäinen*, tvärhuggen.  
*poikkitelainen*, tvärdragen, -liggande 29.  
*pömi*, utsprucken blomma, blomknopp 23.  
*poimuinen*, veckad, veckig 15, 19, 28.  
*polttinsukainen*, brännhårig 1.  
*polvittaleva*, böjd i zigzag.  
*polviwa*, knäböjd 7, 27.  
*ponneton*, felslagen (knapp) 29.

*ponsi*, ståndarknapp, knapp 29.  
*ponsikalvo*, knappband 29.  
*ponsike*, antheridie 42.  
*puhkeama*, öppnande, uppspringande 37.  
*pukea*, äggrund 14.  
*puikeapuolikas*, halft äggrund.  
*puikelo*, blomkolf 20.  
*puinen*, trädartad 5.  
*pullakka*, uppblåst 6.  
*pullakko*, flaskgömmen 27.  
*pullakkomainen*, flasklik 27.  
*pulla*, uppblåst 9.  
*pullokuorinen*, korkbarkig 2.  
*punasinervä*, violett.  
*punertava*, rödaktig.  
*puolialainen*, omkringstående 31, 33.  
*puolijohteinen*, halft nedlöpande 10.  
*puolinainen*, half 17.  
*puoliliherä*, halfttrind 6.  
*puolisepainen*, halft omfattande 10.  
*purje*, segel 26.  
*purjepeitteinen*, segellagd 28.  
*pussimainen*, punglik, påslik 25.  
*putkahtava*, hastigt 1. elastiskt uppspringande.  
*putki* t. *putkilo*, rör.  
*puuaine*, ved 8.  
*puutava*, träaktig, vedartad 3, 34.  
*puuvarsi*, kronstam 5.  
*pye* t. *pykäle*, inskränning 10.  
*pykeinen*, sprickfull 2.  
*pykälaitainen*, inskuren 11.  
*pykäläinen*, i spetsen inskuren 15.  
*pysty* t. *pystöinen*, lodrät, upp-rätt 3, 7, 8, 31.  
*pysyvä*, fortvarande, qvarsittande 24, 35.  
*pyöreä*, cirkelrund, rund 14.  
*pyöredhkö*, nästan rund 14.  
*pyöredmäinen*, rundad 14.  
*pyöryläinen*, rosett 13.  
*pyörökantainen*, med afrundad bas 14.  
*pyöröpäinen*, med afrundad spets 15.  
*pähkinä*, nöt 35.  
*pähkylä*, smånöt 34, 35.  
*pähkylähedelmä*, nötlik delfrukt 34.  
*pähkylä-litukka*, nötskida 37.

**ä, spets, topp 9.**  
**äharju**, hufvudås 36.  
**äjuuri**, hufvudrot 2.  
**ällettdäisyys**, bladtäckläge, täckläge 18.  
**ällinen**, ofvanstående 37.  
**ällittäinen**, liggande ofvan hvarandra, öfverliggande 40.  
**älllys**, *päälyyspuoli* t. *päälystä*, öfra bladsida 9.  
**ätteinen**, begränsad 19.  
**ätteeton**, obegränsad 19.  
**ättölehti**, uddblad 12.  
**ättöparinen**, parbladig med uddblad 12.  
**ölymyhky**, pollenmassa 30.  
**rajaton**, obegränsad.  
**rajattu** t. *rajaava*, begränsad 8.  
**akkojyväke**, blåsfrukt, fruktblåsa 35.  
**akkomainen**, blåslik.  
**rakoluomainen**, uppspringande med remnor 37.  
**rakovälinen**, fenestrerad, med genombruten mellanvägg 33.  
**ratasmainen**, hjulformig, -lik 13, 26.  
**raukea**, mattfärgad.  
**rengas**, ring 43.  
**rengastettu**, försedd med ring, ringad 43.  
**renkaaton**, utan ring, ringlös 43.  
**rento**, nedliggande 7.  
**resahampainen**, sargtandad.  
**resainen** t. *resaliuskainen*, sargad 12.  
**resatylppä**, sargadt trubbig.  
**rihmahoikkainen**, trådsml, -fin.  
**rihmaislehtinen**, trådbladig.  
**rihmamainen**, trådformig -lik 3.  
**rinnakkainen**, parallel 29.  
**rippedelmäys**, hängfrukt 35.  
**rippyntyläinen**, hängknölig, trådhängande 3.  
**rippuva**, hängande, nedhängande 7, 8, 13, 31.  
**ripsi**, cilie, kanthår 1.  
**ripnikarvainen**, -*laitainen* t. *ripinen*, hårbräddad, -kantad 1.  
**ripsuinen**, fransad 25.  
**ristihaarainen**, armgrenig 8.  
**ristikkäinen**, korsvis 8, 13.  
**ristimäinen**, korsformig, -lik 26, 32.

**ristittäinen**, korssittande, korsvis omfattande 18.  
**rivittäinen**, radvis 43.  
**runko**, kronstam, stam 5.  
**runsasytyinen**, mörkfull 6.  
**ruodikas**, skäftad 10.  
**ruodike**, småskäft.  
**ruoditon**, oskäftad, sittande 10.  
**ruoho** t. *ruohoke*, ört.  
**ruohonvärinen**, gräsgrön.  
**ruohovarsi**, örtstam, stjelk 6.  
**ruoko**, säfstrå 6.  
**ruosteenhoitava**, brunglänsande.  
**ruoti**, bladskäft 9.  
**ruotihaara**, bladskäft af andra ordningen 12.  
**ruotihaarukka**, bladskäft af tredje ordningen 12.  
**ruotikorvake**, bladskäftsstipel 16.  
**ruotivarainen**, med sidorna fastväxt vid bladskäftet, randstipel 17.  
**rusappa**, mörkröd.  
**ruskea**, rödbrun.  
**ruskeanmuseva**, mellanbrun.  
**rusokellervä**, brandgul.  
**rustomainen**, broskartad, hornartad 39.  
**ruusuke**, rosett.  
**ruusukkeinen**, rosettformig, rosettilik 13.  
**ruusumainen**, rosartad 26.  
**ruusunpunainen**, rosenröd.  
**ruusuosolmu**, rosett 13.  
**ruutuinen**, rutig.  
**ryhmistynyt**, hopgyttrad.  
**ryhmä**, blomgyttring 22; sporfruktsplätt.  
**ryhmdäinen**, gytttrad.  
**ryppyinen**, rynkad, skrynklig.  
**rypäle**, klase 20.  
**ryytimäinen**, aromatisk, kryddaktig, -lik.  
**rönsy**, grenskott, refva, utlöpare 3, 9.  
**rönsyävä**, alstrande grenskott 1.  
**refvor** 3.  
**röyhy**, blomvippa 20.  
**röyhyviuhko**, vipplikt knippe, tofsknippe 22.  
**Sahahampainen**, sågtandad 11.  
**sahainen** t. *sahalaitainen*, sågad 11.

- sakennut*, konsentrerad.  
*salasiittiö*, kryptogam 23.  
*samettinukkainen*, sammetsmårig 1.  
*sapenvuorinen*, gröngul, olivgrön.  
*sarja*, blomflock 21.  
*sarjahedelmäs*, umbellat-frukt,  
 hängfrukt 35.  
*sarjaperä*, flockstråle 21.  
*sarjasto*, sammansatt blomflock  
 21.  
*sarjavarus*, allmänt svepe 17.  
*sarjukka*, enskild blomflock, små-  
 flock 21.  
*sarjukkaperä*, enskild flockstråle,  
 småstråle 21.  
*sarjukkavarus*, enskildt svepe 17.  
*satunnainen*, adventiv, tillfällig  
 18.  
*sauma*, sutur, söm 32.  
*seitsensorminen*, sjufingrad 13.  
*seittinen*, spindelväfshårig 1.  
*sekahaarainen*, korallgrenig.  
*sekaneuvoinen*, olikkönad 21, 24.  
*sekasilmikko*, blandad knopp 18.  
*sekasopuinen*, mångbyggare 24.  
*sekasukuinen*, hybrid.  
*selkä*, rygg 35, 40.  
*selkäjuuruinen*, med ryggliggan-  
 de rotämne 40.  
*selkävihta*, ryggborst 27.  
*selällinen*, ryggliggande 40.  
*sepiä* t. *sepokantainen*, stjelk-  
 omfattande, omfattande 10.  
*siemen*, frö 38.  
*siemenaiha*, obefruktadt frö, frö-  
 ämne 23, 31.  
*siemenellinen*, fröväxt 23.  
*siemenetön*, ofruktbar, steril 33.  
*siemeninen*, fruktbar, fröbärande  
 33.  
*siemenkalvo*, fröhinna 31.  
*siemenkasvi*, embryofyt, fröväxt 23.  
*siemenkoppi*, frögömmе 32.  
*siemenkuori*, fröhud 38.  
*siemenlaite*, fröredning.  
*siemenvaippa*, fröhylle 41.  
*sienettävä*, svampaktig 6.  
*siikanen*, agnborst, borst 27.  
*siipi*, vinge 26.  
*siipiharju*, vingad ås 36.  
*siipihedelmä*, vingfrukt 36.  
*siipilitukka*, vingad skida 37.  
*siiro*- t. *siirottava*, upprätt ut-  
 stående, utstående 8.  
*siitehiukka*, pollen-, frömjölskorn  
 30.  
*siitektieridinen*, spermatozoid, frö-  
 tråd 42.  
*siiteneste*, befruktningsvätska 30.  
*siiteosa*, könsdel.  
*siiteponsinen*, fruktbar 29.  
*siitepöly*, pollen, frömjöl 23, 30.  
*siiteroikä*, groddhåll, rothål 40.  
*siitin*, fröredningsdel, könsdel 5,  
 19.  
*siitinlakka*, stifttäckе 32.  
*siitintukku*, könpelare 32.  
*siivikäs*, vingad 7, 9.  
*sikäin*, fruktämne 30.  
*sikäis-alainen*, fästad under frukt-  
 ämnet, nedanstående 28.  
*sikäislehti*, fruktblad 30.  
*sikäispäällinen*, fästad ofvan  
 fruktämnet, ofvanstående 28.  
*sikäisympäritsevä*, fästad om-  
 kring fruktämnet, omkringstå-  
 ende 28.  
*sikiösipuli*, löcklyfta, afvellök 4.  
*sileä*, slät 1, 36.  
*silkkimäinen*, sidenhårig, silkes-  
 luden 1.  
*silmikko* t. *silmä*, knopp, öga 18.  
*silmikko-ala*, knoppläge 18, 19.  
*silmus*, maska.  
*silmäke*, bälämne, stamknopp 40.  
*silposuoninen*, enkelnervig 10.  
*silve*, ytterbark.  
*sinihallava*, blågrå.  
*sinikiuhtava*, gredlin.  
*sinipunerva*, violett.  
*sinivihä*, blågrön.  
*sipuli*, lök 4.  
*sipulin sikiö*, löcklyftor, lökaf-  
 vel 4.  
*sirkaton*, utan hjertblad 23.  
*sirkkalehti*, hjertblad 9, 23.  
*sirkkalehtinen*, hjertbladig, koty-  
 ledon 23, 40.  
*sirkkaruoti*, hjertbladastängel 39.  
*sirkus*, hjertblad 40.  
*sirppimäinen*, skärformig 14.  
*sisäkalvo*, inre frukthuden, un-  
 derhuden 33.  
*sisuskerta*, kärnlager.  
*sisäkierteinen*, inrullad 19.  
*sisäkääntöinen*, inböjd.  
*sisäluomainen*, uppspringande  
 längs efter väggarne 37.

*äinen*, ihopböjd 8.  
*erho*, inre blomfoder 25.  
*ä*, seg 6.  
*sida* 40.  
*harju*, sidoås 36.  
*korvake*, sidostipel 16.  
*luomainen*, uppspringsnde på dan 29.  
*peräinen*, sidostående 31, 32.  
*puolinen*, halftrind 6.  
*silmikko*, sidoknopp 18.  
*æa*, oval 14.  
*nikas*, knutigt ledad, knutig 5.  
*nu*, ledknut, led 6.  
*munivelinen*, knutledad 6.  
*muväll*, mellanled 6.  
*u t. solukka*, cell.  
*ukko*, cellväf.  
*ukkoinen*, cellvärt 139.  
*husydän t. -tuma*, cellkärna.  
*rmijakoinen*, fingerdelt 13.  
*rmikkainen*, -sorminen, fingerlik, -fingerad 13.  
*rtoparin*, aftagande parbladig 12.  
*rtuva*, söndergrenad, upplöst 7.  
*ukistuva*, afsmalnande.  
*ukkakantainen*, afsmalnandemot basen 14.  
*uaton*, borstlös, bar 27.  
*uika*, lansettlik 14.  
*uikerrehtava*, något krypande.  
*uikertava*, krypande 5, 7.  
*uikulainen*, smalt lansettlik 14.  
*uippeneva*, långt tillspetsad.  
*uippo*, spetsig 15.  
*uipponghäinen*, hvassnaggad 11.  
*uipukka*, spetsad 15.  
*suka t. sukanen*, borst.  
*sukainen t. sukasinen*, borsthårig 1, 27.  
*sukalaitainen*, borstbräddad.  
*sukamainen*, borstlik 14.  
*sukapeitteinen*, omgifven af borster, borstbetäckt 27.  
*suku*, genus, slägte.  
*sulettu*, slutet, tillslutet 41.  
*sulka- t. sulkamainen*, fjäderformig 32.  
*sulkajakoinen*, fjäderlik 35.  
*sulkakarvainen*, fjäderhårig 2.  
*sulkanen*, bål-, stamämne 40.  
*sulkasuoninen*, fjädernervig 10.  
*suojukka*, småskärm 17.

*suojus*, blomskärm, skärm 17.  
*suojusakana*, yttre agnfjäll, skärmfjäll 27.  
*suojuslehti*, blomskärm, skärmblad 17.  
*suomu*, fjäll 17.  
*suomuinen*, fjällig 2, 4, 7.  
*suomukatteinen*, fjällbetäckt 41.  
*suomukka*, småfjäll, knoppfjäll 18.  
*suomukkainen*, småfjällig 7.  
*suomumainen*, fjälllik 23.  
*suomuniskainen*, fjälltoppad 3.  
*suoni*, blad-nerv, -ådra.  
*suora*, rak 2, 7, 27.  
*suoralaskuinen*, veckliggande 40.  
*supistunut*, sammandragen, hop-snörpt.  
*suppea*, hopdragen, hoptryckt.  
*suppilomainen*, trattformig, -lik 25.  
*surkastuva*, förvissnande 16.  
*suukkonen*, liten öppning, mynning.  
*suumalo*, mynning, öppning.  
*suunnallinen*, regulier, regelbunden 25.  
*suuntainen*, upprätt 39.  
*sydän*, kärna 31, 39.  
*sydänpuu*, kärnved 8.  
*sykerö*, blomsvans 20.  
*syrrittäinen*, kantstående 13.  
*syrrjättävä*, excentrisk 39.  
*syväjakoinen*, djupt delad.  
*syväсахainen*, djupsågad.  
*syy*, fiber.  
*süde*, flockskaf, stråle 21; strål-blomma 22.  
*südejakoinen*, strållikt delad 32.  
*südekukkaisto*, strålblomster 21.  
*südekukkanen*, strålblomma.  
*südekukkainen*, strålblomstrig 21.  
*südepoimuinen*, strålformigt vec-kad 15.  
*säije* (juuri), rottåga.  
*säikeinen*, tågig.  
*särmikäs t. särmäinen*, hvassidig, eggad 6.  
*säteehtivä*, strålformig 21.  
*säteikkö*, bladkrans.  
*säteettäinen*, kranssittande, strålformig 13, 18.  
*säännöitön*, utan ordning, oregelbunden.



*Taaskierteinen*, tillbakarullad.  
*taaskääntöinen*, tillbakaviken 39, 40.  
*taasliuskainen*, nedåt parflikig, rundflikad 11.  
*taaspäinen*, tillbakaböjd 8.  
*tahkulainen*, skiflik 32.  
*tahkoinen*, -sidig 6.  
*tahmea*, klibbig 2, 18.  
*takaperäinen*, omvänd 39.  
*takistava*, fastnande, snärjande 1.  
*takkuinen*, sträfhårig 1.  
*talkainen*, kölad 15.  
*talvehtiva*, öfvervintrande 3.  
*talvipteite*, vinterbetäckning.  
*tanakka*, *tanea* t. *tankea*, styf 6, 16.  
*tappimainen*, tappformig, -lik 3.  
*tasainen*, jemn, plan 19.  
*tasakantainen*, vid basen liksidig 14.  
*tasakorkea*, jemnhög.  
*tasakukkainen*, likblommig 21.  
*tasakulkeva*, parallel.  
*tasalatvainen*, jemntoppad, -hög 8, 22.  
*tasalevyinen*, jemnbred.  
*tasamukainen*, likformig 25.  
*tasaneuvoinen*, likkönad 21.  
*tasapaksu*, jemntjock.  
*tasaparinen*, parbladig utan uddblad, jemnparig.  
*tasapitkä*, lika lång, jemnhög 29.  
*tasapuolinen*, liksidig.  
*tasapäinen*, jemntoppad, jemn 21.  
*tasasoukka*, jemnbred 14.  
*tasasuoninen*, rätnervig 10.  
*terho*, ollon 35.  
*terttu*, blomklase 20.  
*terttumainen*, klaslik 22.  
*terä*, blomkrona, krona 23.  
*teräakana*, kronfjäll 27.  
*terähteinen*, kronblommig 30.  
*terälehti*, kronblad 25.  
*terämdinen*, kronlik 23, 28.  
*teräpohjus*, kronbladsfäste 30.  
*terävarainen*, vidväxt blomkronan 30.  
*terävä*, hvass.  
*tiheä*, tät 3.  
*tiukarvainen*, täthårig.  
*toishaarukainen*, klynnedelt 7.  
*toisintelo*, form.  
*toisinto*, varietet, afart.

*toiskertainen*, sammansatt 10, 20, 21.  
*toisnyhäinen*, dubbelnaggad 11.  
*toisparinen*, dubbelt parbladig 13.  
*toissahainen*, dubbelsågad 11.  
*toissorminen*, dubbelt fingrad 12.  
*toistain*, ånyo, dubbelt 11.  
*torvi*, pip, rör 24.  
*torvimainen*, pip-, rörformig 25, 32.  
*torvipertäinen*, fästad i pipen.  
*torvisisäinen*, innesluten i pipen 30.  
*tukkuinen*, knippvis 2, 13.  
*tukkusuoninen*, divergerande nervig 10.  
*tuma*, cellkärna, kärna.  
*tummanpunainen*, purpurröd.  
*tumman kellervä*, saffrangul.  
*tummanruskea*, kastanjebrun.  
*tumpura*, mökrbrun.  
*tupasjuuri*, tufrot.  
*tupastava*, tufvig, tufvad 3.  
*tupeke*, stipelslida 16.  
*tupillinen*, slidad 6.  
*tuppi*, slida 9.  
*tuppihedelmä* t. *tuppilo*, karpell-, fröhölsa, hölsa 36.  
*tuppikäärinen*, slidomfattande, slidad 6.  
*tuppiainen*, slidformig 9.  
*tupsu*, blomtofs, tofs 22.  
*tupsupäinen*, tofshårig 41.  
*turpea*, tillsvälld, uppsvälld.  
*tuuhea*, lummig.  
*tuuttimainen*, strutformig, -lik 15, 25.  
*tyhjä*, gall, könlös 24; tom 33.  
*tyhjäsuisuinen*, ihälig 22.  
*tylppä* t. *tylppäpäinen*, trubbig 15.  
*tylppänyhäinen*, trubbnaggad 11.  
*tylppäsahainen*, trubbsågad.  
*tymä*, växtlim.  
*typpäkkä*, afstympad, tvärhuggen 15.  
*typätty*, afhuggen, stympad 3.  
*tyvi* t. -*puoli*, nedre del, bas.  
*tyvivihne*, borst utgående från agnens bas 27.  
*tähkistö*, axsamling.  
*tähkylä*, småax 20, 27.  
*tähkä*, ax 20.

*tähhäsisäinen*, innesluten i axet 27.  
*tähtikarvainen*, stjernhårig 2.  
*tähtiliuskainen*, stjernflikad 12.  
*täysineuvoinen*, tvåkönad 24.  
*täysinäinen* t. -tekoinen, fullständig 17, 23.  
*täyteinen*, fylld, tät 6, 22.  
*tönkeä*, styf 6.  
*töyhtö*, vipplikt knippe, tofsknippe 22.  
*töyhtöinen*, pensellik 32.  
*Ulkokuori*, ytterbark.  
*ulkopuolinen*, på yttre sidan 39.  
*ulkoverho*, ytterfoder 17, 25.  
*uloskierteinen*, utåtrullad 19.  
*uloskohtainen*, vågrät 3.  
*ulospäinen*, utböjdt utstående, utböjd 2, 8, 13, 25.  
*ulostyvinen*, frånstående 8.  
*ulottava*, utskjutande, utlöpande 27.  
*umpiliminen*, rundtom tegellagd 13.  
*umpinainen*, hel, sluten 9.  
*umppu*, knopplök, groddlök 4.  
*umppu-ituinen*, med knopplökar, axgroende.  
*uurnamainen*, urnelik.  
*uurrettu* t. *uurteinen*, reflad 2, 7.  
*Vaillinainen*, ofullständig 23.  
*vaippa*, fröhyll 41.  
*vajanainen*, ofullständig, half 17.  
*vajaponsinen*, felslagen (knapp) 29.  
*vajounut*, insänkt 32.  
*vako*, åsdäld 36.  
*valhehede*, falsk ståndare 41.  
*valkuainen*, fröhvite 39.  
*valkuallinen*, med fröhvite 39.  
*vana*, stängel 6, 19.  
*vanukkeinen*, filtuden 1.  
*vare*, fästefjäll 18.  
*vareinen*, med fästefjäll, fjällig 22.  
*varhainen*, tidig 20.  
*variseva*, affallande, förvissnande.  
*varrellinen*, skaftadt (fruktfun), 35.  
*varsi*, örtstam, stjelk 6.  
*varsikko*, bladstam, bål 4.

*varsikko-lehti*, stamblad.  
*varsilehti*, stjelkblad 9.  
*varsimyötäinen*, tilltryckt 8.  
*varsinainen*, egentlig, äkta 4.  
*varsiarainen*, stjelkstipel 17.  
*vartalo*, stift 31.  
*vartalojalka*, stiftdyna, -fot 31.  
*vartaloputki*, stiftkanal 31.  
*varrukseton*, svepelös.  
*varullinen*, väpnad 2.  
*varus*, blomsvepe, svepe 17.  
*varuslehti*, svepeblad 17.  
*varuton*, oväpnad, naken 2.  
*vastaiskorpake*, motsstipel 16.  
*vastaisparinen*, motsatt parbladig 12.  
*vastakkainen*, motsatt 2, 8.  
*vastakohtainen*, motsidigt oregelbunden 25.  
*vastalaskuinen*, hop-, sammanviken 15, 19, 40.  
*vastapuolinen*, liggande invid hvarandra 40.  
*vastasuuntainen*, omvänd 39.  
*vastoherttainen*, omvänt hjertlik 14.  
*vastohuulikkeinen*, omvänt läppformig 26.  
*vastomunainen*, omvänt äggformig.  
*vastopuikea*, omvänt äggrund 14.  
*vastosahainen*, omvänt sågad 11.  
*vedenalainen*, nedsänkt 14.  
*vedenpöällinen*, simmande 14.  
*velto*, slak 6.  
*venho*, köl 26.  
*venhomainen*, kölad 15.  
*verho*, blomfoder, foder 23.  
*verhoheteinen*, foderblommig 30.  
*verholehti*, foderblad 24.  
*verhomainen*, foderlik 23.  
*verhovarainen*, vidväxt fodret 30.  
*verkkomainen*, nätlik.  
*verkkosuoninen*, nättådrig 4, 10.  
*vesa*, rothalsskott, skott.  
*vierellinen*, sidostående 39.  
*vierettäinen*, kantlagd 18.  
*vieriharju*, sidoås invid kanten 36.  
*vihne*, agnborst, borst 27.  
*viiruinen*, randig, randad.

*viisihalkoinen*, femklufven \*).  
*viisikerroksinen* t. -näinen, fem-  
 lagrad 19.  
*viistetty* t. *viistoinen*, snedskuren.  
*villainen*, ullhårig, ullig 1.  
*vinoherttainen*, snedt hjertlik 15.  
*vinokantainen*, med sned bas.  
*vinokierteinen*, snedvriden.  
*virnamainen*, linsformig 39.  
*vitsamainen*, vidjelig 8.  
*viuhko*, blomknippe 22.  
*vuoroparinen*, skiftevis parbla-  
 dig 12.  
*vuorottainen*, skiftevis 8.  
*vuosinainen*, enårig 3.  
*väksukainen*, hullingförsedd 1.  
*väliharju*, mellanås 35, 36.  
*välikalvo*, mellanhud 33.  
*välikelmu*, skiljevägg 31.  
*välikerta*, mellanlager 38.  
*välikkainen*, afbruten 20.  
*välikuori*, ytterbark, korklager 8.  
*väliseinäinen*, med mellanvägg  
 33.  
*välisolus*, intercellulargång.  
*väljenevä*, utvidgad.  
*väänneliäs*, klängande 7.  
  
*Ydelmä*, fruktsaft 38.  
*ydin*, märke 8.  
*yhdennoinen*, likartad.  
*yhdenvärinen*, enfärgad, likfär-  
 gad.  
*yhdiskantainen*, vid basen sam-  
 manväxt 26.  
*yhdiskoppinen*, samgömmig 34.  
*yhdislehtinen*, sambladig 24, 25,  
 41.  
*yhdismarja*, sammansatt stenfrukt  
 1. bär 38.  
*yhdispalhoinen*, med sammanväx-  
 ta strängar 29.  
*yhdisponsinen*, med sammanväxtä  
 knappar, samknappig 29.  
*yhdistynyt*, sammanväxt.  
*yhdisverho*, sambladigt foder 24.  
*yhdyskukkainen*, med sammansat-  
 ta blommor, samblommig 21.

*yhdäppäinen*, ensidig 13, 20.  
*yhtaikainen*, liktidig, samtidig 20.  
*yhteenjuottuva*, hop-, sammanfly-  
 tande 43.  
*yhteisruotinen*, sammansatt (blad)  
 12.  
*yhtenäinen*, fortlöpande, oafbru-  
 ten 6, 20, 43.  
*yhtynyt*, förenad, sammanväxt 10,  
 17, 29.  
*yhtäsuuntainen*, parallel.  
*yhtäällinen*, ensidig 13.  
*yksikertainen*, enkel 2, 7, 10, 20,  
 21.  
*yksikesäinen*, årligen affallande 16.  
*yksikoppinen*, enkelgömmig 33.  
*yksikotinen*, sambyggare 24.  
*yksikukkainen*, enblommig 27.  
*yksikuntainen*, monadelfisk, sam-  
 kullig 29.  
*yksilokeroinen*, enrummig 29, 31.  
*yksineuvoinen*, enkönad 24.  
*yksinäinen*, ensam, enstaka 13,  
 34.  
*yksipesäinen*, enrummig 31.  
*yksipuolinen*, ensidig 20.  
*yksirivinen*, enradig 18, 29, 31.  
*yksisirkkainen*, monokotyledon 40.  
*yksivartinen*, enstjelkig 3 \*\*).  
*ylihuuli*, öfverläpp 26.  
*yltävä*, utlöpande 7.  
*yltämpärinen*, omslutande 39.  
*ylöspäinen*, upprätt utstående 8,  
 25.  
*ympäriperäinen*, omkringstående  
 28.  
*ytevä*, märkefull 6.  
  
*Äikeä*, bitter, skarp.  
*äimäminen*, syllik 14.  
*äimäpäinen*, sylspetsad.  
*äitelä*, fadd, smaklös.  
*ärrettävä*, centrifugal 19.  
  
*Öllyjuomu*, öljerand.  
*öllyjuova*, oljekanal 36.  
*öllyjuovainen*, med oljekanal 36.  
*öllyjuovaton*, utan oljekanal 36.

\*) Yhdysanoista alulla viisi- katso: kaksi-, kolmi-.

\*\*) Muista sanalla yksi- alkavista katso: kaksi-, kolmi-.




## Painovirhettä ja ojennuksia.

Siv.	2 riv.	5 seisoo:	orاماista	lue:	äimämäistä
"	—	" 14	" <i>Nyhäinen</i>	"	<i>Nyyläinen</i>
"	—	" alinen	" jakauisiksi	"	jakauisiki
"	3	" 36	" <i>tiheä</i> (r. car-	"	<i>tiheä</i> (r. solida);
			nosa),	"	<i>möyheä</i> (r. carnosa),
"	4	" 31	" kalvosoppilaihin	"	kalvosoppiloihin
"	6	" 45	" runsaslehtien	"	runsaslehtinen
"	7	" 18	" <i>noukahtava</i>	"	<i>nuokahtava</i>
"	8	" 37	" retroflexus	"	retroflexus
"	12	" 5, 7	" <i>parittainen</i>	"	<i>pariosainen</i>
"	21	" 40	" epätasaisilla	"	epämukaisilla
"	24	" 41	" labatius	"	labiatus
"	25	" 10	" oramaiseksi	"	äimämäiseksi
"	27	" 9	" <i>suojuksanat</i>	"	<i>suojus-akanat</i>
"	—	" 19	" <i>kukkakanat</i>	"	<i>kukka-akanat</i>
"	28	" 39	" <i>oramaisia</i>	"	<i>äimämäisiä</i>
"	32	" 42	" koppi	"	koppia
"	33	" 30	" 72 b	"	72 a
"	35	" 7	" savikolla	"	savikalla
"	36	" 39	" <i>aukeamaton</i>	"	<i>puhkeamaton</i>
"	37	" 17	" varise	"	varisee
"	41	" 9	" <i>siemennyhästä</i>	"	<i>siemennyylästä</i>
"	61	" 28	" Savikko	"	Savikka
"	97	" 4	" <i>parittaisilla</i>	"	<i>parilehtisillä</i>
"	140	" 25, 26	" ponsikoita	"	ponsikkeita
"	219	" 23	" Ke. H. St.	"	K. St. H. S.
"	—	" 31	" U. Ke.	"	U. Ke. S.
"	232	" 6	" A. K.	"	A. K. S.

























































19




53



23



25 a



24



25 b



27



51




29




32





































Hinta: 5 markkaa, 50 penniä.







*Acme*  
Bookbinding Co., Inc.  
300 Summer Street  
Boston 10, Mass.

